

בחינות בגרות במתמטיקה: התהילה

מווטי בן-ארי

<http://www.weizmann.ac.il/sci-tea/benari/>

1.3.1 גרסה

26 במרץ 2019

מווטי בן-ארי © 2019

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).



תוכן עניינים

9	הקדמה	
11	1 תנועה והספק	
11	קייז תשע"ח מועד ב	1.1
13	קייז תשע"ח מועד א	1.2
15	חרוף תשע"ח	1.3
17	קייז תשע"ז מועד ב	1.4
20	קייז תשע"ז מועד א	1.5
22	חרוף תשע"ז	1.6
24	קייז תשע"ו, מועד ב	1.7
26	קייז תשע"ו מועד א	1.8
28	חרוף תשע"ו	1.9
30	קייז תשע"ה מועד ב	1.10
32	קייז תשע"ה מועד א	1.11
34	חרוף תשע"ה	1.12
36	קייז תשע"ד מועד ב	1.13
37	קייז תשע"ד מועד א	1.14
38	חרוף תשע"ד	1.15
40	המלצות: תנועה והספק	1.16
40	המלצות: תנועה והספק	
41	2 סדרות	
41	קייז תשע"ח מועד ב	2.1
43	קייז תשע"ח מועד א	2.2
45	חרוף תשע"ח	2.3
47	קייז תשע"ז מועד ב	2.4

49	קייז תשע"ז מועד א	2.5
51	חרוף תשע"ז	2.6
52	קייז תשע"ו מועד ב	2.7
53	קייז תשע"ו מועד א	2.8
54	חרוף תשע"ו	2.9
56	קייז תשע"ה, מועד ב.	2.10
57	חרוף תשע"ו	2.11
59	קייז תשע"ה מועד ב	2.12
60	קייז תשע"ה מועד א	2.13
61	חרוף תשע"ה	2.14
63	קייז תשע"ד מועד ב	2.15
64	קייז תשע"ד מועד א	2.16
66	חרוף תשע"ד	2.17

67

המלצות: סדרות

69	3 הסתברות	
69	קייז תשע"ח מועד ב	3.1
71	קייז תשע"ח מועד א	3.2
74	חרוף תשע"ח	3.3
75	קייז תשע"ז מועד ב	3.4
77	קייז תשע"ז מועד א	3.5
79	חרוף תשע"ז	3.6
81	קייז תשע"ו מועד ב	3.7
82	קייז תשע"ו מועד א	3.8
84	חרוף תשע"ו	3.9
86	קייז תשע"ה מועד ב	3.10
88	קייז תשע"ה מועד א	3.11
91	חרוף תשע"ה	3.12
92	קייז תשע"ד מועד ב	3.13
94	קייז תשע"ד מועד א	3.14
96	חרוף תשע"ד	3.15

98

המלצות: הסתברות

4 גיאומטריה

100	קייז תשע"ח מועד ב	4.1
103	קייז תשע"ח מועד א	4.2
105	חרוף תשע"ח	4.3
108	קייז תשע"ז מועד ב	4.4
111	קייז תשע"ז מועד א	4.5
114	חרוף תשע"ז	4.6
116	קייז תשע"ו מועד ב	4.7
118	קייז תשע"ו מועד א	4.8
120	חרוף תשע"ו	4.9
122	קייז תשע"ה מועד ב	4.10
124	קייז תשע"ה מועד א	4.11
126	חרוף תשע"ה	4.12
128	קייז תשע"ד מועד ב	4.13
130	קייז תשע"ד מועד א	4.14
132	חרוף תשע"ד	4.15

המלצות: גיאומטריה

134		
135	טראיגונומטריה	5
135	קייז תשע"ח מועד ב	5.1
138	קייז תשע"ח מועד א	5.2
140	חרוף תשע"ח	5.3
142	קייז תשע"ז מועד ב	5.4
144	קייז תשע"ז מועד א	5.5
146	חרוף תשע"ז	5.6
149	קייז תשע"ו מועד ב	5.7
152	קייז תשע"ו מועד א	5.8
154	חרוף תשע"ו	5.9
156	קייז תשע"ה מועד ב	5.10
158	קייז תשע"ה מועד א	5.11
160	חרוף תשע"ה	5.12
162	קייז תשע"ד מועד ב	5.13
166	קייז תשע"ד מועד א	5.14

168	chorf_tshuad	5.15
170	chorf_tshuad (שאלה 6)	5.16

173 המלצות: טריגונומטריה

174	חדו"א שאלה 6	6
174	קייז tshuach moud b	6.1
176	קייז tshuach moud a	6.2
178	chorf tshuach	6.3
181	קייז tshuaz moud b	6.4
183	קייז tshuaz moud a	6.5
186	chorf tshuaz	6.6
188	קייז tshuao moud b	6.7
190	קייז tshuao moud a	6.8
193	chorf tshuao	6.9
196	קייז tshuah moud b	6.10
198	קייז tshuah moud a	6.11
200	chorf tshuah	6.12
202	קייז tshuad moud b	6.13
204	קייז tshuad moud a	6.14
206	chorf tshuad	6.15

208	חדו"א שאלה 7	7
208	קייז tshuach moud b	7.1
210	קייז tshuach moud a	7.2
212	chorf tshuach	7.3
214	קייז tshuaz moud b	7.4
216	קייז tshuaz moud a	7.5
218	chorf tshuaz	7.6
220	קייז tshuao moud b	7.7
222	קייז tshuao moud a	7.8
224	chorf tshuao	7.9
226	קייז tshuah moud b	7.10
228	קייז tshuah moud a	7.11
230	chorf tshuah	7.12

232	קייז תשע"ד מועד ב	7.13
234	קייז תשע"ד מועד א	7.14
236	חורף תשע"ד	7.15
238	חדו"א שאלת 8	
238	קייז תשע"ח מועד ב	8.1
240	קייז תשע"ח מועד א	8.2
242	חורף תשע"ח	8.3
244	קייז תשע"ז מועד ב	8.4
246	קייז תשע"ז מועד א	8.5
248	חורף תשע"ז	8.6
250	קייז תשע"ו מועד ב	8.7
252	קייז תשע"ו מועד א	8.8
254	חורף תשע"ו	8.9
256	קייז תשע"ה מועד ב	8.10
258	קייז תשע"ה מועד א	8.11
260	חורף תשע"ה	8.12
262	קייז תשע"ד מועד ב	8.13
264	קייז תשע"ד מועד א	8.14
266	חורף תשע"ד	8.15
267	המלצות: פרקים 6, 7, 8	
271	א' אין לסמוך על איורים	
272	ב' ייצוג גרפי של משפטי בגיאומטריה	
274	ג' מעגל היחידה	
274	ריבועים של מעגל היחידה	ג.1
275	חלוקת מעגל היחידה ל-8 קטעים	ג.2
275	סינוס וקוסינוס של זוויות הגדלות מ- 90°	ג.3
277	הסינוס והקוסינוס של 30° ו- 60°	ג.4
279	סינוס וкосינוס של $(90 - \theta)$	ג.5
279	סינוס וкосינוס של 2θ	ג.6

הקדמה

מתמטיקאים ידועים לטענה כי הם מפרטים מוסדרות וברורות, ומסתירים את העבודה של הניריות שלהם מלא עד אפס מקום בניסיונות שהובילו למבאות טונמים וטעויות. תלמידים לא נחשפים **لتהליכיים** למציאת הפתרונות, וזה עלול למסכל אותם. הם צריכים למדוד לא התייחס כאשר הם לא מצליחים לפתרו בעיות בנסיון הראשון. לא חסרים פתרונות של בחינות הבגרות, אבל גם הם "נקים" ללא ניסיונות שלא צלחו ודינמיים על דרכי החשיבה שהובילו לפתרונות.

חוברת זו מכילה פתרונות לבחינות הבגרות שאלון 806 בשנים תשע"ד עד תשע"ח. אני משתמש לתאר את חוויתי בחיפוש פתרונות, כגון הבנה מוטעית של ניסוח השאלה, מלכודות שנפלתי בהם ופתרונות חלופיים שמצאת. בסוף כל פרק רשמי המלצות שגיבשתי לאורך העבודה.

השוותי את הפתרונות שלי לפתרונות המופיעים בראשת. עם זאת הפתרונות הם שלי ובסגנון שלי. אני קיצרתי בכתיבת חישובים ברורים ואני משתמש תמיד שדריכים מקובלות להציג פתרונות, כגון טבלאות בעיות תנעה. אני חסיד גדול של תרשימים באמצעות צייר חוני לפתרון בעיות במתמטיקה, ולא חסhti בתרשימים מדוייקים.

תנוועה והספק

הצעה של אבטל אלבוייס-כהן כיוון ATI לפתח את הפתרון של בעיות הללו באמצעות תרשימים דו-ממדיים. מצאתי שהתרשיים מאוד עזריםiziai הקשרים בין קטיעי התנוועה ובכתיבת הנוסחאות. ניתן להיעזר בתרשימים דו-ממדיים גם בעיות הספק שיש להן מבנה דומה בעיות תנעה. התרשימיים קלים מאוד לציר ומעילים גם אם קני המידה בכלל לא מדוייקים, כך שניתן להשתמש בהם כאשר פותרים בחינות.

הציר האופקי בתרשימיים הוא ציר הזמן, והציר האנכי הוא ציר המרחק בעיות תנעה וציר העבודה בעיות הספק. היתרון של ייצוג זה הוא שמהירות והספקים מוצגים כSHIPMENTS של הקווים. ככל שהמהירות או הפסק גובה יותר, הקו תלול יותר. לכל דמות (מכונית, סירה, צבע, וכדומה) צירתי קו עبور כל קטיעת תנעה או בעבודה.

המאמר "פתרונות שונים בעיות הספק באמצעות גרפיים" מעת אבטל אלבוייס-כהן וג'יסון קופר. על"ה גיליון 51, מרץ 2015, עמ' 19-14, מביא פתרונות גיאומטריים עبور בעיות הספק.

סדרות

לדעתי, שאלות הסדרות הן כדי קלות לפתרו, כדי בסופו של דבר יש יחסים ברורים בין איברים עוקבים בסדרה (חשבונית או הנדסית), ובין האיברים לטוכם. עם זאת, מצאתי שקל מאד לטעות, למשל, אם מבלבלים בין האינדקסים של איברי הסדרה לבין ערכיהם.

הסתברות

הчисובים בעיות עם הסתברות פשוטים, אבל קשה לתרגם את העלילה המילולית למשוואות הנכונות. הדבר נכון במיוחד כאשר השאלה שואלת על הסתברות מותנית. מצאתי עשר רב של ביטויים המכונים להסתברות מותנית (ראו בסעיף המלצות), וזה לא מקל על הפתרון.

קושי נוסף נובע מהתמודדות שיש שתי דרכי שונות לארגן את המידע הנוכחי והחישובים: בטבלה או בעץ. שאלת על מהו שהוא "גם א וגם ב" מכוון לחיתוך של הסתברויות, ומכוונת לטבלה, לעומת שאלת המנוסחת "א ואחר כך ב" מכוונת למכלפה של הסתברויות הcadai להציג בעץ.

גיאומטריה וטריגונומטריה

הפתרונות מבאים ציטוטים של המשפטים המתקדמיים מתוך רשיימות המשפטים שהתלמידים רשאים לצטט ללא הוכחה. כל אחד זוכר ללא קושי שלושים חופפים לפי צ.צ.צ., אבל קשה יותר לאזכור משפטים כגון שוויין הזווית בין משיק למיתר.

יש חשיבות רבה לצירורים גדולים עליהם ניתן לרשום ערכיהם, נעלמים ובניות עזר בצורה ברורה. אני ממליץ להכין צירורים שונים לסעיפים שונים של אותה שאלה.

חשבון דיפרנציאלי וAITGERLI

בחדו"א שיטות ברורות לחישוב תחומי הגדרה, נקודות קיצון ואסימפטוטות, אבל לעיתים החישובים ארוכים. חשוב לדikk כי שגיאה בסעיף אחד תגרום לשגיאות בהמשך.

הספר "לימוד ולימד אנליזה" מציג את הנושא בצורה מקיפה ביותר, ומהווה משאב חשוב למורה.

<http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/>

Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Analiza.htm.

נספחים

נספח א' מכיל "הוכחה" ידועה שכל מושולש שווה שוקיים. ההוכחה מראה שתרשימים אינם תחליב להוכחה.

נספח ב' מכיל צירורים צבעוניים של מספר משפטי מתקדמיים בגיאומטריה. בנושא כל כך מוחשי קל יותר לזכור צירור ולא תיאור מילולי מסורבל. כדאי להדפיס עמודים אלה בדף.

נספח ג' עוסק במעגל היחידה. כאשר אני פותר בעיה בטריגונומטריה, אני מצייר בצד תרשימים של מעגל היחידה כדי לראות את הקשרים של הפונקציות הטריגונומטריות של זוויות שונות. למשל, לא כדאי לזכור זהויות כגון $\sin(\theta - 180^\circ) = -\sin(\theta)$, אלא לשחזר אותן מתרשים של מעגל ייחידה.

הבעת תודה

אני מודעה לד"ר רונית בר-בסט לוי ולד"ר אביטל אלבוייס-כהן שליוו אותי בצלילה למתמטיקה של בתים ספר תיכוניים, חמישים שנה לאחר ססיימת את לימודיו!

פרק 1 תנועה והספק

1.1 קיז תשע"ח מועד ב


המרחק מביתה של רננה עד בית הספר הוא 500 מטרים. רננה יצאתה מביתה אל בית הספר והלכה במהירות קבועה. 3 דקות לאחר שיצאה מביתה, יצא אביה בעקבותיה כדי להביא לה כריך שכחה. הוא רץ במהירות קבועה של 2.5 מטרים לשנייה.

כאשר הגיע האב לרננה הם עמדו ושוחחו במשך 2 דקות והוא נתן לה את הכריך, ולאחר מכן הלך כל אחד מהם לדרכו – רננה לבית הספר והאב בחזרה אל הבית. רננה המשיכה ללכת באותה מהירות שהלכה לפני כן, והאב הלך במהירות של 1.5 מטרים לשנייה.

אביה של רננה הגיע אל הבית לבדוק באותו הזמן שהגיעה רננה אל בית הספר.

א. חשב את מהירות ההליכה של רננה.

ב. כמה זמן עבר מן הרגע שרננה יצאתה מביתה ועד שהגיעה אל בית הספר?



נסמן: v = מהירות ההליכה של רננה, t = הזמן עד למפגש בין רננה לאביה, t' = הזמן מהפרידה בין רננה לאביה ועד שניהם מגיעים ליעדם.

מהתרשים אפשר לראות שוווון בין מרחקים: רננה ואביה עד למפגש, אביה אל המפגש ובחזרה, וכן שהמרחק לבית הספר מורכב משני קטעים שרננה הלכה. תחילת נשווה את המרחקים שאביה עבר מהבית עד למפגש ובחזרה כדי לקבל את t' כפונקציה של t :

$$\begin{aligned} \frac{5}{2}t &= \frac{3}{2}t' \\ t' &= \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{2}t = \frac{5}{3}t. \end{aligned}$$

סעיף א

עד למפגש המרחקים שעוברים רננה ואביה שווים:

$$(1.1) \quad v(t + 180) = \frac{5}{2}t.$$

אנו זוקקים לשתי משוואות עם שני הנעלמים כדי למצוא את t . אי-אפשר למצוא משווהה שנייה מהנתונים מהמפגש עד ליעדים, כי המרחקים והמהירותו לא בהכרח שווים. במקומות זה נמצא דרך אחרת להשוות את המרחק שעוברים רננה ואביה עד למפגש.

עבור אבא נשתמש באותו ביטוי $\frac{5}{2}t$ שהשתמשנו במשווהה 1.1. עבור רננה נשים לב שניתן לחשב את המרחק כהפרש בין המרחק מהבית לבית הספר (500) לבין המרחק שרננה עוברת מהמפגש ועד בית הספר (vt') :

$$(1.2) \quad \frac{5}{2}t = 500 - v\left(\frac{5}{3}t\right).$$

ממשוואה 1.1 ניתן למצוא משווהה עבור t :

$$(1.3) \quad t = \frac{360v}{5 - 2v}.$$

נציב את המשווהה 1.3 ב- 1.2:

$$500 - \frac{5}{3}v\left(\frac{360v}{5 - 2v}\right) = \frac{5}{2}\left(\frac{360v}{5 - 2v}\right)$$

נפחס את המשווהה ונקבל משווהה ריבועית עבור v :

$$\begin{aligned} 6v^2 + 19v - 25 &= 0 \\ (v - 1)(6v + 25) &= 0. \end{aligned}$$

המהירות חייבת להיות חיובית ולכן הפרטון היחיד הוא $v = 1$.

סעיף ב

ממשוואה 1.1 קיבל $120 = t$ ונסכם את פרקי הזמן על הציר האופקי בתרשים:

$$180 + 120 + 120 + \frac{5}{3} \cdot 120 = 620$$


שניות.

הערה

שימושו לב למלכודת שקל ליפול לתוכה: הזמן נתונים בדקות והמהירותו נתונות במטרים שנייה!

1.2 קיז תשע"ח מועד א

- שני רוכבי אופניים, אמיר ומשה, יצאו בשעה 6:00 זה לכיוונו של זה. אמיר רכב ב מהירות קבועה מעיר א לעיר ב, ומשה רכב ב מהירות קבועה מעיר ב לעיר א. אמיר ומשה עברו זה על פני זה והמשיכו כל אחד ליעדו. אמיר הגיע לעיר ב שעתים אחרי שעבר על פני משה, ואילו משה הגיע לעיר א 8 שעות אחרי שעבר על פני אמיר.
- א.** באיזו שעה עברו אמיר ומשה זה על פני זה?
- נסמן את מהירותם נסיעתו של אמיר באות V .
 בדיק כאשר עברו אמיר ומשה זה על פני זה יצא יסמין, רוכבה על אופנו, מעיר א לעיר ב, ב מהירות קבועה.
 נתון שישין הגיע לעיר ב אחרי אמיר, אך לפני שהוא הגיע לעיר א.
- ב.** (1) הבע באמצעות V את המרחק בין עיר א לעיר ב.
 (2) הבע באמצעות V את טווח המהירות האפשרי של יסמין.



נסמן: t = הזמן עד מפגש בין אמיר למשה, t_y = זמן הנסיעה של יסמין מעיר א לעיר ב,
 v_a, v_m, v_y = מהירותם של אמיר, משה ויסמין.

סעיף א

מהתרשים מאד עוזר לראות שיש **שלשה** ביטויים עבור המרחק בין הערים: (א) הרחק שנסע אמיר, (ב) המרחק שנסע משה, ו(ג) סכום המרחקים שנסעו אמיר ומשה עד למפגש:

$$tv_a + tv_m = (t+2)v_a = (t+8)v_m.$$

משני הביטויים הראשונים אנו מקבלים:

$$\frac{v_a}{v_m} = \frac{t}{2}.$$

נציב בשני הביטויים האחראוניים:

$$(t+2) \cdot \frac{tv_m}{2} = (t+8)v_m .$$

v_m מצטמצם ונקבל משווה ריבועית $16 - t^2 = 4$ עם הפתרון חיובי $t = 4$.

שיעור לב

יש נטייה לעצור כאן כאשר חישבנו את הזמן t , אבל עיון חוזר בשאלת מראה שהיא מבקשת את השעה של המפגש שהיא 10:00. לאחר שפותרים בעיה יש לעיין שוב בשאלת כדי לוודא שהוא מספקים את התשובה הנדרשת.

סעיף ב

המרחק בין הערים הוא $v_a(t+2)$. חישבנו ש- $t = 4$ ולכן המרחק הוא $V = 6v_a = 6V$ (הסימון הנטוון V שונה מ- v_a שבחרתי בתחילת הפתרון).

סעיף ג

נתון שישמן מגיע לעיר ב אחרי אמיר ולפני משה. מהתרשים רואים ש:

$$2 < t_y < 8 .$$

זמן הוא מרחק חלק מהירות ואת המרחק חישבנו בסעיף ב:

$$2 < \frac{6V}{v_j} < 8 .$$

מכאן ש:


$$\frac{3}{4}v_a < v_j < 3v_a$$

כי כיווני האישוין מתחלפים עם היפוך השבר.

1.3 חורף תשע"ח

בכפר נופש יש שתי בריכות: בריכה א' ובריכה ב'.
 הנפח של בריכה א' הוא V_1 והנפח של בריכה ב' הוא V_2 .
 את הבריכות ממלאים באמצעות 4 צינורות בעלי אותו הספק.
 ביום כלשהו שתיהן ה她们ות היו ריקות.
 התחלו למלא את בריכה א' באמצעות ארבעת הצינורות. כאשר הת מלאה בריכה א' לכדי $\frac{1}{6}$ מנפחיה, העבירו אחד מן הצינורות לבריכה ב' והתחלו למלא אותה באמצעותו. כאשר הת מלאה בריכה א' עד מחציתה, העבירו עוד שני צינורות למילוי בריכה ב'.
 מילוי שתיהן ה她们ות הסתיים באותו הזמן.
 כל הצינורות הזרימו מים ללא הפסקה עד שהת מלאו שתיהן ה她们ות.

$$\text{חשב את היחס } \frac{V_1}{V_2}.$$



נסמן: x = קצב המילוי של כל צינור ("בעל אותו הספק"), $t_1, t_2, t_3 =$ פרקי הזמן בין העברת הצינורות.
 הקו העליון בתרשים מתאר את המילוי של בריכה א', והקו התיכון מתאר את מילוי של בריכה ב'.
 שימו לב שככל שיוטר צינורות ממלאים בריכה, השיפוע של הקו תלול יותר.
 יש לנו שלושה סוגים של נתונים: x , שלושת ה- t_i ושני ה- V_i . אם נצליח להיפטר מ- x או מה- t_i , השני יצטמצם כאשר נחלק את ה- V_i .
 נתחיל עם משוואות ההספק עבור בריכה א', כאשר בכל פרק זמן ממלאים את הח הפרשים של הנפחים, למשל, בזמן t_2 בריכה א' מ מלאת משנית לחצי:

$$\begin{aligned} 4xt_1 &= \frac{1}{6}V_1 \\ 3xt_2 &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right)V_1 \\ xt_3 &= \left(1 - \frac{1}{2}\right)V_1. \end{aligned}$$

נשתמש במשוואת כדי לחשב את פרקי הזמן כתלות בנפח בברינה:

$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{V_1}{24x} \\ t_2 &= \frac{V_1}{9x} \\ t_3 &= \frac{V_1}{2x}. \end{aligned}$$

מהתרשים רואים שאפשר לבטא את הנפח של V_2 כסכום של שני חלקים: הנפח שמתמלא בפרק הזמן t_2 והנפח המתמלא בפרק הזמן t_3 . כאשר נציב את המשוואות שקבלנו עבור בפרק הזמן, נקבל את הנפח של V_2 כתלות ב- V_1 בלבד, כי המשתנה x מצטמצם:


$$\begin{aligned} V_2 &= xt_2 + 3xt_3 = \frac{xV_1}{9x} + \frac{3xV_1}{2x} = \frac{29}{18}V_1 \\ \frac{V_1}{V_2} &= \frac{18}{29}. \end{aligned}$$

הערה

קיבלו שהנפח של ברינה ב גדול מהנפח של ברינה א, עובדה שלא ידעת כיarterti את התרשים עם נפח ברינה א גדול מນפח ברינה ב. אין להזיבות. מטרת התרשימים היא להציג את התסריט כדי שנוכל לכתוב את המשוואות הנכונות.

פרט מעניין הוא שפרק הזמן הראשון t_1 לא נחוץ לפתרון, כי המילוי של ברינה ב מתבצע בשני השלבים לאחר העברת הצינור הראשון.

1.4 קיז תשע"ז מועד ב



הערים A ו B נמצאות על גדת נהר הזורם ב מהירות קבועה. כיוון הזורם הוא מ- A ל- B. מן העיר B יוצאה סירת מנוע לכיוון העיר A. הסירה שטה נגד כיוון הזורם.


באותו הזמן יצא רפסודה מן העיר A לכיוון העיר B. הרפסודה שטה עם כיוון הזורם.

מהירות סירת המנוע במים עומדים היא קבועה וגדולה פי 4 ממהירות הזורם של הנהר. מהירות הרפסודה במים עומדים היא אפס. במים זורמים הרפסודה שטה עם הזורם.

הסירה והרפсадה נפגשו 3 שעות ו- 45 דקות אחרי יציאתן לדרכם המשיכו בדרךן. סירת המנוע הגיעו לעיר A ומיד הסתובבה ושטה בחזרה לעיר B. כאשר סירת המנוע הגיעו לעיר B, הרפסודה הייתה במרחק של 35 ק"מ מן העיר B.

- חשב את מהירות הזורם ואת מהירות סירת המנוע במים עומדים.
- בדרכם חזרה לעיר B פגשה סירת המנוע את הרפסודה בפעם השנייה. כמה זמן עבר יוצאתה של הרפסודה מן העיר A עד שהסירה והרפсадה נפגשו בפעם השנייה?

סעיף א



נסמן: d = מרחק בין שני הנמלים, d_s = מרחק הפלגה של הסירה והרפсадה עד למפגש הראשון, v_z = מהירות הזורם, v_s = מהירות הסירה במים עומדים. בתרשים ציר הזמן הוא בשעות.

הזמן עד למפגש הראשון שווה עבור הסירה והרפסודה ויחס המהירות של הסירה והזרם ידוע, כך שנכתוב את משוואות התנועה עד למפגש. נתון:

$$(1.4) \quad v_z = v_s/4.$$

במפגש הראשון:

$$d = d_s + d_r = \frac{15}{4}(v_s - v_z) + \frac{15}{4}v_z.$$

מהירות הזרם מתאפסת ומתקיים:

$$(1.5) \quad d = \frac{15}{4}v_s.$$

כעת נכתוב משוואות תנועה כדי להשוו את הזמן עד סוף הסיפור. בפרק הזמן שהסירה מפליגה ל- A' ובחרזה ל- B' (מרחק של $d + d'$), הרפסודה מפליגה מ- A ומגיעה "כמעט" לנמל B :

$$\frac{d}{v_s - v_z} + \frac{d'}{v_s + v_z} = \frac{d - 35}{v_z}.$$


מנוסחה (1.4) נציב עבור v_z , מנוסחה (1.5) נציב עבור d , ונקבל משווהה עם נעלם אחד בלבד, v_s .

הפתרון הוא $v_s = 20$ ו- $v_z = 5$. מנוסחה 1.4

מנוסחה 1.5 מתקיים $d = 75$ שנוצרך במשהש.

סעיף ב

נציר תרשימים חדש עם סימונים הקשורים למפגש השני.



נסמן: t_1 = הזמן שהסירה מפליגה ל- A' , t_2 = הזמן שהסירה מפליגה מ- A' למפגש השני, d' = המרחק שהרפסודה מפליגה בזמן t_1 , d'' = המרחק שהרפסודה מפליגה בזמן t_2 .

כל לחשב t_1 ממשוואת התנועה של הסירה:

$$t_1 = \frac{d}{v_s - v_z} = \frac{75}{20 - 5} = 5,$$

ולחשב שת המרחק d' מהמשווה של הרפסודה:

$$d' = v_z t_1 = 5 \cdot 5 = 25.$$

נשאר לחשב את פרק הזמן t_2 . בפרק הזמן זה, הסירה מפליגה מרחק $d' + d''$ והרפסודה מפליגה מרחק d'' . המהירות ידועות, כך שיש לנו שתי משוואות עבור t_2 :

$$\begin{aligned} t_2 &= \frac{d' + d''}{v_s + v_z} = \frac{25 + d''}{25} \\ t_2 &= \frac{d''}{v_z} = \frac{d''}{5}. \end{aligned}$$

נפתרו את המשוואת ונקבל:

$$\begin{aligned} d'' &= \frac{25}{4} \\ t_2 &= \frac{d''}{v_z} = \frac{5}{4}. \end{aligned}$$


שימו לב שהשאלה מבקשת את זמן הפלגה של הרפסודה מנמל A ועד למפגש השני:

$$t_1 + t_2 = 5 + \frac{5}{4} = \frac{25}{4}.$$

1.5 קיז תשע"ז מועד א

נגה רכבה על אופניים במסלול באורך מסויים, באربع מהירותים קבועות. בכל פעם, לאחר שעברה מקטע שאורכו רבע מן המסלול, היא הגבירה את מהירותה, ורכבה ב מהירות הגדולה פי 2 מן מהירותה הקודמת. בקטע האחרון היא רכבה ב מהירות של 40 קמ"ש. נגה יוצאה לדרכּ בשעה 8:00 בבוקר וסיימה את המסלול בשעה 11:45 בבוקר.

- א. מהו אורך המסלול?
 ב. דניאל יצא לדרכּ באותו מסלול בשעה 9:45, ונסע ב מהירות קבועה לאורך כל המסלול. גם הוא הגיע ל סוף המסלול בשעה 11:45.
 באיזה מרבעת מקטעי המסלולפגש דניאל את נגה בפעם הראשונה, ובאיזה שעה?



נסמן: x = המרחק של מקטע, t_1, t_2, t_3, t_4 = זמני רכיבה של נגה בקטעים.
 נתון: 40 = מהירות בקטע האחרון, אך מהירותים של המקטעים האחרים הן $20, 10, 5$.

סעיף א

נתון לנו הזמן הכולל ומהירות (המהירות الأخيرة אבל אפשר לחשב את האחרות), והנעלם היחיד הוא המרחק. נסכם את הזמנים של המקטעים:

$$\left(\frac{x}{5} + \frac{x}{10} + \frac{x}{20} + \frac{x}{40} \right) = \frac{15}{4}.$$

הפתרון הוא $x = 10$ ולכן אורך המסלול הוא 40 ק"מ.

סעיף ב

חישבנו את המרחק ונתנו הזמן של דניאל. מהירותו של דניאל היא 20 km/h . יכול להיות שאפשר למצוא נוסחה עבור המפגש, אבל פשוט יותר לעобр מקטע מקטע ולבודק אם המפגש מתקיים באותו מקטע.

נעה עוברת 10 km בכל מקטע. מה המרחק שעובר דניאל עד סוף המקטע הראשון? נעה עוברת 10 km בכל מקטע. מה המרחק שעובר דניאל עד סוף המקטע השני? דניאל רוכב רבע שעה מד- $09:45$ ועד 10:00 ולכן המרחק שהוא עבר הוא רק $5 \cdot \frac{1}{4} = 2.5 \text{ km}$ והמפגש לא התקיים במקטע הראשון. מתי נעה מגיעה לסוף המקטע השני? נעה $t_2 = 10/10 = 1$ دق' שסוף המקטע הוא ב- $11:00$. בשעה רביע בין 09:45 ל-11:00 דניאל רוכב $25 \cdot \frac{5}{4} = 31.25 \text{ km}$, מרחק גדול מהמרחק של נעה, לכן המפגש מתקיים במקטע השני.

נשאר רק לחשב את פרק הזמן בתוך המקטע השני עד למפגש, שנסמך t . נכתב משווהה למרחקים השווים של נעה ודניאל. נעה רכבה 10 km עד סוף הקטע הראשון ודניאל רכב 5 km . מסוף הקטע הראשון, הם רכבו t שעות, כל אחד במהירות שלו:

$$\begin{aligned} 10 + 10t &= 5 + 20t \\ t &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

כבר חישבנו שתחילה המקטע השני בשעה 10:00, ולכן שעת המפגש היא 10:30.

1.6 חורף תשע"ז

שני צינורות א' ו-ב' מזרימים מים לברכה בקצב קבוע.

כאשר צינור א' בלבד פתוח, הברכה הריקה מתמלאת לגמרי ב- m שעות.

כאשר צינור ב' בלבד פתוח, הברכה הריקה מת מלאת לגמרי ב- $2m$ שעות.

כאשר שני הצינורות פתוחים במקביל, הברכה הריקה מת מלאת לגמרי ביותר מ- 4 שעות.

ביום מסוים הברכה הייתה ריקה. פתחו את צינור א' בלבד למשך שעתיים.

אחר מכן גם את צינור ב', ושני הצינורות היו פתוחים בו בזמן שעתיים נוספים.

בתום אותן שעתיים נוספים יותר מ- $\frac{1}{2}$ הברכה הייתה מלאה.

א. מצא את תחומי הערכיהם האפשריים של m .

ב. ביום אחר $\frac{1}{2}$ הברכה הייתה מלאה. פתחו את שני הצינורות, אלא שבשל התקלה תכנית

צינור ב' רוקן מים מן הברכה במקום למלא בה מים. שני הצינורות היו פתוחים בו בזמן

במשך שעה אחת, ובמהלכה צינור א' מילא מים בברכה וצינור ב' רוקן ממנו מים.


בתום אותה שעה תקלה, ושני הצינורות החלו למלא את הברכה יחד, עד שהיא

התמלאה לגמרי בעבר שעתיים וחצי נוספים.

נתון שהקצב שבו צינור ב' מרוקן מים מהברכה שווה לקצב שבו הוא ממלא אותה במים.

מצא את m .


סעיף א



כאשר שני הצינורות פתוחים, ההספק הכלול הוא סכום ההספקים של הצינורות. לפי הנתונים:

$$1/\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{2m}\right) > 4,$$

$$\text{כך ש-} m > 6.$$




נסמן: $w_a = \text{כמויות המים שמיילא צינור א}, w_b = \text{כמויות המים שמיילא צינור ב}.$

כמויות המים לאחר ארבע שעות שווה לסכום הכמות שכל צינור מילא והוא לפחות מחצית הבריכה:

$$w_a + w_b = \frac{1}{m} \cdot 4 + \frac{1}{2m} \cdot 2 > \frac{1}{2}.$$

. $m < 10$

סעיף ב



כדי למלא את הבריכה, מתחילה ממחצית הכמות, מוסיפים (מחסירים כי שלילי) את הכמות של השעה הראשונה, ומוסיפים את הכמות מהתקופה השנייה של שעתיים וחצי:


$$\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{2m} \right) \cdot 1 + \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{2m} \right) \cdot 2.5 = 1.$$

. $m = 8.5$ הפטרון הוא

1.7 קיז תשע"ו, מועד ב

- . שני הטכנאים גל ודני עבדו בהרכבת מחשבים. קצב העבודה של כל אחד מהם קבוע.
- א. ביום העבודה הראשון הרכיבו שני הטכנאים אותו מספר של מחשבים.
gal התחליל לעבוד בשעה 8:00, וסיים לעבוד בשעה 15:00.
דני התחליל לעבוד לאחר השעה 0:00 ו לפני השעה 9:00, וסיים לעבוד בשעה 13:00.
ידעו שגל ודני הרכיבו אותו מספר של מחשבים מהרגע שכל אחד מהם התחליל לעבוד ועד השעה 0:00.
כמה זמן אחרי השעה 0:00 התחליל דני לעבוד?
- ב. ביום העבודה השני, התחילו גל ודני לעבוד באותו שעה וסיימו לעבוד באותו שעה.
בימים זהם הרכיבו סך הכל יחד את אותו מספר מחשבים שהרכיבו יחד ביום העבודה הראשון.
כמה זמן עבדו הטכנאים ביום העבודה השני?

סעיף א



נסמן: $t = \text{זמן שדני התחליל בהרכבה}$.
נשתמש בנתונים כדי למצוא ביטויים עבור ההספקים של דני וגל. נתייחס לסך המחשבים שהרכיב כל אחד כיחידה עבודה אחת. גל עבד שבע שעות ולכן ההספק שלו הוא $\frac{1}{7}$, ודני עבד $t - 1$ עד לשעה 09:00 ולאחר מכן עוד ארבע שעות. ההספק שלו הוא $\frac{1}{(1-t)+4}$.


נתון ששבועה 0900 שניהם סיימו להרכיב אותו כמות של מחשבים:

$$\frac{1}{7} \cdot 1 = \frac{1}{5-t} \cdot (1-t),$$

ולכן דני התחיל לעבוד $t = \frac{1}{3}$ שעה לאחר 08:00.

סעיף ב

נציר תרשימים חדש עם המידע לסעיף זה.



נסמן: T = הזמן שניהם עבדו ביום השני. על התרשימים סימנו גם את כמות העבודה שעשה כל אחד מהם: w_g = העבודה של גל, w_d = העבודה של דני.

בסעיף א הערכנו שההספק של גל הוא $\frac{1}{7}$, וчисבנו שדני עבד:

$$\left(1 - \frac{1}{3}\right) + 4 = \frac{14}{3}$$

שעות. ההספק שלו הוא:

$$\frac{\frac{1}{14}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{14}.$$


נתון שהם סיימו אותה כמות עבודה כמו היום הראשון:

$$1 + 1 = w_g + w_d = \frac{1}{7}T + \frac{3}{14}T,$$

$$T = \frac{28}{5}$$

1.8 קיז תשע"ו מועד א

שתי מכוניות יצאו באותו זמן מעיר א' לעיר ב'. המרחק בין שתי הערים הוא 300 ק"מ. המכונית הראשונה נסעה במהירות הגדולה ב- 25 קמ"ש מהמהירות של המכונית השנייה. כעבור 1.5 שעות מרגע היציאה מעיר א', הקטינה המכונית הראשונה את מהירותה לחצי מהירותה הקודמת, והגיעה לעיר ב' $\frac{1}{2}$ שעה אחרי המכונית השנייה. א. מצא את מהירותת של המכונית השנייה אם ידוע שמהירות גדולה מד- 60 קמ"ש. ב. מצא כעבור כמה שעות מרגע היציאה מעיר א' ולפניהם שהמכונית השנייה השיגה את המכונית הראשונה, היה המרחק בין שתי המכוניות 12.5 ק"מ (מצא את שתי האפשרויות).



נסמן: v_1 = מהירות התחלתית של מכונית 1, $v_2 =$ מהירות מכונית 2, $t =$ זמן נסעה של מכונית 2 מעיר א' עד לעיר ב'.

נתון: $v_1 = v_2 + 25$. השיפוע של הקו של מכונית 1 גדול מהשיפוע של הקו של מכונית 2.

סעיף א

שתי המכוניות נסעו אותו מרחק מעיר א' לעיר ב'. נכתוב את משוואות התנועה של שתי המכוניות:

$$\begin{aligned} v_1 \cdot \frac{3}{2} + \frac{v_1}{2} \left(\left(t - \frac{3}{2} \right) + \frac{1}{2} \right) &= 300 \\ v_2 t &= 300. \end{aligned}$$


נציב $v_1 = v_2 + 25$ במשוואת ראשונה ונקבל משואה ריבועית ב- v_2 :

$$v_2^2 - 125v_2 + 3750 = 0.$$

השורשים הם 50, 75 ונתון $75 > 50$, לכן $v_2 = 75$ קמ"ש.

סעיף ב

נציר תרשים חדש עם המידע עבור סעיף זה:



הקוים האנכיים הכלואים בין הקווים של שתי המכוניות מסמנים מרחק של 12.5 ק"מ. קו אחד הוא לפניו שינוי המהירות בזמן t_1 מתחילת הנסיעה וקו שני לאחר שינוי המהירות.

בסעיף א' חישבנו $v_1 = v_2 + 25$ ולכן $v_1 = 100$.

נכתוב את המשוואות עבור הפרשי המרחקים:

$$\begin{aligned} 100t_1 - 75t_1 &= 12.5 \\ \left(100 \cdot \frac{3}{2} + 50 \left(t_2 - \frac{3}{2}\right)\right) - 75t_2 &= 12.5. \end{aligned}$$

פתרונותם $t = \frac{1}{2}, t_2 = \frac{5}{2}$ שעות.

1.9 חורף תשע"ז

רוכב אופניים ורוכב אופנו יצאו באותו רגע זה לקרה זה משני יישובים שונים.

הם נפגשו כעבור 3 שעות.

רוכב האופנו עבר $\frac{2}{3}$ מהדרך שבין שני היישובים ב- 1.25 שעות פחות מהזמן שרכוב


האופניים עבר $\frac{1}{4}$ מהדרך שבין שני היישובים.

מהירותו של הרוכבים אין משתנות.

א. מצא פי כמה מהירות של רוכב האופנו גדולה מן מהירות של רוכב האופניים.

ב. מצא בכמה שעות עבר רוכב האופנו את כל הדרך שבין שני היישובים.

סעיף א



נסמן: v_b = מהירות אופניים, v_m = מהירות אופנו, x = מרחק בין הערים, T_m = פרק הזמן שהאופנו עבר $\frac{2}{3}$ מהדרך, פרק הזמן שהאופניים עבר $\frac{1}{4}$ מהדרך.

כאשר שני כלי רכב היוצאים מנקודות שונות נפגשים, סכום המרחקים שהם עוברים הוא המרחק בין הנקודות. לא נתון המרחק, ולכן אנו משתמשים בנהל:

$$x = 3v_b + 3v_m.$$

הנתון השני הוא הקשר בין זמני הנסיעה של חלקים המרחק בין היישובים:

$$\frac{x/4}{v_b} = \frac{2x/3}{v_m} + \frac{5}{4}.$$

נסמן את היחס בין המהירויות (התשובה הדורשה): $r = \frac{v_m}{v_b}$ ונקבל משוואה הריבועית:

$$3r^2 - 10r - 8 = 0.$$

השורש החיובי הוא $r = 4$.

סעיף ב

נתונה משווהת המרחק בין היישובים:

$$x = 3v_b + 3v_m.$$

נשתמש ביחס שחישבנו בסעיף א כדי לחשב את הזמן של נסיעת האופנו:

$$\frac{x}{v_m} = \frac{3v_b + 3v_m}{v_m} = 3\frac{v_b}{v_m} + 3 = 3\frac{v_m/4}{v_m} + 3 = \frac{15}{4}$$

שעות.

1.10 **קייז תשע"ה** מועד ב

בזמן הנסיעה באוטובוס הבחן יוסי ברגע מסויים באימה שלו, הולכת ליד האוטובוס בכיוון הפוך לכיוון הנסיעה של האוטובוס. כעבור 10 שניות מהרגע שiosis הבחן באימו, עצר האוטובוס בתחנה, וIOSI רץ מיד כדי להציג את אימנו.

מהירות הריצה של יוסי גוזלה פי 2 מהירות ההליכה של אימו,
והיא $\frac{1}{7}$ מהירות הנסיעה של האוטובוס.


כל מהירותם הונכבות.

א). כמה זמן רצויysi כדי להשיג את אימוי?

ברגע שיויסי השיג את אימנו, הם הלכו יחד 3 דקות במהירות ההליכה של אימו (בכיוון ההליכה שלה).

מיד בתום 3 הבדיקות רץ יוסי בחזרה לתחנת האוטובוס שירד בה.
(מהירות הריצה של יוסי היא כמו בסעיף א).

ב. כמה זמן רץ יוסי בחזרה לתחנת האוטובוס?



בתרשים סימנו את הקטעים:

$a = \text{יוסי נושא באוטובוס}$ $b = \text{יוסי רץ לפגישה עם אמא}$

$c =$ אמא הולכת עד למפגש עם יוסי $= d$ יוסי ואמא הולכים ביחד

יוסי רץ חזרה לתחנה = $e_1 + e_2$

נסמן זמן: t = הזמן שיוסי רץ מתחנה כדי להציג את אמא.

נסמן מהירותו: $v_y = \text{יוסי}$, $v_a = \text{אמא}$, $v_b = \text{אוטובוס}$.

נתון: $v_y = v_b/7$, $v_y = 2v_a$.

סעיף א

מצאתי שקשה לפתרור את השאלה עד שציירתי את התרשימים המופיעים מעלה. את הזמן t נוכל לחשב ממשוואות התנועה מהמפגש הראשון (יוסי רואה את אימו) ועד למפגש השני (יוסי משיג את אימו). המרחק מסומן מהתרשימים רואים שהמרחק NN' בתרשימים. נוכל למצוא שתי ממשוואות עבור מרחק זה, אחד עבור אמא, קטע c :

$$v_a(t + 10),$$

$$\begin{aligned} \text{ואחד עבור יוסי, קטעים } a, b \\ -10v_b + tv_y. \end{aligned}$$

שיםו לב שבקטע a יוסי מתרחק מהמפגש ולכון המרחק הוא שלילי.

יש לנו שני ביטויים עבור אותו מרחק ולאחר הצבת יחסית המהירות הנותנים קיבל את המשווה:

$$\frac{v_y}{2}(t + 10) = v_y t - 7v_y 10$$

שהפתרון שלו הוא $t = 150$ שניות.

סעיף ב

מהתרשימים קל לראות **שני** קטעי הקווים e_1, e_2 מתארים את הריצה של יוסי בחזרה לתחנה. רואים גם שהמרחק PP' של e_1 הוא גם המרחק שאמא הולכת, קטעים c, d . לפי התוצאה של סעיף א, לוקח לאמא $40 = 150 + 180 + 10$ שניות לעבור מרחק זה. נתון שיוסי רץ פי שניים מהר יותר מההליכה של אמא, ולכון $170 = t_1$ שניות.

עבור הקטע השני, e_2 , המרחק RR' שווה למרחק MM' , המרחק שהאוטובוס עבר מהמפגש הראשון ועד התחנה. נתון שהאוטובוס עבר מרחק זה ב-10 שניות, ונתון שמהירות הריצה של יוסי פי שבע לפחות ממהירות הנסעה של האוטובוס, כך ש- $70 = t_2$.

נסכם ונקבל שיוסי רץ מנקודת הפרידה לתחנה ב $t_1 + t_2 = 240$ שניות.

הערה

שאלה זו שיכנע אותנו שתרשימים דוד-omid זמן-מרחק חיוני בפתרון בעיות תנועה.


שיםו לב למלכודות: זמן ההליכה היחיד נתון בדקות ושאר הזמן בשניות. אמנם המילה "דקות" מודגשת אבל אפשר להתבלבל.

1.11 קיז תשע"ה מועד א

מכונית I ומכונית II יצאו באותו זמן מאותו מקום ולאוטו כיוון. מהירות של מכונית I הייתה 50 קמ"ש, ומהירות של מכונית II הייתה 40 קמ"ש. בעבר חצי שעה מרגע היציאה של שתי המכוניות, יצא גם מכונית III מאותו מקום ולאוטו כיוון.

ברגע שמכונית IIIפגשה במכונית II, המרחק בין מכונית I למכונית II היה 15 ק"מ. מהירות של כל המכוניות היו קבועות.

- מצאת מהירות של מכונית III.
- אם יתכן שאחרי הפגישה בין מכונית III למכונית II, יהיה המרחק בין מכונית III למכונית I שווה למרחק בין מכונית II למכונית I? נמק.



המהירות של מכונית I גדולה מהמהירות של מכונית II, ולכן השיפוע שלו תלול יותר. נסמן t = הזמן בין היציאה של III ועד לפגש שלו עם II, v_3 = המהירות של III. נתון מהירות של I $v_1 = 50$, מהירות של II $v_2 = 40$.

סעיף א


לאחר $t + 1/2$ שעות, המכוניות II ו-III עברו אותו מרחק, ומכונית I עבר אותו מרחק ועוד 15 קמ"ש. נכתוב את משוואות התנועה לשני המקרים:

$$\begin{aligned} 40(t + 1/2) &= v_3 t \\ 50(t + 1/2) &= v_3 t + 15. \end{aligned}$$

מהמשוואות מתקיים $t = 1$ ו $v_3 = 60$ קמ"ש.

סעיף ב

נוסיף סימונים לתרשים שיעזרו לנו לפתור את הבעיה:



נעין בקווים מנוקדים בתרשים ונראה שהמרחקים לא יכולים להיות שווים. בנקודה A המרחקים שוים, אבל מן נקודה זו ועד לנקודה B , המרחק $I-II$ גדול והмарחק $I-III$ קטן.

בנקודה B המרחק $I-II$ חיובי והмарחק $I-III$ שווה לאפס. מכאן ולהלאה, שני המרחקים גדלים באותו קצב כי הפרשי המהירויות שווים 10 קמ''ש .

הוכחה בחישוב

נסמן $t_A = \text{זמן מן נקודה } A, t_B = d_B, t = \text{זמן מן נקודה } B$, המרחק בין I לבין II בנקודה B .
משמאלי לנקודה B המרחקים שוויים אם:

$$15 + (v_1 - v_2)t_A \stackrel{?}{=} 15 + (v_1 - v_3)t_A.$$

נציב $v_1 = 60, v_2 = 40, v_3 = 50$ ונקבל $10 = -10$, כך הטיעון לא יכול להיות נכון.

מיימיו לנקודה B המרחקים שוויים אם:

$$(v_3 - v_1)t_B \stackrel{?}{=} d_B + (v_1 - v_2)t_B.$$

לאחר הצבה עבורו המהירויות, קיבל שהטיעון נכון אם $d_B > 15$.

1.12 חורף תשע"ה

צבעים ותיקים וצבעים מהתלמידים צריכים לצבוע מספר מסויים של דלתות.

צבע אחד ותיק ו- 2 צבעים מהתלמידים יסייעו את הצבעה בזמן הארוך ב- 25%


מהזמן שבו יסייעו את הצבעה 2 צבעים ותיקים וצבע אחד מהתלמיד.

לכל צבע ותיק אותו קצב עובדה בלתי משתנה, ולכל צבע מהתלמיד אותו קצב עובדה בלתי משתנה. (צבע ותיק עובד יותר מאשר צבע מהתלמיד).

א. מצא את היחס בין הזמן שצבע מהתלמיד יסייע לבודו את צביעת הדלתות לבין הזמן שצבע ותיק יסייע לבודו את צביעת הדלתות.

ב. מצא כמה צבעים מהתלמידים צריכים לעבוד עם צבע אחד ותיק, כדי שהם יסייעו את צביעת הדלתות במשך אותו הזמן שבו יסייעו את הצבעה 2 צבעים ותיקים וצבע אחד מהתלמיד.

סעיף א



נסמן את הזמןים לצביעת כל הדלתות. t_v = הזמן שלוקח צבע ותיק, t_m = הזמן שלוקח צבע מהתלמיד, T = הזמן שלוקח שני צבעים ותיקים וצבע מהתלמיד אחד. למעשה, הערך של T לא חשוב ואפשר להשתמש בו כיחידה זמן.

הסבר על התרשימים

הצבעים עובדים במקביל אבל הציג בתרשימים מראה **חלוקת העבודה**, כאשרו שצבע (או זוג צבעים) מסיים את חלקו בעובדה ולאחר מכן הצבע (או הזוג) השני מתחילה את חלקו. ההספקים מתקבלים מעובדה חלקי זמן. כאשר יש זוג צבעים הם רשומים כצבע אחד עם הספק כפול. הקווים הקיימים מראים מראים צבע אחד ותיק ($1/t_v$) ושני צבעים מהתלמידים ($2/t_m$). הקווים העבים מראים שני צבעים ותיקים ($2/t_v$) וצבע אחד מהתלמיד ($1/t_m$).


שני הרכיבים סיימו את העבודה ומכאן ששיעורת ההספק נותנת אותו ערך עבור שני הרכיבים.
(זיכרו שקבענו שהזמן הממוצע הוא $1 + \frac{1}{1.25} = 1.25$ עבור שני הרכיבים):

$$\frac{2}{t_v} \cdot 1 + \frac{1}{t_m} \cdot 1 = \frac{1}{t_v} \cdot 1.25 + \frac{2}{t_m} \cdot 1.25.$$

הפתרון הוא:

$$\frac{t_m}{t_v} = 2.$$

סעיף ב



נסמן n = מספר הבכירים המתלמידים. העבודה של שני הרכיבים שווה ולכן:

$$\frac{2}{t_v} + \frac{1}{t_m} = \frac{1}{t_v} + \frac{n}{t_m}.$$

נשתמש ביחס שחישבנו בסעיף א ונקבל:

$$n = \frac{t_m}{t_v} + \frac{t_m}{t_m} = 2 + 1 = 3.$$

1.13 קיז תשע"ד מועד ב

רץ I ורץ II יצאו באותו רגע מאותו מקום. הם רצו ב מהירות קבועה ובאותו כיוון.


ה מהירות של רץ I הייתה 6 קמ"ש, וה מהירות של רץ II הייתה 7.5 קמ"ש.

כעבור 20 דקות מרגע היציאה של שני הרצים,

יצא רץ III מאותו מקום ובאותו כיוון, והוא רץ ב מהירות קבועה.

רץ IIIפגש בדרך את רץ I, ושעה אחר כך הוא פוגש את רץ II.

מצא כמה שניות עברו מרגע היציאה של רץ III עד לפגישתו עם רץ II.



נסמן: $t =$ הזמן בין היציאה של III ועד למפגש שלו עם I, $v =$ המהירות של III.
נתון: $6 =$ מהירות של I ו- $7.5 =$ המהירות של II. שימו לב לשיפועים של הקווים.
בכל מפגש בין שתי דמיות המרחקים שווים. המפגש בין I ל-III:

$$6(t + 1/3) = vt,$$

ומפגש בין II ו-III:

$$7.5(1/3 + t + 1) = v(t + 1).$$

מה המשוואה הראשונה קיבל ביטוי עבור v ונציב במשוואת השניה. קיבל משוואת ריבועית ב- t :

$$1.5t^2 + 2t - 2 = 0,$$

שיש לה פתרון חיובי אחד $t = 2/3$

הזמן מהיציאה של III ועד המפגש שלו עם II הוא $t + 1 = 5/3$ שעות.

1.14 קיז תשע"ד מועד א

משאית יצאה מעיר A, וכעבור 6 שעות מרגע יציאתה הגיעה לעיר B.


זמן מה אחרי יציאת המשאית יצאה מכוניות מעיר A,

והגעה לעיר B 2 שעות לפני המשאית.

המשאית והמכונית נפגשו בעבר שעה מרגע היציאה של המכונית.

המהירותו של המשאית ושל המכונית היו קבועות.

מצא כמה שעות אחרי רגע היציאה של המשאית יצאה המכונית (מצא את שני הפתרונות).



בתרשים חשוב לרשום את כל פרק זמן, במיוחד כדי לקבל את זמן הנסיעה של המכונית.

נסמן: $t = \text{זמן יציאת המכונית}$, $v_c = \text{מהירות המכונית}$, $v_m = \text{מהירות המשאית}$.

נכתב משוואות למרחקים שווים, מ- A עד למפגש ומ- A עד B :

$$\begin{aligned} v_m(t+1) &= v_c \cdot 1 \\ v_m \cdot 6 &= v_c(4-t). \end{aligned}$$


משתי המשוואות מתקבלת משווהה ריבועית ב- t :

$$t^2 - 3t + 2 = 0$$

שיש לה שני פתרונות $t = 1$ שעיה ו- $t = 2$ שעות.

1.15 חורף תשע"ד

נמל A ונמל B נמצאים על אותה גדה של נהר, שכןון הזרם שלו הוא מ- A ל- B. רפסודה הפליגה בשעה 9:00 בokin מ滿ל A אל נמל B, והיא נישאה על גבי הזרם של הנהר כך שמהירות הרפסודה היא מהירות הזרם. באוֹתָה שׁעָה סִירָה מִן מַלְאָה B (נֶגֶד כַּיוֹן הַזָּרֶם) לְכַיוֹן מַלְאָה A. מהירות הסירה במים עומדים היא 15 קמ"ש. הסירה הגיעה לנמל A, ומיד חזרה אל נמל B. ידוע כי הרפסודה והסירה הגיעו לנמל B באותו זמן. נתון כי הרפסודה והסירה נפגשו לראשונה כעבור 5 שעות מרגע הפלגתן. האם הסירה והרפסודה הגיעו לנמל B עד לשעה 9:00 בערב באותו יום? נמק. מהירות הזרם ומהירות הסירה במים עומדים הן קבועות. הערה: בחישוביך דיקק עד שתי ספרות אחרי הקודעה העשרונית.



נסמן: $d =$ מרחק בין שני הנמלים, $d_1 =$ מרחק בין A למפגש, $d_2 =$ מרחק בין B למפגש. $t =$ זמן עד למפגש ב- B , $v =$ מהירות הזרם.

מהירות הזרם היא נתון חשוב בפתרון הבעיה כי המהירות של הסירה והרפסודה תלויות בה. כאשר הסירה מפליגה מ- A ל- B ובחרזה ל- B , היא עוברת מרחק כפול מהמרחק שהרפסודה עוברת באותו פרק זמן. נשווה את משוואות התנועה לפרק זמן זה:

$$\frac{d}{v} = \frac{d}{15 - v} + \frac{d}{15 + v}.$$

d הצטמצם ונקבל משווה ריבועית בmphירות הזרם v :

$$v^2 + 30v - 225 = 0.$$

השורש החיובי שלה הוא $v = 6.21$.

עכשו שאנו יודעים את mphירות והזמן עד למפגש נתון, ננסה לחשב את המרחק d , שהוא הסכום של המרחקים שעוברים הרפסודה והסירה:

$$d = 5v + 5(15 - v).$$

הפתרון הוא $d = 75$ (ללא תלות mphירות הזרם v).

את הזמן עד המפגש בנמל B אפשר לחשב לפי ההפלגה של הסירה או לפי ההפלגה של הרפסודה. כמוון שפשוט יותר לחשב עבור הקטע היחיד של הרפסודה:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{75}{6.21} \approx 12.08.$$

בכל זאת נבדוק לפי הסירה:

$$t = \frac{d}{15 - v} + \frac{d}{15 + v} = \frac{75}{8.79} + \frac{75}{21.21} = 8.532 + 3.536 \approx 12.07.$$

בגלל עיגול של החישובים יש הבדל קטן בין שתי התוצאות.

הסירה והרפסודה יצאו בשעה 09:00 בבוקר וההפלגות敛 קחו יותר מ-12 שעות, כך המפגש השני התקיים לאחר השעה 09:00 בערב.

1.16 המלצות: תנואה והספק

- שימושו לב שבניגוד לתרשיים חד-ממדיים בהם אורך קו הוא מרחק הנסיעה, כאן מרחק הנסעה הוא ההפרש בציר האנכי בין נקודת התחלה לנקודת הסופה.
- הקושי בפתרון של בעיות הללו נובע מ הצורך לתרגם את התיאורים המילוליים לשווות. אפשר בקלות להתבלבל כאשר מתרגמים ביטויים כגון "לפניהם", "אחרי", "מהר יותר", וכו'. כדי לפתור את הבעיה יש להכין תרשימים בו יצוין המסלול של כל דמויות בשאלת.
- מצאתי שיש יתרונות מובהקים לשימוש בתרשימי דו-ממדיים כאשר הציר האופקי הוא הזמן והציר האנכי הוא המרחק. ה יתרונות הם:
 - נקודות המפגש בין הדמיות ברורות. זה חשוב כי בדרך כלל תוכנות כגון מהירות וכווניות משתמשות בנקודות המפגש.
 - מהירות של כל דמות משתקפת מהSHIPוע את כל קטע קו. קל לוודא אם מהירות SHIPיעו במשוואות תואמות את התיאורים בשאלות, כגון "פי ארבע".
- מומלץ להכין תרשימי גדולים וברורים כדי סימנים שימושיים ממידע נתון או ממידע המתקבל מחישובים יהיו קריאים. לעיתים, כדאי להכין תרשימי חדשים לכל סעיף כדי שמדד הנחוץ רק לסעיף אחד לא יקשה על עיון במידע הנחוץ לסעיף אחר.
- מצאתי שאפשר "לקראא" את המשוואות ישירות מהתרשימיים. לחילופין אפשר גם לסדר את הנתונים בטבלה כמפורט.
- נקודות מפגש נוחות מאוד לכתיבה זוג משוואות תנואה עם אותם נעלמים. הזמן האם אותו זמן (לפעמים בתוספת קבוע), והמרקחים שווים (אם הדמיות נסעות באותו כיוון), או שסכום המרחקים שווה למרחק בין נקודות הkaza (כאשר הדמיות נסעות אחת לפני השנייה).
- פתרון המשוואות עצמן הוא בדרך כלל קל: שני משוואות עם שני נעלמים, כאשר המשוואות שיש לפתור הן לינאריות או ריבועיות.

פרק 2 סדרות

2.1 קיז תשע"ח מועד ב

2. הסדרה a_n מוגדרת לכל n טבעי על ידי כלל הנסיגה: $a_{n+1} = -\frac{c^{n-2}}{a_n}$, $a_1 = -\frac{1}{c}$. נתון: $c > 0$.

א. הוכיח כי האיברים בסדרה a_n הנמצאים במקומות הזוגיים מהווים סדרה הנדסית, וכי האיברים בסדרה a_n הנמצאים במקומות הזוגיים גם הם סדרה הנדסית.

ב. (1) רשום את 7 האיברים הראשונים בסדרה a_n . הבע את תשובתך באמצעות c אם יש צורך.

(2) הבע באמצעות c את סכום 7 האיברים הראשונים בסדרה a_n .

(3) הוכיח שלכל n טבעי, הסכום של $1 - a_1 - a_2$ האיברים הראשונים בסדרה a_n אינו תלוי ב- n .

ג. הסדרה b_n מוגדרת באופן הזה: $b_n = -\frac{2}{a_n \cdot a_{n+1}}$.

(1) הראה כי b_n היא סדרה הנדסית.

(2) מהו תחום הערכים של c שבעבורם b_n היא סדרה יורדת?

(3) נתון שהסדרה האינסופית b_n היא סדרה יורדת.

הבע באמצעות c את סכומה.

סעיף א

כדי להוכיח שסדרה המוגדרת על ידי כלל נסיגה היא הנדסית, לא כדאי לחשב מנתה של שני איברים עוקבים, כי איברים לא יצטמצו. במקום זה, יש להציב את כלל הנסיגה כדי לקבל ערך של איבר כתלותו של איבר אחר:

$$a_{n+1} = -\frac{c^{n-2}}{a_n} = -\frac{c^{n-2}}{-\frac{c^{n-3}}{a_{n-1}}} = ca_{n-1}.$$

ה מנתה $a_{n+1}/a_{n-1} = c$ קבועה ולא תלוי ב- n . ההוכחה נכונה עבור כל זוג של איברים שיש הפרש של שניים במקומות שלהם בסדרה, ולכן ההוכחה נכונה גם עבור זוגות של מספרים זוגיים וגם עבור זוגות של מספרים לא-זוגיים.

סעיף ב (1)

הסדרות של הזוגיים והאי-זוגיים הן סדרות הנדסיות **נפרדות** ויש לחשב את האיברים בנפרד:

$$\begin{aligned} a_1 &= -\frac{1}{c}, \quad a_3 = ca_1 = -1, \quad a_5 = ca_3 = -c, \quad a_7 = ca_5 = -c^2 \\ a_2 &= -\frac{c^{1-2}}{a_1} = -\frac{c^{-1}}{-\frac{1}{c}} = 1, \quad a_4 = ca_2 = c, \quad a_6 = ca_4 = c^2. \end{aligned}$$

שבעת האיברים הראשונים של הסדרה הם:

$$-\frac{1}{c}, 1, -1, c, -c, c^2, -c^2.$$

סעיף ב (2)

כאשר מסכמים את האיברים הם מctrמצמים פרט לאיבר הראשון, ולכן $S_7 = -\frac{1}{c}$.

סעיף ב (3)

כאשר יש מספר איזוגי של איברים המתחלים ממוקם איזוגי, מספר האיברים האיזוגיים גדול באחד ממספר האיברים הזוגיים. נבדוק דוגמה:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9.$$

מספר האיברים הוא 9, מהם 5 איזוגיים ו-4 זוגיים.

נצריך לסכם את זוגיים והאיזוגיים בנפרד, כי הסדרה המקורית אינה הנדסית. עבור שתי התת-סדרות, המנה הינה c , אבל האיבר הראשון שונה $1 - \frac{1}{c}$:

$$S_{odd} + S_{even} = -\frac{1}{c} \frac{c^n - 1}{c - 1} + 1 \cdot \frac{c^{n-1} - 1}{c - 1} = -\frac{1}{c},$$

לא תלוי ב- n .

סעיף ג (1)

כאן הסדרה נתונה על ידי נוסחה ולא כלל נסיגה ולכן ניתן לחשב ישירות את המנה:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\frac{2}{a_{n+1}a_{n+2}}}{\frac{1}{a_na_{n+1}}} = \frac{\frac{1}{a_{n+2}}}{\frac{1}{a_n}} = \frac{1}{\frac{a_{n+2}}{a_n}} = \frac{1}{c}.$$

סעיף ג (2)

סדרה יורדת אם $c > 1$, ולכן $0 < q = \frac{1}{c} < 1$. כלומר $c > 1$, ולכן $q = \frac{1}{c} < 1$.

סעיף ג (3)

עבור סדרה הנדסית יורדת:

$$\begin{aligned} S_b &= \frac{b_1}{1 - (1/c)} \\ &= \frac{-2}{a_1 \cdot a_2} \cdot \frac{c}{c - 1} \\ &= \frac{-2}{-\frac{1}{c} \cdot 1} \cdot \frac{c}{c - 1} \\ &= \frac{2c^2}{c - 1}. \end{aligned}$$

2.2 קייז תשע"ח מועד א

- a_n היא סדרה הנדסית אין-סופית מתכנסת שסכוםה שלילי.
 a₁ הוא האיבר הראשון בסדרה, ר' q היא מנת הסדרה.
 א. לפניו ארבע טענות (I-IV). רק אחת מהן בהכרח נכונה. צין את מספרה ונמק.

$$q < 0 \quad (\text{I})$$

$$q < 0 \text{ וגם } a_1 < 0 \quad (\text{II})$$

$$a_1 < 0 \quad (\text{III})$$

$$q < 0 \text{ או } a_1 > 0 \quad (\text{IV})$$

נסמן ב- T את סכום האיברים במקומות האיזוגיים בסדרה a_n,
 ונסמן ב- R את סכום האיברים במקומות הזוגיים בסדרה a_n.
 q הוא פרמטר.

$$\text{נתון: } T + p \cdot R = 0$$

ב. הביע את q באמצעות p.

b_n היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא p.

ג. האם b_n היא סדרה מתכנסת? נמק.

ד. נתון: q שלילי. הראה שלכל n טבעי $a_{n+1} > a_n$ (כלומר הראה שהסדרה a_n היא סדרה עולה).

סעיף א

השאלה יפה כי היא דורשת חשיבה, לא חישובים! נבדוק את הטענות על סדרה מוכרת:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 2.$$

אם נהפוך את כל הסימנים למינוס, נקבל סדרה שסכוםה שלילי:

$$-1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \dots = -\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots\right) = -2.$$

ברור שהמנה עדין חיובית:

$$\frac{-2^{-(n+1)}}{-2^{-n}} = 2^{-1} = \frac{1}{2}.$$

לכן אפשר לפסול מיד תשובות IV, II, I ונשאר רק תשובה III.

מעבר לסדרה כללית. סדרה הנדסית מתכנסת רק אם $|q| < 1$. מהנוסחה עבור הסכום:

$$S = \frac{a_1}{1 - q} < 0,$$

ניתן לראות ש- a_1 שלילי כי המכנה חיובי $2 - q < 0$.

סעיף ב'

כאן מדובר בתת-סדרות של סדרה הנדסית, ועוד תת-סדרות שאיבריהן במקומות קבוע אחד מהשני (הפרש של שני מקומות: זוגי לאזוגי או אי-זוגי לא-זוגי). לכן, המנה של כל אחת מהסדרות היא q^2 , והסכוםים הם:

$$T = \frac{a_1}{1 - q^2}, \quad R = \frac{a_1 q}{1 - q^2}.$$

$$\cdot p = -\frac{1}{q} \quad 1 + pq = 0, \text{ נקבל}$$

סעיף ג'

הסדרה לא מתכנסת כי $|p| > 1$ גורר $|q| < 1$.

סעיף ד'

שימו לב שהשאלה שואלת על **הסדרה המקורית** a_n ולא על b_n ! נתון ש- p שלילי ולכן $q = -\frac{1}{p}$ חיובי. נתון שהסדרה מתכנסת ולכן $1 < q < 0$. מצאנו בסעיף א' ש- a_1 שלילי ולכן $a_{n+1} > a_n$ כי מכפלה של מספר שלילי x עם מספר חיובי פחות מ-1 מקטינה את הערך המוחלט $|x|$ ומורידה את $-|x|$.

נבדוק בדוגמה: אם $a_n = -6$, $q = \frac{1}{2}$:

$$a_{n+1} = a_n q = -6 \cdot \frac{1}{2} = -3 > -6 = a_n.$$

2.3 חורף תשע"ח

- 2** a_n היא סדרה חשבונית שההפרש שלה, d , שונה מ-0.
- . נתון: $a_7 = -a_{17}$
 - . א. מצא את a_{12} .
 - ב. (1) האם קיימים בסדרה איבר שערכו שווה ל- a_1 – ? נמק.
 - (2) מצא מספר טבעי n שעבורו סכום n האיברים הראשונים בסדרה שווה ל-0.
 - ג. האם קיימים n טבעי שקיימים $a_n \cdot a_{n+1} < 0$? אם כן – מצא n כזה, אם לא – נמק.
 - ד. האם אפשר לדעת כמה איברים שליליים יש בסדרה? נמק (הבחן בין מקרים שונים).

שאלה זו מתאפיין בהצבה של נוסחאות לאיירם מסוימים לתוכן הנוסחאות הכלליות.

סעיף א

$$\text{נציב } d \text{ במשוואת } a_7 = -a_{17} \text{ במשוואת } a_1 + (n-1)d$$

$$\begin{aligned} a_7 &= a_1 + 6d = -(a_1 + 16d) = -a_{17} \\ a_1 + 11d &= 0 \\ a_{12} &= a_1 + 11d = 0. \end{aligned}$$

סעיף ב (1)

נשווה את $-a_1$ – לנוסחה לאייר כללי:

$$-a_1 = a_n = a_1 + (n-1)d.$$

נציב $a_1 = -11d$ שישבנו בסעיף א:

$$-(-11d) = -11d + (n-1)d.$$

$n = 23$ מצטמצם ונקבל d

סעיף ב (2)

נציב $a_1 = -11d$ בנוסחה לסכום של סדרה חשבונית:

$$\frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(2 \cdot -11d + (n-1)d) = \frac{dn}{2}(n-23) = 0.$$

נתון שההפרש d שונה מאפס ושה- n מספר טבעי ולכון חיובי, כך שהביטוי מהתאים רק עבור $n = 23$.

סעיף ג

אם איבר חיובי וההפרש חיובי, המכפלה של שני איברים עוקבים היא חיובית, וכך גם אם שניהם שליליים. האפשרות היחידה לקבל מכפלה שלילית היא איבר שלילי והפרש חיובי או איבר חיובי והפרש שלילי:

$$a_k < 0, \quad a_{k+1} > 0$$

$$a_k > 0, \quad a_{k+1} < 0.$$

אבל ידוע שאחד האיברים בסדרה (a_{12}) הוא אפס:

$$a_k < 0, \quad a_{k+1} = 0, \quad a_{k+2} > 0$$

$$a_k > 0, \quad a_{k+1} = 0, \quad a_{k+2} < 0,$$

ולכן המכפלה של זוג איברים עוקבים חייבת להיות חיובית או אפס.

סעיף ד

נרשום את הסדרה לפי מה שידוע לנו ש- $a_{12} = 0$:

$$a_1, \quad a_2, \quad \dots, \quad a_{11}, \quad 0, \quad -a_{11}, \quad \dots, \quad -a_2, \quad -a_1, \quad \dots.$$

או ש- a_{11} האיברים הראשונים שליליים אם ההפרש חיובי, או כל האיברים לאחר האיבר $a_{12} = 0$ שליליים אם ההפרש שלילי.

2.4 קייז תשע"ז מועד ב

2. נתונה סדרה כללית a_n .

נסמן ב- S_n את סכום כל האיברים הראשונים בסדרה a_n .

נתון: $S_n = k - \frac{1}{3^{n+1}}$ לכל n טבעי. k הוא מספר קבוע.

א. הבע את a_1 ואת האיבר הכללי a_n עבור $n < 1$ באמצעות n ו- k במידת הצורך.

ב. מצא את k שעבורו הסדרה a_n היא סדרה הנדסית. נמק.

נגיד: $T = a_2^2 + a_5^2 + a_8^2 + \dots$ (סכום ריבועי כל איבר שלישי בסדרה a_n החל מב- a_2).

ג. חשב את T .

שאלה זו שונה משאלות אחרות כי נתון ביטוי עבור **סכוםם** ולא עבור האיברים בסדרה.

סעיף א

ניתן לחשב את האיברים על ידי שימוש בנוסחה עבור S_n . האיבר הראשון מתקבל ישירות מהנוסחה:

$$a_1 = S_1 = k - \frac{1}{3^{1+1}} = k - \frac{1}{9},$$

והאיבר הכללי מתקבל על ידי ההפרש בין הנוסחאות לסכומים עוקבים:

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \left(k - \frac{1}{3^{n+1}}\right) - \left(k - \frac{1}{3^n}\right) = \frac{2}{3^{n+1}}.$$

סעיף ב

המנה $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{3}$ לא תלואה ב- n . במבט ראשון נראה שההתשובה היא שהסדרה היא הנדסית עבור כל ערך של n , אולם זו טעות. המנה המתקבלת מ- $\frac{a_2}{a_1}$ חייבת להיות שווה למנה המתבללת מהמקורה הכללי $\frac{a_{n+1}}{a_n}$. נחשב:

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{\frac{2}{3^3}}{k - \frac{1}{9}} = \frac{2}{3(9k - 1)} = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{3}.$$

הפתרון היחיד הוא $k = \frac{1}{3}$.

עבור ה**סעיף הבא** נדרש את האיבר הראשון:

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{2}{9},$$

סעיף ג

האיבר הראשון בסדרה החדשה הוא:

$$a'_1 = a_2^2 = (a_1 q)^2 = \left(\frac{2}{9} \cdot \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{729},$$

הסדרה החדשה היא הנדסית:

$$\left(\frac{a_{3(k+1)-1}}{a_{3k-1}}\right)^2 = \left(\frac{qa_{3k+1}}{a_{3k-1}}\right)^2 = \left(\frac{q^2 a_{3k}}{a_{3k-1}}\right)^2 = \left(\frac{q^3 a_{3k-1}}{a_{3k-1}}\right)^2 = q^6 = \left(\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{1}{729}.$$

הסכום מתקיים מהנוסחה לסדרה הנדסית נוספת עבור a', q'

$$S' = \frac{a'_1}{1 - q'} = \frac{\frac{4}{729}}{1 - \frac{1}{729}} = \frac{1}{182}.$$

2.5 קיז' תשע"ז מועד א

$$\cdot a_n = \frac{(2^n + 1)(2^n - 1)}{2^n}$$

. $a_n = b_n - c_n$ הן סדרות הנדסיות שכל איבריהן חיוביים, המקייםות לכל n טבעי:

$$\text{נתון: } b_6 = 64, c_3 = \frac{1}{8}$$

א. (1) מצא את b_1 ואת המנה של הסדרה.

(2) מצא את c_1 ואת המנה של הסדרה.

את סכום n האיברים הראשונים בסדרה a_n נסמן ב- A_n .

את סכום n האיברים הראשונים בסדרה b_n נסמן ב- B_n .

ו את סכום n האיברים הראשונים בסדרה c_n נסמן ב- C_n .

ב. הראה ש- $C_n = B_n - A_n$

ג. עבור אילו ערכי n מתקיים האידויון: $0.9 < B_n - A_n < 1$?

הנוסחה ל- a_n אינה כלל נסיגה כי איברים של הסדרה לא מופיעים בצד הימני של המשוואה. נתון

שהסדרות b_n, c_n הנדסיות אך לא נתון אם הסדרה המקורית a_n הנדסית או לא.

סעיף א (1,2)

נתון ש- $a_n = b_n - c_n$, לכן כדי לקבל ערך של איבר בסדרה b_n , נctrיך לחשב את הערכים a_n, c_n ובאופן דומה עבור איברים בסדרה c_n . נתון שני ערכי b_6, c_3 וקל לחשב איברים ב- a_n כי הם נתונים כפונקציה של n בלבד:

$$a_3 = \frac{(2^3 + 1)(2^3 - 1)}{2^3} = \frac{63}{8} \quad a_6 = \frac{(2^6 + 1)(2^6 - 1)}{2^6} = \frac{65 \cdot 63}{64}$$

$$b_3 = a_3 + c_3 = \frac{63}{8} + \frac{1}{8} = 8 \quad c_6 = b_6 - a_6 = 64 - \frac{65 \cdot 63}{64} = \frac{1}{64}.$$

כדי לחשב את מנתה של b_n ומהמנה של c_n השתמש בעובודה שהן סדרות הנדסיות וכךได' לקבל את האיבר השלישי מהאיבר השלישי יש להכפיל מנתה לחזקת שלוש:

$$\begin{aligned} b_6 &= b_3 q_b^3 & q_b &= \sqrt[3]{\frac{b_6}{b_3}} = \sqrt[3]{8} = 2 & b_3 &= b_1 q_b^2 & b_1 &= \frac{b_3}{q_b^2} = \frac{8}{4} = 2 \\ c_6 &= c_3 q_c^3 & q_c &= \sqrt[3]{\frac{c_6}{c_3}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2} & c_3 &= c_1 q_c^2 & c_1 &= \frac{c_3}{q_c^2} = \frac{1/8}{1/4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

סעיף ב

הטייעון נובע מחוקיקי הקיבוץ והחילוף של מספרים שלמים:

$$\begin{aligned} C_n &= (b_1 - a_1) + (b_2 - a_2) + \cdots + (b_n - a_n) \\ &= (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \\ &= B_n - A_n. \end{aligned}$$

סעיף ג

הוכחנו ש- $C_n = B_n - A_n$, ונתונה שהסדרה c_n הנדסית. מסעיף א' ולבו:

$$C_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1\right)}{\left(\frac{1}{2} - 1\right)} = 1 - 2^{-n}.$$

בדיקה במחשבון מראה ש:

$$0.9 < 1 - 2^{-3} = 0.875 < 1$$

$$0.9 < 1 - 2^{-4} = 0.938 < 1.$$

לא לעצור לנו! השאלה מבקשת את **כל הערכים** של n המקיימים את האידויון, ולכן התשובה המלאה היא כל מספר גדול או שווה ל- -4 , כי כאשר n גדול מעלה -4 , הערך של $1 - 2^{-n}$ עולה (ולכן גדול מ-0.9) אבל תמיד פחות מ-1.

2.6 חורף תשע"ז

נתונה סדרה a_n המקיים את כלל הנסיגה: $a_1 = -1$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{4 \cdot a_n + 3}$

$$\text{נגיד סדרה חדשה } b_n = \frac{1}{a_n} + 2$$

א. הוכח כי b_n היא סדרה הנדסית.

$$\text{ב. הבע באמצעות } n \text{ את הסכום: } \cdot \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}$$

ג. נתון: n הוא מספר זוגי.

$$\cdot \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_4} + \dots + \frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n}$$

סעיף א

נחשב את המנה על ידי הצבה עבור b_n לפי ההגדרה, ולאחר כך הצבה עבור a_{n+1} לפי כלל הנסיגה. נקבל מנה קבועה ולכן הסדרה הנדסית:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\frac{1}{a_{n+1}} + 2}{\frac{1}{a_n} + 2} = \frac{\frac{4a_n + 3}{a_{n+1}} + 2}{\frac{1}{a_n} + 2} = \frac{\frac{3(2a_n + 1)}{a_{n+1}} + 2}{\frac{1}{a_n} + 2} = \frac{3(2a_n + 1)}{2a_n + 1} = 3.$$

סעיף ב

לא נתון שהסדרה a_n הנדסית, אבל בסעיף א הוכיחו שהסדרה b_n הנדסית, ולכן ניתן לבטא את סכום הסדרה $\frac{1}{a_i}$ כסכום של הסדרה b_n על ידי החוצה $b_i - 2$:

$$\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n} = (b_1 - 2) + \dots + (b_n - 2) = b_1 + \dots + b_n - 2n.$$

נתון ש $a_1 = -1$, $b_1 = \frac{1}{a_1} + 2 = 1$ והוא קבועה. סכום הסדרה של b_n הוא:

$$b_1 + \dots + b_n = \frac{1(3^n - 1)}{3 - 1} - 2n = \frac{3^n - 4n - 1}{2}.$$

סעיף ג

לפי ההגדרה של b_n נוכל לבטא את הסכום כך:

$$(b_1 - 2) - (b_2 - 2) + \dots + (b_{n-1} - 2) - (b_n - 2).$$

נתון שמספר האיברים הזוגיים ולכן סכום הקבועים מתאפס. המנה של הסדרה היא -3 והסכום הוא:

$$b_1 - b_2 + \dots + b_{n-1} - b_n = \frac{1((-3)^n - 1)}{-3 - 1} = \frac{(-3)^n - 1}{-4} = \frac{1 - 3^n}{4},$$

כי מספר האיברים הזוגיים ולכן $(-3)^n = 3^n$.

2.7 קיז תשע"ו מועד ב

- .2. נתונה סדרה חשבונית שיש בה n איברים. הפרש הסדרה הנתונה הוא 3, בין כל שני איברים עוקבים הכניסו איבר אחד נוספת, וኖצרה סדרה חשבונית חדשה.
- (1) הראה כי היחס בין סכום האיברים בסדרה החדשה לסכום האיברים בסדרה הנתונה הוא $\frac{2n-1}{n}$.
- (2) נתון כי היחס שਮופיע בתת-סעיף (1) שווה ל-1.9. סכום של כל האיברים שהכניסו לסדרה הנתונה הוא 130.5. מצא את האיבר הראשון בסדרה הנתונה.
- ב. יוצרים סדרה חשבונית נוספת על ידי הכנסת k איברים בין כל שני איברים עוקבים של הסדרה הנתונה. הביע באמצעות k את הפרש הסדרה המתבקשת.

סעיף א (1)

מספר האיברים החדשים הוא $1 - n$, כפי שראויים אם רושמים את הסדרה:

$$a_1, a'_1, a_2, a'_2, \dots, a_{n-1}, a'_{n-1}, a_n.$$

נתון שהסדרה החדשה גם היא חשבונית. הפרש הסדרה אינם מספר שלם אלא 1.5! אז מה? נחשב את היחס בין סכומי הסדרות, כאשר האיבר a_1 מצטמצם:

$$\frac{S_{new}}{S_{old}} = \frac{\frac{2n-1}{2}(2a_1 + 1.5(2n-1-1))}{\frac{n}{2}(2a_1 + 3(n-1))} = \frac{\frac{2n-1}{2}(2a_1 + 3(n-1))}{\frac{n}{2}(2a_1 + 3(n-1))} = \frac{2n-1}{n}.$$

סעיף א (2)

מ- $\frac{2n-1}{n} = 1.9$ נקבע $n = 10$. אם הסדרה הנתונה חשבונית וגם הסדרה החדשה חשבונית, סדרת האיברים החדשים היא חשבונית עם אותו הפרש כמו בסדרה המקורית, 3. האיבר הראשון של האיברים החדשים הוא $a'_1 = a_1 + 1.5$, וננתן סכום האיברים החדשים:

$$\frac{10-1}{2}(2(a_1 + 1.5) + ((10-1)-1) \cdot 3) = 130.5,$$

והפתרון הוא $a_1 = 1$.

סעיף ב

נתון שהסדרה המתבקשת לאחר הכנסת k איברים חדשים בין איברים סמוכים של הסדרה הנתונה:

$$a_i, b_1, b_2, \dots, b_k, a_{i+1}$$

היא חשבונית. ההפרשים בין האיברים החדשים חייבים להיות שווים וסכום שווה להפרש של הסדרה הנתונה שהוא 3. יש $k+1$ הפרשים שערכם $\frac{3}{k+1}$.

2.8 קיז תשע"ו מועד א

- . $a_4 + a_8 + a_{12} + a_{16} = 224$ המקיים:
א. מצא את הסכום של 19 האיברים הראשונים בסדרה a_n .

הסדרה S_n היא סדרת הסכומים החלקיים של הסדרה a_n : ...
נתון כי $a_n \cdot n = S_n$ לכל n טבעי.

- ב. הראה כי הפרש הסדרה a_n הוא 0.
ג. היעזר בסעיפים הקודמים, ומצא את a_1 .
ד. נתונה סדרה b_n המקיימת את הכלל: $b_{n+1} - b_n = a_n + S_n$ לכל n טבעי.
היעזר בסעיפים הקודמים, ומצא את הסכום
. $(b_2 - b_1) + (b_3 - b_2) + (b_4 - b_3) + \dots + (b_{20} - b_{19})$

סעיף א

האיברים a_4, a_8, a_{12}, a_{16} מהווים סדרה ששבועית עם הפרש d^4 . נתון הסכום של הסדרה:

$$(a_1 + 3d) + (a_1 + 7d) + (a_1 + 11d) + (a_1 + 15d) = 224 \\ a_1 + 9d = 56.$$

יש לנו משווה אחת עם שני נעלמים. לא נתיאש וננסה בכל זאת לחשב את הסכום S_{19} :

$$S_{19} = \frac{19}{2}(2a_1 + 18d) = 19(a_1 + 9d) = 19 \cdot 56 = 1064.$$

סעיף ב

נשווה את המשווה הנתונה $S_n = n \cdot a_n$ לנוסחה עבור סכום של סדרה ששבועית:

$$n \cdot a_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) \\ n(a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d).$$

נפשט את המשווה ונקבל $d = d/2$ שהפתרון היחיד שלו הוא 0

סעיף ג

$$\text{נכיב } 0 \text{ עבור } d: a_1 + 9d = a_1 + 0 = 56$$

סעיף ד

במבחן ראשון נראה שכדי לצלם את סכום הסדרה $b_{20} - b_1$, אבל זה מבוי סתום כי אין לנו דרך לחשב את איברי הסדרה b_n . במקום זה נחשב את $(b_{i+1} - b_i)$ ונייעזר במשווה הנתונה:

$$b_{i+1} - b_i = a_i + S_i = (a_1 + (i-1) \cdot 0) + \frac{i}{2}(2a_1 + (i-1) \cdot 0) = a_1(1+i).$$

הסכום הוא:

$$a_1(2 + 3 + \dots + 20) = 56 \cdot \frac{19}{2}(2 \cdot 2 + (19-1) \cdot 1) = 11704.$$

2.9 חורף תשע"ו

נתונה סדרה הנדסית עולה: 2.
 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$

ההפרש בין האיבר הרביעי בסדרה לאיבר השלישי גדול פי 4

מההפרש בין האיבר השני לאיבר הראשון.

האיבר השישי בסדרה גדול ב- 31 מהאיבר הראשון.

א. מצא את מנת הסדרה, ואת האיבר הראשון בסדרה.

ב. מהסדרה הנתונה בנו שתי סדרות חדשות, I ו- II:

$$\text{I. } a_1 \cdot a_2, a_2 \cdot a_3, a_3 \cdot a_4, \dots, a_n \cdot a_{n+1}, a_{n+1} \cdot a_{n+2}$$

$$\text{II. } \frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2}, \frac{a_3}{a_2} + \frac{a_4}{a_3}, \frac{a_4}{a_3} + \frac{a_5}{a_4}, \dots, \frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}$$

(1) האם כל אחת מהסדרות החדשות היא סדרה הנדסית עולה? נמק.

הסכום של כל האיברים בסדרה I הוא 2730.

(2) מצא את מספר האיברים בסדרה I.

(3) מצא את הסכום של כל האיברים בסדרה II.

סעיף א

נתון:

$$(1) a_4 - a_3 = 4(a_2 - a_1), \quad (2) a_6 - a_1 = 31.$$

נציב $.q = 1, q = 2, q = -2$ עבור $a_n = a_1 q^{n-1}$, ונקבל שלוש תשובות
 נתון שהסדרה **עליה** ולכן $q = 2$. נציב $a_1 = 1$ עבור $a_6 = a_1 q^5 = 32a_1$, ונקבל

סעיף ב (1)

עבור סדרה I:

$$q_I = \frac{a_{n+1} \cdot a_{n+2}}{a_n \cdot a_{n+1}} = \frac{a_{n+2}}{a_n} = \frac{a_n q^2}{a_n} = q^2 = 4,$$

והסדרה היא סדרה הנדסית עולה. עבור סדרה II:

$$q_{II} = \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \right) / \left(\frac{a_n}{a_{n-1}} + \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = \frac{q + q}{q + q} = 1.$$

הסדרה הנדסית אבל **לא עליה**.

סעיף ב (2)

סכום הסדרה ניתן לחשב את מספר האיברים בסדרה:

$$a_1 \cdot a_2 + \cdots + a_{n+1} \cdot a_{n+2} = 2730$$

$$(1 \cdot 2) \cdot \frac{4^{n+1} - 1}{4 - 1} = 2730$$

$$4^{n+1} = 4096$$

$$n = 5.$$

משמעותו! אם $n = 5$ אбел מספר האיברים בסדרה I הוא $n + 1 = 6$

- (1) $a_1 \cdot a_2$, (2) $a_2 \cdot a_3$, (3) $a_3 \cdot a_4$, (4) $a_4 \cdot a_5$, (5) $a_5 \cdot a_6$, (6) $a_6 \cdot a_7 (= a_{n+1} \cdot a_{n+2})$.

סעיף ב (2)

נחשב את $a_1^{II} = 1$. ניחנו

$$a_1^{II} = \frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2} = \frac{2}{1} + \frac{4}{2} = 4.$$

משמעותו! מספר האיברים בסדרה II הוא 5:

$$(1) \frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2}, \quad (2) \frac{a_3}{a_2} + \frac{a_4}{a_3}, \quad (3) \frac{a_4}{a_3} + \frac{a_5}{a_4}, \quad (4) \frac{a_5}{a_4} + \frac{a_6}{a_5}, \quad (5) \frac{a_6}{a_5} + \frac{a_7}{a_6} \left(= \frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \right).$$

ולכן סכום האיברים הוא:

$$a_1^{II} + a_1^{II} \cdot 1 + a_1^{II} \cdot 1^2 + \cdots + a_1^{II} \cdot 1^4 = 4 \cdot 5 = 20.$$

2.10 קיז תשע"ה, מועד ב

- .2. נתונה סדרה b_n המקיימת את הכלל $b_{n+1} = \frac{1}{2^n} \cdot b_n$
- א. הוכח כי האיברים העומדים במקומות הזוגיים מהווים סדרה הנדסית, וגם האיברים העומדים במקומות הזוגיים מהווים סדרה הנדסית.
- ב. סכום 8 האיברים הראשונים בסדרה b_n שווה ל- $3\frac{7}{16}$.
מצא את b_1 (מצא את שתי האפשרויות).

סעיף א

החילוק של איברים במרחב שני מקומות אחד מהשני לא תלוי בזוגיות:

$$\frac{b_{n+2}}{b_n} = \frac{1}{2^{n+1}b_{n+1}} \cdot \frac{1}{b_n} = \frac{1}{2^{n+1} \cdot \frac{1}{2^n}b_n} = \frac{1}{2}.$$

סעיף ב

נחשב בנפרד את הסכום של ארבעת האיברים הזוגיים וארבעת האיברים האזוגיים:

$$\begin{aligned} S_{odd} &= b_1 + b_3 + b_5 + b_7 = b_1 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = \frac{15}{8}b_1 \\ S_{even} &= b_2 + b_4 + b_6 + b_8 = b_2 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = \frac{15}{8}b_2 = \frac{15}{8} \cdot \frac{1}{2^1}b_1. \end{aligned}$$

מ:

$$S_{odd} + S_{even} = \frac{15}{8} \left(b_1 + \frac{1}{2^1}b_1\right) = 3\frac{7}{16} = \frac{55}{16}.$$

נקבל משוואה ריבועית $0 = 6b_1^2 - 11b_1 + 3$.

2.11 חורף תשע"ז

- נתונה סדרה הנדסית עולה: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$.
 הפרש בין האיבר הרביעי בסדרה לאיבר השלישי גדול פי 4 מהפרש בין האיבר השני לאיבר הראשון.
 האיבר השישי בסדרה גדול פי 31 מהאיבר הראשון.
 א. מצא את מנת הסדרה, ואת האיבר הראשון בסדרה.
 ב. מהסדרה הנתונה בנו שתי סדרות חדשות, I ו- II.
 I. $a_1 \cdot a_2, a_2 \cdot a_3, a_3 \cdot a_4, \dots, a_n \cdot a_{n+1}, a_{n+1} \cdot a_{n+2}$
 II. $\frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2}, \frac{a_3}{a_2} + \frac{a_4}{a_3}, \frac{a_4}{a_3} + \frac{a_5}{a_4}, \dots, \frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}$
- (1) האם כל אחת מהסדרות החדשות היא סדרה הנדסית עולה? נמק.
 הסכום של כל האיברים בסדרה I הוא 2730.
 (2) מצא את מספר האיברים בסדרה I.
 (3) מצא את הסכום של כל האיברים בסדרה II.

סעיף א

שימו לב לשאלים על **ההפרשיות** של סדרה הנדסית.

המנטון הראשון:

$$\begin{aligned} a_4 - a_3 &= 4(a_2 - a_1) \\ a_1q^3 - a_1q^2 &= 4(a_1q - a_1) \\ q^2(q - 1) &= 4(q - 1). \end{aligned}$$

פתרון אחד של המשוואה הוא $q = 1$ אבל נתון שהסדרה עולה ולכן $1 \neq q$. אם $1 \neq q \neq -1$, נחלק ב- $q - 1$ ונקבל $4 = q^2$. כאשר המנה שליל, הסימנים של איברי הסדרה מתחלפים, אז הפתרון היחיד הוא $q = 2$.

המנטון השני:

$$\begin{aligned} a_6 - a_1 &= 31 \\ a_1q^5 - a_1 &= 31 \\ 32a_1 - a_1 &= 31 \\ a_1 &= 1. \end{aligned}$$

סעיף ב (1)

עבור סדרה I:

$$q_I = \frac{a_{n+1} \cdot a_{n+2}}{a_n \cdot a_{n+1}} = \frac{a_{n+2}}{a_n} = \frac{a_n q^2}{a_n} = q^2 = 4,$$

והסדרה היא סדרה הנדסית עולה.

עבור סדרה II:

$$q_{II} = \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \right) / \left(\frac{a_n}{a_{n-1}} + \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = \frac{q+q}{q+q} = 1.$$

הסדרה הנדסית אבל לא עולה.

סעיף ב (2)

מסכום הסדרה ניתן לחשב את מספר האיברים בסדרה:

$$\begin{aligned} a_1 \cdot a_2 + \cdots + a_{n+1} \cdot a_{n+2} &= 2730 \\ (1 \cdot 2) \cdot \frac{4^{n+1} - 1}{4 - 1} &= 2730 \\ 4^{n+1} &= 4096 \\ n &= 5. \end{aligned}$$

שימו לב! אמם $n = 5$ אבל מספר האיברים בסדרה I הוא $6 = n + 1$.

- (1) $a_1 \cdot a_2$, (2) $a_2 \cdot a_3$, (3) $a_3 \cdot a_4$, (4) $a_4 \cdot a_5$, (5) $a_5 \cdot a_6$, (6) $a_6 \cdot a_7 (= a_{n+1} \cdot a_{n+2})$.

סעיף ב (3)

чисבנו $1 = q_{II}$. נחשב את a_1^{II} :

$$a_1^{II} = \frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2} = \frac{2}{1} + \frac{4}{2} = 4.$$

שימו לב! מספר האיברים בסדרה II הוא 5:

$$(1) \frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2}, (2) \frac{a_3}{a_2} + \frac{a_4}{a_3}, (3) \frac{a_4}{a_3} + \frac{a_5}{a_4}, (4) \frac{a_5}{a_4} + \frac{a_6}{a_5}, (5) \frac{a_6}{a_5} + \frac{a_7}{a_6} \left(= \frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \right).$$

$a_1 = 4 \cdot 5 = 20$ ולכן כל איברי הסדרה שוים ל-4. המסכום הוא: $1 = q_{II} \cdot 20$.

2.12 קיז תשע"ה מועד ב

2. נתונה סדרה b_n המקיים את הכלל $b_{n+1} = \frac{1}{2^n \cdot b_n}$
- א. הוכיח כי האיברים העומדים במקומות הזוגיים בסדרה מהווים סדרה הנדסית, וגם האיברים העומדים במקומות הזוגיים מהווים סדרה הנדסית.
- ב. סכום 8 האיברים הראשונים בסדרה b_n שווה ל- $3\frac{7}{16}$.
מצא את b_1 (מצא את שתי האפשרויות).

סעיף א

החלוקת של איברים במרחב שני מקומות אחד מהשני לא תלוי בזוגיות:

$$\frac{b_{n+2}}{b_n} = \frac{1}{2^{n+1} \cdot b_{n+1} \cdot b_n} = \frac{1}{2^{n+1} \cdot \frac{1}{2^n \cdot b_n} \cdot b_n} = \frac{1}{2}.$$

סעיף ב

אנחנו לא יודעים אם הסדרה יכולה היא הנדסית, לכן נחשב בנפרד את הסכום של ארבעת האיברים הזוגיים וארבעת האיברים האיזוגיים:

$$\begin{aligned} S_{odd} &= b_1 + b_3 + b_5 + b_7 = b_1 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = \frac{15}{8}b_1 \\ S_{even} &= b_2 + b_4 + b_6 + b_8 = b_2 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = \frac{15}{8}b_2 = \frac{15}{8} \cdot \frac{1}{2^1 b_1}. \end{aligned}$$

מ:

$$S_{odd} + S_{even} = \frac{15}{8} \left(b_1 + \frac{1}{2b_1}\right) = 3\frac{7}{16} = \frac{55}{16}.$$

נקבל משואה ריבועית $0 = 6b_1^2 - 11b_1 + 3$

2.13 קייז תשע"ה מועד א

. $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ נתונה סדרה הנדסית אין-סופית יורדת שכל איבריה חיוביים: כל איבר בסדרה זו (חו"ז מהראשון) הוא $\frac{2}{5}$ מסכום שני האיברים הסמוכים לו, אחד לפניו ואחד אחריו.

א. מצא את המנה של הסדרה .

ב. נתונה הסדרה $b_n = \frac{a_{n+1}}{(a_n)^2}$.

(1) הוכח כי הסדרה b_n היא סדרה הנדסית.

(2) סכום עשרת האיברים הראשונים בסדרה b_n הוא 20,460

מצא את סכום כל האיברים בסדרה a_n .

סעיף א

נתון:

$$a_n = \frac{2}{5}(a_{n-1} + a_{n+1}) = \frac{2}{5} \left(\frac{a_n}{q} + q a_n \right)$$

עבור n . a_n מצטמצם ונקבל משווה ריבועית $2q^2 - 5q + 2 = 0$ שיש לה שני פתרונות
 $q_a = \frac{1}{2}, q = 2$.

סעיף ב (1)

$$q_b = \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\frac{a_{n+2}}{(a_{n+1})^2}}{\frac{(a_n)^2}{a_{n+1}}} = \frac{a_{n+2}}{(a_{n+1})^2} \cdot \frac{(a_n)^2}{a_{n+1}} = \frac{a_n q^2}{(a_n q)^2} \cdot \frac{(a_n)^2}{a_n q} = \frac{1}{q} = 2 .$$

סעיף ב (2)

מ:

$$S_{10} = \frac{b_1(2^{10} - 1)}{2 - 1} = 20460$$

מתקיים $b_1 = 20$. השאלה מבקשת את סכום **הסכום המקורי** a_n . כבר חישבנו את המנה q_a וניתן לחשב את a_1 מהנוסחה עבור b_n :

$$b_1 = \frac{a_2}{a_1^2} = \frac{a_1 q_a}{(a_1)^2} = \frac{1}{2a_1}$$

$$a_1 = \frac{1}{2b_1} = \frac{1}{40}$$

$$S_a = \frac{a_1}{1 - q_a} = \frac{1}{40 \left(1 - \frac{1}{2} \right)} = \frac{1}{20} .$$

2.14 חורף תשע"ה

$$a_1 = 4$$

.2. סדרה מוגדרת לכל $n \in \mathbb{N}$ על ידי הכלל:

$$a_n + a_{n+1} = 4n + 2$$

א. אם בסדרה יש 100 איברים, מצא את הסכום של שני האיברים העומדים במקומות

האמצעיים בסדרה.

ב. הוכח כי איברי הסדרה העומדים במקומות אי-זוגיים מהווים סדרה חשבונית, וגם איברי הסדרה העומדים במקומות הזוגיים מהווים סדרה חשבונית.

אם בסדרה יש 101 איברים, מצא:

ג. את האיבר העומד באמצע הסדרה.

ד. את הסכום של כל איברי הסדרה.

שימו לב שלא נתון שהסדרה כולה היא חשבונית.

סעיף א

כדי לרשום את איברי הסדרה כדי לוודא מהם האיברים الأوسطים:

$$\overbrace{a_1, a_2, \dots, a_{49}}^{50}, \overbrace{a_{50}, a_{51}, a_{52}, \dots, a_{100}}^{50}.$$

ניתן לחשב את הסכום מהגדרת הסדרה:

$$a_{50} + a_{51} = 4 \cdot 50 + 2 = 202.$$

סעיף ב

במבחן ראשון השאלה נראה ב unintuitively כי נתונה נוסחה לחישוב איברים סמוכים זה לזה $a_n + a_{n+1}$, אבל האיברים הזוגיים נמצאים במרחק שני מקומות זה מזה וכך גם האיברים האי-זוגיים $a_{n+2} - a_n$. צמד הביטויים האלה יכול לרמזו ל- "טريق" ידוע במתמטיקה: אם נוסיף ונקסיר את אותו ערך לביטוי, ערך הביטוי לא משתנה:

$$\begin{aligned} a_{k+2} - a_k &= a_{k+2} + (a_{k+1} - a_{k+1}) - a_k \\ &= (a_{k+2} + a_{k+1}) - (a_{k+1} + a_k) \\ &= (4(k+1) + 2) - (4k + 2) \\ &= 4. \end{aligned}$$

ההפרש קבוע ולא תלוי בזוגיות, ולכן הזוגיים והאי-זוגיים מהווים סדרות חשבוניות.

סעיף ג

לא ידוע שהסדרה a_n חשבונית, אבל a_{51} הוא איבר בסדרת **האי-זוגיים**. נרשום את הסדרה כדי לדijk במספר האיברים הזוגיים והאי-זוגיים:

$$\overbrace{a_1, a_2, \dots, a_{49}, a_{50}}^{50}, a_{51}, \overbrace{a_{52}, \dots, a_{100}, a_{101}}^{50}.$$

ברור שמספר האיברים האי-זוגיים גדול באחד ממספר האיברים הזוגיים, 51 אי-זוגיים ו-50 זוגיים. a_{51} הוא האיבר ה-25 העומד באמצע הסדרה. האיבר הראשון של המספרים האי-זוגיים נתון, $a_1 = 4$, ואת ההפרש $d = 4$ חישבנו בסעיף הקודם. מכאן:

$$a_{51} = a_1 + 25d = 4 + 25 \cdot 4 = 104.$$

סעיף ד

נחשב את סכום הסדרה כחיבור של סכום האי-זוגיים וסכום הזוגיים. $a_1 = 4$ נתון, וניתן לחשב לפי הנוסחה הנתונה:

$$a_2 = a_{1+1} = 4 \cdot 1 + 2 - a_1 = 4 + 2 - 4 = 2.$$

כבר חישבנו שה הפרשים של שתי תת-הסדרות הם 4. מספר האי-זוגיים הוא 51 ומספר הזוגיים הוא 50. הסכום הוא:

$$S = S_{odd} + S_{even} = \frac{51}{2}(2 \cdot 4 + 50 \cdot 4) + \frac{50}{2}(2 \cdot 2 + 49 \cdot 4) = 5304 + 5000 = 10304.$$

2.15 קיז תשע"ד מועד ב

.2 נתונה סדרה חשבונית: a_1, a_2, a_3, \dots

שלושה איברים עוקבים בסדרה, מקיימים:

$$a_{n+2}^2 - a_n^2 = 216$$

$$a_n + a_{n+1} + a_{n+2} = 54$$

א. מצא את האיבר a_n .

ב. לקחו חלק מהאיברים בסדרה הנתונה ובני סדרה חשבונית חדשה:

$$a_5, a_9, a_{13}, \dots, a_{4k+1}$$

סכום כל האיברים בסדרה החדשה הוא 450.

האיבר הראשון בסדרה הנתונה בפתיים הוא $a_1 = -21$

מצא את הערך של k .

סעיף א

הסדרה חשבונית ולכן ניתן להשתמש להציג בתוך המשוואות הנתונות ולקבל שתי משוואות עם שני נעלמים:

$$\begin{aligned} (a_n + 2d)^2 - a_n^2 &= 216 \\ 4a_n d + 4d^2 &= 216 \\ a_n + (a_n + d) + (a_n + 2d) &= 54 \\ 3a_n + 3d &= 54. \end{aligned}$$

הפתרון הוא $d = 3, a_n = 15$

סעיף ב

הסדרה החדשה חשבונית שאיבריה a'_1, a'_2, \dots הם:

$$\overbrace{a_5 = a_1 + 4d}^{a'_1}, \quad a_6 = a_5 + 5d, \quad a_7 = a_5 + 6d, \quad a_8 = a_5 + 7d, \quad \overbrace{a_9 = a_5 + 8d}^{a'_2}.$$

בסדרה החדשה $a'_1 = a_5 = -21 + 4d = -9$ ו- $d' = 4d = 12$.

$$\frac{k}{2}(2a'_1 + (k-1)d') = \frac{k}{2}(-18 + (k-1) \cdot 12) = 450$$

מתקובלת משווה ריבועית 0 $2k^2 - 5k - 150 = 0$

2.16 קיז תשע"ד מועד א

- .2. בסדרה חשבונית יש 3 איברים.
 סכום 2 האיברים האחרונים גדול פי 2 מסכום 2 האיברים הקודמים להם.
 א. הוכח שסכום 2 האיברים הראשונים הוא 0.
 ב. נתון גם שסכום האיברים החמישי והשביעי הוא 0.
 סכום כל איברי הסדרה הוא 726.
 מצא את הפרש הסדרה.

סעיף א

כדי לבדוק עם האינדקסים כדי לרשום את הסדרה עם סימונו של הסדרות החלקיים:

$$\underbrace{a_1, a_2, \dots, a_n}_{S_1}, \underbrace{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, a_{2n}}_{S_2}, \underbrace{a_{2n+1}, a_{2n+2}, \dots, a_{3n}}_{S_3}.$$

$$\text{נתון: } S_3 = 2S_2$$

$$\begin{aligned} \frac{n}{2}(2(a_1 + 2nd) + (n - 1)d) &= 2 \cdot \frac{n}{2}(2(a_1 + nd) + (n - 1)d) \\ 2a_1 + (5n - 1)d &= 4a_1 + (6n - 2)d \\ 2a_1 + (n - 1)d &= 0. \end{aligned}$$

הביטוי בצד השמאלי של המשוואה האחרון הוא הסכום S_1 .
 דרך אחרת לפטור את הבעה היא להחסיר את סכום התת-הסדרות מסכום הסדרה כולה:

$$\begin{aligned} S_1 &= S_{3n} - (S_2 + S_3) = S_{3n} - (S_2 + 2S_2) = S_{3n} - 3S_2 \\ &= \frac{3n}{2}(2a_1 + (3n - 1)d) - 3 \cdot \frac{n}{2}(2(a_1 + nd) + (n - 1)d) \\ &= 0. \end{aligned}$$

בבוחינה של חורף תשע"ב אורך הסדרה הוא $1 - 2n$, ונתונים הסכומים של n האיברים הראשונים ו- n האיברים האחרונים. רק רישום זהיר של הסדרה יבהיר שיש חפיפה בין שתי תתי הסדרות:

$$\overbrace{a_1, a_2, \dots, a_n}^n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, a_{2n-1}.$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_n$

בדוגמה קל יותר לשים לב לחפיפה. עם $n = 4$:

$$\overbrace{a_1, a_2, a_3, a_4}^4, a_5, a_6, a_7.$$

$\underbrace{\hspace{4em}}_4$

סעיף ב

נתון סכום הסדרה ועלינו למצוא d למרות שאין לנו a_1 . נבדוק אם הנתון השני יכול לעזור:

$$a_5 + a_7 = (a_1 + 4d) + (a_1 + 6d) = 0.$$

$$\text{מכאן } d = -5a_1.$$

בסעיף א חישבנו $S_1 = 0$ ונציב עבור a_1 :

$$\frac{n}{2}(-10d + (n-1)d) = 0.$$

לא יכול להיות 0 כי אחרת מהנתון שהסכום של שני איברים הוא אפשר להסיק שככל איברי הסדרה הם אפס. זה סותר את הנתון שהסכום הוא מספר חיובי. לכן אפשר לחלק את המשווה $n = 11$ ונקבל $d = -5a_1$.

נציב עבור n בנוסחה ל- S_{3n} :

$$\begin{aligned} S_3 &= \frac{3n}{2}(2a_1 + (3n-1)d) \\ &= \frac{33}{2}(-10a_1 + (33-1)d) \\ &= \frac{33}{2} \cdot 22d = 363d = 726, \end{aligned}$$

$$\text{ונקבל } d = 2.$$

2.17 חורף תשע"ז

2. נתונה סדרה הנדסית אינ-סופית יורדת: $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$

סכום כל איברי הסדרה בלי האיבר הראשון הוא 6.

מחליפים את הסימנים של כל האיברים הנמצאים במקומות הזוגיים בסדרה,

$a_1, -a_2, a_3, -a_4, \dots$ וمت�בלת סדרה הנדסית חדשה:

סכום כל איברי הסדרה החדשה בלי האיבר הראשון הוא 3.

מהאיברים של הסדרה הנתונה בנו סדרה שלישית: $\frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_3}, \frac{1}{a_4}, \dots$

א. הוכח כי הסדרה השלישית היא סדרה הנדסית.

ב. נתון כי סכום n האיברים הראשונים בסדרה השלישית הוא 273.25.

מצא את n .

סעיף א

המנה של הסדרה השלישית קבועה כי נתון שהסדרה הראשונה הנדסית:

$$\frac{1/a_{n+1}}{1/a_n} = \frac{a_n}{a_{n+1}}.$$

סעיף ב

נשתמש בשני הטעונים הנתונים כדי לכתוב שתי משוואות עם שני נעלמים:

$$\begin{aligned} \frac{a_2}{1-q} &= 6 \\ \frac{-a_2}{1-(-q)} &= -3. \end{aligned}$$

$$a_2 = 4 \quad \text{ו-} \quad q = \frac{1}{3}$$

בסדרה השלישית, האיבר הראשון הוא $\frac{1}{d} = 3$ וההפרש הוא $\frac{1}{4} = \frac{1}{a_2}$ מהטעום השלישי ונקבל:

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{3^n - 1}{3 - 1} = 273.25$$

$$3^n = 2187$$

$$n = 7,$$

כאשר בדקנו חזקתו של 3 עד שהתקבל 2187.

המלצות

- **חוובה לקרוא את השאלות בזיהירות רבה.** בבחינה של קיז תשע"ה א' סעיף ב שואלת על סדרה חדשה b_n אבל בסוף חוזרת וمبקשת למצוא את הסכום של הסדרה הנתונה a_n .
- **שיםו לב אם סדרה היא חשבונית, הנדסית או לא זו ולא זו.**
- **ברוב השאלות נתונה סדרה ומוגדרת סדרה חדשה המובוססת על הסדרה הנתונה. אין בהכרח קשר בין תוכנה של הסדרה המקורית והסדרה החדשה.** להלן שתי סדרות חשבוניות, אבל כאשר משלבים את שתיהן, מתקבלת סדרה שאיננה חשבונית:

$$1, 4, 7, 10, 13, \dots$$

$$2, 5, 8, 11, 14, \dots$$

$$1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, \dots$$

- כאשר מבקשים להוכיח שת-סדרת הזוגיים חשבונית או הנדסית וגם שת-סדרת האיזוגיים, הוכחה אחת תספק כי אם $\frac{a_{n+2}}{a_n}$ קבוע, לא משנה אם n זוגי או אי-זוגי.
- כדי לרשום את איברי הסדרה כדי לבדוק במקומות של האיברים:

$$\overbrace{a_1, a_2, \dots, a_{49}, a_{50}}^{50}, \overbrace{a_{51}, a_{52}, \dots, a_{100}}^{50}$$

$$\underbrace{\overbrace{a_1, a_2, \dots, a_{49}, a_{50}}_{50}, \overbrace{a_{51}, a_{52}, \dots, a_{100}, a_{101}}_{50}}_{50}.$$

- מקרה מעניין הוא שת-סדרות חופפות (בחינה של חורף תשע"ב שלא נמצאת במסמך זה):

$$\overbrace{a_1, a_2, \dots, a_n}^n, \overbrace{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, a_{2n-1}}_n$$

- קיימות שתי דרכים לסכם מספר שת-סדרות (בחינה של קיז תשע"ד). דרך אחת היא לסכום כל שת-סדרות בנפרד עם ערכי d , a_1 או q , n שלහן. זה קורה לעיתים קרובות כאשר השאלה מבקשת לחשב סכום של סדרה, אבל ידוע רק שת-סדרות חשבוניות או הנדסיות, למשל, זוגיים או איזוגיים (בחינה של קיז תשע"ח ב).

- דרך אחרת היא לחבר הסכומים של שת-סדרות ולהחסיר את התוצאה מסכום הסדרה כולה:

$$S_1 = S_n - (S_2 + S_3).$$

- בסדרה קיימים ארבעה נעלמים d, a_1, S, n, q . כדי למצוא את ערכו של נעלם אחד, צריך לדעת את ערכי שלושת הנעלמים האחרים (או שניים אם לא מדובר בסכום). לעיתים מספיק לדעת את הקשר בין שני נעלמים, כגון $0 = a_1 + 11d$ בבחינה של חורף תשע"ח.

- הבדיקה של חורף תשע"ו מעניינת כי מספר האיברים הוא לא הערך של המספר n המופיע בשאלת. חשוב לרשום דוגמה מספרית כדי לוודא מהו מספר האיברים:

$$(1) a_1 \cdot a_2, \quad (2) a_2 \cdot a_3, \quad \dots \quad (5) a_5 \cdot a_6 = (a_n \cdot a_{n+1}), \quad (6) a_6 \cdot a_7 (= a_{n+1} \cdot a_{n+2}).$$

- טריון שימושי הוא לחבר ולהחסיר את אותו ערך בביטוי (בדיקה חורף תשע"ה):

$$a_{k+2} - a_k = a_{k+2} + (a_{k+1} - a_{k+1}) - a_k = (a_{k+2} + a_{k+1}) - (a_{k+1} + a_k).$$

- הכנסת איברים חדשים בתוך סדרה לא בהכרח שומרת על הסדרה כחובונית או הנדסית. השורה הראשונה להלן היא סדרה חשבונית. בשורה השנייה הוכנסו איברים של סדרה חשבונית נוספת והסדרה החדשה היא חשבונית. בשורה השלישיית הוכנסו איברים של סדרה חשבונית נוספת והסדרה החדשה אינה חשבונית.

$$1, \quad 5, \quad 9, \quad 13, \quad 17$$

$$1, \quad 3, \quad 5, \quad 7, \quad 9, \quad 11, \quad 13, \quad 15, \quad 17$$

$$1, \quad 2, \quad 5, \quad 6, \quad 9, \quad 10, \quad 13, \quad 14, \quad 17$$

בבדיקה של קיז תשע"ו ב כתוב במפורש שהסדרה חדשה חשבונית.

- באישוב הפרש אומנה, כדאי להציב ב- a_{n+1} או a_{n-1} ביטוי שיש בו a_n . הנה דוגמה מבדיקה של קיז תשע"ה א' :

$$a_n = \frac{2}{5}(a_{n-1} + a_{n+1}) = \frac{2}{5} \left(\frac{a_n}{q} + qa_n \right).$$

מצטמצם ונקבל משווהה ריבועית ב- q .

פרק 3 הסתברות

3.1 קיז תשע"ח מועד ב

במבחן רב-ברירה ("אמריקני") יש 5 שאלות.

כל שאלה מוצגת 4 תשובות, אך רק אחת מהן נכונה.

התלמידים צריכים לסמך תשובה אחת מבין 4 התשובות המוצגות.

תלמיד שמסמן את התשובה הנכונה על השאלה מקבל 20 נקודות לשאלה זו.

תלמיד שמסמן תשובה לא נכונה על השאלה אינו מקבל נקודות לשאלה.

כדי לעבור את המבחן יש לצבור לפחות 60 נקודות סך הכל.

א. על 2 מן השאלות ידע שחר בודאות לענות את התשובות הנכונות, וסימן אותן.

בשאר השאלות הוא סימן באקראי תשובה אחת בכל שאלה.

(1) מהי הסתברות ששחר יצבור במבחן בדיק 60 נקודות?

(2) מהי הסתברות ששחר יעבור את המבחן?

ב. על 2מן השאלות ידע דניאל בודאות לענות את התשובות הנכונות, וסימן אותן,

בכל אחת משלוש השאלות האחרות ידע דניאל בודאות שתשובה אחת, מבין 4 התשובות המוצגות, אינה נכונה,

ולכן סימן באקראי אחת מן התשובות האחרות בכל שאלה.

מהי הסתברות שדניאל יצBOR במבחן בדיק 60 נקודות?

ג. על 3 מן השאלות ידעה הדס בודאות לענות את התשובות הנכונות, וסימנה אותן.

בכל אחת משתי השאלות האחרות היא ידעה בודאות ש- k מבין 4 התשובות המוצגות אינן נכונות, וסימנה

באקראי אחת מן התשובות האחרות בכל שאלה.

ידעו שהסתברות שהדס תצBOR במבחן שווה להסתברות שהיא תצBOR 100 נקודות במבחן.

מצא את k . נמק.

שאלה זו ארוכה במיוחד, אבל לא קשה במיוחד, כי ניתן לפתור את כל הסעיפים באמצעות נוסחת ברנולי בלבד.

סעיף א (1)

שחר ידע שהוא ענה נכון על שתי שאלות ולכן כדי לקבל ציון 60 עליו לענות על **בדיקה אחת** משלשות השאלות האחרות:

$$\binom{3}{1} \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{27}{64}.$$

סעיף א (2)

כדי לעבור את המבחן עליו לצBOR לפחות 60 נקודות. להסתברות מהסעיף הקודם יש להוסיף את ההסתברויות של ארבע וחמש תשובות נכונות:

$$\frac{27}{64} + \binom{3}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^1 + \binom{3}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^0 = \frac{37}{64}.$$

סעיף ב

דניאל צריך לענות נכון על שאלת אחת **בזיווק** מתוך שלושת השאלות הנותרות. דניאל ידע שתשובה אחת לא נכון, אך ההסתברות שהוא ענה נכון על השאלה היא $\frac{1}{4}$ ולא $\frac{1}{3}$ כמו בסעיף הקודם:

$$\binom{3}{1} \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}.$$

סעיף ג

השאלה בסעיף זה דומה לשאלות בסעיפים הקודמים, רק במקום מספר קבוע של תשובה נכון / לא נכון ידועות, המספר ניתן על ידי פרמטר.

אם הדס ידעה שה- k מתוך 4 תשובה לא נכון, ההסתברות שהיא ענתה תשובה נכון היא $\frac{1}{4-k}$, וההסתברות ענתה תשובה לא נכון היא $\frac{4-k-1}{4-k} = \frac{4-k-1}{4-k}$, כי $\frac{1}{4-k} + \frac{4-k-1}{4-k} = 1$. כדי לקבל ציון **בזיווק** 100 הדס צריכה לבחור תשובה נכון לשתי השאלות הנותרות. כדי לקבל ציון **בזיווק** 60 עליה לבחור תשובה לא נכון לשתי השאלות הנותרות.

אין צורך להשתמש בנוסחת ברנולי במלואו, כי כאשר מחשבים את ההסתברות של "הכל" או "אף אחד", $\binom{n}{k} = 1$, וגם $1^0 = 1$ או $p^0 = 1$, ולכן, מספיק לחשב את ההסתברות של האירוע להזקפת מספר השאלה:

$$\left(\frac{1}{4-k}\right)^2 = \left(\frac{4-k-1}{4-k}\right)^2.$$

נפеш ונקבל משווה ריבועית 0. $k = 2, k = 4$ שהפתרונות שלה הם $k^2 - 6k + 8 = 0$. הפרמטר k מוגדר כמספר התשובות שהدس יודעת שהן **אינן** נכון, ונתון (בשורה השנייה של השאלה) תשובה אחת נכון, כך שיש לפסול את הפתרון $k = 4$ ולבחור $k = 2$.

3.2 קיז תשע"ח מועד א

בעיר גדולה נערך מבחון לכל תלמידי התיכון.
 37% מן התלמידים שניגשו לבחון נעזרו בחבריהם כדי להתכוון לבחון. $\frac{35}{37}$ מהם עברו את המבחן.
 מספר התלמידים שלא נעזרו בחבריהם ולא עברו את המבחן קטן פי 5 מסטודנטים שעזרו בחבריהם ו עברו את המבחן.

- א. בחרו באקראי תלמיד שניגש לבחון, והתברר שהוא לא עבר את המבחן. מהי ההסתברות שהוא נעזר בחבריו?
- ב. יעל והדס ניגשו לבחון. ידוע שיעיל נעזרה בחבריה כדי להתכוון לבחון, והדס לא נעזרה בחבריה כדי להתכוון לבחון. האם ההסתברות שיעיל עברה את המבחן גבוהה מההסתברות שהדס עברה את המבחן? נמק.
- ג. בחרו באקראי 6 תלמידים שניגשו לבחון. מהי ההסתברות שליש מהם לא נעזרו בחבריהם ו עברו את המבחן?
- ד. בחרו באקראי תלמיד שניגש לבחון. מהי ההסתברות שהוא מקיים לפחות אחת משתי הטענות I-II:
 - (I) התלמיד נעזר בחבריו.
 - (II) התלמיד לא עבר את המבחן.

לפנינו שニアנו לפתרור את השאלות בסעיפים, נמלא את טבלת ההסתברויות לפי המידע הנתון.
 נסמן ב- N את התלמידים שנעזרו בחבריהם, וב- A את התלמידים שעברו את המבחן.

די ברור שאם 37% נעזרו בחבריהם ו-35 מהם עברו אז $P(N \cap A) = 0.35$, אבל בכל זאת נחשב בצורה פרומלית. נתון שגם $P(N) = 0.37$. מהו עברו את הבחינה $\frac{35}{37}$, כך שעריך זה הוא ההסתברות המותנית $P(A|N)$. נחשב:

$$P(A|N) = \frac{P(N \cap A)}{P(N)} = \frac{P(N \cap A)}{0.37} = \frac{35}{37}$$

$$P(N \cap A) = 0.35.$$

עד כאן טבלת ההסתברויות היא:

\bar{A}	A		
N	0.37	0.02	0.35
\bar{N}	0.63		
1.0			

בالمישק נתון ש:

$$P(\bar{N} \cap \bar{A}) = \frac{P(N \cap A)}{5} = \frac{0.35}{5} = 0.07,$$

וניתן להשלים את הטבלה:

	\bar{A}	A	
N	0.37	0.02	0.35
\bar{N}	0.63	0.07	0.56
	1.0	0.09	0.91

סעיף א

נקרא את השאלה בעיון: "בחרו . . . תלמיד . . . שלא עבר את המבחן. מה ההסתברות שהוא נער בחבריו?" הניסוח שני שלבים מכוון להסתברות מותנית:

$$P(N/\bar{A}) = \frac{P(N \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{0.02}{0.09} = \frac{2}{9}.$$

סעיף ב

"ידעו ש" מכוון להסתברות מותנית, כי השאלה אם התלמידה עברה את המבחן או לא, תלוי בעובדה שאנו ידעים שהיא עזרה או לא עזרה לחבריהם.

עבור עיל ההסתברות המותנית היא:

$$P(A/N) = \frac{P(A \cap N)}{P(N)} = \frac{0.35}{0.37} = 0.9459,$$

ועבור הדס ההסתברות המותנית היא:

$$P(A/\bar{N}) = \frac{P(A \cap \bar{N})}{P(\bar{N})} = \frac{0.56}{0.63} = 0.8889.$$

לייעל הסתברות גבוהה יותר לעבר את המבחן.


סעיף ג

שליש של שיש הוא שניים. (שים לב שלא לקרוא "שלושה" במקום "שלישי") החישוב הוא לפי נוסחת ברנולי כאשר הערך $P(\bar{N} \cap A) = 0.56$ נמצא בטבלה:

$$\binom{6}{2} (0.56)^2 (1 - 0.56)^4 = 0.1763.$$

סעיף ד

הניסוח "פחות אחת" משתי הטענות I, II אומר שהairoע קורה אם קורה אחד מהairoעים I, II או שנייהם. בתרשים להלן שני העיגולים המייצגים את שני האירועים I, II, והairoע "פחות אחת" מיוצג על ידי כל השטח המוקווקו:



יש שתי דרכים לחשב את ההסתברות. בדרכ הראשונה אנו לוקחים את סכום ההסתברויות של שני האירועים, ומחסרים את ההסתברות של האירוע המשותף כי ספרנו אותו פעמיים, פעם כחלק מהאירוע I ופעם כחלק מהאירוע II:

$$P(I \cup II) = P(I) + P(II) - P(I \cap II).$$

בדרך השנייה אנו סופרים כל חלק מהאירוע השותף בנפרד, כאשר הסימון $B - A$ הוא כל האיברים בקבוצה A שאינם בקבוצה B :

$$P(I \cup II) = P(I - II) + P(II - I) + P(I \cap II).$$

את ההסתברויות לחישוב ניקח מהטבלה. הדרך הראשונה מופיעה מימין והדרך השנייה משמאלי:

	\bar{A}	A		\bar{A}	A		
0.37	0.02	0.35	N	0.37	0.02	0.35	N
0.63	0.07	0.56	\bar{N}	0.63	0.07	0.56	\bar{N}
1.0	0.09	0.91		1.0	0.09	0.91	

בשתי הדרכים מקבלים אותה תוצאה:

$$P(N \cup \bar{A}) = P(N) + P(\bar{A}) - P(N \cap \bar{A}) = 0.37 + 0.09 - 0.02 = 0.44$$

$$P(N \cup \bar{A}) = P(N - \bar{A}) + P(\bar{A} - N) + P(N \cap \bar{A}) = 0.35 + 0.07 + 0.02 = 0.44.$$

3.3 חורף תשע"ח

למיכל יש קופיה מאוזנת. על שלוש מפאות הקופיה שלה כתוב המספר 2, ועל שלוש הפאות האחרות כתוב המספר 4.

לגלית יש קופיה מאוזנת אחרת. על כל אחת מפאות הקופיה של גלית כתוב אחד מן המספרים: 1 או 3.

מיכל וגלית משחקים משחק בן חמישה סיבובים. המשתפתח שתנצח במספר סיבובים רב יותר מחברתה, תנצח במשחק. בכל סיבוב המשחק כל אחת מהן מטילה את הקופיה שלה פעם אחת.

המנצחת בסיבוב היא השחקנית שהתקבל על הקופיה שלה גובה יותר.

נתנו שבסיבוב יחיד הסיכוי של מיכל לנצח את גלית הוא $\frac{7}{12}$.

א. על כמה פאות בקופיה של גלית כתוב המספר 1? נמק את תשובתך.

ב. מהו הסיכוי שgalit תנצח במשחק?

ג. מהו הסיכוי של גלית לנצח במשחק, אם ידוע שהיא ניצחה בסיבוב הראשון?

סעיף א

נסמן ב- a את המספר הפאות של הקופיה של גלית שכותוב עלייהן 1. מיכל תנצח אם היא מטילה 4 (הסתברות $\frac{3}{6}$), לא משנה מה גלית מטילה (הסתברות 1), או אם היא מטילה 2 (הסתברות $\frac{3}{6}$), וגלית מטילה 1 (הסתברות $\frac{n}{6}$):

$$\frac{3}{6} \cdot 1 + \frac{3}{6} \cdot \frac{n}{6} = \frac{7}{12},$$

והפתרון הוא $n = 1$.

סעיף ב

גלית תנצח אם היא תנצח ב-5, 4, 3 סיבובים. ההסתברות לניצחון בכל סיבוב היא $1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$

$$\binom{5}{3} \left(\frac{5}{12}\right)^3 \left(\frac{7}{12}\right)^2 + \binom{5}{4} \left(\frac{5}{12}\right)^4 \left(\frac{7}{12}\right)^1 + \binom{5}{5} \left(\frac{5}{12}\right)^5 \left(\frac{7}{12}\right)^0 = 0.3466.$$

סעיף ג

הambilim אם ידוע מכוונות להסתברות מותנית:

$$P = \frac{\text{(גלית ניצחה בסיבוב הראשון} \cap \text{גלית תנצח)}}{\text{(גלית ניצחה בסיבוב הראשון)}}.$$


ההסתברות במנה: כדי שgalit תנצח במשחק וגם בסיבוב הראשון, היא חייבת לנצח בסיבוב הראשון וגם ב-2, 3, 4 מהסיבובים הנוגדים:

$$\frac{5}{12} \left[\binom{4}{4} \left(\frac{5}{12}\right)^4 \left(\frac{7}{12}\right)^0 + \binom{4}{3} \left(\frac{5}{12}\right)^3 \left(\frac{7}{12}\right)^1 + \binom{4}{2} \left(\frac{5}{12}\right)^2 \left(\frac{7}{12}\right)^2 \right] = \frac{5}{12} \cdot 0.5534.$$

ההסתברות במכנה היא $\frac{5}{12}$ ולכן התשובה היא 0.5534.

3.4 קיז תשע"ז מועד ב

בקופסה I יש 10 כדורים, כמה מהם כחולים והשאר אדומים, ובקופסה II יש 7 כדורים כחולים ו 3 כדורים אדומים. מוצאים באקראי כדור מ קופסה I. אם יצא כדור אדום, מעבירים אותו לkopfshe II. אם יצא כדור כחול, מוחזרים אותו לkopfshe I. שוב מוצאים באקראי כדור מ קופסה I, ושוב, אם יצא כדור אדום, מעבירים אותו לkopfshe II. ואם יצא כדור כחול, מוחזרים אותו לkopfshe I. לאחר מכן מוצאים באקראי כדור אחד מ קופסה II. א. נתון כי ההסתברות שאחרי שתי הוצאות מ קופסה I יועבר כדור אדום אחד בלבד מ קופסה I לkopfshe II היא $\frac{19}{36}$. חשב את מספר ה כדורים הכהולים שהיו בkopfshe I לפני הוצאה הראשונה. ענה על השיעיפים ב-ג עבור מספר ה כדורים הכהולים שהיחס בתשע"א. ב. מהי ההסתברות שהכדור שהוציאו מ קופסה II הוא כדור אדום? ג. ידוע שהכדור שהוציאו מ קופסה II הוא כדור אדום. מהי ההסתברות שאחרי שהוציאו את הכדור האדום מ קופסה II נשארו בה שלושה כדורים אדומים בבדיקה?



המילים "מוצאים באקראי ... ולאחר מכן שוב מוצאים באקראי" מכוונות לשימוש בעז. נסמן ב- b את מספר ה כדורים הכהולים בkopfshe I. בתרשים בכל צומת רשום שני זוגות של מספרים: מספר ה כדורים האדומים ומספר ה כדורים הכהולים בkopfshe I, ו מתחתיתו מספר ה כדורים האדומים ומספר ה כדורים הכהולים בkopfshe II.

סעיף א

הכוכביות מסמנות את שתי האפשרויות בהן הוצאנו כדור אדום אחד בדיק מקופסה I. נשווה את הסתברות הנתונה לסכום ההסתברויות של שני המסלולים:

$$\frac{10-b}{10} \cdot \frac{b}{9} + \frac{b}{10} \cdot \frac{10-b}{10} = \frac{19}{36}.$$

נפеш ונקבל משואה ריבועית $b^2 - 10b + 25 = 0$ שיש לה פתרון אחד $b = 5$.

סעיף ב

בתרשים רשום מספר ה כדורים האדומים מتوز' כל ה כדורים בקופסה II. מלמעלה למטה:

$$\frac{5}{5+7} = \frac{5}{12}, \quad \frac{4}{4+7} = \frac{4}{11}, \quad \frac{4}{4+7} = \frac{4}{11}, \quad \frac{3}{3+7} = \frac{3}{10}.$$

את ההסתברויות להגעה לכל אחד מהמצבים נקבל לאחר הצבת $b = 5$. נסכם את ההסתברויות להוציא כדור אדום:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} \right) \left(\frac{5}{12} \right) + \left(\frac{5}{10} \cdot \frac{5}{9} \right) \left(\frac{4}{11} \right) + \\ & \left(\frac{5}{10} \cdot \frac{5}{10} \right) \left(\frac{4}{11} \right) + \left(\frac{5}{10} \cdot \frac{5}{10} \right) \left(\frac{3}{10} \right) = 0.3595. \end{aligned}$$

סעיף ג

המילים "ידעו ש-" מכונת להסתברות מותנית:

$$P(\text{הוציאו כדור אדום מקופסה II}/\text{נשארו שלושה אדומים בקופסה II}) =$$

$$\frac{P(\text{הוציאו כדור אדום מקופסה II} \cap \text{nשארו שלושה אדומים בקופסה II})}{P(\text{הוציאו כדור אדום מקופסה II})}$$

ישארו שלושה כדורים אדומים רק אם היו ארבעה כדורים אדומים לפני הבחירה. ההסתברות במנה היא $\frac{19}{36}$, ההסתברות (הנתונה!) שנגיע לאחד הממצבים המסומנים בכוכבית, כפול ההסתברות לבחר אדום מקופסה II, 4 מתוך 11 כדורים. חישבנו את ההסתברות במכנה בסעיף ב:

$$\frac{\frac{19}{36} \cdot \frac{4}{11}}{0.3595} = 0.53385.$$

3.5 קייז תשע"ז מועד א

- בבית אבות גדול יש לכמה מן הדירות קלנוועית, ולשאר אין.
- אם בוחרים באקראי 9 דירות מבית האבות הזה, ההסתברות של 4 מהם בדיק יש קלנוועית גדולה פי 24 מנה הסתברות של 6 מהם בדיק יש קלנוועית.
- א. מהי ההסתברות שלدير שנבחר באקראי יש קלנוועית?
 - ב. בוחרים באקראי 6 דירות מבית האבות. ידוע שלפחות ל-3 מהם יש קלנוועית.
 - ג. בוחרים באקראי 6 דירות מבית האבות, זה אחר זה, עד של-3 מהם בדיק יש קלנוועית. מהי ההסתברות שייבחרו בדרך זו בדיק 6 דירות?

סעיף א

נסמן ב- D את האירוע "לدير יש קלנוועית" ואת ההסתברות של האירוע ב- p . לפי נוסחת ברנולי נתון ש:

$$\binom{9}{4} p^4 (1-p)^5 = 24 \binom{9}{6} p^6 (1-p)^3.$$

נפשט ונקבל משווה ריבועית:

$$15p^2 + 2p - 1 = 0,$$

$$p = \frac{1}{5} = 0.2$$

סעיף ב

הambilים "ידוע ש-" מכונות להסתברות מותנית:

$$P(D = 4 | D \geq 3) = \frac{P(D = 4 \cap D \geq 3)}{P(D \geq 3)}.$$

כאשר יש חפיפה בין שני ביטויים בחיתוך אפשר לפשט אותן: ברור שם ערך גדול או שווה 3 **וגם** שווה ל-4 אז הוא שווה ל-4, וניתן לפשט את המשווה להסתברות מותנית:

$$P(D = 4 | D \geq 3) = \frac{P(D = 4)}{P(D \geq 3)}.$$

לפי נוסחת ברנולי:

$$P(D = 4) = \binom{6}{4} 0.2^4 (1-0.2)^2 = 0.01536.$$

את המנה $P(D \geq 3)$ אפשר לחשב בשתי דרכים, בצורה ישירה:

$$\binom{6}{3} 0.2^3 (1-0.2)^3 + \binom{6}{4} 0.2^4 (1-0.2)^2 + \binom{6}{5} 0.2^5 (1-0.2)^1 + \binom{6}{6} 0.2^6 (1-0.2)^0 = 0.099,$$

או אחד פחות המשלימים:

$$1 - 0.2^0(1 - 0.2)^6 - \binom{6}{1}0.2^1(1 - 0.2)^5 - \binom{6}{2}0.2^2(1 - 0.2)^4 = 0.099,$$

כMOVED שנדאי לבחור את האפשרות השנייה כי יש פחות גורמים לחשב.

התשובה לשאלה היא:

$$P(D = 4/D \geq 3) = \frac{P(D = 4)}{P(D \geq 3)} = \frac{0.01536}{0.099} = 0.15534.$$

סעיף ג

המשמעות של "עד ש" היא שהבחירה **אחרונה** תהיה "הצלחה" ויהיו שתי "הצלחות" בחמשת הבחירה קודמות:

$$\underbrace{\pm \pm \pm \pm \pm}_{2/5} \quad \underbrace{+}_{1/1}.$$

התשובה מתΚבלת מנוסחת ברנולי לבחירות הראשונות כפול ההסתברות p לבחירה האחרונה:

$$\left[\binom{5}{2} 0.2^2(1 - .02)^3 \right] \cdot 0.2 = 0.04096.$$

3.6 חורף תשע"ז

אבייגיל משתתפת במשחק של זרייקת חצים למטרה. הסיכוי שלו לפגוע במטרה בניסיון בודד הוא $P(0 > P)$, ואינו תלוי בניסיונותיה הקודמים. כל משתתף זורק 5 זרייקות רצופות. הסיכוי של ABIIGIL לפגוע במטרה ארבע זרייקות מtower החמש גדול פי 3 מן הסיכוי שלו לפגוע בה בכל חמש הזריקות.

א. מצא את P .

- משתתף מנצח במשחק אם מtower 5 זרייקות רצופות, מספר הפגיעות שלו במטרה גדול ממספר ההחטאות שלו (יכול להיות יותר ממנצח אחד במשחק).
- ב. מהי ההסתברות שאבייגיל תנצח במשחק?
- ג. (1) אם ABIIGIL תחטיא את המטרה בזריקה השנייה, מהי ההסתברות שהיא תנצח במשחק?
(2) גם TAMER משתתפת במשחק, וגם הסיכוי שלו לפגוע במטרה בניסיון בודד שווה ל- P . ואינו תלוי בניסיונותיה הקודמים. TAMER החטיא בזריקה הראשונה. מה ההסתברות שהיא תנצח במשחק?

סעיף א

כתב מסאווה עם נוסחת ברנולי לפי המידע הנתון:

$$\binom{5}{4} p^4 (1-p)^1 = 3 \binom{5}{5} p^5 (1-p)^0.$$

הגורם p^4 מctratzם והפתרון הוא $p = \frac{5}{8}$.

סעיף ב

ABIIGIL תנצח אם היא פוגעת ב-5, 4, 3 זרייקות. ההסתברות היא:

$$\binom{5}{3} p^3 (1-p)^2 + \binom{5}{4} p^4 (1-p)^1 + \binom{5}{5} p^5 (1-p)^0.$$

נציב $p = \frac{5}{8}$ ונקבל 0.7248.

סעיף ג (1)

לדעתו, ניסוח השאלה לא ברור. אני פירשתי אותה כך: מה ההסתברות של **האירוע "אביגיל החטיאה בזירה השניה ופוגעת בשלוש או ארבע מהזריקות האחרות"**? כותב הבדיקה התכוון להסתברות מותנית: **"אם ידוע ש-'אביגיל החטיאה בזירה השניה', מה ההסתברות שהיא פוגעת בשלוש או ארבע מהזריקות האחרות?"** הנוסחה היא:

$$P(1, 3, 4, 5) = (\text{אביגיל החטיאה בזירה השניה}) / (\text{אביגיל החטיאה בזירה השניה})$$

$$\frac{P(1, 3, 4, 5)}{P(1, 3, 4, 5)} = (\text{אביגיל החטיאה בזירה השניה})$$

אפשר לפטור את הבעה בשתי דרכים. נתחיל עם הדרך הפשטota יותר. נתון שהסיכוי לפגוע במטרה אינו תלוי בנסיבות הקודמים, ולכן ההסתברויות בלתי תלויות והחישוב מוצטמצם:

$$\frac{P(1, 3, 4, 5)}{P(1, 3, 4, 5)} = (\text{אביגיל החטיאה בזירה השניה}) \cdot (\text{אביגיל פוגעה בשלוש או ארבע מהזריקות})$$

$$P(1, 3, 4, 5) = (\text{אביגיל פוגעה בשלוש או ארבע מהזריקות}).$$

לפי נוסחת ברנולי:

$$\binom{4}{4} \left(\frac{5}{8}\right)^4 \left(\frac{3}{6}\right)^0 + \binom{4}{3} \left(\frac{5}{8}\right)^3 \left(\frac{3}{8}\right)^1 = 0.5188.$$

הדרך השנייה ארוכה יותר אבל מעניינת. האירוע של החיתוך בנוסחה להסתברות מותנית מורכבת משני אירועים: (א) לא משנה מה יצא מהזריקה הראשונה, הזריקה השנייה החטיאה, ושלושת הזריקות האחרונות פוגעו. (ב) הזריקה הראשונה פוגעה, הזריקה השנייה החטיאה, ושתים מתוך שלושת הזריקות האחרונות פוגעו. הסתברות של האירוע המשותף היא:

$$1 \cdot \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{5}{8}\right)^3 + \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{8} \cdot \left[\binom{3}{2} \left(\frac{5}{8}\right)^2 \left(\frac{3}{8}\right)\right] = 0.1945.$$

נחלק ב- $\frac{3}{8}$, ההסתברות האביגיל החטיאה בזירה השניה, ונקבל 0.5188.

סעיף ג (2)

לא משנה איזו זריקה החטיאה, הזריקות בלתי תלויות וחישוב ההסתברות של "תמר פוגעה בשלוש או ארבע מהזריקות 5, 4, 3, 2" נותן אותה תוצאה כמו האירוע "אביגיל פוגעה בשלוש או ארבע מהזריקות 5, 4, 3, 2".

3.7 קיז תשע"ו מועד ב

שחמט הוא משחק בין שני שחקנים שיכל להסתיים בניצחון של אחד מהם או בתיקו.

יעל וアナ משחקות זו מול זו בטורניר שחמט בשני סבבים.

ההסתברות של כל אחת מן השחקניות לניצח במשחק בודד היא קבועה בכל הטורניר.

א. בסבב הראשון יש 4 משחקים. ההסתברות שיעל תנצח ב- 2 משחקים

או ב- 3 משחקים גדולה פי 10 מן ההסתברות שיעל תנצח ב- 4 משחקים.

חשב את ההסתברות שיעל תנצח במשחק בודד.

בסבב השני יש 2 משחקים.

ההסתברות שתוצאת הסבב השני תהיה שוויה – היא 0.34.

ב. מהי ההסתברות שאנה תנצח במשחק בודד?

ג. חשב את ההסתברות שאנה תנצח במשחק השני, אם ידוע שתוצאת סבב זה היא שוויה.

נסמן: y = ההסתברות שיעל תנצח במשחק בודד, a = ההסתברות שאנה תנצח במשחק בודד.

סעיף א

לפי המידע הנתון:

$$\binom{4}{2}y^2(1-y)^2 + \binom{4}{3}y^3(1-y) = 10 \cdot \binom{4}{4}y^4(1-y)^0.$$

נפשט ונקבל משווה ריבועית $0 = 4y^2 + 4y - 3 = 4y^2 + 4y - 3 = 0$ שהשורש החיובי שלה היא $y = \frac{1}{2} = 0.5$.

סעיף ב

האפשרויות לקבל שוויון הן: (א) ניצחון אחד לאנה וליעל, או (ב) תיקן בשני המשחקים. ההסתברות לתיקו היא המשלימים לסכום ההסתברויות שאחת מהן תנצח:

$$\binom{2}{1}ya + (1 - (y + a))^2 = 0.34.$$

נציב $y = 0.5$ ונקבל $a = 0.3$.

סעיף ג

המילים "אם ידוע ש-" מכוננות להסתברות מותנית:

$P = (\text{תוצאת הסבב השני היא שוויה}/\text{אננה תנצח במשחק השני})$

$\frac{(\text{תוצאת הסבב השני היא שוויה} \cap \text{אננה תנצח במשחק השני})}{(\text{תוצאת הסבב השני היא שוויה})}$.

ההסתברות לשווין בסבב השני נתונה. אם אננה תנצח במשחק השני, יהיה שוויון רק אם גם יעל תניצח במשחק הראשון:

$$\frac{ya}{.34} = \frac{0.5 \cdot 0.3}{.34} = 0.4412.$$

שםו לב שלא צריכים $\binom{2}{1}$ כי האירוע הוא שאנה תנצח במשחק השני ויעל תנצח במשחק הראשון.

3.8 קיז תשע"ו מועד א

במבחן כניסה למכללה 20% מן הנבחנים היו מקיובצים.
 40% היו ממושבים ו- 40% היו מעירים.
 70% מן הנבחנים הצלicho ב מבחן.
 $\frac{1}{8}$ מן הנבחנים שהיו ממושבים נכשלו ב מבחן.
 ההסתברות לבחור באקראי מבין כל הנבחנים לבדוק שהוא מקיוב זוגם הצלich ב מבחן, גדולה פי 2.5 מן ההסתברות לבחור באקראי מבין כל הנבחנים לבדוק שהוא מקיוב זוגם הצלich ב מבחן.
 א. מבין הנבחנים שנכשלו ב מבחן, מהי ההסתברות לבחור באקראי נבחן שלא היה מעיר?
 ב. (1) משה הצלich ב מבחן.

מהי ההסתברות שהוא לא היה ממושב?

(2) חמישה נבחנים הצלicho ב מבחן.

מהי ההסתברות שלפחות אחד מהם היה ממושב?

לפני שניגש לפתרון השאלות, ננסה למלא את טבלת ההסתברויות.
 נסמן S = נבחנים שהצלicho, K = נבחנים מקיובצים, M = נבחנים ממושבים, E = נבחנים מעירים. ההסתברויות הנתונות הן:

$$P(K) = 0.20, P(M) = 0.40, P(E) = 0.40, P(S) = 0.70.$$

נתון:

$$P(\bar{S}/M) = P(\bar{S} \cap M)/P(M) = \frac{1}{8},$$

ולכן:

$$P(\bar{S} \cap M) = P(\bar{S}/M) \cdot P(M) = \frac{1}{8} \cdot 0.40 = 0.05.$$

סיכום ביניים:

E	M	K		S
0.70		0.35		\bar{S}
0.30		0.05		
1.0	0.40	0.40	0.20	

הنتון האחרון הוא: $P(E \cap S) = 2.5P(K \cap S)$, ולכן:

$$P(S) = 0.70 = P(K \cap S) + 0.35 + 2.5P(K \cap S),$$

ולכן: $P(K \cap S) = 0.1$, $P(E \cap S) = 0.25$.

	E	M	K	
0.70	0.25	0.35	0.10	S
0.30	0.15	0.05	0.10	S̄
1.0	0.40	0.40	0.20	

שיעור לב שהמילים " $\frac{1}{8}$ מון הנבחנים שהיו ממושבים נכשלו" מכוונות להסתברות מותנית, לעומת המילים "ההסתברות לבחור באקראי **בין כל** הנבחנים נבחן שהיה מהעיר **וגם** הצלח ב מבחן" מכוונות לחישוב הסתבריות כ**י** ההסתברות לבחור אחד "מכל הנבחנים" היא 1:

$$P(E \cap S) = \frac{(P(E \cap S) / P(S))}{(כל הנבחנים / כל הנבחנים)} = \frac{P(E \cap S)}{1} = P(E \cap S).$$

סעיף א

לפי הנוסחה להסתברות מותנית וההנחה שאף נבחן לא בא גם מקיובז וגם ממושב:

$$P(\overline{E}/\overline{S}) = P((K \cup M)/\overline{S}) = \frac{P(K \cap \overline{S}) + P(M \cap \overline{S})}{P(\overline{S})} = \frac{0.10 + 0.05}{0.30} = \frac{1}{2}.$$

סעיף ב (1)

לפי הנוסחה להסתברות מותנית וההנחה שאף נבחן לא בא גם מקיובז וגם מעיר:

$$P(\overline{M}/S) = P((K \cup E)/S) = \frac{P(K \cap S) + P(E \cap S)}{P(S)} = \frac{0.10 + 0.25}{0.70} = \frac{1}{2}.$$

סעיף ב (2)

"פחות אחד ממושב" הוא המשלים ל-"olumn לא מהמושב":

$$1 - P(\overline{M}/S)^5 = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{31}{32}.$$

3.9 חורף תשע"ו

במכוונת מזל אפשר לזכות ב- 50 שקל, ב- 100 שקל או לא לזכות כלל.

דנ' משחקים במכוונה זו.

ההסתברות שדנ' זוכה ב- 50 שקל בדיק פעם שווה להסתברות

שהוא זוכה ב- 50 שקל בדיק פעם אחת.

(ההסתברות לזכות ב- 50 שקל שונה מאפס.)

ההסתברות שדנ' לא זוכה באך משחק היא $\frac{1}{32}$.

א. מהי ההסתברות שדנ' זוכה ב- 50 שקל במשחק בודד?

ב. מהי ההסתברות שדנ' זוכה ב- 100 שקל במשחק בודד?

ג. ידוע כי לאחר שדנ' שיחק שני משחקים הוא זכה סך הכל ב- 100 שקל בבדיקה.

מהי ההסתברות שהוא לא זוכה ב- 50 שקל באך אחד משני המשחקים?

סעיף א

ההסתברות שדנ' לא זוכה באך אחד מחרמישת המשחקים היא $P(0)$ ⁵. נתון שערך זה הוא $\frac{1}{32}$, ולכן

$P(0) = \frac{1}{2}$. לפי המידע הנתון:

$$\begin{aligned} \binom{5}{2} P(50)^2 (1 - P(50))^3 &= \binom{5}{1} P(50) (1 - P(50))^4 \\ P(50) &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

סעיף ב

לפי ההסתברות המשילימה: $P(100) = 1 - P(0) - P(50) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

סעיף ג


הambilים "ידעו פ"י" מכונות להסתברות מותנית:

$= (\text{זוכה ב-}100 \text{ בשני משחקי לא זוכה ב-}50 \text{ באך משחק}) P$

$$= \frac{(\text{זוכה ב-}100 \text{ בשני משחקי לא זוכה ב-}50 \text{ באך משחק})}{(\text{זוכה ב-}100 \text{ בשני משחקי})}.$$

נתבונן בעץ המופיע בעמוד הבא שמציג את תוצאות שני המשחקים. סימנו את המסלולים שבהם דנ' זוכה ב-100 והמסלולים בהם דנ' לא זוכה ב-50 באך אחד משני המשחקים. חישוב ההסתברות המותנית:

$$\frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{5}{18}} = \frac{3}{5}.$$



3.10 קיז תשע"ה מועד ב

חוקר עורך מחקר על הרגלי האכילה של סטודנטים באוניברסיטה גדולה במשך יום לימודים.

חלק מהסטודנטים מבאים תמיד אוכל מהבית, והשאר אינם מבאים אוכל מהבית.

כל הסטודנטים שמבאים אוכל מהבית אותו ביום ואינם אוכלים בקפטריה.

הסטודנטים שאינם מבאים אוכל מהבית אוכלים בקפטריה או אינם אוכלים באותו יום.

א. נמצא כי אם בוחרים באקראי 4 סטודנטים, ההסתברות שבדוק 2 מהם מבאים אוכל מהבית גדולה פי 6 מההסתברות שבדוק 1 מהם מביא אוכל מהבית.

(1) מהו אחוז הסטודנטים שמבאים אוכל מהבית?

(2) החוקר בחר באקראי 8 סטודנטים באוניברסיטה.

מהי ההסתברות שלפחות אחד מהם מביא אוכל מהבית, אבל לא כולם?

ב. נמצא כי 60% מהסטודנטים שאינם מבאים אוכל מהבית אינם אוכלים באותו יום.

(1) מהו אחוז הסטודנטים באוניברסיטה שאוכלים בקפטריה?

(2) מהי ההסתברות לבחור סטודנט שמביא אוכל מהבית מ בין הסטודנטים שאוכלים

באותו יום?

סעיף א (1)

נסמן b = ההסתברות להביא אוכל מהבית. לפי המידע הנתון:

$$\binom{4}{2} b^2 (1-b)^2 = 6 \cdot \binom{4}{1} b (1-b)^3.$$


פתרון המשווה הוא $b = \frac{4}{5}$.

סעיף א (2)

"פחות אחד אבל לא כולם" היא המשלים ל-"לא אפס ולא כולם":

$$1 - \left(\frac{1}{5}\right)^8 - \left(\frac{4}{5}\right)^8 = 0.8322.$$

סעיף ב (1)



בעז ההסתברויות הכוכבית מראה את מהמסלול עבור "אוכל בCAFETERIA":

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{10} = \frac{2}{25}.$$

סעיף ב (2)

המילה "מבין" מכוונת להסתברות מותנית וקבוצת "מביא אוכל" היא תות-קבוצה של "אוכליים":

$$P(\text{אוכליים} / \text{מביא אוכל}) =$$

$$\frac{P(\text{אוכליים} \cap \text{מביא אוכל})}{P(\text{אוכליים})} =$$

$$\frac{P(\text{מביא אוכל})}{P(\text{אוכליים})}.$$

הчисלוב הוא:

$$\frac{\frac{4}{5}}{\frac{4}{5} + \frac{2}{25}} = \frac{10}{11}.$$

3.11 קיז תשע"ה מועד א

נתונה קבוצה של ספורות שונות: 3 זוגיות (שונות מ-0), והשאר הן ספורות אי-זוגיות.

יוני יוצר מספר דו-ספרתי מן הספורות שבקבוצה הנתונה באופן זה:

הספרה הראשונה שיוני בוחר באקראי היא ספרת העשרות,

והספרה השנייה שהוא בוחר באקראי היא ספרת היחידות.

יוני בוחר כל ספרה בדיק פעם אחת בלי החזרה.

א. נתון כי הסתברות שיוני ייצור מספר אי-זוגי היא $\frac{4}{7}$.

מהו מספר הספורות הא-זוגיות בקבוצה הנתונה?

ב. אם ידוע שהמספר שנוצר הוא זוגי, מהי הסתברות שתי הספרות שיוני בחר הן זוגיות?

אמיליאן יוצרת מספר תלת-ספרתי מן הספורות שבקבוצה הנתונה באופן זה:

הספרה הראשונה שאmilian בוחרת באקראי היא ספרת המאות,

הספרה השנייה שהיא בוחרת באקראי היא ספרת העשרות,

והספרה השלישית שהיא בוחרת באקראי היא ספרת היחידות.


אמיליאן בוחרת כל ספרה בדיק פעם אחת בלי החזרה.

ג. ידוע כי הספרה הראשונה שאmilian בחרה היא זוגית.

מהי הסתברות שבמספר התלת-ספרתי שאmilian יצרה, סכום הספרות יהיה זוגי?

נסמן $n =$ מספר הספרות בקבוצה. מספר הזוגיים = 3, ומספר הא-זוגיים = $3 - n$.

בחירה של ספרת העשרות ואחר כך ספרת היחידות מכוונת לעצם הסתברויות. כדי לפשט את התרשים רשמי, בכל צומת את ההסתברויות ולא את מספר הספרות.



סעיף א

המספר שיוני בחר יהיה איזוגי רק אם **הבחירה השנייה** היא ספרה איזוגית. המסלולים המתאימים מסומנים בתרשים בכוכבויות. נשווה את סכום ההסתברויות של המסלולים לערך הנתון:

$$\frac{3}{n} \cdot \frac{n-3}{n-1} + \frac{n-3}{n} \cdot \frac{n-4}{n-1} = \frac{4}{7}.$$

נפשט ונקבל משווה ריבועית $0 = 8n^2 - 8n + 7 = n^2$ לה שני פתרונות חיוביים $n = 7$ ו- $n = 1$.

נתון שיש לפחות שלוש ספרות, לכן מספר הספרות הוא 7.

שימו לב שהשאלה מבקשת את מספר הספרות **האיזוגיות** ולכן התשובה היא $7 - 3 = 4$.

סעיף ב

המילים "**אם ידוע ש-**" מכוננות להסתברות מותנית. במספר זוגי הספרה الأخيرة זוגית:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{(ספרה אחרתונה זוגית } \cap \text{ שתי ספרות זוגיות)}}{\text{(ספרה אחרתונה זוגית)}} = \\ & \frac{\text{שתי ספרות זוגיות}}{\text{(ספרה אחרתונה זוגית)}}. \end{aligned}$$

את החיתוך אפשר לפשט כי אם שתי הספרות זוגיות הספרה الأخيرة חייבת להיות זוגית.

ניתן לחשב את ההסתברות "ספרה אחרתונה זוגית" במכנה לפי המידע בעז או פשוט לשים לב שהוא המשלימה לערך הנתון בסעיף א של "ספרה אחרתונה איזוגית". נחשב את ההסתברות במנה לפי המסלול העליון בעז עבור בחירה של שתי ספרות זוגיות:

$$\frac{\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6}}{1 - \frac{4}{7}} = \frac{1}{3}.$$

סעיף ג


הסכום יהיה זוגי רק אם שתי הספרות האחרונות הן זוגיות או איזוגיות:

$$\begin{aligned} 2k_1 + 2k_2 + 2k_3 &= 2(k_1 + k_2 + k_3) \\ 2k_1 + 2(k_2 + 1) + 2(k_3 + 1) &= 2(k_1 + k_2 + k_3 + 1). \end{aligned}$$

שני האירועים (בחירה הספרות) בלתי תלויים, ולכן אפשר לבטא את החיתוך כמכפלה:

$$\begin{aligned} & \text{(ספרה ראשונה זוגית / סכום זוגי)} = \\ & \frac{\text{(ספרה ראשונה זוגית } \cap \text{ סכום זוגי)}}{\text{(ספרה ראשונה זוגית)}} = \\ & \frac{\text{(ספרה ראשונה זוגית} \cdot P(\text{סכום זוגי})}{\text{(ספרה ראשונה זוגית}}} = \\ & P(\text{סכום זוגי}). \end{aligned}$$

שיםו לב שלאחר הבחירה הראשונה של אמילי מספר הספרות הוא ש. הנה עז ההסתברויות לאחר בחירה הראשונה, כאשר הכוכبيות מסמןות את המסלולים לסכום זוגי (שני מספרים זוגיים או שני מספרים אי-זוגיים):



ההסתברות היא:

$$\frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{7}{15}.$$

3.12 חורף תשע"ה

בישוב גדול $\frac{1}{3}$ מהתושבים הם נשים, והשאר הם גברים.

מבין התושבים בוחרים באקראי שתי קבוצות:

קבוצת של 4 אנשים (נשים / גברים) לריאיון ברדיו

וקבוצה של 4 אנשים (נשים / גברים) לריאיון בטלוויזיה.

א. מהי ההסתברות שכל קבוצה יש בדיק 2 גברים?

ב. ידוע כי הקבוצה שנבחרה לריאיון ברדיו היו לכל היוטר 2 גברים.

מהי ההסתברות שהיו בקבוצה זו בדיק 2 גברים?

"ישוב גדול" אומר לי שnitן לבחור מספר רב של תושבים, לפחות שמונה תושבים כפי שנדרש.

סעיף א

כל קבוצה היא בחירה בלתי תלوية. לפי נוסחת ברנולי:

$$\binom{4}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{27}.$$

כדי לקבל את ההסתברות שלשתי הקבוצות יהיו בדיק שני גברים, נעלם ערך זה בربיעו:

$$\left(\frac{8}{27}\right)^2 = \frac{64}{729}.$$

סעיף ב

המילים "ידע כ" מכוננות להסתברות מותנית:

$$P = \text{(לכל היוטר שני גברים/בדיקות שני גברים)}$$

$$\frac{\text{(לכל היוטר שני גברים \cap בדיק שני גברים)}}{\text{(לכל היוטר שני גברים)}}.$$

הчитוך במנה שcolaה ל-"בדיקות שני גברים" (שהיחסנו בסעיף א), כי "לכל היוטר שני גברים" היא 0, 1, 2 גברים. "לכל היוטר שני גברים" הוא הסכום של שלוש נוסחאות ברנולי:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^0 \left(\frac{1}{3}\right)^4 + \binom{4}{1} \left(\frac{2}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \binom{4}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{11}{27}$$

וההתשובה לשאלת היא:

$$\frac{8}{27} = \frac{8}{11}.$$

3.13 קייז תשע"ד מועד ב'

בעיר גודלה כל אחד מתלמידי כיtotot י"ב בשנה מסוימת בוחר באחד משני המסלולים לטיוול שנתי:
מסלול א' או מסלול ב'.

נמצא: 75% מן התלמידים שבחרו במסלול א' הן בנות.

% 10% מן הבנות בחרו במסלול ב'.

% 40% מן התלמידים הם בנות.

א. בוחרים באקראי תלמיד י"ב (בן/בת).

מהי ההסתברות שהוא בחר במסלול א'?

ב. כאשר בוחרים באקראי תלמיד י"ב (בן/בת), האם המאורע "התלמיד הוא בת"

והמאורע "התלמיד (בן/בת) בחר במסלול א'" הם מאורעות בלתי תלויים? נמק.

ג. בחרו באקראי כמה בנות מבין התלמידים.

נמצא שההסתברות שלפחות אחת מהן בחרה במסלול א' היא 0.99.

(הבחירה של המסלולים על ידי הבנות שנבחרו הן בלתי תלויות.)

כמה בנות נבחרו?

נתון ש- 0.4 מהתלמידים הן בנות. 10% מהם בחרו במסלול ב: $.04 = .01 \times 0.4$. נתון שגם 75% מהתלמידים שבחרו במסלול א הן בנות: $0.36 = 0.75 \cdot 0.48$, ולכן $0.36/0.75 = 0.48$. מהתלמידים בחרו מסלול א. נמלא את הטבלה לפי ההסתברויות המשלים:

		בנות	בניים
א	.36/.75 = .48	.48 - .36 = .12	.4 - .04 = .36
	$1 - .48 =$.52	$.52 - .04 =$.48	$.1 \times .4 =$.04
ב	1	$1 - .4 =$.6	נתון 0.4

בצורה יותר מפורשת תוק שימוש בהסתברות מותנית:

$$0.1 = \frac{P(\text{בנות} \cap \text{מסלול ב})}{P(\text{בנות})} = \frac{P(\text{מסלול ב})}{P(\text{בנות})} \cdot \frac{P(\text{בנות} \cap \text{מסלול ב})}{P(\text{מסלול ב})} = \frac{0.4}{0.4} \cdot \frac{0.36}{0.48} = \frac{0.36}{0.48} = 0.75.$$

מכאן ש:

$$P(\text{בנות} \cap \text{מסלול ב}) = 0.4 \cdot 0.1 = 0.04.$$

המשך עם הנתון הנוסף:

$$0.75 = P(\text{מסלול א} \cap \text{בנות}) = \frac{P(\text{מסלול א} \cap \text{בנות})}{P(\text{מסלול א})} = \frac{0.36}{\frac{P(\text{מסלול א})}{0.75}}.$$

מכאן ש:

$$P(\text{מסלול א}) = \frac{0.36}{0.75} = 0.48.$$

סעיף א

הסעיף מבקש $P(\text{מסלול א})$ וחישבנו שערכו 0.48.

סעיף ב

$$\begin{aligned} P(\text{מסלול א} \cap \text{התלמיד הוא בת}) &= 0.36 \\ P(\text{התלמיד הוא בת}) &= 0.4 \cdot 0.48 = 0.192. \end{aligned}$$

האירועים **אינם** בלתי תלויים.

סעיף ג

כדי לחשב "לפחות אחת", נחשב שת ההסתברות המשלימה ל-"**אף אחת**" (ההסתברות שבת לא תבחר מסלול א) היא ההסתברות שהיא תבחר מסלול ב:

$$P(\text{בת} / \text{מסלול ב}) = \frac{P(\text{בת} \cap \text{מסלול ב})}{P(\text{מסלול ב})} = \frac{0.04}{0.4} = 0.1.$$

נפתח את המשוואה:

$$(0.1)^n = 1 - 0.99 = 0.01,$$

ונקבל $n = 2$.

3.14 קיז תשע"ד מועד א

אבא וدني משחקים בזריקת כדור לסל. בכל משחק שני סיבובים. המנצח בסיבוב מקבל נקודה אחת. אם הסיבוב מסתיים בתיקו, כל אחד מקבל חצי נקודה.

נתון: ההסתברות שدني ינצח בסיבוב היא 0.1,

ההסתברות שאבא ינצח בסיבוב היא 0.2,

ההסתברות שהסיבוב יסתיים בתיקו היא 0.7.

הסיבובים אינם תלויים זה בזה.

א. מהי ההסתברות שאבא יצBOR בשני הסיבובים יוטר מנוקודה אחת?

ב. מהי ההסתברות שدني יצBOR בשני הסיבובים פחות נקודה אחת?

ג. ידוע כי דני צBOR בשני הסיבובים פחות נקודה אחת.

מהי ההסתברות שאחד הסיבובים הסתיים בתיקו והאחר הסתיים בניצחון של דני?


ד. אבא וدني משחקים 4 פעמים את המשחק שמתחiar בפתיחה. (בכל משחק שני סיבובים).

מהי ההסתברות שدني יצBOR פחות נקודה אחת 2 פעמים ב迪וקן?

סעיף א

ע"ז ההסתברות מראה את צבירת הנקודות של אבא בשני הסיבובים, כאשר המცבים בהם אבא צBOR יותר מנוקודה אחת מסוימים בכוכבית. ההסתברות של האירוע היא:


$$0.2 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot 0.7 + 0.7 \cdot 0.2 = 0.32.$$



סעיף ב

על ההסתברות מראה את צבירת הנקודות של דני בשני הסיבובים, כאשר המצביעים בהם דני צובר לפחות מנקודה אחת מסומנים בכוכבית. ההסתברות של האירוע היא:

$$0.2 \cdot 0.1 + 0.1 \cdot 0.2 + 0.1 \cdot 0.1 + 0.1 \cdot 0.7 + 0.7 \cdot 0.1 + 0.7 \cdot 0.7 = 0.68.$$



סעיף ג

המילים "ידע פ"י" מכוונות להסתברות מותנית והחיתוך מצטמצם כי אם יש תיקו אחד וניצחון של דני איז דני כבר לפחות נקודה אחת:

$$\frac{P(\text{דני צבר לפחות נקודה אחת} \cap \text{תיקו אחד}, \text{ニtschon achd LDNI})}{P(\text{דני צבר לפחות נקודה אחת})} = P(\text{תיקו אחד}, \text{ニtschon achd LDNI}).$$

נחשב את המנה על ידי חיבור הסתברויות של שני מסלולים בעז המסומנים ב-#:

$$\frac{0.1 \cdot 0.7 + 0.7 \cdot 0.1}{0.68} = .2059.$$

סעיף ד

סעיף ב חישבנו את ההסתברות של האירוע בכל סיבוב, ונשאר רק לחשב:

$$\binom{4}{2}(0.68)^2(0.32)^2 = 0.2841.$$

3.15 חורף תשע"ד

בעיר מסוימת יש תושבים המשתתפים בחוג לרכיבי עם, יש תושבים המשתתפים בחוג לתאטרון ויש תושבים המשתתפים בשני החוגים.

נמצא כי המאורע "תושב העיר משתתף בחוג לרכיבי עם"

המאורע "תושב העיר משתתף בחוג לתאטרון" הם מאורעות בלתי תלויים.

מספר התושבים המשתתפים בחוג לרכיבי עם גדול פי 2 ממספר התושבים המשתתפים בחוג לתאטרון.

מבין התושבים המשתתפים בחוג לתאטרון, 60% משתתפים בחוג לרכיבי עם.

א. מהו אחוז התושבים בעיר המשתתפים בחוג לרכיבי עם וגם בחוג לתאטרון?

ב. يوم אחד נערכ בעיר כנס שהשתתפו בו כל התושבים המשתתפים בחוג לרכיבי עם, ורक הם. עיתונאי ריין 6 משתתפים בכנס שנבחרו באקראי.

מהי ההסתברות של לפחות 2 מהם משתתפים בחוג לתאטרון?

נסמן $T =$ מספר המשתתפים בתאטרון, $R =$ מספר המשתתפים בריקודי עם. המילה "**ambil**" מכוונת להתרבויות מותנית. נתון $P(R/T) = 0.6$ וגם שהAIRUIM בלתי תלויים. נחשב:

$$0.6 = P(R/T) = \frac{P(R \cap T)}{P(T)} = \frac{P(R) \cdot P(T)}{P(T)} = P(R).$$

ביחד עם הנתון $P(T) = 2P(R)$ נתחיל למלא את הutableה:

\bar{T}	T		R
0.60			\bar{R}
0.40			
1.0	0.70	0.30	

שוב נסתמך על העובדה שהAIRUIM בלתי תלויים ונקבל:

$$P(R \cap T) = P(R) \cdot P(T) = 0.6 \cdot 0.3 = 0.18,$$

ואז יש לנו מספיק נתונים למלא את הטבלה:

\bar{T}	T		R
0.60	0.42	0.18	\bar{R}
0.40	0.28	0.12	
1.0	0.70	0.30	

סעיף א

$$P(R \cap T) = 0.18$$

סעיף ב

הambilim "כל התושבים המשתתפים בחוג לריקודי עם, ורק הם" מכוננות להסתברות מותנית. אם ידוע שתושב משתתף בריקודי עם, ההסתברות שהוא משתתף גם בתיאטרון היא:

$$P(T|R) = \frac{P(T \cap R)}{P(R)} = \frac{0.18}{0.60} = 0.3.$$

כדי לחשב "פחות שניים" עדיף לחשב את המambilim ל-"אפס או אחד":

$$1 - \binom{6}{0}(0.3)^0(0.7)^6 - \binom{6}{1}(0.3)^1(0.7)^5 = 0.5798.$$

המלצות: הסתברות

- **קרא בזיהירות את השאלה.** לעיתים השאלות ארוכות (בחינות של קיז תשע"ה א, קיז תשע"ח ב) וחשוב להבין את המשמעות של כל פסקה.
- כמעט כל הבדיקות מכילות שאלות על **הסתברות מותנית**. ניסוחים רבים מכוונים להסתברות מותנית וחשוב להכיר אותן!
 - הניסוח השכיח ביותר משתמש במילים "**אם ידוע ש-**" או "**ידוע כי**".
 - בבדיקה של חורף תשע"ז כתוב "**אם ... מהי ההסתברות ...**". לא לגמרי ברור שלמילה "אם" יש משמעות של "אם ידוע", אבל זאת הכוונה.
 - לעיתים קרובות (בדיקה של קיז תשע"ה ב) כתוב "**מה ההסתברות לבחור ... מבין ...**".
 - יוצא מן הכלל: בבדיקה של קיז תשע"ו א כתוב "**מבין כל הנבחנים**" והמילה "מבין" בדרך כלל מכוonta להסתברות מותנית, אבל כאשר "מבין" מתייחס ל"**כל הנבחנים**" אין הסתברות מותנית, או ההסתברות מותנית בהסתברות שהיא 1, והחיתוך מצטמצם:

$$P(X) = \frac{P(X \cap \text{כל הנבחנים})}{P(\text{כל הנבחנים})} = \frac{P(X)}{1} = P(X).$$

מצב דומה מופיע בבדיקה של קיז תשע"ד ב ("בוחרים באקראי תלמיד י"ב (בן/בת")", ובבדיקה של קיז תשע"ח ב ("מן התלמידים שנגשו למבחן").

- בבדיקה של קיז תשע"ח א הניסוח הוא: " $\frac{k}{n}$ נעזרו בחבריהם (נקרא לאירוע A) ו- **מהם עברו את הבדיקה**" (נקרא לאירוע B). ברור ש- $P(B \cap A) = k$, אבל נבדוק לפי הנוסחה להסתברות מותנית:

$$\begin{aligned} P(B/A) &= \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B \cap A)}{n} = \frac{k}{n} \\ P(B \cap A) &= k. \end{aligned}$$

- בבדיקה של חורף תשע"ד יש ניסוח אחר: **כל התושבים המשתתפים ב-** ... , וرك המ.
- כאשר יש חיתוך בחישוב של הסתברות מותנית, לעיתים קרובות ניתן לפשט את החישוב. בבדיקה של קיז תשע"ז א יש לחשב $P(D = 4 \cap D \geq 3)$, אבל אם ערך גדול או שווה 3 וגם שווה ל-4, אז הוא שווה ל-4, ולכן מספיק לחשב $P(D = 4)$.
- אם שני אירועים בלתי תלויים, חישוב הסתברות המותנית מצטמצם:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) \cdot P(A)}{P(A)} = P(B).$$

מצב זם מופיע בבדיקות של חורף תשע"ז, חורף משע"ח, קיז תשע"ה א, חורף תשע"ד.

- המילה **בדיק** מכוונת לחישוב אחד של נוסחת ברנולי, כי נתון כמה "הצלחות" צריכות להיות גם כמה "כשלונות". מקרה מעניין נמצא בבדיקה של קיז תשע"ח באשר נתון שההסתברות לקל 60 שווה להסתברות לקבל 100. נתון גם שיש שלוש הצלחות מתוך חמיש (20 נקודות כל אחת), אז ההסתברות לקבל שני כשלונות (20 נקודות כל אחת) צריכה להיות שווה להסתברות לקבל שתי הצלחות (20 נקודות כל אחת).

- בבדיקה של קיז תשע"ז כתוב **"בוחרים באקראי ... עד של"** 3 מהם **בדיק** יש קלונועית". המשמעות של "עד ש" היא שmpsיקים את הבחירה האקראית כאשר הבחירה **אחרונה** היא "הצלחה". במקרה זה נשארו שתי הצלחות" שיש לחשב את ההסתברות שלן לפוי נוסחת ברנולי, ואז להכפיל בהסתברות של הצלחה" בבחירה האחרונה:

$$\overbrace{\pm \pm \pm \pm}^{2/5} \quad \overbrace{+}^{1/1}.$$

- בבדיקה של קיז תשע"ז בבייטוי "מוסכאים באקראי ...", ובהמשך הביטוי "מוסכאים באקראי **שוב ...**" מכוון לשימוש בעץ כדי לתאר את הבחירה הסדרתית.

- בבדיקה של קיז תשע"ח א, המשמעות של הניסוח **"לפחות אחת משתי הטענות I, II היא שהairoう קורה אם קורה אחד מהairoうים I, II, או שנייהם, המסומן I ∪ II.** יש שתי דרכים לחשב את ההסתברות: על ידי חיבור ההסתברות של שני הairoうים וחיסורairoう המשותף כדי לקזז את הספירה הכפולה, או לחבר אתairoう המשותף עםairoうים של אחד ולא השני המסומן $-II, I - II$:

$$\begin{aligned} P(I \cup II) &= P(I) + P(II) - P(I \cap II) \\ P(I \cup II) &= P(I - II) + P(II - I) + P(I \cap II). \end{aligned}$$

- בבדיקה של קיז תשע"ח ב יש לחשב את ההסתברות של תשובה נconaה **לכל** ($n = k$) השאלות או תשובה נconaה **לאף אחת** ($0 = k$) מהשאלות, כאשר ההסתברות לשובה נconaה אחת היא p . אין צורך להשתמש בנוסחת ברנולי הכללית:

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

$$\begin{aligned} \cdot p^0 (1-p)^{n-0} &= (1-p)^n, \binom{n}{0} = 1, k = 0 \\ \cdot p^n (1-p)^{n-n} &= p^n, \binom{n}{n} = 1, k = n \end{aligned}$$


- בבדיקות של קיז תשע"ז, ב יש שלוש תוצאות פועלה במקום שתים. סכום ההסתברויות חייב להיות אחד, ולכן כאמור מעריכים משלים להסתברות אחת, יש להחסיר את שתי ההסתברויות האחרות. בבדיקה של מועד ב, ההסתברות לティקו היא אחד פחות ההסתברות שיעל תנצה פחות ההסתברות أنها תנצה:

$$P(\text{אניה}) = 1 - (P(\text{יעל}) + P(\text{תיקו})) = 1 - P(\text{יעל}) - P(\text{תיקו}).$$

- במספר בבדיקות (חויר תשע"ה, קיז תשע"ד, קיז תשע"ה ב) כתוב **"ישוב גדול", "עיר גדולה", "אוניברסיטה גדולה". אני מניח שבמילה "גדול" מבטיחה שאפשר לבחור תושבים או סטודנטים כפי שדרושים בשאלות. אין משמעותם לבחור ארבעה סטודנטים אם יש רק שניים.**

פרק 4 גיאומטריה

4.1 קיז תשע"ח מועד ב



. $AB = BC$ הוא משולש שווה שוקיים (.

. $AK \perp CL$ הם תיכונים במשולש, החותכים זה את זה בנקודה D.

. $AK \perp CL$ נתון:

. $BD = AC$ הוכח:

ב. חשב את היחס $\frac{S_{BLDK}}{S_{\Delta ABC}}$.

ג. M הוא מרכז המעגל החוסם את המרובע ALKC.


(1) הוכח: $\angle AML = 90^\circ$.

(2) מצא את היחס $\frac{AM}{AD}$.

תוכל להשאיר שורש בתשובהך.

סעיף א

כאשר יש תיכונים נחתכים מיד חושבים על משפט 45 "שלושת התיכונים במשולש נחתכים בנקודה אחת", ובמשפט 46 "נקודת חיתוך התיכונים מחולקת כל תיכון ביחס 1 : 2".
הו $BE \perp AC$, שחותך את מפגש התיכונים האחרים ב-D. לפי משפט 6 "במשולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים". מכאן קל להראות שהתיכונים AK, CL שוים.



אם נוכיח ש- $\angle ADE = \angle CDE$, נוכיח שגם $\angle AED = \angle CED$. לפי משפט 6, הוא חוצה זווית של $\angle ABC$, וגם של $\angle ADC$ כי חוצה הזווית והຕיכון מתלכדים. נתון $BE \perp AC$ כך $\angle ADE + \angle CDE = 90^\circ$, ולכן $\angle AED = \angle CED = 45^\circ$. במשולשים

ישר זווית $\angle DAE$, $\angle DCE$, $\triangle ADE$, $\triangle CDE$ שוות 45° , ולכן גם הזווית $\angle AED = \angle CED = 45^\circ$ והמשולשים שווה שוקיים. מכאן $AE = EC = DE = b$

אפשרות אחרת, פשוטה יותר, להוכיח המשפט 86 "במשולש $AE = EC = DE = b$ ישר זווית התיכון ליתר שווה למחצית היתר".

סעיף ב

כדי לחשב S_{BLDK} על ידי חישור שטח המצלע $ALDKC$ מהשטח של $\triangle ABC$, כי המצלע מורכב משולשים ישר זווית וחישוב השטח שלהם קל מאוד:


$$\begin{aligned} S_{ALDKC} &= 2S_{ADL} + S_{ADC} \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} AD \cdot DL + \frac{1}{2} AC \cdot DE \\ &= 2a \cdot a + \frac{1}{2} \cdot 2b \cdot b \\ &= 2a^2 + b^2. \end{aligned}$$

אפשר להניח שהיחס המבוקש אינו תלוי באורכם של הצלעות, لكن נחפש דרך להביע את שטח המצלע S_{ALDKC} כפונקציה של b בלבד. משפט פיתגורס על $\triangle ADE$

$$\begin{aligned} b^2 + b^2 &= (2a)^2 = 4a^2 \\ S_{ALDKC} &= 2a^2 + b^2 = 2 \cdot \frac{1}{4}(b^2 + b^2) + b^2 = 2b^2 \\ S_{ABC} &= \frac{1}{2} AC \cdot BE = \frac{1}{2} 2b \cdot 3b = 3b^2 \\ S_{BLDK} &= S_{ABC} - S_{ALDKC} = 3b^2 - 2b^2 = b^2 \\ \frac{S_{BLDK}}{S_{ABC}} &= \frac{b^2}{3b^2} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

סעיף ג (1)

לא התקדמתי בפתרון עד שציירתי תרשימים חדש עם המ Engel וראיתי שהזווית היקפית $\angle LKA$ נשענת על המיתר עליו נשענת הזווית המרכזית $\angle AML$, כך $\angle AML = 2\angle LKA = 2\alpha$ לפי משפט 69 "במעגל, זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת". אבל לפי משפט 14 "קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה", $LK \parallel AC$, $\angle KAC = \angle LKA = 2\alpha = 90^\circ$. לפיכך זווית מתחלפות, והוכחנו בסעיף הקודם $\angle AML = 45^\circ$.



סעיף ג (2)

תחילה שמתי לב שה- $\triangle MGA \sim \triangle DGL$ כי במשולשים ישר זווית, הزواיות $\angle MGA = \angle DGL$ כוודקזיות. גישה זו לא הצליחה כי לא מצאתי דרך לבטא את הקשר בין AD, GD לבין AG, MG . לבסוף שמתי לב שלמשולשים $\triangle LDA, \triangle LMA$ יתר משותף, והמשולש $\triangle LMA$ שווה שוקיים כי שני הצלעות AM, ML הם רדיוסים. ממשפט פיתגורס:

$$AM^2 + ML^2 = AL^2$$

$$2AM^2 = AL^2$$


$$LD^2 + AD^2 = AL^2$$

$$a^2 + AD^2 = 2AM^2$$

$$\frac{1}{4}AD^2 + AD^2 = 2AM^2$$


$$\frac{AM}{AD} = \sqrt{\frac{5}{8}}.$$

4.2 קיז תשע"ח מועד א




סעיף א

כדי להוכיח שהנקודה G היא מרכזו של מעגל חוסם השתמש במשפט 54 "במשולש, שלושת האנכים האמצעיים נחתכים בנקודה אחת, שהיא מרכזו המעגל החוסם את המשולש". צריך להוכיח שהאנכים GE , GB הם אנכים אמצעיים. מעוין הוא מקבילית עם צלעות שוים, וكمקבילית, ניתן להשתמש במשפט 28 "במקבילית האלכסונים חוצים זה זה". סימנו בציר את אורכי האלכסון AC ב- b . ביחד עם משפט 35 "במעוין האלכסונים מאונכים זה זה", GB הוא אכן אמצעי ל- AC . נתנו שנקודות E היא אמצע של AB , וש- GE הוא אנך ל- AB , ולכן G היא נקודת החיתוך של שני אנכים אמצעיים ומרכז של מעגל חוסם ל- $\triangle ABC$.



סעיף ב

ההוכחה שהמשולשים דומים תהיה קל יותר אם נזכיר מחדש את התרשים תוך הדגשת צלעות המשולשים. לפי משפט 35 האלבסן AC הוא אכן אמצעי ל- DB . נתון שהנקודה M היא מרכז המרגל החוסם את CK , $\triangle BDC$, ולכן הנקודה G שחותכת את CK היא אכן אמצעי ל- BC . הزاوية α משותפת לשני משולשים ישר זוויות, כך $\triangle BKC \sim \triangle MFC$. הزاوية β משותפת לשני משולשים ישר זוויות, כך $\triangle BFG \sim \triangle BKC \sim \triangle MFC$ ו- $\triangle BFG \sim \triangle BKC \sim \triangle MFC$.



סעיף ג (1)

היחס:

$$\frac{MC}{GB} = \frac{MF}{BF} = \frac{MF}{CF}$$

מתקובל מדמיון המשולשים $BCF = CF$ כי F הוא אמצע הצלע BC . מתקובל: מדמיון המשולשים $\triangle BFG \sim \triangle MFC$ כי F הוא אמצע הצלע BC .


$$\begin{aligned} \frac{MF}{BK} &= \frac{CF}{CK} \\ \frac{MF}{CF} &= \frac{BK}{CK}. \end{aligned}$$

סעיף ג (2)

מהנתון שהנקודה M היא המרכז של המרגל החוסם את BDC , אנו מקבלים שהאלבסון MC שווה ל- r . בסעיף א הוכיחו שהנקודה G היא מרכז המרגל החוסם את ABC , ולכן GB שווה ל- R . נחשב אתיחס הרדיוסים תוך שימוש ביחס שהישבנו בסעיף ג 1 ומשפט 29 שהאלבסונים של מקבילית (מעוין) חוצים אחד את השני:

$$\frac{r}{R} = \frac{MC}{GB} = \frac{BK}{CK} = \frac{DB/2}{AC/2} = \frac{DB}{AC}$$

4.3 חורף תשע"ח



המרובע $ABCD$ חסום במעגל.

. $CB = CG$ נמצאת על הצלע CD כך ש- $AB = AG$ וגם

המשיק למעגל בנקודה A חותך את המשך הצלע CD בנקודה L ,

וחותך את המשך הצלע CB בנקודה K (ראה ציור).

א. הוכח כי $AD = AG$


ב. (1) הוכח כי $\triangle ABK \sim \triangle CDA$

$$(2) \text{ הוכח כי } AD^2 = BK \cdot CD$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle LDA}}{S_{\triangle KAB}} = \frac{LA}{AK}$$

סעיף א

נתון ש- $\triangle ABCG$ $AB = AG, CB = CG$ הוא דلتון, אבל לא ברור בשלב זה אם זה יעזר בפתרון. נתון שהמרובע $ABCD$ חסום במעגל, ולפי משפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם $\alpha' = 180 - \alpha, \beta' = 180 - \beta, \gamma' = 180 - \gamma, \delta' = 180 - \delta$ ". סימנו זוויות נגדיות שוות ל- 180° .



אם המשולש $\triangle GAD$ שווה שוקיים, ולפי הסימונים של הזויות הנesse להוכיח ש- $\angle AGD = \angle ADG = \beta$. נזכיר ש- $\triangle ABCG$ דلتון והזויות הצדדיות שלו שוות, כך ש:

$$\angle AGC = \angle ABC = \beta', \quad \angle AGD = 180 - (180 - \beta) = \beta.$$


רשימת המשפטים לבגרות לא כוללת משפט על שוויון זוויות בדלתון, אז נctrיך להוכיח אותו. דلتון מוגדר כמרובע עם שני זוגות של צלעות סמוכות שוות, כך שהוא מורכב משני משולשים שווה שוקיים המוצמדים בבסיסיהם (קו מקווקו בתרשים):

$$\angle ABC = \angle ABG + \angle GBC = \angle AGB + \angle BGC = \angle AGC.$$

סעיף ב (1)

נדגש בתרשים את המשולשים $\triangle ABK, \triangle CDA$ שיש להוכיח שהם דומים. הוספנו לתרשים את הסימון $\beta = \angle ABK$, המשלים של $\angle ABC = \beta'$. אם נמצא עוד זוג של זוויות שווות נקבל שהמשולשים דומים לפי ז.ז. ננסה להוכיח ש- $\angle ACD = \angle BAK$.

זהוות $\angle BAK$ היא הזווית בין המשיק AB והmittar KA . לפי משפט 79 "זוויות בין משיק ומיתר שווה לזוויות ההיקפית הנשענות על מיתר זה מצדדיו השני", $\angle BAK = \angle BCA = \gamma$. לפי משפט 21 "האלכסון הראשי בדלתון חוצה את זוויות הראש ...", $\angle BAK = \angle BCA = \angle ACD = \gamma$. מכאן ש- $\triangle ABK \sim \triangle CDA$ לפי ז.ז.



דרך אחרת להוכיח ש- $\angle BCA = \angle ACD$ היא לשים לב ש- $AB = AG = AD$ ו- $\angle BCA = \angle ACD$ נשתמש במשפט 63 "במעגל, מיתרים שווים זה לזה אם ורק אם שתי הקשתות המתאימות להם שוות זו לזו" ומשפט 71 "במעגל, לקשתות שוות מתאימות זוויות היקפיות שוות", ונקבל $\angle BCA = \angle ACD$.

סעיף ב (2)

לפי $\triangle ABK \sim \triangle CDA$ שהוכחנו בהחלק הראשון של הסעיף ולפי

$$\begin{aligned} \frac{AB}{CD} &= \frac{BK}{AD} \\ AB \cdot AD &= BK \cdot CD \\ AD^2 &= BK \cdot CD. \end{aligned}$$

סעיף ג


הם הבסיסים של המשולשים $\triangle LDA, \triangle KAB$ כך שנתקבל את היחס המבוקש אם נוכיח שהגבאים שוים. הוכחנו שהיתרים ב- $\triangle ADN, \triangle ABM$ שוים a , כך שנשאר רק להוכיח שהזווית שווה γ . הוכחנו שה- $\angle DAL = \angle DCA = \gamma$. ה- $\angle BAK = \angle DAL$ ה- $\angle DCA = \angle DAL$ ה- $\angle DAL$ נשענת על מיתר AD . ה- $\angle DCA$ נשענת על מיתר זה, וכך $\angle DAL = \angle DCA = \angle BAK$. לפיכך ניתן לחשב את השטחים:

$$\frac{S_{LDA}}{S_{KAB}} = \frac{(LA \cdot DN)/2}{(AK \cdot BM)/2}$$


$$DN = AD \sin \angle DAL = a \sin \gamma$$

$$BM = AB \sin \angle BAK = a \sin \gamma$$

$$\frac{S_{LDA}}{S_{KAB}} = \frac{LA}{AK}.$$



4.4 קיז תשע"ז מועד ב



המרובע $ABCD$ הוא מקבילית.
הזווית A היא זווית חדה.
הנקודה E היא אמצע הצלע
 BC והנקודה F היא אמצע הצלע
(ראה ציור).

א. שטח המשולש ECF הוא S .
הבע את שטח המקבילית $ABCD$
באמצעות S . נמק את תשובתך.

ב. הנקודה L היא אמצע הקטע BE .
דרך הנקודה L העבירו ישר המקביל ל- AB וחوتך את BF ואת AD
בנקודות M ו- N בהתאם.


$$\cdot \frac{LM}{MN}$$

ג. נתון $BE = EF$.

האם אפשר לחסום את המרובע $ABFD$ במעגל? נמק את קביעתך.

סעיף א


כדי לחשב את שטח המקבילית באמצעות שטח של משולש נפרק את המקבילית למשולשים. יהיו GF מקביל ל- BC ו- EH מקביל ל- CD . לפי זויות מתאימות ומשילימות, המרובעים $BEHG$, $ECFH$ הם מקביליות. בגלל שהנקודה E היא אמצע הצלע BC , H הוא נקודת האמצע של GF . מכאן שהמשולשים $\triangle ECF$, $\triangle EHF$ חופפים, ו- $S_{EHF} = S_{ECF} = S$. באותה דרך נוכיח ש- $S_{BCFG} = 4S$, $S_{BEH} = S_{BGH} = S$. חלקיים שטחים שווה, כך ש- $S_{ABCD} = S_{BCFG} + S_{GFDA} = 8S$.



הוכחה אחרת משתמשת במשפט 5 א' "שטח מקבילית שווה למכפלת צלע המקבילית בגובה לצלע זו". הגובה של המקבילית באורך כפול מהגובה של המשולש לפי דמיון המשולשים $\triangle FCK, \triangle DCJ$:

$$S_{EKF} = \frac{1}{2}ah = S$$

$$S_{ABCD} = 2a \cdot 2h = 4ah = 8S.$$




סעיף ב'

נקבל יחס בין קטעי קו אם נמצא משולשים דומים שקטעי הקו הם צלעות שלהם. בתרשים להלן הדגשתי משולשים שכולים להתאים. קטע האמצעים במקבילית מקביל לבסיסים $BC \parallel GF$ וזוויות מתחלפות $\angle LBM = \angle MFK$ וזוויות קודקודיות $\angle LMB = \angle KMF$, מתקבל:

$$\triangle LMB \sim \triangle KMF.$$

בתרשים רשםנו את אורכי הקטעים תוך שימוש בՆעלמיים a, b, c .



$$\frac{c}{b-c} = \frac{a}{3a} = \frac{1}{3}$$

$$b = 4c$$

$$\begin{aligned} \frac{LM}{MN} &= \frac{c}{2b-c} \\ &= \frac{a}{2 \cdot 4c - c} \\ &= \frac{1}{7}. \end{aligned}$$

סעיף ג

כדי לחסום את המרובע $ABFD$, לפי משפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ".

בתרשים להלן הוספתי את הנתון $BE = EF$. ראייתי פתרון משתמש במשפט 86 "במשולש ישר זוית התיכון ליתר שווה לממחית היתר" כדי להוכיח $\angle BFC = 90^\circ$. הוכחה זו בעיינית כי משפט 86 לא מנוסח כ-"אם ורק אם". לא קשה להוכיח את הכיוון ההופך כי כל הנקודות הנמצאות במרחיק שווה מנקודה E נמצאות על מעגל שמרכזו E .

אפשר לפטור את השאלה ללא שימוש במשפט 86 תוך שימוש בעובדות ש: (א) המרובע $ABCD$ הוא מקבילית, (ב) המשולשים $\triangle BEF, \triangle CEF$ שווה שוקיים, (ג) זוויות משילימות ב- $\angle E$, נסמן את הזווית של המשולש שווה שוקיים $\angle BEF = 180 - 2\alpha$. מכאן $\angle BFE = 180 - 2\alpha - \alpha = 180 - 3\alpha$ ולבסוף $\angle ECF = 2\alpha$. גם המשולש $\triangle ACEF$ הוא שווה שוקיים כך $\angle ACF = 90^\circ - \alpha$. ניתן $\angle ECF = 2\alpha = \angle EFC = 90^\circ - \alpha$. ניתן $\angle BFD = 90^\circ - \alpha$. ניתן $\angle BFC = 90^\circ - \alpha$.

לפי משפט 26 "במקבילית כל שתי זוויות נגדיות שוות זו לזו". כדי לחסום את המרובע $ABFD$ חיבר לנתונים:

$$\angle BFD + \angle BAD = 90 + (90 - \alpha) = 180 - \alpha = 180.$$


נתון $\angle BAD = 90^\circ - \alpha$ הינו זווית חדה שהיא פחות מ- 90° :

$$90 - \alpha < 90$$

$$\alpha > 0$$

$$180 - \alpha < 180,$$

שסותר את הדרישה $180 - \alpha = 180$, לכן אי אפשר לחסום את המרובע במעגל.



4.5 קיז תשע"ז מועד א

נתון מעגל שמרכזו O .

$\angle ADC = 90^\circ$, $AB \parallel DC$ ($\triangle ABC$ הוא טרפז ישר זוית).

הצלע AD משיקה למעגל בנקודה E ,


ונקודות B ו- C נמצאות על המעגל כך ש- BC הוא קוטר.

הצלע DC חותכת את המעגל בנקודה F , כמפורט בציור.

א. הוכח: $\angle BCD = 2\angle DEF$.

ב. הוכח: $\triangle ABE \cong \triangle DFE$.


ג. הוכח: $BC = DF + DC$.



סעיף א

השאלה שואלת על זוויות ויש לנו קווים מקבילים, משיק, זוית ישרה. הנסה להסיק מסקנות על זוויות. מתרבי השאלה סיפקו רמז: הקו $\angle DEF$ היא זוית בין המשיק ED לבין המסלון EF המשומן בתרשים. לפי משפט 79 "זוית בין משיק ומיתר שווה לזוית ההיקפית הנשענת על מיתר זה מצידו השני", $\angle ECF$ שווה להזוית ההיקפית $\angle ECF$. סימנו את שתי הזוויות α .

נקבל את הערך של $\angle BCD$ אם נידע את ערכיה של $\angle ECO$. נתון $\angle ADC = 90^\circ$. $\angle ECO = \alpha$. $\angle ECB = \alpha$. $EO \parallel DC$, $EO \perp AD$, ולכן, המשיק מאונך לרדיו EO , ולכן, $\angle BCD = 2\alpha$. המשולש $\triangle ECO$ שווה שוקיים ולכן $\angle ECO = \alpha$. מתחלפות.



הוכחה אחרת משתמשת במשפט 103 "אם מן קודה שמחוץ למעגל יוצאים חותך ומשיק, אז מכפלת החותך בחלקו החיצוני שווה לריבוע המשיק". לכן:

$$ED^2 = DC \cdot DF$$

$$\frac{ED}{DF} = \frac{DC}{ED}$$

$$\triangle EDF \sim \triangle CDE.$$


נשתמש במשפט 69 "במעגל, זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת", בزواיות המתחלפות $\angle BOE \sim \angle BCD$ ובדמיון המשולשים $\triangle EDF \sim \triangle CDE$ שכבר הוכחנו:

$$\begin{aligned}\angle BCD &= \angle BOE \\&= 2 \cdot \angle BCE \\ \angle ECD &= \angle BCD - \angle BCE \\&= \angle BCD - \angle BCD/2 \\ \angle DEF &= \angle BCD/2.\end{aligned}$$

סעיף ב

שני המשולשים $\triangle ABE \cong \triangle DFE$ כי הם ישר זווית וצלע באחד המשולשים שוים לזוית וצלע מקבילים במשולש השני, כי ביחד עם הזווית הישרה יש חפיפה לפי ז.צ.ז.

נתון ש- BC הוא קוטר שמרכזו O ולכן r . נפעיל את המשפט 44 "ברטראן", ישר החוצה שוק אחת ומקביל לבסיסים, חוצה את השוק השנייה" על הטרפז $ABCD$, כדי לקבל $AE = DE = a$. נצייר את המיתר BE ונוכיח שהזווית $\angle AEB$ בין המיתר ומשיק יהיה שווה לזוית $\angle DEF$ במשולש השני. לפי משפט 79, $\angle AEB = \angle ECO$, הזווית ההיקפית. אבל כבר הוכחנו שזוית זו שווה ל- $\angle ECO = \angle DEF = \alpha$.




הוכחה אחרת מחשבת זווית מהשלש שווה שוקיים $\angle BOE = 2\alpha$ ולכן $\angle AEB = \angle DFE = \alpha$. ביחד עם $\angle AED = \alpha$ ו- $\angle OBE = 90 - \alpha$ חופפים.

סעיף ג

האורך של BC הוא $2r$, כך שעלינו להוכיח ש- $DF + DC = 2r$. אם נפשט את התרשים נראה ש- EO הוא קטע אמצעים של הטרפז $ABCD$, כי $AB = CD$, כי $BO = OC = r$ ו- $AE = ED$ לפי הסעיף הקודם. לפיכך $EO = \frac{1}{2}(AB + DC) = \frac{1}{2}(DF + DC) = r$.


$$\begin{aligned} EO &= \frac{1}{2}(AB + DC) \\ &= \frac{1}{2}(DF + DC) = r, \end{aligned}$$

כי $AB = DF$ לפי משולשים חופפים שהוכחנו בסעיף הקודם, ו- EO הוא רדיוס. מכאן ש- $BC = 2r = DF + DC$.




הוכחה אחרת משתמשת במשפט פיתגורס ומשפט 103 על משיק וקו חותם. נסמן את אורךי הצלעות באיוור ונקבל:

$$\begin{aligned} a^2 &= bc \\ BC^2 &= (2a)^2 + (c - b)^2 \\ &= 4bc + c^2 - 2bc + b^2 \\ &= c^2 + 2bc + b^2 \\ &= (c + b)^2 \\ BC &= c + b = DC + DF. \end{aligned}$$



4.6 חורף תשע"ז



נתונים שני מעגלים בעלי רדיוס שונה, המשיקים זה לזו מבחוץ בנקודה F.

AC משיק לשני המעגלים בנקודות B ו-C,

AE משיק לשני המעגלים בנקודות D ו-E,

כמפורט בציור.

א. הוכח שהמרובע BDEC הוא טרפז שווה שוקיים.

ב. המשיק המשותף למעגלים העובר בנקודה F חותם את שוקי הטרפז, BC ו-DE, בנקודות G ו-H בהתאמה.

הוכחה: GH הוא קטע אמצעים בטרפז.

ג. נסמן ב-R את רדיוס המעגל הגדול וב- r את רדיוס המעגל הקטן.

$$\text{הוכחה כי } R \cdot BD = r \cdot CE.$$

סעיף א


המשפט הרלונטי ביותר הוא משפט 80 "שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שוויים זה לזה". נפעיל אותו על $:AC, AE$

$$AD = AB = a$$

$$AE = AC = a + b$$

$$DE = BC = b.$$

אם נוכיח ש- $DB \parallel EC$, המרובע $BDEC$ יהיה טרפז לפי ההגדרה והוכחנו שהוא שווה שוקיים. לפי התרשים $\triangle ADB \sim \triangle AEC$ וזה יכול לתרום לפתרון. המשולשים דומים כי יש להם זוויות משותפות ב- A והוכחנו ש- $\frac{AD}{AE} = \frac{AB}{AC} = \frac{a}{a+b}$, כך שהמשולשים דומים לפי צ.צ. המשולשים $\triangle ADB, \triangle AEC$ שווה שוקיים, ולכן לפי משפט 6 "במשולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים". הקו c , חוצה הזווית A , הוא גם גובה. מכיוון שבבסיסי המשולשים DB, EC מאונכים שניהם לקו c ו- $DB \perp EC$.




סעיף ב

במבחן ראשון נראה שכדי לעבוד עם משפט 43 "קטע האמצאים בטרפז מקביל לבסיסים ושווה למחצית סכומם", כאן, $(GH = \frac{1}{2}(BD + CE))$. תחילת עלה בדעתך שאפשר להשתמש בנוסחה לשטח של טרפז שהיא:

$$S_{BDEC} = h \cdot \frac{1}{2}(BD + CE),$$

אבל זה לא הוביל לפתרון. אחר כך חשבתי לחפש משולשים כדי להשתמש במשפט 14 "קטע אמצאים במשולש מקביל לצלע השלישי ושווה למחציתו", אבל לא מצאתי משולש מתאים. לאחר פישוט של התרשימים שמתי לב ש- GH , H הן נקודות הנitin להפעיל עליהן את משפט 80 שכבר השתמשתי בסעיף א. $DH = HE = HF = x$, $HE = HF = y$, וכך $DH = HF = x$. אותה הוכחה מראה ש- $GH = BG = GC$, והוא קטע אמצאים של הטרפז.



סעיף ג


ניתן לכתוב את הטענה שיש להוכיח כיחס:

$$\frac{BD}{CD} = \frac{r}{R}.$$


נוכיח ש- $\triangle BO_1D \sim \triangle CO_2E$, כאשר O_1, O_2 הן מרכזי המעגלים. המשולשים מורכבים משני משולשים חופפים $\triangle NO_2E, \triangle NO_2C$ ו- $\triangle MO_1D, \triangle MO_1B$ המספקים להוכיח דמיון של זוג משולשים קטנים. כבר הוכחנו ש- $DB \parallel EC$ והזווית בין רדיוס למשיק היא זוויות ישרה, ולכן:

$$\angle MDO_1 = 90^\circ - \angle MDA = 90^\circ - \angle NEA = \angle NEO_2.$$

לפי 2. $\triangle BO_1D \sim \triangle CO_2E$



4.7 קיז תשע"ו מועד ב



- .4 נתון משולש PDC .
הנקודות B ו- L מונחות על הצלע PC .
הנקודות A ו- K מונחות על הצלע PD , כמפורט בציור.
נתון כי המרובע $ABLK$ הוא בר-חסימה במעגל
וגם המרובע $KLCD$ הוא בר-חסימה במעגל.
א. הוכח: $AB \parallel DC$.

נתון: $3 \text{ ס"מ} = PB = 4 \text{ ס"מ}$

שטח המשולש ABP הוא $S \text{ סמ"ר}$,

שטח המרובע $ABCD$ הוא $24S \text{ סמ"ר}$.

ב. האם אפשר לחסום במעגל את המרובע $ABCD$? נמק.


ג. מצא את אורך הצלע PD .

ד. נתון גם: $5 \text{ ס"מ} = BL$.

היעזר בדמיון משולשים והבע באמצעות S את שטח המרובע $KLCD$.

סעיף א

שני מרובעים חסומים והמשפט המתאים הוא משפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ". נצייר את שני המעגלים החסומים את המרובעים, ונבחר זוג זוויות נגדיות, למשל, $\angle LKA$, $\angle ABL$, $\angle LKA$, $\angle ABL$. נסמן $\angle LKA = \alpha$, $\angle ABL = \alpha'$, $\angle LKA = \beta$, $\angle ABL = \beta'$. לפי זוויות משילימות בנקודה P , $\angle ABP = \alpha' = 180^\circ - \alpha$ עברו הזווית הנגדית $\angle ABL$. ובנוקודה K , $\angle KAL = \beta' = 180^\circ - \beta$. נפעיל שוב את משפט 56 כדי להסיק ש- $\angle LCD = \alpha$. מכאן $\angle LCD = \alpha'$ ו- $\angle LKD = \beta'$. לפיה $\angle LCD = \alpha'$ ו- $\angle LKD = \beta'$ מתקיימת $\angle LCD + \angle LKD = 180^\circ$.



סעיף ב

כדי להפעיל שוב את משפט 56 נדרש להוכיח שהזווית הנגדיות במרובע $ABCD$ מקיימות $\angle ADC = \beta$, $\angle BAD + \angle BCD = 180$, $\angle ADC + \angle ABC = 180$. נסמן $\angle PBA = \angle BCD = \alpha$, $\angle PAB = \angle ADC = \beta$, נקבל A, B והוכחנו ש- $AB \parallel DC$, ולפי זוויות חד-מתאימות בנקודות A, D ו- B, C , וזוויות משלימות בנקודות P, A , P, B אם המרובע $ABCD$ בר חסימה, $\angle PAB + \angle PBC = 180 - \alpha + \beta = 180 - \beta + \alpha' = \alpha'$, אבל נתון $\angle PAB \neq \angle PBC$. המשקנה היא שלא ניתן לחסום את המרובע $ABCD$.

סעיף ג

לפי 2. אולם, זה לא עוזר: אמם נתון היחס בין PA, PB , אבל יש שני זוגות של נעלמים AB, DC ו- PD, PC . מה שכן ניתן הוא שטחים של שני המושלים, ולפי משפט 100 "יחס הצלעות הוא השורש של יחס השטחים", נוכל לחשב את יחס הצלעות:

$$\frac{PA}{PD} = \sqrt{\frac{S_{ABP}}{S_{PDC}}} = \sqrt{\frac{S_{ABP}}{S_{ABP} + S_{ABCD}}} = \sqrt{\frac{S}{S + 24S}} = \frac{1}{5}.$$


האורך של PD הוא $5 \cdot PA = 15$

סעיף ד


מהזוויות שחישבנו ורשמנו באירור, לפי 2. יחס השטחים מתקיים מיחס אורכי הצלעות הנתונים ווחישבנו:

$$\frac{S_{PBA}}{S_{PKL}} = \left(\frac{PA}{PL}\right)^2 = \left(\frac{3}{9}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

$$S_{KLCD} = S_{PDC} - S_{PKL} = 25S - 9S = 16S.$$



4.8 **קייז תשע"ו מועד א**



(AB || EC) ABCE נתון טרפז

הנקודה F נמצאת על האלכסון BE

. CF \perp BE

הנקודה D היא אמצע הבסיס CE (ראה ציור).

נתון: $\angle CEB = \angle AEB$

$$ED = 3a \quad , \quad EA = 4a$$

. א. הוכח כי $\Delta EAB \sim \Delta EDF$

ב. נתון כי שטח המשולש EAB הוא S.


. CEF את שטח המשולש באמצעות .

ג. המשך DF חותך את AB בנקודה G.

. BFG משולש שטח את באמצעות S בבע .

סעיף א

נסמן את הזווית $\angle AEB = \alpha$ ונסמן את האורכים הנתונים. כעת קופץ לעין משפט 86 "במשולש ישר זוויות התיכון ליתר שווה למחצית היתר", ולכן $DF = CD = DE$, ו- $\triangle EDF \sim \triangle EAB$. לפיכך $\angle DFE = \alpha$. כמו כן, נתנו $AB \parallel EC$, כך $\angle ABE = \alpha$ לפי זוויות מתחלפות שווה שוקיים, $\angle DFE = \alpha$. לפיכך $\triangle EDF \sim \triangle CEB$.



סעיף ב

כדי לחשב את השטח של $\triangle CEF$ יש לנו בסיס CE וגובה מ- F ל- CE . כדי עין ישימו לב גובה זה משותף לשני המשולשים $\triangle CFD, \triangle DFE$. הבסיסים $CD = DE = 3a$ שוים, ולכן השטחים של שני המשולשים שוים.

בסעיף א הוכחנו ש- $\triangle CEB \sim AEB$, לפי משפט 100: "יחס השטחים שווה לריבוע יחס הדמיון":

$$\frac{S_{DFE}}{S_{EAB}} = \left(\frac{DE}{AE}\right)^2 = \left(\frac{3a}{4a}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

$$S_{CEF} = S_{CFD} + S_{DFE} = 2S_{DFE} = \frac{9}{8}S.$$

סעיף ג


אנחנו צריכים לחשב את האורך של צלע של $\triangle BFG$ כדי לחשב את יחס השטחים. כבר הראינו ש- $\triangle BFG \sim \triangle DFE$ ו- $\angle BFG = \angle DFE = \alpha$, $\angle ABE = \angle BEC = \alpha$ לפי 2. הווית 13 "ווית חיצונית למושלש שווה לסכום שתי הוויות הפנימיות שאינן צמודות לה". המרובע $AGDE$ הוא מקבילית לפי משפט 29 "מרובע שבו כל זוג וויתות נגדיות שוות הוא מקבילית". $GD = GF + FD$ ובעת ניתן לחשב את GF :

$$GF = GD - DF = AE - DF = 4a - 3a = a,$$


ולהשתמש שוב במשפט 101:

$$\frac{S_{BFG}}{S_{DFE}} = \left(\frac{a}{3a}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

$$S_{BFG} = \frac{1}{9}S_{DFE} = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2}S_{CEF} = \frac{1}{(9 \cdot 2)}\frac{9}{8}S = \frac{1}{16}S.$$



4.9 חורף תשע"ו



בריבוע $ABCD$ הנקודה E

מצאת על הצלע AD (ראה ציר).

מעגל העובר דרך הנקודות E, D, C ו-

חותך את האלכסון BD בנקודה M ,

ואת הצלע BC בנקודה N .

הנקודה M נמצאת בין הקדקוד B

ובין נקודות החיתוך של BD עם CE .

א. הוכח כי $CD = EN$.

ב. האם הקטע DM קצר מהקטע CE

ארוך ממנו או שווה לו? נמק.


ג. הוכח כי $BM \cdot BD = AE \cdot AD$.

סעיף א

קשה להבין את השאלה אלא אם מציררים תרשימים חדש עם הנקודות M, N והקו EN . המעגל מוגדר כך שהוא עובר דרך הנקודות C, D, E , ונמצא גם שהנקודה N נמצאת על המעגל. מכיוון ש- $ENDC$ הוא מרובע הסום במעגל. נשתמש במשפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ". $ABCD$ הוא ריבוע כך ש- $\angle ADC = \angle EDC = 90^\circ$, $\angle BCD = \angle NCD = 90^\circ$

$$\angle ENC = 180 - \angle EDC = 90, \quad \angle NED = 180 - \angle NCD = 90.$$

מרובע שכל הזויות שלו ישרות הוא מלבן ו-




הוכחה אחרת משתמשת במשפט 74 "זווית היקפית בת 90° נשענת על קוטר". הנקודות N, C, D, E נמצאות על מעגל, כך $\angle EDC = 90^\circ$, וכך EC הוא קוטר לפי משפט 74 "זווית היקפית בת 90° נשענת על קוטר". לפי המשפט ההופך (73) $\angle ENC = 90^\circ$. כדי להשלים את סכום הזוויות במרובע END ל- 360° , נדרש $\angle NED$ להיות 90° והוא אכן מלבן.

סעיף ב

בזאת הרבה זמן בנסיונות לפתור סעיף זה כי חשבתי לשווות אורךים לפי מושלמים דומים או משפט פיתגורס. לבסוף נזכרתי במשפט 66 "במעגל, אם מרכזו של מיתר ממרכז המעגל קטן יותר ממרכזו של מיתר אחר, אז מיתר זה ארוך יותר מהמיתר האחר". בהוכחה השנייה לסעיף א' ראיינו EC הוא קוטר, וקוטר הוא מיתר הקרוב ביותר למרכז המעגל (עבור דרכו) ולכן הוא ארוך יותר מכל מיתר שאינו קוטר. מה שנותר לעשות הוא להוכיח $DM \perp EN$.

נתון שהנקודה M נמצאת בין B לבין נקודת החיתוך המסומן ב- F . נתון גם $EN \perp AB$ נמצאת על AD ונניח שהכוונה היא $EN \parallel AB$ מנקודות הקצה A, D . הוכחנו $EN \parallel AB$ ולכן אם E שונה מ- A גם N שונה מ- B , ו- M אינה מתלכדת עם N .




סעיף ג

הנטיה הראשונה היא להשתמש במשפט תאילס, אבל משפט זה מנוסח כחילוק ולא ככפל על קטיעים של אותו קו. המשפט שמנוסח ככפל הוא משפט 102 "אם מנקודה מחוץ למעגל יוצאים שני חותכים, אז מכפלת חותך אחד בחלוקת החיצוני שווה למכפלת החותך השני בחלוקת החיצוני". נשתמש במשפט זה עבור החותכים BC, BD היוצרים מנקודה B ונקבל $BM \cdot BD = BN \cdot BC$.
במשפט $AD = BC$ כי הם צלעות בריבוע $ABCD$, ו- $ED = NC$ כי הם צלעות של $ENCD$ שהוכחנו בסעיף א' שהוא מלבן. מכאן:

$$BM \cdot BD = BN \cdot BC = (BC - NC) \cdot BD = (AD - ED) \cdot AD = AE \cdot AD.$$

4.10 קיז תשע"ה מועד ב



מרובע $ABCD$ חסום במעגל שמרכזו O .
הצלע AB היא קוטר.

E היא נקודה על המשך AD כך שה- $\Delta CDE \sim \Delta ABC$.

נתון גם: $\frac{S_{\Delta CDE}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{1}{4}$, $OD \perp AC$


ב. הוכח כי $OC \parallel AD$.

ג. הוכח כי CE משיק למעגל.

סעיף א

מרובע חסום במעגל מכוכן למשפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות גדיות שווה ל- 180° ". נתון גם שצלע שלו הוא קוטר והמשפט רולונטי הוא 73 "זווית היקפית הנשענת על קוטר היא זווית ישרה (90°)". כדי לקבל את המשלוש $\triangle ABC$, נצייר את הקו AC ו- $\angle ACB = 90^\circ$ כי הוא נשען על קוטר.

נסמן זוויות לפי משפט $BAC = 180 - \alpha = \alpha'$, $\angle ABC = \alpha$:(56) לפי זוויות משלימות בנקודה D , $\angle CDE \sim \angle ABC$ ו- $\angle CDE = 180 - \alpha' = \alpha = \angle ABC$ לפי ז.א.




סעיף ב

בתרשים נראה שהמרובע $AODC$ הוא מקבילית, ואם כן, $OC \parallel AD$, $OD \perp AC$. נתנו גם ש- r שאמם המרובע הוא מקבילית, הוא גם מעוין לפי משפט 36 "מקבילית שבה האלכסונים מאונכים זה לזה היא מעוין". למעשה לא צריך להשתמש במשפט 36 כדי להוכיח שהמקבילית היא מעוין כי מכיוון שסביר יותר שהנתון $OD \perp AC$ יעזר להוכיח ש- $AODC$ הוא מקבילית.

כעת נפנה לנตอน על יחס השטחים של המשולשים. לפי משפט 100 "יחס השטחים שווה לריבוע יחס הדמיון", היחס הצלעות במשולשים הדומים הוא $\frac{1}{2}$. מכאן $Sh-r = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}AB = CD$.

אם נוכיח ש- $r = AD$ יהיה לנו את המקבילית (מעוין) שנחוץ כדי להוכיח ש- $OC \parallel AD$.

נחויר לנตอน $OD \perp AC$. הוכחנו ש- $\triangle OCD$ הוא שווה שוקיים (למעשה הוא שווה צלעות), כך ש- CA גובה ל- OD , ולפי משפט 6 "במשולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים", ולכן $OF = FD = \frac{r}{2}$ ו- $\triangle OCF \cong \triangle DCF$.¹ איתה הוכחה מראה ש- $AD = OA = r$. מכאן ש- $\triangle DAF \cong \triangle OAF$ ו- $\triangle OAF \cong \triangle OCF$.



בפתרונות אחרים שראיתי, משתמשים בעובדה ש- $\triangle OCD$ הוא שווה צלעות שהזוויות שלו הן 60° .
לא מצאתי שערך זה נכון כדי להוכיח את הטענה.


סעיף ג

בסעיף ב הוכחנו ש- $AC \parallel OAD$. מכאן ש-

$$\angle ECO = \angle ECD + \angle OCD = \angle CAB + 60^\circ = \frac{1}{2} \angle OAD + 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 60^\circ + 60^\circ = 90^\circ.$$

הHIPA נובעת ממשפט 20 "משפט חפיפה שתי צלעות והזווית שמלול הצלע הגדולה מבין השתיים" לאחר שנטען שהזווית הישרה גדולה יותר מזוויות האחרות. בספר גיאומטריה משתמשים במשפט זה כך: שני מושלמים ישר זווית חופפים עם היתר וצלע אחר שווים.

4.11 קיז תשע"ה מועד א




- ר. PB משיקים למעגל שמרכזו O .
המשך BO חותך את המעגל בנקודה D (ראה ציור).
א. הוכח: $PO \parallel AD$.
- .
הנקודה C נמצאת על הקוטר DB כך ש- $AC \perp DB$.
ב. הוכח: $\Delta ADC \sim \Delta POB$.
- .
PD חותך את AC בנקודה E .
ג. הוכח: $\Delta DEC \sim \Delta DPB$.
- .
ד. הוכח: $AC = 2EC$.

סעיף א


כאשר יש שני משיקים וקו מהנקודות החיצונית של המשיקים למרכז המעגל המשפטים האלה עשוויים להיות קלולוניים: משפט (77) "המשיך למעגל מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה", משפט (80) "שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שוים זה לזה", וממשפט (81) "קטע המחבר את מרכז המעגל לנקודה ממנו יוצאים שני משיקים למעגל, חוצה את האזווית שבין המשיקים". באירור, הוספנו סימנים המציגים את המשפטים האלה.

נitin להשלים את שר האזווית, כאשר השתמשנו בקיצור $\alpha' = \alpha'$, תוך שימוש בעבודות שסכום האזווית במשולש הוא 180° , וסכום האזווית המשלימות לאזווית שטוחה הוא 180° . משווין $\angle ADO = \angle DAO = \angle DAB = \alpha'$. מכאן ש- $\angle AOD = \angle DAO = \alpha'$. מכיוון $PD \parallel AD$ לפי זווית מתאימות.



סעיף ב

הצעד הראשון הוא להוסיף לתרשים את הנקודה C ולסמן את הנתון $AC \perp DB$. הרבה זויות מופיעות בתרשים ולכן ננסה להוכיח דמיון לפי ז'. מסעיף אינו יודע אם $\angle ADC = \angle POB = \alpha'$, ולכן עבור המשולשים ישר הזווית $\triangle ADC \sim \triangle POB$.



סעיף ג

מוסיף את הנקודה E לתרשים. הזווית $\angle DEC$ של המשולש EDC היא למעשה אותה זווית $\angle DPB$ של המשולש PDB , ולכן $\triangle DEC \sim \triangle DPB$. במסולשים ישר זווית.

סעיף ד


עלינו לחפש ערך אחד שהוא כפול מערך אחר. כМОון הקוטר DB כפול מהרדיוסים DO, OB בסעיפים הקודמים הוכחנו שני זוגות של משולשים דומים. נפשת את האIOR ונססה להוכיח את המשוואה תוק שימוש במסולשים. עבור AC , מסעיף ב, $\triangle ADC \sim \triangle POB$, ולכן:

$$\frac{AC}{PB} = \frac{DC}{OB} = \frac{DC}{r}.$$


מסעיף ג, $\triangle DEC \sim \triangle DPB$, ולכן:

$$\frac{EC}{PB} = \frac{DC}{DB} = \frac{DC}{2r}.$$

נציב את תוק שימוש במסולשים $AC = 2EC$ ונקבל $PB \cdot DC = 2EC \cdot DC$.



4.12 חורף תשע"ה



במקבילית $ABCD$ הנקודה E נמצאת על
הצלע AD .

המשך BE חותך את המשך CD בנקודה F
(ראה ציור).

נתון: שטח המשולש ABE הוא 27 סמ^2 .

שטח המשולש DFE הוא 48 סמ^2 .

א. מצא את שטח המשולש BED .

ב. נתון גם כי המרובע $BCDE$ הוא בר חסימה במעגל.

$$\cdot \frac{AB}{EF}$$

סעיף א


יש שתי דרכים לחשב את השטח של $\triangle BED$. הראושונה היא לחשב את השטח של $\triangle ABD$ ולהחסיר את השטח של $\triangle ABE$. לפי הסימונים בתתרשים:

$$S_{ABD} = \frac{1}{2}x(h_1 + h_2), \quad S_{AEB} = \frac{1}{2}xh_1.$$

אם נוכל לבטא את h_2 במנוחים של h_1 , נוכל לחשב את $S_{BED} = S_{ABD} - S_{AEB}$. בגלל הזהויות המתחלפות בין A, D, F ו- B, E, C לפי משפט 100 יחס השטחים שווה לריבוע יחס הדמיון:


$$\frac{h_2}{h_1} = \sqrt{\frac{S_{DEF}}{S_{ABE}}} = \sqrt{\frac{48}{27}} = \frac{4}{3}$$

$$\begin{aligned} S_{BED} &= S_{ABD} - S_{AEB} \\ &= \frac{1}{2}x\left(h_1 + \frac{4}{3}h_1\right) - \frac{1}{2}xh_1 \\ &= \frac{4}{3}\left(\frac{1}{2}xh_1\right) = \frac{4}{3}(S_{ABE}) = \frac{4}{3} \cdot 27 = 36. \end{aligned}$$



הדרך השנייה לחשב את השטח של $\triangle BED$ קשה לראות אבל החישוב מאוד פשוט. למשולשים $\triangle AEB$, $\triangle BED$ יחס השטחים הוא הריבוע של יחס הצלעות AE, ED במשולשים $\triangle ABE$, $\triangle DFE$ שיחסינו לעיל:

$$S_{BED} = \frac{4}{3} S_{AEB} = \frac{4}{3} \cdot 27 = 36.$$



סעיף ב

לכארה, לא צריך את הנתון על המרובע כי $\triangle ABE \sim \triangle DFE$. אבל עיון מדויק גלה שהיחס שיחסינו הוא $\frac{AB}{EF}$ ולא $\frac{AB}{FD}$.


הנתון שהמרובע $BCDE$ בר חסימה במעגל מכוון למשפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ". נסמן זוויות ונראה אם יוצא מזיהמו מעיל. נסמן ב- α את הזוויות הנגדיות של המקבילות A, C ו- B, D . נסמן ב- β את הזוויות המתאימות בנקודות C, D . נסמן ב- γ את הזוויות המתחולפות ב- E, F .

סכום הזוויות במשולש הוא 180 וכאן הזוויות הקודקודיות ב- E שוות ל- $180 - (\alpha + \beta)$. לפי זווית משלים β נפעיל את משפט 56 ונקבל:


$$\begin{aligned}\angle BCD + \angle BED &= 180 \\ \alpha + \alpha + \beta &= 180 \\ \alpha &= 180 - (\alpha + \beta) \\ \angle ABE &= \angle EBA \\ \angle DFE &= \angle EFD.\end{aligned}$$

המשולשים $\triangle ABE$, $\triangle DFE$ שווה שוקיים! השתמש ביחס שיחסנו בסעיף א:

$$\frac{AB}{EF} = \frac{AB}{FD} = \frac{3}{4}.$$



4.13 קיז תשע"ד מועד ב



AC הוא קוטר במעגל שמרכזו O_1 .
BD הוא קוטר במעגל שמרכזו O_2 .
ישר משיק למעגלים O_1 ו- O_2 בנקודות A ו- B בהתאם.
המשיק חותך את קטע המרכזים O_1O_2 בנקודה E (ראה ציור).

נתון: רדיוס המעגל O_1 הוא 30 ס"מ
רדיוס המעגל O_2 הוא 20 ס"מ
אורך קטע המרכזים O_1O_2 הוא 90 ס"מ

א. (1) מצא את היחס $\frac{O_1E}{O_1C}$. נמק.

(2) הוכח כי $\Delta EO_1C \sim \Delta EO_2D$.

ב. הוכח כי הנקודה E נמצאת על הישר CD.


סעיף א (1)

כדי לסייע מעט את השאלה ביקשו את היחס בין O_1E ל- O_1C , אבל $O_1A = O_1C$ כי הם רדיוסים.
אם נוכיח ש- $\triangle O_1AE \sim \triangle O_2BE$, נוכל להחשב את היחס המבוקש.

AB משיק לשני המעגלים ולכן $\angle O_1AE = \angle O_2BE = 90^\circ$ לפי משפט 77 "המשיק למעגל מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה". $\angle AEO_1 = \angle BEO_2$ כי הן זוויות קודקודיות. מכאן שגם $\triangle O_1AE \sim \triangle O_2BE$ לפי ז.ז. נסמן ב- x את אורך של O_1E ונקבל:

$$\frac{O_1E}{O_2E} = \frac{x}{90-x} = \frac{O_1A}{O_2B} = \frac{30}{20}$$

$$\frac{O_1E}{O_1C} = \frac{O_1E}{O_1A} = \frac{54}{30} = \frac{9}{5}.$$




סעיף א (2)

נראה שאפשר להשתמש באותה שיטה כדי להוכיח שהמשולשים $\triangle EO_1C \sim \triangle EO_2D$ דומים. אבל, כפי שמרמזו סעיף ב, איןנו יודעים שהנקודה E נמצאת על הקו הימני CD , ולכן איןנו יכולים להניח ש- $\angle O_1EC = \angle O_2ED$ הן זוויות הקודקודיות (שווות). במקום זה, נשתמש בעובדה שהקוטרים מקבילים ולהוכיח בצורה ישירה שהמשולשים דומים.

כיוון $AC \parallel DB$ כי שניהם ניצבים לקו O_1O_2 , ולבן $\angle CO_1E = \angle DO_2E = \alpha$ כי הן זוויות מתחלפות. כל הרדיוסים של מעגל שווים, כך ש- $\triangle EO_1A \sim \triangle EO_2B$. הוכחנו ש- $O_1C = O_1A, O_2B = O_2D$, ולכן

$$\frac{O_1E}{O_2E} = \frac{O_1C}{O_2D},$$


$\triangle EO_1C \sim \triangle EO_2D$.




סעיף ב

נתבונן בזוויות סיבוב הנקודה E שנמצאת על CD אם זוויות $\angle AED$ משלימה זוויות $\angle AEC$. הוכחנו $\triangle O_1AE \sim \triangle O_2BE$ ו- $\triangle O_1EC \sim \triangle O_2ED$, ונסמן את הזוויות השווות α, β . נתון ש- AB הוא קו ישר ו- $\angle AED = 180^\circ - (\alpha + \beta)$, כך ש- $\angle AED = 180^\circ - (\alpha + \beta)$. נבדוק עם :

$$\angle AED + \angle AEC = (180^\circ - (\alpha + \beta)) + (\alpha + \beta) = 180^\circ.$$



4.14 קיז תשע"ד מועד א



מנקודה A יוצא ישר המשיק למעגל בנקודה B,

ויצא ישר אחר החותך את המעגל בנקודות C ו-D.

הנקודה E היא אמצע המיתר DC.

הנקודה M היא מרכז המעגל (ראה ציור).

א. הוכח כי המרובע AEMB הוא בר חסימה במעגל.

ב. אלכסוני המרובע AEMB, שהוא בר חסימה במעגל,

נפגשים בנקודה T.

נתון כי הנקודה T היא מפגש התיכונים במשולש BDC.

$$\text{הוכח כי } AB^2 = 2MT \cdot TA.$$

$$\text{ג. נתון: } \frac{\sqrt{10}}{2} \text{ ס"מ} = TE, 1 \text{ ס"מ} = MT.$$

מצא את רדיוס המעגל החוסם את המרובע AEMB.

סעיף א


משפטים רלוונטיים: (103) "אם מנקודה שמחוץ למעגל יוצאים חותך ומשיק, אז מכפלת החותך בחלקו החיצוני שווה לריבוע המשיק", $AB^2 = AC \cdot AD$. (77) "המשיק למעגל מאונך לרדיוס בנקודות ההשקה", $MB \perp AB$. (68) "קטע ממרכז המעגל החוצה את המיתר מאונך למיתר", $ME \perp DC$. (56) "ניתן לחסום מרובע במעגל רק אם סכום הזוויות הנגדיות שווה ל- 180° ".

$:AEMB$

$$\angleMEA + \angleMBA = \angleEMB + \angleEAB = 180^\circ.$$


מ- $AB \perp MB$ ו- $DC \perp ME$, $\angleMEA + \angleMBA = 180^\circ$. לפי משפט (106) "סכום הזוויות הפנימיות של מצולע קמור הוא $(n - 2) \cdot 180^\circ$ ", סכום הזוויות הפנימיות של מרובע הוא 360° , ולכן:

$$\angleEMB + \angleEAB = 360^\circ - (\angleMEA + \angleMBA) = 180^\circ.$$



סעיף ב

באיור למטה מופיע המידע הרלוונטי בלבד: המרجل החוסם את המרובע $AEMB$, האלכסונים שלו AM, EB ומשולש BDC . הם מיתרים נחטכים של המרجل החוסם. לפי משפט (101) "אם במרجل שני מיתרים נחטכים, אז מכפלת קטעי מיתר אחד שווה למכפלת קטעי המיתר השני", $TE \cdot TB = MT \cdot TA$. אם נוכיח $TE = TB/2$, נקבל הוכחה להשווואה בשאלת. נתון שהנקודה T היא מפגש התיכוןים ב- $\triangle BDC$ ולפי משפט (46) "נקודות חיתוך התיכוןים מחלקת כל תיכון ביחס $1 : 2$ ", וכך $TE = TB/2$ או $TB/TE = 2/1$.




סעיף ג

רדיוס המרجل החוסם הוא קו מהמרכז לאחת הקוקודים A, E, M, B . אין לנו ידיעים את מרכז המרجل, אבל נראה ש- MA יכול להיות קוטר ואז נקבל את הרדיוס כמחצית הקוטר. מסעיף א $\angle MBA$ היא זוויות ישרה, ולפי משפט (74) "זוויות היקפית בת 90° נשענת על קוטר", MA הוא קוטר. עם הערכות הנתונות נחשב את הרדיוס תוך שימוש בנוסחאות מסעיף ב:

$$\begin{aligned}
 R &= \frac{1}{2}MA \\
 &= \frac{1}{2}(MT + TA) \\
 &= \frac{1}{2}\left(MT + \frac{TB^2}{2MT}\right) \\
 &= \frac{1}{2}\left(MT + \frac{4TE}{2MT}\right) \\
 &= \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2 \cdot 1} \cdot 4\left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right)^2\right) \\
 &= 3.
 \end{aligned}$$


4.15 חורף תשע"ד



- משולש שווה-צלעות ABC חסום במעגל.
נקודות D ו- L נמצאות על המרחב כר ש- $BD \parallel LC$.
הmittרים AL ו- BD נחתכים בנקודה E (ראה צייר).
א. הוכח כי המרובע $LEDC$ הוא מקבילית.
ב. (1) הוכח כי $\triangle ADE$ הוא משולש שווה-צלעות.
. (2) הוכח כי $LC + LB = LA$

סעיף א


אין לנו מידע על המיתרים המגדירים את המרובע, לכן ננסה להוכיח שהוא מקבילית לפי משפט 29 "מרובע שבו כל זוג זוויות נגדיות שוות הוא מקבילית". כאשר יש "מספר רב" של מיתרים, סביר שיש זווית שווה לפאי משפט 72 "במעגל, כל הזווית ההיקפיות הנשענות על מיתר מסוימו צד של המיתר שווות זו לזו". נסמן את הזווית של המשולש שווה צלעות $\triangle ABC$ ב- $60^\circ = \alpha$.
מכיון ש- $\angle CLA = \angle CBA = \alpha$ כי הן נשענות על המיתר BC . נתון ש- $BD \parallel LC$, אז $\angle LEB = \angle CLA = \alpha$ לפי זוויות מתחלפות.
מה עם זוג הזווית הנגדיות השני במרובע? $\angle LED = 180 - \alpha$ לפי זוויות משלימות בנקודה E .
נתון ש- $CD \parallel BD$ ולכן $\angle LCD = 180 - \angle DCB = 180 - \alpha$ לפי זוויות חד-צדדיות על CD .



סעיף ב (1)

שוב אין לנו מידע על אורך הצלעות, לכן ננסה להוכיח שכל הזוויות של המשולש $\triangle ADE$ שוות. מספיק להוכיח שתי זוויות שוות ל- 60° כי השלישי צריכה להשלים ל- 180° .

בסעיף א הוכחנו ש- $\angle LEB = \angle CLA = 60^\circ$. מכאן שגם $\angle CBA = 60^\circ$. ננסה להוכיח ש- $\angle DAE = \angle DAL = 60^\circ$ או $\angle ADB = \angle ADE = 60^\circ$ על ידי חיפוש זוויות הנשענות על המיתר DL או AB . אכן, $\angle ACB = 60^\circ$ נשענת על המיתר AB .



סעיף ב (2)

מהחלק הראשון של הסעיף אנו יודעים ש- $\triangle ADE$ שווה צלעות, כי $LC = DE$, $AE = DE$, ו- $AD = AE$ כי הם צלעות נגדיים של המקבילית. לכן $AE = LC$ ו-

$$LA - LC = (LE + AE) - LC = (LE + LC) - LC = LE.$$

נשאר להוכיח $LE = LB$. הוכחנו ש- $\angle LEB = 60^\circ$, כך שאם נוכיח שאחת מ- $\angle EBL$, $\angle ELB$ שווה ל- 60° קיבל משלו שווה צלעות.שוב נחפש זוויות נשענות על אותו מיתר ונקבל ש- $\angle BLA = \angle BCA = 60^\circ$ כי שתיהן נשענות על המיתר AB .

תוך כי נסיונות לפטור את השאלה, מצאתי הוכחה אחרת מעניינת. נמשוכו על אותו קשת אבל **מצדדים נגדיים**. זווית היקפית נשענת על קשת שווה למחצית הזוויות המרכזיות הנשענת על אותה קשת (משפט 69), ולכן אם סכום שתי הקשתות הוא כל המעגל, סכום הזוויות שווה 180° . במקבילית, $\angle DCL = 120^\circ$, ולכן:

$$\angle LBE = \angle LBD = 180^\circ - \angle DCL = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$

המלצות: גיאומטריה

- חשוב לציר תרשימים **ברורים** ו**גודולים** עדיף עם סרגל ומחוגה. בתחילת הפתרון אנו מסמנים את המידע החוצה על הזווית והצלעות ויש לדאוג שהזוויה מספיק מקום.
- כאשר לשאלה יש מספר סעיפים כדאי לציר תרשימים נפרדים לכל סעיף תוך העמתת מידע לא רלוונטי לאותו סעיף.
- **אין לסמן על התרשימים.** לעיתים, מה שנראה ברור בתרשימים הוא בדיקת מה שעליינו להוכיח. בנספח א' הביתי הוכחה שכל משולש הוא שווה שווקיים כאשר ההוכחה מסתמכת על תרשימים שאינם נכון. מטרת התרשימים היא לחפש קשרים בין זוויות, צלעות, משיקים, וכו', כדי להעלות השערות על דרכי אפשריות להוכחת הטענה.
- אני מעדיף לסמן זוויות עם אותיות יווניתות כגון α , ולא על ידי ציון שלושת הנקודות המגדירות אותה ABC . הסיבה היא שקשה יותר לעקוב אחר הנקודות השונות של זוויות מעוקבות לאחר סימן בודד.
- רצוי לרשום את המשפטים שיכולים להיות רלוונטיים לפני שמנסים לפתור את השאלה כי זה יכול לכוון לפתרון. כiboldן שלא כל המשפטים יהיו נחוצים. לעיתים קרובות שאלה מתבססת על משפט מתקדם אחד, כגון הזווית של מרובע החסום במעגל, הזווית בין משיק למעגל או השווון של כל זווית היקפית הנשענת על מיתר. לכן, ההיכרות עם משפטיים אלה יקל על מציאת פתרונות השאלה.
- יש משפטיים שאוכרים בנסיבות כי הם די אינטואטיביים, למשל, שימושים חופפים לפי צ.צ.צ. ודומים לפ.ז.ז. יש משפטיים אחרים שקשה יותר לזכור אותם ושהוכחת נכונותם לא קללה. למשל, אני מתקשה לזכור איך להפעיל את המשפט על משיק ומיתר. בנספח ב' הביתי תרשימים צבעוניים של מבחר משפטיים בתקווה שהתרשיים יקלו עליכם לזכור אותם, בוודאי יחסית לניסוחים מיולאים מסורבלים.
- כאשר שואלים על שטחים של משולשים יש לחפש גבהים משותפים. אנו רגילים לראות גבהים שיורדים מנוקודה לקו אופקי, אבל גבהים יכולים להופיע מכל נקודה لكו ממול ללא קשר למצב של המשולש על הנייר.
- כדי להוכיח חפיפה של משולשים ישר זווית, מספיק להוכיח שווון של צלע אחד וזוית חדת אחת מכל משולש. אם הצלע הוא בין זוית חדת לבין זוית הישרה, החפיפה היא מיידית לפי צ.צ.ז. אם הצלע הוא בין שתי זוויות החדות (היתר), זוית שערכה α ושנייה שערכה β , אז $\alpha - \beta = 90^\circ$, ושוב יש צ.צ.ז. אני מניח שבבוחינה צריך לרשום איך מגעים מזוית חדת וצלע לא.צ.ז., אבל כאשר מחפשים הוכחה לחפיפה>KYCOR דרך זה יכול להיעיל.

פרק 5 טריגונומטריה


5.1 קיז תשע"ח מועד ב

. (AB = AC) הוא משולש שווה שוקיים . ABC הוא חוצה זווית במשולש ABC. המשך הקטע BD חותך את המרجل החוסם את המשולש ABC בנקודה E. גודל הזווית ABC הוא 2β .
א. הבע באמצעות β את $\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta ADE}}$.
 אין צורך לפשט את הביטוי שקיבלת.

נתון: BE שווה באורכו לרדיוויס המרجل החוסם את המשולש ABC .

ב. חשב את היחס $\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta ADE}}$.
 נסמן ב- a את אורך השוק AB .
ג. הבע באמצעות a את רדיוס המרجل החסום על ידי המשולש ABC .
 בתשובותיך השארשתי ספורות אחרי הנקודה העשרונית.

להלן התרשימים עם הזווית הנזונות ב- B, C ולאחר חישוב הזווית האחורית לפי סכום של זוויות של משולש. כמו כן, $\angle AEB = \angle ACB = 2\beta$, $\angle EAC = \angle EBC = \beta$, כי הן נשענות על אותן קשתות. התרשימים נראה דחוס, אבל ציירתי אותו לפי הזווית המתקבלות במהלך הפתרון.



סעיף א

$\triangle ABC$ משולש שוקיים ולכן מייד יש לנו:

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a \cdot \sin(180 - 4\beta) = \frac{a^2}{2} \sin 4\beta .$$

כדי שהיחס יהיה ביטוי ב- β בלבד, علينا למצוא ביטוי ל- $S_{\Delta ADE}$ כדי ש- a^2 יצטמצם.

נחפש משולשים כדי לבטא AE , AD כביטויים ב- β , a כדי ש- a^2 יצטמצם. ב- $\triangle ABE$ נמצא $AE = \frac{a \sin \beta}{\sin 2\beta}$. ב- $\triangle ABD$ נמצא $AD = \frac{a \sin \beta}{\sin 3\beta}$. לפי חוק הסינוסים: צלע אחד הוא באורך a וצלע שני באורך AD , AE .

$$\begin{aligned}\frac{AE}{\sin \beta} &= \frac{a}{\sin 2\beta} \\ AE &= \frac{a \sin \beta}{\sin 2\beta} \\ \frac{AD}{\sin \beta} &= \frac{a}{\sin 3\beta} \\ AD &= \frac{a \sin \beta}{\sin 3\beta} \\ S_{\triangle ADE} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{a \sin \beta}{\sin 2\beta} \cdot \frac{a \sin \beta}{\sin 3\beta} \cdot \sin \beta \\ &= \frac{a^2}{2} \cdot \frac{\sin^3 \beta}{\sin 2\beta \sin 3\beta} \\ \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle ADE}} &= \frac{\sin 4\beta \sin 2\beta \sin 3\beta}{\sin^3 \beta}.\end{aligned}$$

אפשרות אחרת היא לאחר חישוב AE או AD , להשתמש בחוק הסינוסים על המשולש $\triangle ADE$ כדי לחשב את השני.

סעיף ב'

נשתמש בחוק הסינוסים על $\triangle ABE$ עם צלע BE , AB והרדיוס יצטמצם:


$$\begin{aligned}2R &= \frac{BE}{\sin(180 - 4\beta + \beta)} = \frac{BE}{\sin 3\beta} = \frac{R}{\sin 3\beta} \\ 2 \sin 3\beta &= 1 \\ 3\beta &= 30^\circ \\ \beta &= 10^\circ.\end{aligned}$$

נכון שגם $\sin 3 \cdot 50 = \frac{1}{2}$, אבל לא ניתן שלמשולש שתי זוויות של 100° ו- 20° . נסמן $\beta = 10^\circ$, אז $2\beta = 20^\circ$, $3\beta = 30^\circ$, $4\beta = 40^\circ$.

$$\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle ADE}} = \frac{\sin 4\beta \sin 2\beta \sin 3\beta}{\sin^3 \beta} = \frac{\sin 40 \sin 20 \sin 30}{\sin^3 10} = 20.99^\circ.$$

סעיף ג

לפי משפט 6 "במשולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים", כך שחוצה זווית $\angle BAC$ ניצב ל- BC בנקודה F . לפי משפט 49 "שלושת חוצי הזווית של משולש נחתכים בנקודה אחת, שהיא מרכז המעגל החסום במשולש", הנקודה המסומנת M בתרשים היא מרכז המעגל החסום.



נשאר רק להשתמש בהגדרות של הפונקציות הטריגונומטריות. ב- $\triangle ABF$


$$\begin{aligned} \sin(90 - 2\beta) &= \frac{b}{a} \\ b &= a \cos 2\beta. \end{aligned}$$

ב- $\triangle BMF$

$$\begin{aligned} \tan \beta &= \frac{r}{b} \\ r &= a \cos 2\beta \tan \beta \\ &= a \cos 20 \tan 10 = 0.1657a. \end{aligned}$$

5.2 קיז תשע"ח מועד א

- ABC הוא משולש ישר זווית ($\angle ABC = 90^\circ$).
 M היא נקודה על היתר CR ש-
 $AM : MC = \sqrt{3} : 4$.
 $BM = 8$, $\angle ABM = 30^\circ$.
א. סמן: $MC = 4x$ וחשב את זוויות המשולש ABC.
ב. נסמן את מרכזי המעגלים החוסמים את המשולשים ABM ו- CMB ב- O_1 ו- O_2 בהתאם.
(1) הסבר מדוע המרובע BO_1MO_2 הוא דלטון.
(2) חשב את אורך הקטע O_1O_2 .
- $\angle BAM = \alpha, \angle BCM = 90 - \alpha$



סעיף א

- (1) לשני המשולשים $\triangle ABM, \triangle CMB$ צלע עם הנעלם x , זווית ידועה אחת, זווית שנייה עם הנעלם α . מחוק הסינוסים קיבל שתי משוואות עם שני הנעלמים שאפשר לפתור אתכדי לקבל משווה אחת עם הנעלם α בלבד:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{3}x}{\sin 30} &= \frac{8}{\sin \alpha} \\ x &= \frac{8 \sin 30}{\sqrt{3}x \sin \alpha} \\ \frac{4x}{\sin 60} &= \frac{8}{\sin(90 - \alpha)} \\ x &= \frac{8 \sin 60}{4x \cos \alpha}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}\frac{1}{2\sqrt{3}\sin\alpha} &= \frac{\sqrt{3}}{4 \cdot 2\cos\alpha} \\ \tan\alpha &= \frac{4}{3}.\end{aligned}$$

לכן, $\angle BCA = 90 - \alpha = 36.87$, ולא נשכח לרשות גם $\angle BAC = \alpha = 53.13$
 לפि חוק הסינוסים עבור $\triangle CMB, \triangle ABM$ (2)

$$\begin{aligned}2R_1 &= \frac{8}{\sin\alpha} \\ R_1 &= 5 \\ 2R_2 &= \frac{8}{\sin(90 - \alpha)} \\ R_2 &= 20/3.\end{aligned}$$

סעיף ב

(1) נצייר התרשים חדש עם המעלגים החוסמים. ניתן לראות ש- $O_1M = O_1B$ כי הם רדיוסים של המעלג החוסם את $\triangle ABM$, ו- $O_2M = O_2B$ כי הם רדיוסים של המעלג החוסם את $\triangle CBM$.
 לפי ההגדרה מרובע עם שני זוגות של צלעות שכנים שהם שוויים הוא דلتון.




(2) לפי משפט 21 "האלכסון הראשי בדלתון חוצה את זויות הראש, חוצה את האלכסון השני ומאונך לו", $MB \perp O_1O_2$ וחוצה אותו. את האורך של O_1O_2 ניתן לחשב כסכום האורכים ממרכזים המעלגים ועד לנקודות החיתוך של האלכסונים. נשתמש במשפט פיתגורס:

$$\begin{aligned}O_1O_2 &= O_1E + O_2E = \sqrt{R_1^2 - 16} + \sqrt{R_2^2 - 16} \\ &= \sqrt{5^2 - 16} + \sqrt{\left(\frac{20}{3}\right)^2 - 16} \\ &= 3 + \frac{16}{3} = \frac{25}{3}.\end{aligned}$$

5.3 חורף תשע"ח

נתונה מקבילית $ABCD$. AC הוא האלכסון הארוך, כמתואר בציור.



במשולש ABC חסום מעגל שמרכזו O .

נתון: הנקודה O נמצאת במרחקים 6 ו- 3

מן היסרים AD ו- AC בהתאם;

$$OA = 10$$


א. חשב את גודלי זוויות המקבילית.

$$\text{ב.} \quad \text{חسب את אורך האלכסון } AC.$$

ג. חשב את שטח המקבילית.

הן נקודות המפגש של האנכים מ- O עם AC, AD הם מ- 49 "שלשות חוצי הזוויות של משולש נתככים בנקודה אחת, שהיא מרכז המעגל החסום במשולש", הם חוצי הזוויות BAC, BCA , בהתאם. המונח "חוצה זוויות" נtapס ל' בראש ו'fterת' את הבעה תוק הנחה שלאלכסון של מקבילית חוצה את הזוויות: $\angle BAC = \angle CAD$. כמו כן שזה נכון עבור מעוין.

נסמן את הזוויות בנקודה A עבור המשולשים ישר-זוויות $\triangle AOE, \triangle AOF$ שנוצרו על ידי האנכים: $\alpha = \angle OAE, \beta = \angle OAF$



סעיף א

לפי התדרשים $BAD = \alpha + \beta$. נחשב α, β מהפונקציות הטריגונומטריות במשולשים ישר-זוויות:

$$\sin \alpha = 3/10$$

$$\alpha = 17.46$$

$$\sin \beta = 6/10$$

$$\beta = 36.87$$

$$\angle BCD = \angle BAD = \alpha + \beta = 54.33$$

$$\angle ABC = \angle ADC = \frac{360 - 2(\alpha + \beta)}{2} = 125.67.$$

סעיף ב

האלכסון AC הוא צלע של $\triangle ABC$ והזווית שלו ידועים, אבל אי-אפשר להשתמש בחוק הסינוסים כי אורכי הצלעות לא ידועים. מהתרשימים רואים שהאלכסון מורכב משני קטעי קו AE, EC שهما צלעות של משולשים ישר-זוויתים $\triangle AOE, \triangle COE$. מתקבל המשפט פיתגורס:

$$AE = \sqrt{10^2 - 3^2} = 9.54.$$

נשתמש בחוק הסינוסים ב- $\triangle COE$ (ונימנע מהפיתוי לקבוע $\angle OCE = \alpha$). לפי זוויתות מתחלפות במקבילות $\angle BCA = \angle CAD = \beta - \alpha$:

$$\begin{aligned}\angle OCE &= \frac{\angle BCA}{2} = \frac{\beta - \alpha}{2} \\ &= \frac{36.87 - 17.46}{2} = 9.71\end{aligned}$$

$$\angle COE = 180 - 90 - \angle OCE = 80.29$$


$$\frac{EC}{\sin 80.29} = \frac{3}{\sin 9.71}$$

$$EC = 17.54$$

$$AC = AE + EC = 9.54 + 17.54 = 27.08.$$

סעיף ג

שטח של מקבילית הוא הבסיס כפול הגובה:



$$\frac{b}{\sin 2\alpha} = \frac{27.08}{\sin 125.67}$$

$$b = 19.08$$

$$\sin(\beta - \alpha) = \frac{h}{27.08}$$

$$h = 9$$

$$S_{ABCD} = bh = 171.71.$$

אפשרות אחרת היא להשתמש בנוסחה הטריגונומטרית כדי לחשב $S_{\triangle ABC}$ ולהכפיל בשניים.

5.4 קיז תשע"ז מועד ב

.($AB \parallel DC$) $ABCD$

נתון: $(a < b)$ $CD = b$, $AB = a$

$$\therefore \angle C = 60^\circ$$

א. הבע את שוקי הטרפז, BC ו- AD , באמצעות a ו- b .

נתון: $a = 4$, אורך האלכסון BD הוא $4\sqrt{7}$.

ב. חשב את b .


ג. (1) R הוא רדיוס המרجل החוסם את הטרפז. מצא את R .

(2) הסבר מדוע אפשר לחסום מרجل בטרפז $ABCD$.

(3) r הוא רדיוס המרجل החוסם בטרפז. מצא את r .

סעיף א

לפי משפט 56 "ניתן לחסום מרובע במרجل אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ", ולכן גבהים מ- A, B ל- CD החותכים אותו ב- E, F . $\triangle AED, \triangle BFC$ הם משולשים ישר-זווית. בתרשים השלמנו את הזווית במשולשים ל- 180° . לפי משפט 40 "טרפז בו הזווית שליד אותו בסיס שווה זו לו הוא טרפז שווה שוקיים", $ABCD$ שווה שוקיים.



מכאן: $\triangle AED \cong \triangle BFC$ $\because AE = BF$

$$\begin{aligned} \cos 60^\circ &= \frac{(b-a)/2}{s} = \frac{1}{2} \\ s &= b - a. \end{aligned}$$

פתרון אחר משתמש בחוק הקוסינוסים על $\triangle ACD, \triangle ACB$. נסמן ב- c את אורך האלכסון AC .

$$\begin{aligned} c^2 &= s^2 + b^2 - 2sb \cos 60^\circ \\ &= s^2 - sb + b^2 \\ c^2 &= s^2 + a^2 - 2sa \cos 120^\circ \\ &= s^2 + sa + a^2 \end{aligned}$$


נשווה את שתי הנוסחאות ל- c^2 ונפתר עבור s :

$$\begin{aligned}s(b+a) &= b^2 - a^2 = (b+a)(b-a) \\ s &= b-a.\end{aligned}$$

סעיף ב

שקלתי להשתמש בחוק הסינוסים במשולש $\triangle ADB$: פעם אחת לחשב $\angle ADB$ ופעם שנייה לחשב את s . עדיף להשתמש בחוק הקוסינוסים ב- $\triangle ADB$ כי אנו יודעים ש- $\angle ADB = 120^\circ$.

$$\begin{aligned}(4\sqrt{7})^2 &= 4^2 + (b-4)^2 - 2 \cdot 4 \cdot (b-4) \cdot \cos 120^\circ \\ b^2 - 4b - 96 &= 0 \\ (b-12)(b+8) &= 0 \\ b &= 12.\end{aligned}$$



סעיף ג

(1) שימו לב שהאלכסון BD הוא **לא** הקוטר של המעגל החוסם שמסומן בנקודת השחורה הגדולה. לפי חוק הסינוסים ב- $\triangle ADB$:

$$R = \frac{4\sqrt{7}}{2 \sin 120^\circ} = \frac{4\sqrt{7}}{\sqrt{3}} = 6.11.$$


(2) לפי משפט 57, "מרובע קמור חוסם מעגל אם ורק אם סכום שתי צלעות נגדיות שווה לסכום שתי הצלעות הנגדיות האחרות":

$$\begin{aligned}a+b &\stackrel{?}{=} s+s \\ a+b &\stackrel{?}{=} (b-a)+(b-a) \\ 3a &\stackrel{?}{=} b \\ 3 \cdot 4 &= 12.\end{aligned}$$

$:BF = 2r$ הם מישיקים מקבילים למעגל החוסם, ולכן AB, CD (3)

$$\begin{aligned}\sin 60^\circ &= \frac{2r}{s} = \frac{2r}{b-a} = \frac{2r}{8} \\ r &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 8 = 2\sqrt{3} = 3.464.\end{aligned}$$

5.5 קיז תשע"ז מועד א



. (AB = BC) הוא משולש שווה שוקיים △ABC

ור' BD הם תיכוןים במשולש,

הנחתכים בנקודה O (ראה ציור).

א. הוכת: $S_{\triangle BOE} = S_{\triangle COD}$

מעגל שמרכזו O משיק לצלע

בנקודה D.


נתון כי שטח העיגול שווה לשטח המשולש AOC .

ב. חשב את גודל הזווית ACE .

ג. הביע את אורך הקטע OE באמצעות רדיוס המעגל.

סעיף א

נסמן בתרשים לפיה: $\triangle ABC$ שווה שוקיים, AF, BD, CF תיכוןים. משפט 46 "נקודת חיתוך התיכוןים מחלקת כל תיכון ביחס 1 : 2". כי $AF = CE$ כי $\triangle CAF \cong \triangle ACE$ לפי צ.צ. כי $\triangle ABC$ שווה-שוקיים.



נשתמש במשפט 91 "משפט תאלס המורחב": ישר המקביל לאחת מצולמות המשולש חותך את שתי הצלעות האחרות או את המשכיהן בקטועים פרופורציוניים", כך ש- $\frac{EG}{EF} = \frac{AC}{BC}$ גם $\triangle EBF \sim \triangle EAF$ כי $\angle EBF = \angle EAF$ ו- $\angle BEF = \angle AEF$ (הן יוצרים זוג מושגים משותפים).
 $EG = \frac{EF}{2} = \frac{a}{4}$ והוא שווה-שוקיים, ולכן $EG = \frac{a}{4}$.

$$S_{BOE} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{4} \cdot BG + \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{4} \cdot GO = \frac{a}{8}(BG + GO) = \frac{a}{8} \cdot 2r = \frac{ar}{4}$$

$$S_{COD} = \frac{1}{2} \cdot r \cdot \frac{a}{2} = \frac{ar}{4} .$$


פתרונות אחר מתקבל מהנוסחה הטריגונומטרית לשטח עם הזווית הקודקודית α :

$$S_{BOE} = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot c \cdot \sin \alpha$$

$$S_{COD} = \frac{1}{2} \cdot r \cdot 2c \cdot \sin \alpha.$$

פתרונות זה הרבה יותר קל רק קשה לי להימל מגישה גיאומטרית לחשב שטח מבסיס וגובה!

סעיף ב



נתון:

$$S_O = \pi r^2 = \frac{1}{2}ar = S_{AOC}$$

$$a = 2\pi r.$$

נציב עבור a בחישוב פונקציה טריגונומטרית עבור הזווית β

$$\tan \beta = \frac{r}{a/2} = \frac{2r}{2\pi r} = \frac{1}{\pi}$$

$$\beta = \arctan \frac{1}{\pi} = 17.66^\circ.$$

סעיף ג


בתרשים סימנו $OE = c$. נחשב פונקציה טריגונומטרית עבור הזווית β ב- $\triangle COD$.

$$\sin \beta = \frac{r}{2c}$$

$$c = \frac{r}{2 \sin \beta}$$

$$= 1.648r.$$

5.6 חורף תשע"ז




- נתון טרפז $(BC \parallel AD)$ $ABCD$
 החסום בחצי מעגל שמרכזו O ורדיוסו R
 כך ש- AD הוא קוטר של חצי המעגל.
 המשכי השוקיים AB ו- DC נפגשים
 מחוץ למעגל בנקודה E (ראה ציור).
 נתון: $\angle EAD = \alpha$.
- א. הבע באמצעות R ו- α את אורך הקטע BC .
 ב. מהו התחום של כל הערכים האפשריים עבור הזווית α ? נמק.
 ג. נתון כי שטח משולש AED גדול פי 9 משטח משולש COD .
 מהו היחס בין רדיוס המעגל החסום את המשולש AED לבין R ?

סעיף א

להלן הוכחה לסתירות של הטענות בתרשימים להלן. הרדיוסים של המעגל שוים $OA = OB = OC = OD = R$, שכן $\triangle ABO \cong \triangle CBO$ (שווה-שוקיים, ו- $\angle BAO = \angle BCO = \alpha$). כדי להשלים זוויות של $\angle BCO = \angle AOB = \beta$ ב- $\angle AOB = 180 - 2\alpha$, נסמן $\angle AOB = 180 - 2\alpha$. נשלים את הזווית של $\triangle BOC = \angle CBO = \beta$ ב- $\angle BOC = 180 - 2\beta$. לפי זווית מתחלפות $\angle COD = \angle BCO = \beta$ ב- $\angle BOC = 180 - 2\beta$. נסמן γ . לפי זווית מתחלפות $\angle COD = \angle OCD = \gamma$. נקבל $\angle COD = \angle OCD = (180 - \beta)/2 = \alpha$.

אפשר גם להשתמש המשפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ". לאחר חישקנו ש- $\angle AOB = \angle CBO = 180 - 2\alpha = \beta$, נסמן $\angle OAB = \angle ABO = \alpha$. אפשר לחשב ש- $\angle CDO = \alpha$ ומשם את שאר הזווית.



נחשב $a = BC$ לפי חוק הסינוסים ולפי חוק הקוסינוסים ב- $\triangle BOC$, ותחליטו איזו שיטה עדיפה.

לפי חוק הסינוסים:

$$\begin{aligned}\frac{a}{\sin \gamma} &= \frac{R}{\sin \beta} \\ a &= \frac{R \sin(180 - 2\beta)}{\sin \beta} = \frac{R \sin 2\beta}{\sin \beta} \\ &= \frac{R(2 \sin \beta \cos \beta)}{\sin \beta} \\ &= 2R \cos \beta = 2R \cos(180 - 2\alpha) \\ &= -2R \cos 2\alpha.\end{aligned}$$

לפי חוק הקוסינוסים:

$$\begin{aligned}a^2 &= R^2 + R^2 - 2R \cdot R \cos \gamma \\ &= 2R^2(1 - \cos(180 - 2\beta)) = 2R^2(1 + \cos 2\beta) \\ &= 2R^2(1 + \cos^2 \beta - \sin^2 \beta) \\ &= 2R^2(2 \cos^2 \beta) \\ a &= 2R \cos \beta = 2R \cos(180 - 2\alpha) \\ &= -2R \cos 2\alpha.\end{aligned}$$

סעיף ב

האורך של צלע חייב להיות חיובי $a = -2R \cos 2\alpha < 0$, ולכן 2α נמצא בربיע השני:

$$\begin{aligned}90 < 2\alpha &\leq 180 \\ 45 < \alpha &\leq 90.\end{aligned}$$

$90 \neq \alpha$ כי הזרויות הבסיס של משולש שווה-שוקיים חייבות להיות פחות מ-90°.

סעיף ג


נתון יחס של השטחים של שני משולשים. נחשב את השטחים של שני המשולשים ונראה מה יוצא.

נחשב $S_{\triangle AED}$ לפי הנוסחה הגיאומטרית. הגובה של $\triangle AED$ הוא $h = R \tan \alpha$:

$$S_{\triangle AED} = \frac{1}{2} \cdot 2R \cdot h = R^2 \tan \alpha.$$

נחשב $S_{\triangle COD}$ לפי הנוסחה הטריגונומטרית:

$$\begin{aligned}S_{\triangle COD} &= \frac{1}{2} R \cdot R \cdot \sin \beta \\ &= \frac{1}{2} R^2 \sin(180 - 2\alpha) = \frac{1}{2} R^2 \sin 2\alpha.\end{aligned}$$




לפי היחס נתון בין השטחים:

$$\begin{aligned}
 tR^2 \tan \alpha &= 9 \cdot \frac{1}{2} R^2 \sin 2\alpha \\
 \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} &= 9 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \sin \alpha \cos \alpha \\
 \cos \alpha &= \frac{1}{3} \\
 \sin \alpha &= \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}.
 \end{aligned}$$

במשולש $\triangle DOE$ יש לנו $R = DE \cos \alpha$. נשתמש בחוק הסינוסים כדי לחשב r , הרדיוס של המगעל שחותם $\triangle AED$:

$$\begin{aligned}
 2r &= \frac{DE}{\sin \alpha} \\
 \frac{r}{R} &= \frac{1}{2 \sin \alpha \cos \alpha} \\
 &= \frac{1}{2(2\sqrt{2}/3)(1/3)} \\
 &= \frac{9}{4\sqrt{2}} = 1.591.
 \end{aligned}$$

5.7 קיז תשע"ו מועד ב




- . במעגל חסום טרפז $ABCD$ ($AB \parallel DC$) מרכז המעגל O בתחום הטרפז (ראה ציור).
- רדיוס המעגל הוא R וגובה הטרפז הוא h .
- נתון: $\alpha = \angle BOA = 3\alpha$, $\angle COD = \angle$.
- א. הביע באמצעות α את $\angle DAB$.
- ב. הביע את האורך של שוק הטרפז באמצעות α ו- R .
- ג. הביע את האורך של שוק הטרפז באמצעות α ו- h .
- ד. נתון כי שטח המשולש COD הוא $\frac{h^2}{12 \cos^2 \frac{\alpha}{2}}$ מצא את α .

מהתרשים נראה שהטרפז שווה-שוקיים, אבל אין לסמוך על תרשימים. השיק统 זמן רב עד שעלה בדיוני האפשרות שטרפז חסום במעגל חייב להיות שווה-שוקיים. המשפט לא מופיע ברשימה המשפטים שניתן לצטט בבחינת הבגרות ויש להוכיח אותו. בספרי לימוד המשפט לא מובלט ומופיע רק כדוגמה או תרגיל. אני אביא שתי הוכחות: אחת שליל ואחת המופיעה בספרים.


ההוכחה מהספרים (רישום ימני למטה): $\angle ACD = \angle CAB$ לפי זוויות מתחלפות ולכן גם המיתרים הצלואים שוים $AD = CB$.

ההוכחה שליל (תרשים שמאלי למטה): המשפט הראשון שחשבתי עליו כאשר קראתי את השאלה הוא משפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ". נסמן $\angle DAB = \theta$, ולפי המשפט $\angle DCB = 180 - \theta$. לפי זוויות משלימות ומתאמיות $\angle DCF = \angle ABC = \theta$. לפי משפט 40 "טרפז בו הזוויות שליד אותו בסיס שוות זו לזו הוא טרפז שווה-שוקיים", הטרפז שווה-שוקיים.



סעיף א

בארבעת המשולשים עם קודקוד O , הצלעות המקווקות הם רדיוסים שאורכם R , והמשולשים שווה-שוקיים. $\triangle COB \cong \triangle DOA$ לפי צ.צ. כי הטרפז שווה-שוקיים. מכאן $\angle COB \cong \angle DOA$ וניתן לסמך את הזוויות לפי החישובים מימין לתרשים. החישוב של γ מוצדק כי סכום הזוויות סביב נקודה הוא 360. השורה الأخيرة מציגה את התשובה לשאלת כי $\delta + \beta = \gamma$.



$$\begin{aligned}\beta &= \frac{180 - 3\alpha}{2} \\ \gamma &= \frac{360 - (\alpha + 3\alpha)}{2} = 180 - 2\alpha \\ \delta &= \frac{180 - \gamma}{2} = \frac{180 - (180 - 2\alpha)}{2} = \alpha \\ \beta + \delta &= \frac{180 - \alpha}{2}.\end{aligned}$$

סעיף ב

כדי חשב אורך של שוק נחפש משולש שאחד מצלעותיו הוא DA . לפי חוק בסינוסים ב- $\triangle DOA$:

$$\begin{aligned}\frac{DA}{\sin \gamma} &= \frac{R}{\sin \delta} \\ \frac{DA}{\sin(180-2\alpha)} &= \frac{R}{\sin \alpha} \\ DA &= \frac{R \sin 2\alpha}{\sin \alpha} \\ &= \frac{R \cdot 2 \sin \alpha \cos \alpha}{\sin \alpha} = 2R \cos \alpha.\end{aligned}$$

סעיף ג

בתרשים ציירנו את הגובה מהנקודה C כדי לא להסתיר את הסימונים ב- $\triangle DOA$.
הו גם שוק. נשתמש בהגדירה של סינוס במשולש $\triangle CBE$:

$$\frac{h}{CB} = \sin \angle CBE = \sin \left(\frac{180 - 3\alpha}{2} + \alpha \right) = \sin \left(90 - \frac{\alpha}{2} \right) = \cos \frac{\alpha}{2}.$$

$.CB = \frac{h}{\cos(\alpha/2)}$. התשובה היא $\angle CBE = \angle DAB = \beta + \delta$

סעיף ד

בנוסחה הטריגונומטרית עבור $S_{\triangle COD}$ יופיעו אורך הצלעות R והזווית α . אנו רוצים נוסחה עם h כדי להשווות לביטוי הנתון. נשווה את הביטויים עבור שוקי הטרפז מהסעיפים הקודמים:

$$2R \cos \alpha = \frac{h}{\cos(\alpha/2)}$$

$$R = \frac{h}{2 \cos \alpha \cos(\alpha/2)}.$$

נציב בנוסחה לשטח, נשווה לנוסחה הנתונה לשטח ונצמצם:

$$\begin{aligned}
 S_{\triangle COD} &= \frac{1}{2} \cdot OC \cdot OD \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} R^2 \sin \alpha \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{h^2}{4} \cdot \frac{1}{(\cos \alpha \cos(\alpha/2))^2} \cdot \sin \alpha \\
 \frac{h^2}{12 \cos^2(\alpha/2)} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{h^2}{4} \cdot \frac{1}{(\cos \alpha \cos(\alpha/2))^2} \cdot \sin \alpha \\
 \frac{1}{12} &= \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{\cos^2 \alpha} \cdot \sin \alpha \\
 \frac{1}{12} &= \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{1 - \sin^2 \alpha} \cdot \sin \alpha.
 \end{aligned}$$


נקבל משואה ריבועית ב- $\sin \alpha$, ונבחר את השורש $\frac{1}{2}$ כי הערך של סינוס לא יכול להיות מ-2:

$$2 \sin^2 \alpha + 3 \sin \alpha - 2 = 0$$

$$\begin{aligned}
 (2 \sin \alpha - 1)(\sin \alpha + 2) &= 0 \\
 \sin \alpha &= \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

הערך היחיד ש- α יכול לקבל הוא 30° כי זוויות הבסיס של טרפז חייבים להיות פחות מ- 90° .

5.8 קיז' תשע"ו מועד א



נתון משולש שווה-שוקיים $\triangle ABC$ ($AB = AC$)

BC הוא גובה לבסיס AE

ור- BT הוא תיכון לשוק AC (ראה צייר).

נתון: $BC = 2k$, $\angle TBC = \alpha$, $\angle ACB = \beta$

(1) הבע את האורך של TC באמצעות k ו- β בלבד.


(2) היעזר בתת-סעיף (1), והראה כי

$$\sin(\alpha + \beta) = 4 \sin \alpha \cdot \cos \beta$$

נתון גם: $5 \text{ ס"מ} = 4 \text{ ס"מ}$, $TE = k$.

(1) מצא את β .

(2) מצא את α .



: $\triangle AEC$ לפי הגדרת קוסינוסים ב-

$$\cos \beta = \frac{k}{2a}$$

$$TC = a = \frac{k}{2 \cos \beta}.$$


(2) נחפש משולש עבוריו חוק הסינוסים ייתן משוואה בה יצטמצם k או a . מתחאים:

$$\frac{2k}{\sin(180 - (\alpha + \beta))} = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\frac{2k}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{k / (2 \cos \beta)}{\sin \alpha}$$

$$\sin(\alpha + \beta) = 4 \sin \alpha \cos \beta.$$

(1) נוסיף את אורך הצלעות הנתונות ונשתמש במשפט 86 "במשולש ישר זווית התיכון ליתר שווה למחצית היתר" כדי להסיק שה- $\triangle ETC$ שווה-שוקיים:




נוריד גובה מ- T שהוא אכן אמצעי במשולש שווה-שוקיים $\triangle ETC$ ונקבל:

$$\begin{aligned}\cos \beta &= \frac{2}{5} \\ \beta &= 66.4^\circ.\end{aligned}$$

(2) לפי סעיף (1) וסעיף (2) הקודם:

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= 4 \sin \alpha \cos \beta \\ \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta &= 4 \sin \alpha \cos \beta \\ \sin \alpha \cdot \frac{2}{5} + \cos \alpha \sqrt{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^2} &= 4 \sin \alpha \cdot \frac{2}{5} \\ \sqrt{21} \cos \alpha &= 6 \sin \alpha \\ \tan \alpha &= \frac{\sqrt{21}}{6} \\ \alpha &= 37.37^\circ.\end{aligned}$$

5.9 חורף תשע"ו



במשולש שווה-שוקיים $\triangle ABC$ ($AB = AC$) זווית הבסיס היא 2α .

הנקודה E היא מפגש חוץ-הזווית במשולש $\triangle ABC$. המשך CE חותך את הצלע AB בנקודה D (ראה ציור).

נתו: $\angle BAC > 90^\circ$, $\frac{EC}{DE} = \frac{\sqrt{3}}{2 \sin \alpha}$.


א. מצא את α .

ב. מצא את היחס בין רדיוס המעגל החוסם את המשולש $\triangle ABC$ ובין רדיוס המעגל החסום במשולש $\triangle ABC$.

ג. נתון כי הפרש בין רדיוס המעגל החוסם את המשולש $\triangle ABC$ ובין רדיוס המעגל החסום במשולש $\triangle ABC$ הוא 2 ס"מ.

מצאו את אורך הקטע AE .

נתון שהנקודה E היא מפגש חוץ-הזווית. לפי משפט 6 "במשולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים", ולכן חוצה הזווית $\angle BAC$ עובר דרך E וחותך את BC בנקודה F בזווית ישרה. לפני שניגש לשאלות, נסמן זוויות תוך שימוש רק במשפטים פשוטים כגון סכום הזוויות במשולש הוא 180° .



$\triangle EFB \cong \triangle EFC$ לפי צלע-צלע במשולש ישר-זווית: F היא נקודת האמצע של EF ו- BC והוא צלע משותף. לכן $\angle BEF = \angle CEF = 90 - \alpha$ שנסמן β .

בדרכ דומה נראה ש- $\angle BAF = \angle CAF = 90 - 2\alpha$ שנסמן γ .
 $\angle ADE = 180 - \beta - \gamma = 3\alpha - \beta$ לפי זווית קודקודית, ו- $\angle AED = \beta$ לבסוף, $\angle BDE = 180 - 3\alpha$ לפי זווית משלימות.

סעיף א

נתון היחס $\frac{EC}{DE}$ כתלות ב- α , ולכן נחפש מושלש שuberו חוק הסינוסים ייתן יחס אחר כתלות ב- α , וזה תהיה לנו משווהה ב- α בלבד. אמם EC, DE הם צלעות במשולשים שונים, אבל כבר הוכחנו ש- $\triangle BDE \cong \triangle EFB \cong \triangle EFC$ כי חוק הסינוסים ב- $\triangle EFB$

$$\begin{aligned} \frac{EB}{\sin(180-3\alpha)} &= \frac{DE}{\sin \alpha} \\ \frac{EB}{DE} &= \frac{\sin(180-3\alpha)}{\sin \alpha} = \frac{\sin 3\alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sqrt{3}}{2 \sin \alpha} \\ \sin 3\alpha &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \alpha &= 20^\circ. \end{aligned}$$

סעיף ב

לפי משפט 49 "שלשות חוציא הזוויות של משולש נתכנים בנקודה אחת, שהיא מרכז המעל החסום במשולש", הנקודה E היא מרכז המעל החסום שמשיק לצלע המשולש ב- F . $r = EF$ הוא הרדיוס של המעל החסום.

כעת צריך להיזהר שלא לקובע ש- E היא מרכז המעל החסום כי אין לנו ידיעים שחווצי הזוויות האחרות הם גם אנכים אמצעיים. במקום זה נשתמש בחוק הסינוסים על המשולש $\triangle ABC$. נבחר את הזויה $\angle BAC = 180 - 4\alpha$, כי אפשר לחשב את אורך הצלע הנדי BC כתלות ב- α :


$$\begin{aligned} \tan \alpha &= \frac{r}{BF} = \frac{r}{BC/2} \\ 2R &= \frac{BC}{\sin(180-4\alpha)} = \frac{2r}{\sin 4\alpha \tan \alpha} \\ \frac{R}{r} &= \frac{1}{\sin 4\alpha \cdot \tan \alpha} = \frac{1}{\sin 80 \cdot \tan 20} = 2.79. \end{aligned}$$

סעיף ג

נתון $R - r = 2/(2.79 - 1) = 1.117$. נציב $R = 2.79r$ שהיחסנו בסעיף ב, ונקבל $AF = AE + EF = AE + r$, ולכן נחשב $\triangle AED, \triangle AEC$ לעוד משולשים על המשולשים

$$\begin{aligned} \tan 2\alpha &= \frac{AE + r}{BF} = \frac{AE + r}{r / \tan \alpha} \\ AE &= \frac{r(\tan 2\alpha - \tan \alpha)}{\tan \alpha} \\ &= \frac{1.117(\tan 40 - \tan 20)}{\tan 20} = 1.458. \end{aligned}$$

5.10 קיז תשע"ה מועד ב



מעגל שרדיוּסוֹ ז חסום בטרפז שווה-שוקיים $ABCD$ ($AB \parallel DC$), כמתואר בציור.

נתון: $\angle BCD = 70^\circ$.

א. הבע באמצעות ז:

(1) את הבסיס הגדול של הטרפז.

(2) את שוק הטרפז.


(3) את אלכסון הטרפז.

ב. מצא את היחס בין רדיוס המעגל החסום בטרפז

ובין רדיוס המעגל החסום את הטרפז.

נוריד אnek מ- A שחתוך את DC ב- G , ונק M- B שחותך את DC ב- H . בטרפז $ABHG$ $AB \parallel DC$ והוא מלבן. לפי משפט 77 "המשיק למעגל מאונך לרדיוּס בנקודת ההשקה", האnek מנקודת ההשקה של מעגל עם AB עובר דרך מרכז המעגל והוא ניצב לנקודת ההשקה עם DC . מכאן $AG = EF = BF = 2r$

נסמן $AB = GH = b_2$. הטרפז שווה-שוקיים ולפי משפט 39 "בטרפז שווה שוקיים הזוויות שליד אותו בסיס שוות זו לזו", $\angle DAG = \angle CBH = 20^\circ$, $\angle ADC = \angle BCD = 70^\circ$. ביחד עם $AD = BC$ בטרפז שווה-שוקיים, $\triangle ADG \cong \triangle BCH$ ונקבל $DG = HC = b_1$. נסמן $b = DC = 2b_1 + b_2$.



סעיף א

(1) נחפש משפט הקשור צלעות של מרובע עם הרדיוס של המעלג החוסם. משפט 57 "מרובע קמור":
חסום מעגל אם ורק אם סכום שתי צלעות נגדיות שווה לסכום שתי הצלעות הנגדיות האחרות:

$$2s = b + b_2 = (b_1 + b_2 + b_1) + b_2 = 2(b_1 + b_2).$$

משמעותה זו נחשב משווהות נוספים שייעזרו לנו בהמשך:

$$s = b_1 + b_2, \quad b = 2b_1 + b_2 = s + b_1.$$

לפי ההגדרות של הפונקציות הטריגונומטריות ב- $\triangle ADC$, נוכל לקשר את r לצלעות:

$$\begin{aligned} \tan 70 &= \frac{2r}{b_1} \\ \sin 70 &= \frac{2r}{s} \\ b &= s + b_1 \\ &= 2r \left(\frac{1}{\sin 70} + \frac{1}{\tan 70} \right) \\ &= 2.856r. \end{aligned}$$

$$.s = \frac{2r}{\sin 70} = 2.128r \quad (2)$$

(3) האלכסון הוא היתר של $\triangle BDH$ שצלעותיו ידועים:


$$\begin{aligned} DB^2 &= (b_1 + b_2)^2 + (2r)^2 = s^2 + (2r)^2 \\ &= \left(\frac{2r}{\sin 70} \right)^2 + 4r^2 \\ DB &= 2r \sqrt{\left(\frac{1}{\sin 70} \right)^2 + 1} = 2.921r. \end{aligned}$$

סעיף ב

במבחן ראשון נראה שכדי להשתמש במשפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ", אבל אין בו צורך. שימו לב שהמרכז של המעלג החוסם לא חופף את המרכז של המעלג החוסם, כך שאפשר לחשב R , הרדיוס של המעלג החוסם, כמורחיק ממרכז $\triangle BCD$ המעלג החוסם לאחת מקודקודיו הטרפז. במקומות זה השתמש בחוק הסינוסים ב- $\triangle BCD$:

$$\begin{aligned} 2R &= \frac{DB}{\sin BCD} = \frac{2.921r}{\sin 70} \\ \frac{r}{R} &= \frac{2 \cdot \sin 70}{2.921} = 6.434. \end{aligned}$$

5.11 קיז תשע"ה מועד א



נתון טרפז $(BC \parallel AD)$ $ABCD$

הנקודה E נמצאת על המשך AD כך ש- $CE \parallel BD$

(ראה ציור).

$$\angle CAD = 2 \angle DBC$$

$$DB = 1.8AC$$


א. מצא את גודל הזווית $\angle CEA$.

נתון גם כי שטח המשולש ACE הוא 87.873 סמ"ר.

מצא את גובה הטרפז.

סעיף א

נסמן זוויות לפי זוויות מתחלפות, מתאימות ופנימיות: $\alpha = \angle CBE = \angle BDA = \angle CEA$, $180 - \alpha = \angle BCE = \angle BDE$.



משולש- $\triangle CEA$ לאחר שנוכיח $CE \parallel BD$, $BC \parallel AD$, $CD = DB = 1.8a$, ולפי משפט 29 "מרובע שבו כל זוג זוויות נגדיות שוות הוא מקבילית", $BCED$ היא מקבילית.

$$\begin{aligned} \frac{a}{\sin \alpha} &= \frac{1.8a}{\sin 2\alpha} = \frac{1.8a}{2 \sin \alpha \cos \alpha} \\ \cos \alpha &= 0.9 \\ \alpha &= 25.84. \end{aligned}$$

סעיף ב


נרשום את כל הזווית ב- $\triangle ACE$:

$$\angle CEA = \alpha = 25.84$$

$$\angle CAE = 2\alpha = 51.68$$

$$\angle ACE = 180 - 3\alpha = 102.48.$$

מהתרשים אפשר לראות ש- $S_{\triangle ACE}$ מרכיב מסכום השטחים של שני משולשים עם אותו גובה:



$$\begin{aligned}
 S_{\triangle ACE} &= \frac{1}{2}(b_1 + b_2)h \\
 b_1 &= \frac{h}{\tan 2\alpha} \\
 b_2 &= \frac{h}{\tan \alpha} \\
 S_{ACE} &= \frac{1}{2}h^2 \left(\frac{1}{\tan 2\alpha} + \frac{1}{\tan \alpha} \right) \\
 87.873 &= \frac{1}{2}h^2(6.79 + 2.06) = 1.428h^2 \\
 h &= 7.846.
 \end{aligned}$$


פתרונות אחר משתמש בנוסחה הטריגונומטרית לשטח:

$$\begin{aligned}
 S_{\triangle ACE} &= \frac{1}{2} \cdot AC \cdot CE \cdot \sin \angle ACE \\
 &= \frac{1}{2} \cdot a \cdot 1.8a \cdot \sin(180 - 3\alpha) \\
 87.873 &= 0.87873a^2
 \end{aligned}$$

$$a = 10$$

$$h = a \sin 2\alpha = 7.846.$$

5.12 חורף תשע"ה



אלכסוני הטרפז $ABCD$ מאונכים זה לזו

ונפגשים בנקודה M .

E היא אמצע השוק (ראה ציור).

נתון: $DC = a$, $\angle ACB = \beta$, $\angle ACD = \alpha$

א. הבע באמצעות a , α ו- β

את האורך של ME .


נתון: $a = 6.6$, $\frac{\tan \beta}{\tan \alpha} = \frac{1}{3}$

ב. מצא את האורך של AB .

נתון גם: $BM = 1.3$

ג. מצא את הזווית DCB .

נמשן את הצלעות בתרשימים.



סעיף א

שייר זווית נתון ME הוא תיקון ליתר. לפי משפט 86 "במשולש שייר זווית התיכון ליתר שווה לממחצית היתר", $ME = c/2$. לפי ההגדרות של הפונקציות הטריגונומטריות:

$$\cos \beta = \frac{b}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{a}$$

$$ME = \frac{c}{2} = \frac{b}{2 \cos \beta}$$

$$= \frac{a \cos \alpha}{2 \cos \beta}.$$

סעיף ב

למשולשים $\triangle AMB, \triangle CMB$ צעל משותף $MB = e$. לפי ההגדרות של הפונקציות הטריגונומטריות:

$$\begin{aligned}\tan \beta &= \frac{e}{b} \\ \sin \alpha &= \frac{e}{d} \\ AB = d &= \frac{e}{\sin \alpha} = \frac{b \tan \beta}{\sin \alpha} \\ &= \frac{a \cos \alpha \tan \beta}{\sin \alpha} = \frac{a \tan \beta}{\tan \alpha} \\ &= 6.6 \cdot \frac{1}{3} = 2.2.\end{aligned}$$

הוכחת אחרת משתמשת במשולשים דומים. לפי זווית מתחלפות, $\angle BAM = \angle MCD = \alpha$. $\triangle ABM \sim \triangle DMC$ ו-

$$\begin{aligned}\tan \beta &= \frac{e}{b} \\ \tan \alpha &= \frac{f}{b} \\ \frac{e}{f} &= \frac{\tan \beta}{\tan \alpha} = \frac{1}{3} \\ \frac{d}{a} &= \frac{e}{f} = \frac{1}{3} \\ AB = d &= \frac{6.6}{3} = 2.2.\end{aligned}$$

סעיף ג

ממשפט פיתגורס $b = \sqrt{a^2 - f^2} = 5.32$

$$\tan \beta = \frac{e}{b} = \frac{1.3}{5.32} = 0.2444$$


$$\beta = 13.73$$

$$\tan \alpha = 3 \tan \beta = 0.7331$$

$$\alpha = 36.24$$

$$\angle DCB = \alpha + \beta = 49.97.$$

5.13 קייז תשע"ד מועד ב



במשולש ישר-זווית $\angle ACB = 90^\circ$ $\angle ACB$

נקודה G היא אמצע הnick של AC .

נקודה P נמצאת על GB כר' ש- $BG = 4 \cdot PG$ (ראה ציור).

רדיוס המעגל החוסם את המשולש CGB הוא R .

נתון: $GC = BC$

א. הבע באמצעות R את רדיוס המעגל


חוסם את המשולש ACB .

ב. הבע באמצעות R את מרחק הנקודה P

מרכזו המעגל החוסם את המשולש ACB .

מצאת שאלת זו קשה לחסית לשאלות אחריות בטריגונומטריה. אתן שתי הוכחות לסעיף ב.

נסמן M = מרכז המעגל החוסם את $\triangle CGB$ והרדיוס שלו, ו- M' = מרכז המעגל החוסם את $\triangle ACB$ והרדיוס שלו. שימו לב שבתרשים הנקודות M, M' נמצאות על הצלעות AB, GB , AB, AB נמצאות על הצלעות AB, CB . אבל אלו חייבים להוכיח את הטענה אם רצים להשתמש בה.



סעיף א

נשתמש בחוק הסינוסים ובמשפט פיתגורס, תחילת עבור


$$R = \frac{BG}{2 \sin 90^\circ} = \frac{BG}{2} = \frac{\sqrt{a^2 + a^2}}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}},$$

ואחר כך עבור

$$R' = \frac{AB}{2 \sin 90^\circ} = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{a^2 + (2a)^2}}{2} = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)a = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)\sqrt{2}R = \sqrt{\frac{5}{2}}R.$$

סעיף ב

$GM' \perp AC$, המריצ' המגע של החיתוך $\triangle ACB$ של האנכים האמצעיים M' ו- $CH = HB = \frac{a}{2}$. $M'H \perp BC$.



אם נמצא משולש שuberו נוכל לחשב שני צלעות והזווית הכלואה ביניהם, נוכל להשתמש בחוק הקוסינוסים. ננסה את $\triangle MPM'$. נסמן $CG \parallel MH$ ולכן לפי משפט 91 "משפט תאלס המורחב: ישר המקביל לאחית מצלעות המשולש חותך את שתי הצלעות האחרות או את המשכיהם בקטעים פרופורציוניים":

$$\frac{GC}{MH} = \frac{CB}{HB} = \frac{a}{a/2} = 2,$$

�- $MH = \frac{a}{2}$. אבל $GCHM'$ הוא מלבן, ולכן:

$$y = MM' = M'H - MH = GC - MH = a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2}R = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

שוב לפי משפט תאלס המורחב:

$$\frac{GB}{MB} = \frac{GC}{MH} = 2,$$

ובסוד, $PG = \frac{1}{4}(2x + 2x) = x$, $GB = 4 \cdot PG = 4x$. נתון $GM = MB$ שנסמנו. $\angle PG = \angle PM$. נסמן $z = PG$. $\angle CGB = \angle PM$. את x ניתן לחשב לפי משפט פיתגורס ב- $\triangle CGB$: $z^2 = x^2 + (2x)^2$

$$\begin{aligned} (4x)^2 &= a^2 + a^2 \\ x &= \frac{1}{\sqrt{8}}a = \frac{1}{\sqrt{8}} \cdot \sqrt{2}R = \frac{R}{2}. \end{aligned}$$

$\triangle MHB$ הוא משולש ישר-זווית, כך $\angle BMH = 45^\circ$ ו- $\angle PMM' = 45^\circ$ לפי זוויות קודקודיות. כעת יש לנו מספיק נתונים להשתמש בחוק הקוסינוסים. נסמן $z = PG$

$$\begin{aligned}
z^2 &= x^2 + y^2 - 2xy \cos \angle PMM' \\
&= \left(\frac{R}{2}\right)^2 + \left(\frac{R}{\sqrt{2}}\right)^2 - 2\left(\frac{R}{2}\right)\left(\frac{R}{\sqrt{2}}\right) \cos 45^\circ \\
&= R^2 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{R^2}{4} \\
z &= \frac{R}{2}.
\end{aligned}$$


* * *

פתרון אחר משמש ב證明 הקוסינוסים על $\triangle PM'B$, האנך האמצעי לצלע AC חותך את GM' ב- M' (בלי להסתמך על מרכז המעגל החסום את AB וכאן לפי משפט

תאלס (הרגיל)

$$\frac{AG}{GC} = \frac{AM'}{M'B},$$

ונסמן $y = AM' = M'B$



ולפי פיתגורס ב- $\triangle GCB$:

$$\begin{aligned}
(4x)^2 &= a^2 + a^2 \\
x &= \frac{1}{\sqrt{8}}a = \frac{1}{\sqrt{8}} \cdot \sqrt{2}R = \frac{R}{2}.
\end{aligned}$$

לפי פיתגורס ב- $\triangle ACB$

$$\begin{aligned}(2y)^2 &= (2a)^2 + a^2 \\ y &= \frac{\sqrt{5}}{2}a = \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \sqrt{2}R = \sqrt{\frac{5}{2}}R.\end{aligned}$$

נחשב את האזויות α, β :

$$\sin \alpha = \frac{a}{2y} = \frac{\sqrt{2}R}{2\sqrt{(5/2)R}} = \sqrt{\frac{1}{5}}$$

$$\alpha = 26.57$$


$$\beta = 180 - \angle AGB - \alpha = 180 - 135 - 26.57 = 18.43.$$

נשメתש בחוק הקוסינוסים ב- $\triangle PM'B$:

$$\begin{aligned}z^2 &= (3x)^2 + y^2 - 2 \cdot 3x \cdot y \cdot \cos \beta \\ &= \left(\frac{3R}{2}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{5}{2}}R\right)^2 - 2 \cdot \frac{3R}{2} \cdot \sqrt{\frac{5}{2}} \cdot 0.9487 \\ &= 0.25R^2 \\ z &= \frac{R}{2}.\end{aligned}$$

אני מעדיף את הפתרון הראשון. אמנם התרשים מעט יותר מסובך אבל החישובים הרבה יותר פשוטים.

5.14 קיז תשע"ד מועד א



במשולש שווה-שוקיים $(AB = AC)$ $\triangle ABC$

BM הוא תיכון לשוק (ראה ציור).

נתון: $\angle BAC = 50^\circ$.

א. חשב את גודל הזווית הקהה $\angle AMB$.

ממשיכים את BM עד הנקודה D .

נתון גם:

רדיוס המעגל החוסם את המשולש $\triangle ABC$ הוא 10 ס"מ.


רדיוס המעגל החוסם את המשולש $\triangle ABD$ הוא 14 ס"מ.

ב. חשב את זוויות המשולש $\triangle AMD$.

נסמן $\angle BAC = 50^\circ$ ו $\angle AMB = \alpha$. נתון $\angle AMB = 50^\circ$.

$$\angle ABC = \angle ACB = (180 - 50)/2 = 65^\circ.$$

נחשב $\angle ABM = 180 - 50 - \alpha = 130 - \alpha$



סעיף א

נחפש משולש שעליו אפשר להפעיל את חוק הסינוסים. נתון BM הוא תיכון ל- AC . נסמן את $\triangle ABM$ עם הנעלם a , ונפעיל את משפט הסינוסים על AB, AM

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{a/2}{\sin(130 - \alpha)}$$


$$\sin \alpha = 2 \sin(130 - \alpha)$$

$$= 2 \sin 130 \cos \alpha - 2 \sin \alpha \cos 130$$

$$\begin{aligned}
 &= 1.53 \cos \alpha + 1.29 \sin \alpha \\
 \tan \alpha &= \frac{-1.53}{0.29} \\
 \alpha &= -79.27^\circ = 100.73^\circ \approx 101^\circ.
 \end{aligned}$$

בالمשך נעבד עם קירובים למלחה שלמה.

סעיף ב




חישבנו $\angle AMD = 79^\circ$ בסעיף הקודם. נצטרכ' לחשב אחת מ- $\angle MAD$, $\angle ADM$, והזווית השלישית תתקבל מסכום הזוויות במשולש. מהתרשים אנו רואים שהצלע AB מול הזווית $\beta = \angle ADM$ הוא באורך a , ו- $\angle ADB$ הוא גם צלע מול $\angle AMB = 101^\circ$. לפי חוק הסינוסים ב- $\triangle ACB$, $\angle ACB = 65^\circ$.

$$\begin{aligned}
 2R_{ABC} &= \frac{a}{\sin 65^\circ} = 2 \cdot 10 \\
 a &= 18.126 \\
 2R_{ABD} &= \frac{a}{\sin \beta} = \frac{18.126}{\sin \beta} = 2 \cdot 14 \\
 \beta &= 40.34^\circ.
 \end{aligned}$$

הزوויות של $\triangle AMD$ הן (בקירוב למלחה שלמה) $79^\circ, 40^\circ, 61^\circ$.

5.15 חורף תשע"ד



במשולש ABC האנץ האמצעי לצלע BA חותך את הצלעות BC ו- BA בנקודות E ו- D בהתאמה (ראה ציור).

$$\text{נתון: } \angle ABC = \beta, \quad \angle BAC = \alpha$$

א. (1) הבע באמצעות α ו- β את $\angle EAC$.

$$\cdot \frac{CE}{EB} \quad \text{(2) הבע באמצעות } \alpha \text{ ו- } \beta \text{ את היחס}$$


נתון גם: $\angle BAC$ חוצה-זווית AE

$$\beta = 40^\circ, \quad AC = 10 \text{ ס"מ}$$

ב. חשב את הרדיוס של המרجل החסום במשולש ABC .

סעיף א

(1) נתון ש- DE הוא האנץ האמצעי ל- AB , ולכן $\triangle AED \cong \triangle BED$ לפי צ.ג.צ. נסמן את שאר הזוויות לפי זוויות משלימות וסכום זוויות המשולש, כאשר קיצרנו $\beta' = 90 - \beta$. התשובה היא $\angle EAC = \alpha - \beta$.




(2) נסמן $\angle BAC = \alpha = 90^\circ$. השאלה מבקשת את היחס $\frac{c}{b}$. מהתרשים נראה ש- $EC = c, BE = b, AE = b$, ונווכל להשתמש במשפט תאלס, אבל אי אפשר להסתמך על התרשומות מהתרשים. הראנו ש- $\triangle AEC \cong \triangle BED$

$$\begin{aligned} \frac{c}{\sin(\alpha - \beta)} &= \frac{b}{\sin(180 - (\alpha + \beta))} \\ \frac{c}{b} &= \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)}. \end{aligned}$$

סעיף ב

המשפט הרלונטי הוא 49 "שלושת חוצי הזוויות של משולש נחכמים בנקודה אחת, שהיא מרכז המרجل החסום במשולש". נתון חוצה זווית AE ב- A . נבנה חוצה זווית שני. ננסח ב- C כי ידוע $AC = 10$ ו諾ול להשתמש במשפט הסינוסים ב- $\triangle ACF$, כאשר F היא נקודת החיתוך עם חוצה הזוויות AE , ולכן היא המרכז של המרجل החסום.

נתון ש- $\beta = 40^\circ$ וזה מאפשר לנו להשלים זוויות בתרשימים:




לפי משפט הסינוסים:

$$\frac{x}{\sin 40^\circ} = \frac{10}{\sin 110^\circ}$$


$$x = 6.84.$$

לא לעזרך כאן! השאלה מבקשת את הרדיוס של המרجل החסום ולא המרחק אל מרכז המרجل.
נוריד אנך מ- F לצלע AC ולחשב: $r = x \sin 30^\circ = 3.42$
כדי להראות את המרجل החסום, צירתי תרשימים חדש עם ערכי זוויות מדוייקים:



5.16 חורף תשע"ד (שאלה 6)

בבחינה זו היו שלוש שאלות בפרק השני.




שני מעגלים, גדול וקטן, משיקים מפנים בנקודה A. נקודה F נמצאת על המעגל הגדל כך שقطع המרכזים של שני המעגלים נמצא על AF. חותך את המעגל הקטן בנקודה E. דרך נקודה B של המעגל הקטן העבירו ישר המקביל למשיק המשותף לשני המעגלים. המקביל חותך את המעגל הגדל בנקודה C (ראה ציור). רדיוס המעגל הגדל הוא R, ורדיוס המעגל הקטן הוא r. נתון: $\angle FAB = \beta$, $\angle BAC = \alpha$.


א. הבע באמצעות α ו- β את $\angle BCA$. נמק. (1)

ב. הבע רק באמצעות α ו- β את היחס $\frac{AC}{AB}$. (2)

ג. הבע באמצעות α ו- β את היחס $\frac{R}{r}$.



בפתרון השאלה נשתמש לעיתים קורבות בקשר בין סינוס לקוסינוס במשולש ישר זווית:



$$\sin \theta = \frac{a}{c} = \cos(90 - \theta)$$

$$\cos \theta = \frac{b}{c} = \sin(90 - \theta)$$

סעיף א

. $\angle BCA = \gamma = 90 - (\alpha + \beta)$ ולכן סכום האזויות החדשות שווה ל- 90° .
נפעיל את חוק הסינוסים על $\triangle DCA$ ווגם על $\triangle DBA$:

$$\frac{AB}{\sin 90^\circ} = \frac{AD}{\sin(90^\circ - \beta)}$$

$$AD = AB \cos \beta$$

$$\frac{AC}{\sin 90^\circ} = \frac{AD}{\sin \gamma}$$

$$AC = \frac{AB \cos \beta}{\sin(90^\circ - (\alpha + \beta))}$$


$$\frac{AC}{AB} = \frac{\cos \beta}{\cos(\alpha + \beta)}.$$

פתרון אחר מתקובל מהפעלת חוק שסינוסים פעם אחת על $\triangle ABC$

$$\begin{aligned} \frac{AC}{\sin(180^\circ - \alpha - \gamma)} &= \frac{AB}{\sin \gamma} \\ \frac{AC}{AB} &= \frac{\sin(\alpha + \gamma)}{\cos(\alpha + \beta)} \\ &= \frac{\sin(\alpha + 90^\circ - (\alpha + \beta))}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\cos \beta}{\cos(\alpha + \beta)} \end{aligned}$$

סעיף ב

סביר שנctrיך להשתמש בתוצאה של הסעיף הקודם, שכן נחפש קשר בין הקווים AB, AC לבין הרדיויסים. נחבר B ל- E ו- C ל- F . קיבל שני משולשים חסומים במעגלים וניתן להשתמש בנוסחה של חוק הסינוסים עם רדיוסים.



פתרון אחר: נתון ש- \overline{FA} הוא קוטר ("קטע המרכזים") של המעגל הגדול, ולכן \overline{EA} הוא קוטר של המעגל הקטן. זווית הנשענת על קוטר היא זווית ישרה, כך ש- $\triangle ACF$, $\triangle ABE$, $\triangle ACB$ הם ישר זווית, וניתן פשוט להשאמש בהגדרת הfonקציות הטריגונומטריות:

$$\begin{aligned}
 \cos \beta &= \frac{AB}{2r} \\
 \cos(\alpha + \beta) &= \frac{AC}{2R} \\
 \frac{R}{r} &= \frac{AC}{2\cos(\alpha + \beta)} \cdot \frac{2\cos \beta}{AB} \\
 &= \frac{\cos^2 \beta}{\cos^2(\alpha + \beta)}.
 \end{aligned}$$

המלצות: טריגונומטריה

- ראו נספח ג' המסביר את החשיבות של מעגל היחידה בחישובים טריגונומטריים.
- הנספח מציג איך לשזר בקלות את הנוסחאות $\sin(90^\circ - \theta)$, $\sin(180^\circ - \theta)$, $\sin(\theta - 2\theta)$ ונוסאות דומות עבור קיסינוס.
- חשוב לציר תרשימים **ברורים** ו**גודולים** עדיף עם סרגל ומחוגה. בתהליך הפתרוןanno מסמנים את המידע המתבר על האזויות והצלעות ויש לדאוג שהיה מספיק מקום.
- כאשר לשאלת יש מספר סעיפים כדי לציר תרשימים נפרדים לכל סעיף תוך העلمת מידע לא רלוונטי לאותו סעיף.
- אני מעדיף לסמן זווית עםאותיות יווניות כגון α , ולא על ידי ציון שלושת הנקודות המגדירות אותה ABC , כי קשה יותר לעקוב אחר הנקודות המגדירות את האזווית.
- השלימו זווית ככל האפשר תוך שימוש בסכום האזויות במשולש, ובזווית משילמות. כדי להקל על החישובים אני משתמש בנעלמים נוספים כדי לקצר ביטויים, למשל, $(\alpha + \beta) - 180 = \gamma$.
- שימושו לב שאין עיקיות בסימונו A, B, C, D של הקודקודים של משולש או מרובע.
- בשאלות על טריגונומטריה בדרך כלל עדיף להשתמש בנוסחה לשטח משולש:

$$S = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin \alpha,$$


ולא בחישוב של מחצית מכפלת הבסיס והגובה.

- עבור מעגל חסום, המשפט הרלונטי הוא 54 "במשולש, שלושת האנכים האמצעיים נחתכים בנקודה אחת, שהיא מרכז המעגל החסום את המשולש". ניתן בקלות למצוא את רדיוס המעגל מחוק הסינוסים:
$$2R = \frac{a}{\sin \alpha}.$$
- עבור מעגל חסום, המשפט הרלונטי הוא 49 "שלושת חוצי האזויות של משולש נחתכים בנקודה אחת, שהיא מרכז המעגל החסום במשולש". אין נוסחה עבור רדיוס המעגל אבל אפשר למצוא אותו כארוך הגובה מהמרכז לאחד הצלעות.
- טרפזים מאד אהובים על ידי כותבי הבחינות. שננו משפטיים 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל-180" ו-57 "מרובע קמור חסום מעגל אם ורק אם סכום שתי צלעות נגדיות שווה לסכום שתי הצלעות הנגדיות האחרות".
- שימושו לב שהמרכז המעגל החסום לא חופף את מרכז המעגל החסום אלא במקרים מיוחדים כגון משולש שווה-צלעות וריבוע.
- לעיתים קרובות התשובה לשאלת תהיה ערך ממשי לאזווית או אורך. אני מעדיף להישאר עם נעלמים כל עוד הדבר אפשרי ורק בסוף להשתמש במחשבון כדי לחשב ערכיים.

פרק 6 חדו"א שאלה 6

6.1 קיז תשע"ח מועד ב

לפניך הגרפים של הפונקציות $(x)f'$ ו- $(x)f''$ (פונקציית הנגזרת הראשונה ופונקציית הנגזרת השנייה של הפונקציה $(x)f$) בתחום $x \leq 2.5$. שני הגרפים עוברים בראשית הצירים.



- א. התאמות בין הגרפים I ו- II ובין הפונקציות $(x)f'$ ו- $(x)f''$. נמק.
 ב. (1) כמה נקודות קיצון פנימיות יש לפונקציה $(x)f$ בתחום המתוואר בגרף? נמק את תשובתך.
 (2) כמה נקודות פיתוי יש לפונקציה $(x)f$ בתחום המתוואר בגרף? נמק את תשובתך.
 ג. עבור איזה ערך של x בתחום $\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{6}$ – שיפוע המשיק לגרף פונקציית הנגזרת, $(x)f'$, הוא מינימלי?
 נתון: $(x)f$ היא פונקציה איזומטרית.
 ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $(x)f$.

- נתון: ערך הפונקציה $(x)f$ בנקודת המקסימום שלה הוא t .
 ה. הביע באמצעות t את השטח המוגבל על ידי גרף II ועל ידי חלקו השילי של ציר ה- x (השטח המוקווקו בציור).
 ו. נתון: קבועים a , b ו- c ממשיים כך ש- c
 $f(x) = ax^5 + bx^3 + c$.
 מצא את c ואת היחס $\frac{a}{b}$.

סעיף א

נקודות הקיצון של $(x)f'$ הן הנקודות בהן $0 = f''(x)$. לגרף II נקודות קיצון ב- $0, \pm\sqrt{3}$ ובנקודות הללו הגרף I חותך את ציר ה- x . לכן, II הוא הגרף של $(x)f'$ ו- I הוא הגרף של $(x)f''$.

סעיף ב

- (1) הגרף II מתאפס ב- $0, \pm\sqrt{6}$, אבל ב- 0 הוא לא מחליף סימן ולכן לא נקודת קיצון.
 (2) הנגזרת השנייה מתאפשרת בשלוש נקודות $0, \pm\sqrt{6}$. בכל שלושת הנקודות הנגזרת הראשונה לא מחליפה סימן, ולכן כולן נקודות פיתוי ולא נקודות קיצון.

סעיף ג


הנגזרת השנייה היא שיפוע המשיק לנגזרת הראשונה. בתחום הנitinן הערך המינימלי מתקובל ב-1.

סעיף ד

נתון שהפונקציה אי-זוגית אז $f(0) = 0$.

$f(0) = f(-0) = -f(0) = 0$. אם $f(x)$ אי-זוגית, $a = 0$.

בין 0 ל- $\sqrt{3}$ הנגזרת הראשונה, השיפוע, שלילית (גרף II), ולכן מאפס לערכים שליליים. בסעיף ב חישבנו שיש שתי נקודות פיטול נוספת בסביבת $x = \pm\sqrt{6} \approx \pm 2.45$. נתון שהפונקציה אי-זוגית כך שאפשר לקבל את הערכים עבור $x < 0$ על ידי סימטריה סביב ציר ה- y . הגרף נראה כך:

**סעיף ה**

מהגרף רואים שהגבולות הם $0, -\sqrt{6}, 0, \sqrt{6}$, אבל כדי לנמק. מצאנו בסעיף ב $f'(0) = 0$, ובסעיף ד רأינו $f'(0) = 0$, כך שציר ה- x תוחם את השטח. האינטגרל הוא:

$$\int_{-\sqrt{6}}^0 0 - f'(x) dx = -f(x) \Big|_{-\sqrt{6}}^0 = -(-f(-\sqrt{6})) = t,$$

כי נקודת המקסימום של $f(x)$ היא ב- $-\sqrt{6}$.

סעיף ו

לפי $0, f(0) = 0$.

הנגזרת הראשונה מתאפסת ב- $\pm\sqrt{6}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5ax^4 + 3bx^2 \\ &= 5a(\pm\sqrt{6})^4 + 3b(\pm\sqrt{6})^2 \\ &= 5a(\pm\sqrt{6})^2 + 3b = 0 \\ \frac{a}{b} &= -\frac{1}{10}. \end{aligned}$$

6.2 קיז תשע"ח מועד א

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{ax - 1}{\sqrt{ax^2 - 2x + 1}}$. a הוא פרמטר.

נתון: הפונקציה $f(x)$ מוגדרת לכל x .

א. הוכח: $a > 1$.

עננה על סעיף ב. אם יש צורך, הביע באמצעות a .

ב. (1) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גраф הפונקציה $(x)f$ עם הצירים.

(2) כתוב את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $(x)f$ המקבילות לציר ה- x .

(3) מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה $(x)f$ (אם יש כאלה).

(4) סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $(x)f$.

נתון: $a = 3$.

ג. חשב את השטח המוגבל על ידי גраф הפונקציה $(x)f$, על ידי ציר ה- x , ועל ידי הישרים $x = 2$ ו- $x = \frac{2}{3}$.

ד. (x) g היא פונקציה רציפה המוגדרת לכל x .

נסמן ב- S את השטח המוגבל על ידי גраф הפונקציה $(x)f$, על ידי ציר ה- x ועל ידי הישרים $x = b$ ו- $x = \frac{1}{3}$.

נתון: השטח המוגבל על ידי גраф הפונקציה $(x)f$, על ידי גраф הפונקציה $(x)g$ ועל ידי הישרים $x = b$ ו- $x = \frac{1}{3}$ שווה ל- $2S$ בעבר כל b .

הבע את $(x)g$ באמצעות $(x)f$ בתחום $x < b$ (כתבו את שתי האפשרויות). אין צורך להוכיח את תשובתך.

סעיף א

נתון שהפונקציה מוגדרת לכל x , ולכן הפולינום במכנה לא יהיה שורשים, כלומר, $x^2 - 0 < 0$
 $-4a < 0 < 4 - 4a$, ולכן $1 < a < 4$. כמו כן, אסור של פולינום יהיה ערכים שליליים כדי שהשורש יהיה מוגדר. לפולינום יש לפחות ערך חיובי אחד, למשל, $x = \frac{1}{2} > 0$. אם הפולינום לא יכול לקבל ערך אפס, אין נקודות חיתוך עם ציר ה- x ולא יהיה ערכים שליליים.

סעיף ב

(1) $f(0) = \frac{-1}{\sqrt{1}} = -1$ ונקודת החיתוך עם ציר ה- y היא $(0, -1)$. המכנה חיובי כך שנקודת החיתוך עם ציר ה- x מתקבלת מ- $0 = ax - 1$, והנקודה היא $(\frac{1}{a}, 0)$.

עבור $x \rightarrow +\infty$: (2)

$$\frac{\left(a - \frac{1}{x}\right)}{+\sqrt{a - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{a}{\sqrt{a}} = \sqrt{a}.$$

עבור $x \rightarrow -\infty$:

$$\frac{\left(a - \frac{1}{x}\right)}{-\sqrt{a - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\frac{a}{\sqrt{a}} = -\sqrt{a}.$$


(3) נחשב את הנגזרת הראשונה:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{a\sqrt{ax^2 - 2x + 1} - (ax - 1) \cdot \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{ax^2 - 2x + 1})^{-\frac{1}{2}} (2ax - 2)}{(\sqrt{ax^2 - 2x + 1})^2} \\ &= \frac{a(ax^2 - 2x + 1) - (ax - 1)(ax - 1)}{(\sqrt{ax^2 - 2x + 1})^2 \sqrt{ax^2 - 2x + 1}}. \end{aligned}$$

המכנה חיובי ולכן סימן הנגזרת תלוי בסימן המונה:

$$a^2x^2 - 2ax + a - a^2x^2 + 2ax - 1 = a - 1.$$

הוכחנו ש- $a - 1 > 0$ ולכן $a - 1 > 0$ והפונקציה תמיד עולה.



סעיף ג

ולכן גבולות האינטגרל הם בחלוקת החיווי של הפונקציה.

$$\begin{aligned} \int_{2/3}^2 \frac{3x - 1}{\sqrt{3x^2 - 2x + 1}} &= \int_{2/3}^2 \frac{2}{2} \left(\sqrt{3x^2 - 2x + 1} \right)' \\ &= \sqrt{3x^2 - 2x + 1} \Big|_{2/3}^2 \\ &= \sqrt{12 - 4 + 1} - \sqrt{\frac{4}{3} - \frac{4}{3} + 1} = 3 - 1 = 2. \end{aligned}$$

סעיף ד

נתו ש- $\frac{1}{3} < b$ כך שבגבולות האינטגרלים בתחום החיווי של הפונקציות. שתי האפשרויות הן $f(x) \geq g(x)$ ו- $g(x) \geq f(x)$.

$$\int (g - f) = \int g - \int f = \int g - S = 2S,$$

ולכן $\int g = 3S$.

$$\int (f - g) = \int f - \int g = S - \int g = 2S,$$

ולכן $\int f = -S$.

6.3 חורף תשע"ח

נתונות הפונקציות $g(x) = \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}}$, $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}}$

ענה על סעיף א' עבור התחום $\pi < x \leq \frac{\pi}{2}$

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$. (1)

ב. מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$, המאונכות לציר ה- x . (2)

ג. מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה). (3)

ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$. (4)

ענה גם על סעיף ב' עבור התחום $\pi \leq x \leq -\frac{\pi}{2}$.

ב'. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$. (1)

ג'. הוכח: $g(x) = -f\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ (2)


ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$. (3)

תוכל להיעזר בתשובהתיק על הסעיפים הקודמים.

ג'. מצא את ערך הביטוי $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$. נמק את תשובתך.

הקשת העבה מראה את התחום והקוים מראים איך מתקיים $x - \frac{\pi}{2} < 0$ עבור $x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$

$$\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} - \frac{3\pi}{6} = -\frac{2\pi}{6} = -\frac{\pi}{3}, \quad \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6} - \frac{3\pi}{6} = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}.$$



סעיף א'

$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ מוגדרת אם $\cos x > 0$, אם x מימין לציר ה- x . תחום ההגדרה הוא $f(x)$ (1)


(2)

$$\frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}} \xrightarrow{+\frac{\pi}{2}} \frac{+1}{0} = +\infty, \quad \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}} \xrightarrow{-\frac{\pi}{2}} \frac{-1}{0} = -\infty.$$

(3)

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{\cos x \sqrt{\cos x} - \sin x \cdot \frac{1}{2}(\sqrt{\cos x})^{-\frac{1}{2}} \cdot (-\sin x)}{\cos x} \\
&= \frac{2\cos^2 x + \sin^2 x}{2\cos x \sqrt{\cos x}} \\
&= \frac{\cos^2 x + 1}{2\cos x \sqrt{\cos x}}.
\end{aligned}$$

בתחום ההגדרה $\cos x > 0$ ולכן הנגזרת הראשונה תמיד חיובית והפונקציה עולה בכל התחום. שימושו לב שאמ nagzrat tamid chiyobit, heia la matapsat b'tachom ck shein nukodot kitzon penimiot. ביחד עם חישוב האסימפטוטות, ניתן לצייר את גרף הפונקציה:



סעיף ב

- (1) הפונקציה מוגדרת אם $\sin x > 0$: אם y מעלה לציר ה- x . תחום ההגדרה הוא $0 < x < \pi$.
- (2) חיבור או חיסור של $\frac{\pi}{2}$ משנה סינוס לקוסינוס ולהיפך. צריך רק לקבוע את הסימנים (ראו תרשימים לפני סעיף א).


$$f\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}{\sqrt{\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}} = \frac{-\cos x}{\sqrt{\sin x}} = -g(x).$$

אפשר גם לחשב לפי הנוסחה לחיסור של סינוס וкосינוס:

$$\begin{aligned}
\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) &= \sin x \cos \frac{\pi}{2} - \cos x \sin \frac{\pi}{2} = -\cos x \\
\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) &= \cos x \cos \frac{\pi}{2} + \sin x \sin \frac{\pi}{2} = \sin x.
\end{aligned}$$

(3) הגרף של $g(x)$ מתקבל מהזהה ימינה של $\frac{\pi}{2}$ והפיכת הסימן. למשל:

$$g\left(\frac{\pi}{4}\right) = -f\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2}\right) = -f\left(-\frac{\pi}{4}\right).$$



סעיף ג

התרומה של החלק שלילי של הפונקציה לאינטגרל שווה לתרומה של החלק החיובי שלו, ולכן האינטגרל מתאפס.

מי שלא משתמש מהטייעון יכול לחשב.

$$(\sqrt{\cos x})' = \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{\cos x})^{-\frac{1}{2}} \cdot (-\sin x) = -\frac{1}{2} \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}},$$

ולכן:

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}} = -2\sqrt{\cos x} \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = -2\left(\sqrt{\sqrt{2}/2}\right) - (-2)\left(\sqrt{\sqrt{2}/2}\right) = 0.$$

6.4 קיז תשע"ז מועד ב

נתונה הפונקציה $f(x) = a - \frac{2}{x-2} + \frac{1}{(x-2)^2}$. a הוא פרמטר.

עננה על סעיף א. הביע את תשובותיך באמצעות a במידה הצורך.

- א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $(x)f$.
 - (2) מצא את המשוואות של האסימפטוטות המאונכות לצירים.
 - (3) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $(x)f$ (אם יש כאלה), וקבע את סוגן.
 - (4) מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה $(x)f$.
- נתון כי גраф הפונקציה $(x)f$ משיק לציר x .
- ב. מצא את a .
- הצב את הערך של a שמצאת ועננה על הסעיפים ג-ד.
- ג. סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $(x)f$.
 - ד. נתונה הפונקציה $g(x) = |f(x) + k|$.
- ידעו שהגרף הפונקציה $(x)g$ משיק לאסימפטוטה האופקית של גраф הפונקציה $(x)f$.
- מצא את k (מציא את שתי האפשרויות). נמק את תשובתך.

סעיף א

(1) תחום ההגדרה הוא $2 \neq x \Rightarrow x = 2$ כי $x = 2$ מאיpas את המכנה של שני גורמים.

(2) כאשר $\infty \pm \rightarrow x$ שני גורמים שוואים לאפס, ולכן האסימפטוטה האופקית היא $y = a$.

כאשר $2 \pm \rightarrow x$ שני גורמים שוואים לאינסוף, ולכן האסימפטוטה האנכית היא $x = 2$.

נבדוק את סימן הפונקציה השואפת לאינסוף. כאשר $2 \rightarrow x$, $\frac{1}{(x-2)^2} \gg \frac{2}{x-2}$, $y \rightarrow +\infty$ גם מימין וגם משמאל.

$$(3) f'(x) = -\frac{2 \cdot -1}{(x-2)^2} + \frac{-2}{(x-2)^3} = 0.$$

הפונקציה לא מוגדרת ב- $x = 2$, כך שאפשר להכפיל את המשווהה ב- $(x-2)^3$. קיבל $2(x-2) = 2$.

ונקודת הקיצון היא $(3, a-1)$.

על ידי הכפלה ב- $(x-2)^2$ ($x-2$) הנגזרת הראשונה היא:

$$f'(x) = \frac{2(x-2)^2 - 2(x-2)}{(x-2)^4} = \frac{2x^2 - 10x + 12}{(x-2)^4}.$$

המכנה חיובי ולכן הסימן של הנזורת השנייה הוא סימן נזורת המונה $4x - 10$. ב- $x = 3$, הסימן חיובי והנקודות הקיצון היא מינימום.

דרך אחרת לבדוק אם מדובר במינימום או מקסימום היא באמצעות טבלת עליות וירידות:

x	0	2	2.5	3	4
$f'(x)$	0.75	\times	-0.8	0	0.25
$f(x)$	\nearrow	\times	\searrow	$a - 1$	\nearrow

הנקודה $(3, a - 1)$ היא מינימום.


(4) הפתרון מופיע בטבלה בתת-סעיף הקודם.

סעיף ב

נתון שערכה של $f(x)$ בנקודת המינימום הוא אפס. $a = 1$ ו- $f(3) = a - 1 = 0$.

סעיף ג

לפי טבלת העליות והירידות, הפונקציה עולה עד לאסימפטוטה האנכית, אח"כ יורדת לנקודת המינימום ואח"כ עולה.



(4) האסימפטוטה האופקית היא $y = a = 1$ ונקודת המינימום היא $(3, a - 1) = (3, 0)$.

$$\begin{aligned} g(3) &= |f(3) + k| = a = 1 \\ |0 + k| &= 1 \\ k &= \pm 1. \end{aligned}$$

6.5 קיז תשע"ז מועד א

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x-5}{\sqrt{x^2 - 10x + 24}}$.

- . (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
- (2) מצא את נקודות החיתוך של גраф הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).
- (3) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.
- (4) מצא את את תחומי העליה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).
- (5) סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = f(x+5)$ המקיים:

ב. (1) הוכח ש- $g(x)$ היא פונקציה אי-זוגית.

(2) סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $g(x)$.

ג. הסבר מדוע לכל $b < a < 1$ מתקיים השוויון: $\int_a^b g(x) dx = \int_{a+5}^{b+5} f(x) dx$

סעיף א

(1) הפונקציה מוגדרת אם המכנה שונה מאפס ואם הביטוי בשורש גדול או שווה לאפס:

$$\begin{aligned} x^2 - 10x + 24 &> 0 \\ (x-4)(x-6) &> 0. \end{aligned}$$

המכפלה חיובית רק אם שני הגורמים גדולים מאפס או שניהם קטנים מאפס. אבל אם $x > 6$ או גם $x < 4$, ורק הפונקציה מוגדרת כאשר:

$$x < 4 \quad \text{או} \quad x > 6.$$

(2) אם המכנה חיובי והמונה $0 = 5 - x$. אבל 5 לא בתחום ההגדרה כך שאין נקודות חיתוך עם ציר ה- x . נחשב את נקודת החיתוך $(0, y)$ עם ציר ה- y :

$$y = f(0) = \frac{0-5}{\sqrt{0^2 - 10 \cdot 0 + 24}} = \frac{-5}{\sqrt{24}}.$$

(3) כאשר $x \rightarrow 6^+$ המונה שואף ל $+1$, ובמכנה שורש חיובי שהולך וקטן, ולכן $\infty \rightarrow +\infty$. אבל $x = 6$ היא אסימפטוטה אנכית אחת. באופן דומה, כאשר $x \rightarrow 4^-$, $f(x) \rightarrow -\infty$, ו- $x = 4$ היא אסימפטוטה אנכית שנייה.

כאשר $x \rightarrow +\infty$ המנה שואף ל $+\infty$, ובמכנה $x^2 \gg -10x + 24$, וערך שואף ל $+\infty$. לכן $y = 1$ היא אסימפטוטה אופקית אחת. באופן דומה, כאשר $x \rightarrow -\infty$, $y \rightarrow -1$ היא אסימפטוטה אופקית שנייה.


(4) אי-אפשר מייד להכין טבלה של עליות וירידות, כי אין לנו ידועים אם יש נקודות קיצון בתחום ההגדרה של הפונקציה.צעד ראשון נבדוק את ערכו של $f(x)'$. לשם קיצור נסמן $u = x^2 - 10x + 24$:

$$\frac{1 \cdot \sqrt{u} - (x-5) \cdot \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}} \cdot (2x-10)}{u} = \frac{u - (x-5)(x-5)}{u\sqrt{u}}.$$

נמצא בתחום ההגדרה גם \sqrt{u} חיובי, ולכן הסימן או נקודת האיפוס של הנגזרת תלוי רק במונה:

$$u - (x-5)(x-5) = x^2 - 10x + 24 - x^2 + 10x - 25 = -1.$$

בתחום ההגדרה, הנגזרת שלילית (ולא מתאפסת), ולכן הפונקציה יורדת בכל תחום ההגדרה.



סעיף ב

(1) פתרון אחד הוא לחשב את $g(-x)$ ולהראות ש-


$$\begin{aligned} g(-x) &= f(-x+5) = f(5-x) \\ &= \frac{5-x-5}{\sqrt{(5-x)^2 - 10(5-x) + 24}} \\ &= \frac{-x}{\sqrt{25 - 10x + x^2 - 50 + 10x + 24}} \\ &= \frac{-x}{\sqrt{x^2 - 1}}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= f(x+5) \\ &= \frac{x+5-5}{\sqrt{(x+5)^2 - 10(x+5) + 24}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 10x + 25 - 10x - 50 + 24}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = -\left(\frac{-x}{\sqrt{x^2 - 1}}\right) = -g(-x). \end{aligned}$$

פתרונות מעט יותר מסובך הוא להראות ישירה:

$$\begin{aligned}
 g(-x) &= f(-x+5) = f(5-x) \\
 &= \frac{5-x-5}{\sqrt{(5-x)^2 - 10(5-x) + 24}} \\
 &= \frac{-x}{\sqrt{25 - 10x + x^2 - 50 + 10x + 24}} \\
 &= \frac{-x}{\sqrt{(x^2 + 10x + 25) - (10x + 50) + 24}} \\
 &= \frac{-(x+5)-5}{\sqrt{(x+5)^2 - 10(x+5) + 24}} \\
 &= -g(x).
 \end{aligned}$$

(2) הgraf הוא אותו graf מוז שמאלה חמיש יחידות:



סעיף ג

נתון ש- $b < 1 < a$, וכפי שניתן לראות מהgraf, a, b הם בתחום ההגדרה של g . נחשב:

$$\int_a^b g(x) dx = \int_a^b f(x+5) dx = \int_{a+5}^{b+5} f(x) dx.$$

6.6 חורף תשע"ז

$$f(x) = \frac{ax^2 + 4x}{x^2 + 3x + b} \quad \text{נתונה הפונקציה}$$

א. ו. b הם פרמטרים.

נתון: $x = 1, y = 1$, הן אסימפטוטות של הפונקציה.

א. מצא את a ואת b .

ב. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) מצא את נקודות החיתוך של גרען הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

(3) האם יש לפונקציה אסימפטוטות נוספות המאונכות לצירים

(מלבד $1 = x \text{ ו- } y = 1$) ? הסבר.

(4) מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

ג. סרטט סקיצה של גרען הפונקציה.

ד. עברו אליו ערכי x מתקיים: $|f(x)| = -f(x)$? נמק.

ה. נגיד $(x, f'(x)) \cdot g(x) = f^2(x)$.

הראה כי השטח המוגבל על ידי ציר ה- x , על ידי גרען הפונקציה ($x = 0$)

ועל ידי הישר $x = 0.5$ הוא $\frac{1}{3}$. נמק את תשובתך.

סעיף א

נקבל את האסימפטוטה אנכית $x = 1$ כאשר המכנה מתאפס:

$$\begin{aligned} x^2 + 3x + b &= 0 \\ 1^2 + 3 \cdot 1 + b &= 0 \\ b &= -4. \end{aligned}$$

נחשב את האסימפטוטה האופקית $y = 1$. כאשר $x \rightarrow \infty$.

$$\frac{a + \frac{4}{x}}{1 + \frac{3}{x} - \frac{4}{x^2}} \rightarrow 1,$$

סעיף ב

(1) המכנה מתאפס כאשר:

$$x^2 + 3x - 4 = (x + 4)(x - 1) = 0,$$

ולכן הפונקציה מוגדרת עבור כל x פרט ל- -4 .

(2) נציב $x = 0$. המונה מתאפס והמכנה לא מתאפס ולכן נקודת החיתוך עם ציר ה- y היא $(0, 0)$.

נציב $y = 0$ ונקבל $0 = x^2 + 4x = x(x + 4)$. ($0, 0$) היא נקודת חיתוך עם שני הצירים. ב- $x = -4$ הפונקציה לא מוגדרת, ולכן אין עוד נקודת חיתוך עם ציר ה- x .

(3) אין עוד אסימפטוטה אופקיות כי לפי החישוב בסעיף א, ה-אסימפטוטה היא $\frac{a}{1}$ שיש לה רק פתרון אחד כי a הוא קבוע.

אסימפטוטה אנכית יש כאשר $x^2 + 3x - 4 = (x+4)(x-1) = 0$. אבל $x = -4$ גם מאייפס את המוניה. נצמצם את הפונקציה:

$$\frac{x^2 + 4x}{x^2 + 3x - 4} = \frac{x(x+4)}{(x+4)(x-1)} = \frac{x}{x-1}.$$

כאשר $x \rightarrow -\infty$ (בשני הכוונים), ערך הפונקציה שואפת ל- $-\frac{4}{5}$, ולכן אין כאן אסימפטוטה אלא חור.


(4) נחשב את הנגזרת הראשונה, כאשר נתיחס רק למוניה כי המכנה הוא ריבוע שטमיד חיובי פרט לנקודות של החור והאסימפטוטה:

$$(x^2 + 4x)'(x^2 + 3x - 4) - (x^2 + 4x)(x^2 + 3x - 4)' = -(x+4)^2.$$

(לא רשמיית את כל החישובים הארכיים). ערך זה לא מתאפס ותמיד שלילי, ולכן הפונקציה יורדת בכל תחום ההגדרה שלו.

אפשר לומר אם נצמצם את הפונקציה לפי שנחשב את הנגזרת. -1 , שטמיד שלילי.

סעיף ג



סעיף ד

אם נתיחס לגרף, $|f(x)|$ מעביר ערכים מתחת לציר ה- x לערכים מעל לציר, ו- $-f(x)$ – מעביר את כל הערכים לצד השני של ציר ה- x . רק עבור ערכים מתחת לציר ה- x כי רק עבור ערכים אלה מתבצעת אותה פעולה. עבור פונקציה זו הערכים הם $0 \leq x < 1$.

סעיף ה

מסעיף ב $f'(x)$ תמיד שלילי ולכן $g(x) = f(x)^2 \cdot f'(x)^2$ תמיד שלילי או אפס. ראיינו גם ש- $0 = f(0)$, ולכן השטח שיש לחשב נמצא מתחת לציר ה- x ומימין לציר ה- y . נשים לב ש- $(f^3(x))' = 3f^2(x) \cdot f'(x)$ וنוכל לחשב את האינטגרל:

$$\int_0^{0.5} 0 - f^2(x) \cdot f'(x) = -\frac{1}{3} f^3(x) \Big|_0^{0.5} = -\frac{1}{3} f^3(0.5) = -\frac{1}{3} \cdot -1 = \frac{1}{3}.$$

6.7 קיז תשע"ו מועד ב

$$f(x) = \frac{2\cos^2 x - 1}{2\cos^2 x} \quad \text{נתונה הפונקציה:}$$

א. בתחום $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לציר x (אם יש כאלה).

(3) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר x (אם יש כאלה).

(4) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה),

וקבע את סוגן.

ב. בתחום $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

(1) הראה שפונקציה $f(x)$ היא זוגית.

(2) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ג. מצא את השטח בריבוע הראשון המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$,

על ידי ציר x ועל ידי ציר y .

סעיף א

(1) הפונקציה לא מוגדרת כאשר המכנה מתאפס. $\cos^2 x = 0$ בתחום כאשר $x = \frac{\pi}{2}$, ולכן תחום ההגדרה הוא $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$.

(2) כאשר $x = \frac{\pi}{2}$, המכנה שווה לאפס אבל המונה שווה לערך שונה מאפס -1 , ולכן היא אסימפטוטה אנכית.

(3) בתחום ההגדרה המכנה לא מפאס, ולכן נקודות החיתוך הן הנקודות עבורן המונה מתאפס:

$$\begin{aligned} 2\cos^2 x &= 1 \\ \cos x &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

בתחום ההגדרה יש רק פתרון אחד ונקודת הקיצון הוא $(\frac{\pi}{4}, 0)$.

(4) בתחום ההגדרה $\cos x > 0$ ולכן $f(x) = 1 - \frac{1}{2\cos^2 x}$. חישוב הנגזרת הוא:

$$f'(x) = \left(1 - \frac{1}{\cos^2 x}\right)' = -(-2\cos x \cdot -\sin x) = -2\cos x \sin x = 0.$$

(5) מתאפס בתחום ההגדרה כאשר $x = 0$ ונקודת הקיצון היא $(0, 1)$. סינוס וקוסינוס חיוביים בתחום, ולכן הנגזרת שלילית והפונקציה יורדת בכל התחום. נקודת הקיצון היא מקסימום.

אפשרות אחרת היא לחשב את הנגזרת השנייה:


$$f''(x) = (-2\cos x \sin x)' = -2(-\sin^2 x + \cos^2 x).$$

בנקודת הקיצון $x = 0$, $f''(0) = -2 \cdot (-0 + 1) = -2$, כלומר מקסימום.

סעיף ב

$$\cos^2(-x) = \cos^2 x, \cos(-x) = \cos x \quad (1)$$

(2) המקסימום הוא ב- $(0, \frac{1}{2})$, הfonקציה יורדת בתחום ההגדרה $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$, יש אסימפטוטה אנכית ב- $\frac{\pi}{2}$, והfonקציה זוגית. התרשים שמתאים הוא:



סעיף ג

הנוסחה $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ אמנם מופיעה בנוסחאות אבל לא מרבים להשתמש בה, כך שהשאלה עלולה להיות קשה.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2 \cos^2 x - 1}{2 \cos^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2 \cos^2 x} dx \\ &= x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{1}{2} \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\pi}{4} - 0 - \frac{1}{2} \tan \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \tan 0 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

6.8 **קייז תשע"ו מועד א**

. $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0$ בתחום $f(x) = x^2 - \sin(2x)$ נתונה הפונקציה

ענה על הסעיפים שלפניך עבור התחום הנתון.

- . א. מצא את השיפוע הגדול ביותר ואת השיפוע הקטן ביותר של גוף הפונקציה $(x) f$.

. ב. סרטט סקיצה של גוף פונקציית הנגזרת $(x) f'$.

. ג. (1) מצא את תחומי הקוויות כלפי מעלה U ו כלפי מטה U של גוף הפונקציה $(x) f$.
 . (2) סרטט סקיצה של גוף הפונקציה $(x) f$.

אני ממש לא אוחב את השאלה כי היא מחייבת חישובים רבים עם מחשבון!


סעיף א

נתחיל עם חישוב הנגזרות:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^2 - \sin 2x \\f'(x) &= 2x - 2 \cos 2x \\f''(x) &= 2 + 4 \sin 2x.\end{aligned}$$

השאלה מבקשת את נקודות הקיצון של הנזרת הראשונה ונקבל אותם על ידי חישוב נקודות ב**הנזרת השניה** מתאפסת:

$$\begin{aligned} 2 + 4 \sin 2x &= 0 \\ \sin 2x &= -\frac{1}{2} \\ 2x &= -\frac{\pi}{6} \\ x &= -\frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$



בתחום כי $\frac{\pi}{2} < -\frac{5\pi}{6} < -\frac{\pi}{2}$, אבל $\frac{1}{2} \cdot -\frac{5\pi}{6} = -\frac{5\pi}{12} > -\frac{5\pi}{6}$. לכן הינה נקודת קיצון של הנגזרת הראשוֹן.

כדי לבדוק אם הנקודות הקיצון הן מינימום או מקסימום, נחשב את **הנגזרת השנייה** של הנגזרת הראשונה שהיא הנגזרת השלישייה של הפונקציה.

$$f''(x) = 2 + 4 \sin 2x$$

$$f'''(x) = 8 \cos 2x$$

$$f'''(-\frac{\pi}{12}) = 8 \cos\left(-2 \cdot \frac{\pi}{12}\right) = 6.93 > 0$$


$$f'''(-\frac{5\pi}{12}) = 8 \cos\left(-2 \cdot \frac{5\pi}{12}\right) = -6.93 < 0.$$

מכאן שהSHIPוע הגדול ביותר נמצא ב- $x = -\frac{5\pi}{12}$, והSHIPוע הקטן ביותר נמצא ב- $x = -\frac{\pi}{12}$. שימו לב שהשאלה מבקשת את ערכי הקיצון של **הSHIPועים** ולא רק איפה הם נמצאים:

$$f'(-\frac{5\pi}{12}) = 2 \cdot -\frac{5\pi}{12} - 2 \cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -2.62 + 1.73 = -0.89$$

$$f'(-\frac{\pi}{12}) = 2 \cdot -\frac{\pi}{12} - 2 \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -0.52 - 1.73 = -2.25.$$

סעיף ב



סעיף ג

(1) נקודות הפיתול הן הנקודות בהן הנגזרת השנייה מתאפסת $\cdot \left(-\frac{5\pi}{12}, 2.21\right)$ ו- $\left(-\frac{\pi}{12}, 0.569\right)$

עבור הערך $-\frac{5.5\pi}{12}$ שהוא מעט קרוב יותר ל- $-\frac{\pi}{2}$ הנגזרת השנייה היא:

$$f''\left(-\frac{5.5\pi}{12}\right) = 2 + 4 \sin\left(2 \cdot -\frac{5.5\pi}{12}\right) = 0.965 > 0,$$

והפונקציה קעורה כלפי מעלה ב- $-\frac{\pi}{2} < x < -\frac{5\pi}{12}$.

עבור הערך $-\frac{\pi}{4}$ שהוא בין שתי נקודות הפיתול, הנגזרת השנייה היא:


$$f''\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 2 + 4 \sin\left(2 \cdot -\frac{\pi}{4}\right) = -2 < 0,$$

והפונקציה קעורה כלפי מטה ב- $x = -\frac{\pi}{12}$
 עבור הערך $-\frac{\pi}{24}$ שהוא מעט קרוב יותר ל-0 הנגזרת השנייה היא:

$$f''\left(-\frac{\pi}{24}\right) = 2 + 4 \sin\left(2 \cdot -\frac{\pi}{24}\right) = 0.965 > 0,$$

והפונקציה קעורה כלפי מעלה ב- $x = -\frac{\pi}{12}$

(2) נקודות הפיתול מסומנות.



6.9 חורף תשע"ו

. $0 \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ נתונה הפונקציה $f(x) = a \cdot \sin^2 x + b \cdot \cos(4x)$ בתחום a ו- b הם פרמטרים.

לפונקציה $f(x)$ יש קיצון בנקודה שבת $x = \frac{\pi}{3}$. נתון כי $b < 0$.

א. הביע באמצעות b (במידת הצורך) את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון, וקבע את סוגן.

ב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון.

ג. סרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ בתחום הנתון.

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} f''(x) dx .$$

ד. (1) מצא את הערך של האינטגרל $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} f''(x) dx$.

(2) בתחום $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$, הגרף של פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$ חותך את ציר ה- x בנקודה אחת שבה $x = k$.

בתחום $k \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, השטח המוגבל על ידי הגרף של $f''(x)$, על ידי ציר ה- x ועל ידי הישר $x = \frac{\pi}{2}$ שווה ל- S .

הביע באמצעות S את השטח המוגבל על ידי הגרף של $f''(x)$, על ידי ציר ה- x ועל ידי הישר $x = \frac{2\pi}{3}$ בתחום $k \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$. נמק.
הערה: אין צורך למצוא את $f''(x)$.

שאלה מאוד ארוכה. קצת מפחידה!

סעיף א'

נחשב את הנגזרת הראשונה, נציב $x = \frac{\pi}{3}$, ונבדוק Aiפה היא מתאפסת?

$$f'(x) = 2a \sin x \cos x - 4b \sin 4x$$

$$\begin{aligned} f'\left(\frac{\pi}{3}\right) &= 2a \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{3} - 4 \sin \frac{4\pi}{3} \\ &= 2a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} - 4b \cdot \frac{-\sqrt{3}}{2} = 0 \end{aligned}$$

$$a = -4b .$$

השאלה מבקשת את נקודות הקיצון באמצעות b ולכן נציב עבור a :

$$f'(x) = -8b \sin x \cos x - 4b \sin 4x = 0.$$

המשווהה נראה די מסובכת אבל ניתן לפשט אותו על ידי שימוש בנוסחה עבור $\sin(\theta + \theta)$

$$\begin{aligned} -8b \sin x \cos x - 4b \sin 4x &= -4b(2 \sin x \cos x + \sin(2x + 2x)) \\ &= -4b(\sin 2x + 2 \sin 2x \cos 2x) \\ &= -4b \sin 2x(1 + \cos 2x) = 0. \end{aligned}$$


נבדוק כל אחד משני הגורמים כדי לחפש איפה הם מתאפסים בתחום. $\sin 2x = 0$ כאשר $2x = 0, \pm\pi, \dots$. בתחום, האפשרויות הן $x = 0, x = \frac{\pi}{2}, \dots$. $\cos 2x = 1 + \cos 2x = 0$. מ- $x = 0$, יש לנו $x = \frac{\pi}{3}, x = \frac{2\pi}{3}, x = \frac{4\pi}{3}, x = \frac{8\pi}{3}, \dots$. נחשב את נקודות הקיצון:

$$\begin{aligned} f(0) &= -4b \sin^2 0 + b \cos 0 = b \\ f\left(\frac{\pi}{3}\right) &= -4b \sin^2 \frac{\pi}{3} + b \cos \frac{4\pi}{3} = -4b \cdot \frac{3}{4} + b \cdot -\frac{1}{2} = -3.5b \\ f\left(\frac{\pi}{2}\right) &= -4b \sin^2 \frac{\pi}{2} + b \cos \frac{4\pi}{2} = -4b + b = -3b \\ f\left(\frac{2\pi}{3}\right) &= -4b \sin^2 \frac{2\pi}{3} + b \cos \frac{8\pi}{3} = -4b \cdot \frac{3}{4} + b \cdot -\frac{1}{2} = -3.5b. \end{aligned}$$

אליה כל נקודות הקיצון כולל בקצות התחום והפונקציה מוגדרת בכל התחום. נתון $0 < b$, ולכן:


$(0, b)$	מינימום
$\left(\frac{\pi}{3}, -3.5b\right)$	מקסימום
$\left(\frac{\pi}{2}, -3b\right)$	מינימום
$\left(\frac{2\pi}{3}, -3.5b\right)$	מקסימום

סעיף ב



סעיף ג

בארבעת נקודות הקיצון הנגזרת הראשונה היא אפס. מעיון הגраф של $f(x)$, השיפוע מתחילה באפס, עולה וاز' יורדת שוב לאפס, אח"כ יורדת עוד ועולה, ולבסוף עולה עוד ויורדת.



סעיף ד

(1)

$$\begin{aligned}
 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} f''(x) dx &= f'(x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} \\
 &= -8b \sin \frac{4\pi}{3} \left(1 + 2 \cos \frac{4\pi}{3}\right) + 8b \sin \frac{2\pi}{2} \left(1 + 2 \cos \frac{2\pi}{2}\right) \\
 &= -8b \cdot -\frac{\sqrt{3}}{2} \left(1 + 2 \cdot -\frac{1}{2}\right) + 8b \sin 0 (1 + 2 \cdot -1) \\
 &= 0 + 0 = 1.
 \end{aligned}$$

(2) ב-(1) חישבנו שהאינטגרל על כל התחום מ- $\frac{\pi}{2}$ ל- $\frac{2\pi}{3}$ הוא 0. השטח הראשון, האינטגרל מ- $\frac{\pi}{2}$ ל- k , הוא S . لكن השטח השני, האינטגרל מ- k ל- $\frac{2\pi}{3}$, הוא $-S$.

6.10 קיז תשע"ה מועד ב

נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{1}{\sin x \cos x}$, נתון התחום $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, וננתן הגדירה של הפונקציה $f(x)$ ו.ב.

- א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
 - (2) האם הפונקציה $f(x)$ היא פונקציה זוגית או אי-זוגית? נמק.
 - (3) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.
 - (4) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
- ב. נתונה הפונקציה $g(x) = f(x) - a$.
- (1) מצא את הערכים האפשריים של a שעבורם יש למשוואה $f(x) - a = 0$ פתרון אחד בלבד.
 - (2) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ עבור כל אחד מהערכים של a שמצאת בתת-סעיף ב(1).

סעיף א

(1) הערכים שמאפסים את המכנה הם:

$$\sin 0 = 0, \quad \cos \frac{\pi}{2} = 0, \quad \cos -\frac{\pi}{2} = 0.$$

תחום ההגדרה הוא:

$$-\frac{\pi}{2} < x < 0, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}.$$

(2) הפונקציה סינוס היא אי-זוגית והפונקציה קוסינוס היא זוגית. המכפלה של הן היא אי-זוגית.

(3)

$$((\sin x \cos x)^{-1})' = -1 \cdot (\sin x \cos x)^{-2}(\sin x \cos x)'.$$

בתחום ההגדרה המכנה חיובי, כך שנאריך רק לבדוק אם המונה יכול להתאפס.

$$-(\sin x \cos x)' = -(\cos^2 x - \sin^2 x) = (\sin^2 x - \cos^2 x) = 0.$$

נקודות הקיצון הן בערכים שיש להם ערך מוחלט של סינוס שווה לערך מוחלט של קוסינוס, שהם $\frac{\pi}{4} \pm k \cdot \frac{\pi}{2}$. בתחום ההגדרה:


$$x = \frac{\pi}{4}, \quad y = \frac{1}{(\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{2}/2)} = 2, \quad x = -\frac{\pi}{4}, \quad y = \frac{1}{(-\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{2}/2)} = -2.$$

המכנה של הנגזרת הראשונה הוא $(\sin x \cos x)^2$, ערך חיובי בתחום ההגדרה, ולכן, סימן הנגזרת השנייה הוא כסימן הנגזרת של המונה.

$$(\sin^2 x - \cos^2 x)' = 2 \sin x \cos x - 2 \cos x(-\sin x) = 4 \sin x \cos x .$$

עבור $x = \frac{\pi}{4}$ והנקודה היא מינימום.
עבור $x = -\frac{\pi}{4}$ והנקודה היא מקסימום.


(4)




סעיף ב

(1) למשווה פתרון אחד אם הגרף משיק לציר ה- x או חותך את הציר במקום אחד בלבד (לא קויה כאנ'). הגרף משיק כאשר $a = \pm 2$, שמעלה או מוריד את הגרף בשתי ייחיות.

(2)



6.11 קיז תשע"ה מועד א



נתונה הפונקציה $0 \leq x \leq \frac{3\pi}{4}$ $f(x) = \frac{\sin x}{\cos 2x}$ ונתון התחום
(ראה ציור).

עננה על הסעיפים א, ב ו-ג עברו התחום הנתון.

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f(x)$.

(3) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$,


וקבע את סוגן על פי הצייר.

ב. סרטט סקיצה של גורף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

ג. נתונה הפונקציה $g(x)$ המקיים: $g(x) = 2f(x) \cdot f'(x)$

מצא את השטח המוגבל על ידי גורף הפונקציה $g(x)$,

על ידי ציר ה- x ועל ידי הישר $x = \frac{\pi}{6}$.



סעיף א

(1) הפונקציה לא מוגדרת כאשר $\cos 2x = 0$. בתחום הנתון, רואים בתרשים שזה קורה עבור $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$. תחום ההגדרה הוא:

$$0 \leq x < \frac{\pi}{4}, \quad \frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}.$$

(2) האסימפטוטות הן בערכי ציר ה- x בהם הפונקציה לא מוגדרת: $x = \frac{3\pi}{4}, x = \frac{\pi}{4}$.

(3) יש נקודה קיצון בקצה התחום $(0, 0)$. נחשב את הנגזרת כדי לחפש את נקודות קיצון הפנימית המופיעות בתרשים:

$$\left(\frac{\sin x}{\cos 2x} \right)' = \frac{\cos x \cos 2x - \sin x(-2 \sin 2x)}{\cos^2 2x}.$$

בתחום ההגדרה המכנה חיובי כך הנגזרת תתאפס אם המונה יתאפס:

$$\begin{aligned} \cos x \cos 2x + 2 \sin x \sin 2x &= \cos x(\cos^2 x - \sin^2 x) + 2 \sin x \cdot 2 \sin x \cos x \\ &= \cos x(\cos^2 x - \sin^2 x + 4 \sin^2 x) \\ &= \cos x((\cos^2 x + \sin^2 x) + 2 \sin^2 x) \\ &= \cos x(1 + 2 \sin^2 x). \end{aligned}$$


בתחום ההגדרה $\cos x$ מותאפס כאשר $x = \frac{\pi}{2}$ אף פעם לא מתאפס. נקודת הקיצון היא $\left(\frac{\pi}{2}, -1\right)$. לפי הظיר מדובר במקסימום מקומי.

סעיף ב

$$f'(x) = \frac{\cos x(1 + 2 \sin^2 x)}{\cos^2 2x}.$$

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \quad \text{ובסעיף הקודם חישבנו ש-} 0$$

המכנה של f' שווה לאפס, והמונה שונה מאפס, ולכן יש אסימפטוטה אנכית. בתרשים הנתון ל-(x) רואים שהשיפוע (הנגזרת הראשונה של הפונקציה) עולה בין 0 ל- $\frac{\pi}{4}$, ושהיא יורדת בין $\frac{\pi}{4}$ ל- $\frac{3\pi}{4}$. התרשים ל-(x) נראה כך:




סעיף ג

$$\text{ולכן: } (f^2(x))' = 2f(x) \cdot f'(x)$$

$$\int_0^{\pi/6} g(x) = \int_0^{\pi/6} 2f(x) \cdot f'(x) = f^2(x) \Big|_0^{\pi/6} = \frac{\sin(\pi/6)}{\cos(2\pi/6)} - \frac{\sin 0}{\cos 0} = \frac{1/2}{1/2} - \frac{0}{1} = 1.$$

6.12 חורף תשע"ה



נתונות שתי פונקציות:

$$f(x) = 0.5 \sin(2x) + \cos x$$

$$g(x) = \sin(2x)$$

בתוחם $0 \leq x \leq 2\pi$.

בתחום הנתון

הגרפים של הפונקציות

נפגשים בשתי נקודות, A ו B.

הנמצאות על ציר ה- x, כמתואר בציור.

א. דרך נקודה על ציר ה- x, הנמצאת בין הנקודות A ו B, מעבירים אנך לציר ה- x.


האנך חותך את הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו $g(x)$ בנקודות M ו N.

מצא את האורך המקסימלי של הקטע MN.

ב. דרך נקודה על ציר ה- x, הנמצאת בתוחם $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, מעבירים אנך לציר ה- x.

האנך חותך את הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו $g(x)$ בנקודות K ו L.

מצא את האורך המקסימלי של הקטע KL.



סעיף א

הgraf המודגש הוא g בغالל המחוויות, אבל נבדוק על ידי חישוב נקודות החיתוך עם ציר ה- x.

$\sin 2x = 0$ בתחום כאשר $x = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$ ורך לגרף המודגש יש חמישה נקודות חיתוך.

נחשב את הנגדת של ההפרש בין הפונקציות:

$$\begin{aligned} g(x) - f(x) &= \sin 2x - 0.5 \sin 2x - \cos x = 0.5 \sin 2x - \cos x \\ (g(x) - f(x))' &= \cos 2x + \sin x = (1 - 2 \sin^2 x) + \sin x. \end{aligned}$$

נקודות החיתוך A, B של f, g עם ציר x הן נקודות השניה והרביעית של g שהן $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$. נבדוק:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{2}\right) &= 0.5 \sin 2 \cdot \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} = 0 + 0 = 0 \\ f\left(\frac{3\pi}{2}\right) &= 0.5 \sin 2 \cdot \frac{3\pi}{2} + \cos \frac{3\pi}{2} = 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

נחשב מתי הנגזרת הראשונה של הפרש הפונקציות מתאפסת בתחום $A \leq x \leq B$

$$2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$$

$$(2 \sin x + 1)(\sin x - 1) = 0$$

$$\begin{aligned} \sin x &= 1, -\frac{1}{2} \\ x &= \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}. \end{aligned}$$

נקודות הקיצון המבוקשת. המשקנה היא שנקודות הקיצון של $g - f$ בין A ל- B היא ב- $x = \frac{7\pi}{6}$, וכאן $\frac{\pi}{2} < \frac{3\pi}{2} < \frac{11\pi}{6}$, ולכן אין מקסימום.

נבדוק שנקודה זו היא באמת מקסימום על ידי חישוב הנגזרת השניה:

$$(1 - 2 \sin^2 x + \sin x)' \Big|_{\frac{7\pi}{6}} = (-4 \sin x + 1) \cos x \Big|_{\frac{7\pi}{6}} = -\left(4 \cdot -\frac{1}{2} + 1\right) \cdot -\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} > 0,$$

ולכן:

$$g\left(\frac{7\pi}{6}\right) - f\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \sin \frac{7\pi}{3} - \cos \frac{7\pi}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

הוא האורך המקסימלי של MN .

סעיף ב

נקודות חיתוך של שלילה של פונקציה על ציר x זהים לנקודות החיתוך של הפונקציה (ראו בנספח). לכן נקודות האיפוס של $(f(x) - g(x))'$ הן נקודות האיפוס של $(g(x) - f(x))'$, שהן $x = 0, \frac{\pi}{2}$. נחשב:

$$f(0) - g(0) = -(0.5 \sin(2 \cdot 0) - \cos 0) = -(0 - 1) = 1$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) - g\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\left(0.5 \sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) - \cos \frac{\pi}{2}\right) = -(0 - 0) = 0,$$

והאורך המקסימלי של KL הוא 1 כאשר $x = 0$.

6.13 קיז תשע"ד מועד ב

$$f(x) = x\sqrt{8-x^2}$$

$$g(x) = \sqrt{8x^2 - x^4}$$


א. (1) לשתי הפונקציות יש אותו תחום הגדרה.
מצאו את תחום הגדרה.

(2) מצאו את נקודות החיתוך של כל אחת מהפונקציות $f(x)$ ו- $(x)g$ עם הצירים.
ב. מצאו את השיעורים של נקודות הקיצון המוחלט של כל אחת מהפונקציות, וקבעו את סוגן.

ג. על פי הטעיפים א ו-ב, סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$,
ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $(x)g$.

ד. לפניך ארבעה גרפים, I-IV.

איזה מהגרפים מתאר את פונקציית הנגזרת $(x)g$? נמק.



סעיף א

(1) הפונקיות מוגדרת כאשר ביטוי בשורש לא שלילי. עבור f אם $0 < 8 - x^2 \leq$ והוא $x \leq -\sqrt{8}$ ו- $x \geq \sqrt{8}$.

עבור g אם $0 \leq 8 - x^4$ ותחום ההגדרה מורכב מ- $-\sqrt{8} \leq x \leq \sqrt{8}$ ו- $x = 0$. אבל $x = 0$ נמצא בתחום הראשון כך שהוא לא מוסיף ערכים, ותחומי ההגדרה של f, g זהים.

(2) עבור f : אם $x = 0, y = 0$, ונקודות החיתוך עם ציר ה- x הן $(0, 0)$, $(\pm\sqrt{8}, 0)$. אם $y = 0, x = 0$, ונקודות החיתוך עם ציר ה- y היא $(0, 0)$.

עבור g : אם $0, y = 0, \pm\sqrt{8}$ עבור אותם ערכים $\sqrt{8x^2 - x^4} = \sqrt{x^2} \cdot \sqrt{8 - x^2} = 0$. ונקודות החיתוך הן אותן נקודות שקיבלונו עבור f .


סעיף ב

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 1 \cdot \sqrt{8-x^2} + x \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{8-x^2}} \cdot (-2x) \\
 &= \frac{8-2x^2}{\sqrt{8-x^2}} \\
 g'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{8x^2-x^4}} \cdot (16x-4x^3) \\
 &= \frac{8x-2x^3}{\sqrt{8x^2-x^4}} = \frac{x(8-2x^2)}{\sqrt{8x^2-x^4}}.
 \end{aligned}$$

פרט ל- $\pm\sqrt{8}$, בוחן הfonקציות לא מוגדרות, המכנה חיובי והנזרות יתאפשרו כאשר המונה יתאפשר.
 עבור f הנקודות הן $(-2, -4)$, $(2, 4)$. בנקודות הקצה ערכי הfonקציה הם $(\pm\sqrt{8}, 0)$, ולכן $(-2, -4)$ היא מינימום אבסולוטי ו- $(2, 4)$ היא מקסימום אבסולוטי.
 עבור g הנקודות הן $(0, 0)$, $(-2, 4)$, $(2, 4)$. בנקודות הקצה ערכי הfonקציה הם $(0, 0)$, $(\pm\sqrt{8}, 0)$, ולכן $(0, 0)$ הוא מינימום אבסולוטי ו- $(2, 4), (-2, 4)$ הם מקסימום אבסולוטי.

סעיף ג

נתבונן על תחומי ההגדרה ונקודות הקצה של הfonקציות כדי לצייר את התרשימים:



סעיף ד

$$g'(x) = \frac{x(8-2x^2)}{\sqrt{8x^2-x^4}}$$

לא מוגדר באפס, ולכן אפשר לפסול IV, III . נחשב מספר ערכיהם:

x	-2	-1	1	2
$g'(x)$	0	$-(6/7)$	$(6/7)$	0

$g'(x)$ יורדת כאשר מתקרבים לציר ה- y משמאלו וגם כאשר מתרחקים מציר ה- y לימינו. לכן הגרף I מתאר את הfonקציה.

6.14 קיז תשע"ד מועד א

. $0 \leq x \leq \pi$, $g(x) = \sin(2x)$, $f(x) = 2 \sin^2 x$ בתחום

א. בתחום הנתון נמצא:

(1) את שיעורי x של נקודות החיתוך בין הגרפים של שתי הפונקציות.

(2) את נקודות החיתוך של כל אחת משתי הפונקציות עם ציר x .

ב. (1) נתונה הפונקציה $h(x) = x - \frac{\sin(2x)}{2}$

$$\text{הראה כי } h'(x) = f(x).$$

(2) בתחום $\pi \leq x \leq 0$ מצא את השטח הכלוא בין הגרפים

$$\text{של שתי הפונקציות } f(x) \text{ ו- } g(x).$$

סעיף א

(1) בזרור שערכי הפונקציות שוים ב- π , $x = 0$ כי $\sin 0 = \sin \pi = 0$.

נחפש פתרונות אחרים כאשר נניח ש- $x \neq 0$ כדי לחלק ב- $\sin x$:

$$\begin{aligned} 2 \sin^2 x &= \sin 2x \\ &= 2 \sin x \cos x \\ \sin x &= \cos x \\ x &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

(2) ראיינו ששתי הפונקציות מקבלות ערך אפס ב- π , 0. נחפש ערכים אחרים בתחום.

עבור f : $2 \sin^2 x = 0$ רק כאשר $x = 0, \pi$, ולכן אין נקודות חיתוך נוספות עם ציר x .


עבור g : $\sin 2x = 0 + k\pi$, ולכן יש נקודת חיתוך גם ב- $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$.

סעיף ב

(1)

$$\begin{aligned} h(x)' &= \left(x - \frac{\sin 2x}{2}\right)' = 1 - \frac{2 \cos 2x}{2} = 1 - \cos 2x \\ &= 1 - (\cos^2 x - \sin^2 x) = (1 - \cos^2 x) + \sin^2 x \\ &= 2 \sin^2 x = f(x). \end{aligned}$$

(2) מהתרשים להלן אנו רואים שהשטח מרכיב משני קטיעים, מ-0 עד $\frac{\pi}{4}$, ומן $\frac{\pi}{4}$ עד π .



בסעיף זה יש מתנה: כדי לחשב את האינטגרל של $f(x)$ נוכל להשתמש בפונקציה $h(x)$ הנתונה:

$$h(x) = x - \frac{\sin 2x}{2} = \int h'(x) = \int f(x).$$

השיטח הראשון הוא:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin 2x - f(x)) dx &= \left. \frac{-\cos 2x}{2} - \left(x - \frac{\sin 2x}{2} \right) \right|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \left(0 - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right) - \left(-\frac{1}{2} - 0 + 0 \right) = -\frac{\pi}{4} + 1. \end{aligned}$$

השיטח השני הוא:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} (f(x) - \sin 2x) dx &= \left. \left(x - \frac{\sin 2x}{2} \right) - \frac{-\cos 2x}{2} \right|_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \\ &= \left(\pi - 0 + \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{3\pi}{4} + 1. \end{aligned}$$

השיטח הכללי הוא:

$$S = -\frac{\pi}{4} + 1 + \frac{3\pi}{4} + 1 = \frac{\pi}{2} + 2.$$

6.15 חורף תשע"ד

$$f(x) = \frac{x^2 + x - a}{x^2 - x + a} \quad \text{נתונה הפונקציה}$$

הfonקציה $f(x)$ מוגדרת לכל x .

א. (1) מצא את האסימפטוטות של $f(x)$ המקבילות לצירים (אם יש כאלה).

(2) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של $f(x)$, וקבע את סוגן.

(הבע באמצעות a במידת הצורך).

(3) ידוע כי גраф הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה- x בשתי נקודות בדיק.

סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $f(x)$.

ב. בתחום $x \leq 0$, השטח המוגבל על ידי הגраф של $f(x)$, על ידי הישר $x = -1$ ועל ידי ציר ה- x , שווה ל- $\frac{1}{2}$.

חשב את נקודות החיתוך של גраф הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- x (מצא ערכים מסוימים).

בבhinah zo hiyo shelosh shalot b'parak haShni lken m'sef haShala haOla 7 v'la 6.

נתון שהfonקציה מוגדרת לכל x אבל מתחשך לי לוודא שהיא נכונה. אם נשווה את המכנה לאפס נקבל משווהה ריבועית שפתרוניה היא:

$$\frac{1 \pm \sqrt{1 - 4a}}{2}.$$

נתון ש- $a < -1$ אז אין פתרונות ממשיים למשווהה.

סעיף א

(1) הפונקציה מוגדרת לכל x אז אין אסימפטוטות אנכיות.

נחלק את הפונקציה בחזקה הגדולה ביותר ונקבל:

$$\frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{a}{x^2}}{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{a}{x^2}}$$

ששואף ל 1 כאשר $x \rightarrow \pm\infty$. האסימפטוטה האופקית היא $y = 1$.

(2) נחשב את הנגזרת הראשונה:

$$f'(x) = \frac{(2x+1)(x^2-x+a) - (x^2+x-a)(2x-1)}{(x^2-x+a)^2} = \frac{-2x^2+4xa}{(x^2-x+a)^2}.$$

מכנה חיובי ולכן הנגזרת תתאפס כאשר $2x^2 = 4ax$. נקודות הקיצון הן:

$$(0, -1), \quad \left(2a, \frac{4a+1}{4a-1}\right).$$


המכנה של הנגזרת הראשונה חיובית ולכן מספק לבדוק את הסימנים של הנגזרת של המונה:

$$(-2x^2 + 4ax)' = -4x + 4a$$

ב- $x = 0$: חיובי כי נתון $-1 < a$, ולכן נקודת הקיצון היא מינימום.

ב- $x = 2a$: שלילי כי נתון $1 > a$, ולכן נקודת הקיצון היא מקסימום.

(3) קיימים מינימום ב- $x = 0$ ואסימפטוטה אופקית ב- $y = u$. לפי הנתון שיש שתי נקודות חיתוך עם ציר ה- x , הגרף עולה מנוקודת המינימום וושאך לאינסוף ב- $x = 1 = u$. נשאר רק להחליט אם נקודת המקסימום היא מעל לאסימפטוטה או מתחתיה. אבל עם $1 > a > \frac{4a+1}{4a-1}$ אז הנקודה $\frac{4a+1}{4a-1}$ נמצאת מעל לאסימפטוטה.



סעיף ב

נחשב את האינטגרל של הנגזרת הראשונה הוא הפונקציה עצמה:

$$\left| \int_{-1}^0 -f'(x) dx \right| = \left| f(x) \Big|_{-1}^0 \right| = |f(0) - f(-1)| = \left| -1 - \frac{-a}{a+2} \right| = \left| \frac{-2}{a+2} \right| = \frac{1}{2}.$$

נתון שהשטח שווה ל- $\frac{1}{2}$ ולכן $a = 2$. ערכי ה- x של נקודות החיתוך הן הפתרונות של:

$$x^2 + x - 2 = 0$$

שהם $x = -2$, $x = 1$. נקודות החיתוך הן $(-2, 0)$, $(1, 0)$.

פרק 7 חדו"א שאלה 7

7.1 קיז תשע"ח מועד ב

נתונה הפונקציה $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$.

a. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?

ענה על הסעיפים ב-ה עבור התחום $x \geq \frac{2}{7}$.

b. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גורף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- x .

c. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

d. לפונקציה $f(x)$ יש אסימפטוטה אופקית. מצא את משוואת האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x)$.

e. סרטט סקיצה של גורף הפונקציה $f(x)$.

ענה על סעיף ו עבור התחום $x > 0$.

f. נסתכל על נקודות החיתוך של גורף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- x .

לפניך 3 טענות (i-iii). אחת מהן נכונה. איזו מהן היא הנכונה? נמק.

(i) ככל שמתקרבים ל- $x = 0$, המרחק בין שתי נקודות חיתוך סמוכות הולך וקטן.

(ii) המרחק בין כל שתי נקודות חיתוך סמוכות נשאר קבוע.

(iii) ככל שמתקרבים ל- $x = 0$, המרחק בין שתי נקודות חיתוך סמוכות הולך ונגד.

סעיף א

הפונקציה לא מוגדרת רק כאשר המכנה $x \neq 0$.

סעיף ב

$$\sin\left(\frac{\pi}{x}\right) = 0, \quad \frac{\pi}{x} = k\pi, \quad x = \frac{1}{k}.$$

נבדוק עבור כמה ערכים של $[k, x]$

$$[1, 1], \quad \left[2, \frac{1}{2}\right], \quad \left[3, \frac{1}{3}\right], \quad \left[4, \frac{1}{4}\right].$$

אבל $\frac{2}{7} \leq x \leq 4$, הנקודות מחוץ לתחום. נקודות החיתוך הן:

$$\left(\frac{1}{3}, 0\right), \quad \left(\frac{1}{2}, 0\right), \quad (1, 0).$$

סעיף ג

$$\left(\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)\right)' = \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0.$$

הגורם $-\frac{1}{x^2}$ לא יכול לקבל ערך אפס, ולכן נקודות הקיצון הן הנקודות:

$$\frac{\pi}{x} = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad \frac{1}{x} = \frac{1}{2} + k, \quad x = \frac{2}{1+2k}.$$

נבדוק עבור כמה ערכים של $[k, x]$:

$$[0, 2], \left[1, \frac{2}{3}\right], \left[2, \frac{2}{5}\right], \left[3, \frac{2}{7}\right].$$

ברור שעבור $k \geq 4$ הנקודות מחוץ לתוחום.

לפי הערכים של $f(x)$ אפשר לקבוע את סוג נקודות הקיצון:

$$\text{מקסימום } \left(\frac{2}{7}, -1\right) \quad \text{מקסימום } \left(\frac{2}{5}, 1\right) \quad \text{מינימום } \left(\frac{2}{3}, -1\right) \quad \text{מינימום } (2, 1)$$

אפשר לבדוק לפי נגזרת שנייה. המכנה של הנגזרת הראשונה x^2 חיובית, ולכן מספיק לבדוק את הסימן של הנגזרת של המונה:

$$-\left(\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)\right)' = -\left(-\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)}{x^2}.$$

מכאן שסימן הנגזרת השנייה תלוי בסימן של $\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$.

$$-\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1, \quad -\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 1, \quad -\sin\left(\frac{5\pi}{2}\right) = -1, \quad -\sin\left(\frac{7\pi}{2}\right) = 1.$$


הסימנים תואמים את קבועות סוג נקודות הקיצון המקוריים.

סעיף 4

$y = f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$. יש אסימפטוטה אופקית ב- $y = 0$ ו-

סעיף 5

נקודות הקיצון מסומנות:



סעיף 6

אז $x = \frac{1}{k}$ כל שמתקרבים לאפס הערך של k עולה. המרחק בין שתי נקודות חיתוך סמוכות:

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{1}{k(k+1)},$$

ברור שערך זה קטן ככל ש- x מתקרב לאפס ולכן k עולה. המסקנה היא ש-(i) נכון.

7.2 קיז תשע"ח מועד א

$f(x)$ היא פונקציה גזירה, המוגדרת לכל x , כך ש- $f'(x) \neq 0$ לכל x .

א. הוכח שאם הפונקציה $f(x)$ עולה בקטע מסוים, אז הפונקציה $\frac{1}{f(x)}$ יורדת באותו הקטע;

ואם הפונקציה $f(x)$ יורדת בקטע מסוים, אז הפונקציה $\frac{1}{f(x)}$ עולה באותו הקטע.

נתונה הפונקציה $g(x) = \sin^2 x + \cos x + 2$, המוגדרת לכל x .

ב. האם קיים x שבבגרו $g(x) = 0$? נמק.

ג. (1) האם הפונקציה $g(x)$ היא פונקציה זוגית? נמק.

(2) הראה שלכל x מתקיים: $g(x) = g(x + 2\pi)$.

(3) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ בתחום $0 \leq x \leq \pi$, וקבע את סוגן.

(4) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ בתחום $-\pi \leq x \leq 3\pi$.

נתונה הפונקציה $h(x) = \frac{1}{\sin^2 x + \cos x + 2}$

ענה על סעיף ד. תוכל להיעזר בתשובותיך על הסעיפים הקודמים.

ד. (1) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $h(x)$? נמק.

(2) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $h(x)$ בתחום $\pi \leq x \leq -\pi$ – באוטה מערכת צירים שבה סרטטת את

גרף הפונקציה $g(x)$.

סעיף א

לכואורה הטיעון ברור מאליו אבל כנראה צריך להוכיח באמצעות נגזרות:

$$\left(\frac{1}{f(x)} \right)' = -1 \cdot f(x)^{-2} \cdot f'(x).$$

נתון ש- $f(x)$ מוגדרת בכל התחום, ו- $f'(x)$ חיובי בכל התחום. הסימן של $\left(\frac{1}{f(x)} \right)'$ הפוך מהסימן של $f'(x)$, ולכן אם אחת עולה השניה יורדת.

סעיף ב

$g(x) = \sin^2 x + \cos x + 2 \geq 1$. מכיוון $\cos x \geq -1$ ו- $\sin^2 x \geq 0$ מתקפסת.

סעיף ג

(1) הפונקציה זוגית, כי \cos זוגית ו- \sin אי-זוגית, אבל \sin^2 זוגית. בחישוב:

$$\sin^2(-x) + \cos(-x) + 2 = (-\sin x)^2 + \cos x + 2 = \sin^2 x + \cos x + 2.$$

$$g(x) = g(x + 2\pi) \text{ וכאן } \sin(x + 2\pi) = \sin x, \cos(x + 2\pi) = \cos x \quad (2)$$

אפשר גם לחשב:

$$\begin{aligned} \sin^2(x + 2\pi) + \cos(x + 2\pi) + 2 &= \\ (\sin x \cos 2\pi + \sin 2\pi \cos x)^2 + (\cos x \cos 2\pi - \sin x \sin 2\pi) + 2 &= \\ \sin^2 x + \cos x + 2. \end{aligned}$$

(3) נחשב את הנגזרת הראשונה:


$$g'(x) = 2 \sin x \cos x - \sin x = \sin x(2 \cos x - 1) = 0.$$

בתחום $\pi \leq x \leq 0$ מתאפס $2 \cos x - 1$, $x = 0, x = \pi$. נקודות הקיצון $\frac{\pi}{3}, (0, 3), \left(\frac{\pi}{3}, \frac{13}{4}\right), (\pi, 1)$.
נחשב את הנגזרת השנייה:

$$\begin{aligned} g''(x) &= \cos x(2 \cos x - 1) + \sin x(-2 \sin x) \\ &= 2 \cos^2 x - 2 \sin^2 x - \cos x \\ &= 4 \cos^2 x - 1 - \cos x. \end{aligned}$$

בנקודות הקיצון: $g''\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ והנקודה היא מינימום.
 $g''(0) = 2$ והנקודה היא מקסימום.
 $g''(\pi) = 4$ והנקודה היא מינימום.

(4) לפי נקודות הקיצון נצייר את הגרף עבור $0 \leq x \leq \pi$. לפי (1) הפונקציה זוגית אז הגרף עברו זהה. לפי (2) הפונקציה מחזורית וניתן להעתיק את הגרף לתוחם $0 \leq x \leq \pi$.



סעיף 2

- (1) עבור כל $x > 0$, ולכן עבור כל $x > 0$ $h(x) = \frac{1}{f(x)} > 0$ והפונקציה מוגדרת.
(2) ב- $-\pi \leq x \leq 0$ נחשב את נקודות הקיצון ונחפוץ את תחומי העליה והירידה לפי סעיף א.

7.3 חורף תשע"ח

נתונה משפחת הפונקציות: $f(x) = \frac{(x-2)^2}{x^2-a}$. $a \neq 4$, $a \neq 0$ והוא פרמטר.

עננה על סעיף א. הבע באמצעות a במידת הצורך. הבחן בין $0 > a$ ובין $a < 0$ במידת הצורך.

- א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה (x) .
- (2) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גраф הפונקציה (x) עם הצירים.
- (3) מצא את משוואת האסימפטוטה של הפונקציה (x) המקבילה לציר ה- x .
- (4) מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה (x) המאונכות לציר ה- x (אם יש כאלה).

עננה על סעיף ב. הבע באמצעות a במידת הצורך. הבחן בין $4 > a$ ובין $a < 4$ במידת הצורך.

ב. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה (x) , וקבע את סוגן.

סעיף ג של השאלה מופיע בהמשך.

תחילה התעלמתי מהנתנו על הסימן של a זה סיבך אותו.

סעיף א

(1) כאשר $0 > a$, הפונקציה לא מוגדרת עבור $x = \pm\sqrt{a}$, ערכיים שאינם מוגדרים את המכנה. כאשר $0 < a$, המכנה תמיד חיובי והפונקציה מוגדרת לכל x .

(2) חישוב נקודת החיתוך עם ציר ה- y : $f(0) = \frac{(-2)^2}{-a} = -\frac{4}{a}$

чисוב נקודת החיתוך עם ציר ה- x : כאשר $0 < a$, המכנה חיובית והפונקציה מתאפסת כאשר $x = 2$. נתון $\neq 4 \neq x$, ולכן גם כאשר $0 > a$, המכנה לא מתאפסת והפונקציה מתאפסת ב- $x = 2$:

$$\frac{(x-2)^2}{x^2-a} = \frac{(x-2)(x-2)}{(x-\sqrt{a})(x+\sqrt{a})}.$$

(3) נחלק את המונה והמכנה ב- x^2 (נתון $\neq 0 = x$):

$$f(x) = \frac{1 - \frac{4x}{x^2} + \frac{4}{x^2}}{1 - \frac{a}{x^2}} \xrightarrow{\pm\infty} 1.$$

$y = 1$ היא אסימפטוטה אופקית.

(4) אסימפטוטות אנכיות יכולות להימצא רק עבור ערכי x עבורם הפונקציה לא מוגדרת. כאשר $0 < a$ הפונקציה מוגדרת לכל x ואין אסימפטוטה.

כאשר $0 > a$: נתון $4 \neq a$ כך $\neq -2 \neq \sqrt{a}$, לכן המונה של הפונקציה לא מתאפסת כאשר $x = \sqrt{a}, x = -\sqrt{a} \rightarrow \pm\sqrt{a}$ ויש אסימפטוטות אנכיות.

סעיף ב

$$\begin{aligned} f'(x) = \left(\frac{(x-2)^2}{x^2-a} \right)' &= \frac{2(x-2)(x^2-a) - (x-2)^2 \cdot 2x}{(x^2-a)^2} \\ &= \frac{2(x-2)(2x-a)}{(x^2-a)^2}. \end{aligned}$$

נקודות הקיצון הן $\left(\frac{a}{2}, \frac{a-4}{a}\right)$, $(2, 0)$.

נחשב את הסימן של הנגזרת של המונה של הנגזרת הראשונה:

$$(2(x-2)(2x-a))' = 8x - 2a - 8.$$

לפי ההנחה בשאלתנו נבדוק בנפרד עבור ערכים חיוביים ושליליים של a .


עבור $a > 4$, $8 \cdot 2 - 2a - 8 = 2(4 - a) < 0$, $(2, 0)$ היא מקסימום.

עבור $a < 0$, $8 \cdot \frac{a}{2} - 2a - 8 = 2(a - 4) < 0$ ו- $\left(\frac{a}{2}, \frac{a-4}{a}\right)$ היא מינימום.

עבור $0 < a < 4$ הсимנים מתחלפים ו- $(2, 0)$ היא מינימום ו- $\left(\frac{a}{2}, \frac{a-4}{a}\right)$ היא מקסימום.

סעיף ג

- ג. לפניך שלושה גרפים אפשריים של הפונקציה $f(x)$, כל אחד עבור ערך אחר של a . כתוב מהו תחום הערכים של a המתאים לכל אחד מן הגрафים I-II. נמק את תשובה.




כאשר $a > 4$ נקודות הקיצון ב- $(2, 0)$ היא מקסימום כפי שモופיע בgraf I.

כאשר $a < 0$ הפונקציה מוגדרת כל ל- x כפי שモופיע בgraf II.

כאשר $0 < a < 4$ נקודות הקיצון ב- $(2, 0)$ היא מינימום, ויש אסימפטוטות ב- $x = \pm\sqrt{-a}$ כפי שモופיע בgraf III.

7.4 קיז תשע"ז מועד ב



- ג. מצא את שיעור ה- x של הנקודות A ו- B שעבורו אורך הקטע AB הוא מקסימלי.
(אפשר לפטור את הסעיף בלי למצוא את הפונקציה $f(x)$).

סעיף א

הgraf I מתאפס בנקודת C שםgraf II יש נקודת מקסימום. graf I מתאפס ב- $(0,0)$ שםgraf II יש נקודת מינימום. לכן, II הוא graf של $f(x)$ ו- I הוא graf של $f'(x)$.

סעיף ב

בנקודת פיתול הנגזרת השנייה מתאפסת:

$$\begin{aligned}f''(x) &= 1 \cdot (x + b)^3 + x \cdot 3(x + b)^2 = (x + b)^2(4x + b) \\f''(-1) &= (b - 1)^2(b - 4) = 0 \\b &= 4,\end{aligned}$$

כ噫 נתון $b > 1$.

סעיף ג

הערך המקסימלי יתקבל כאשר הנזרת של ההפרש מאפסת:

$$\begin{aligned}(f(x) - f'(x))' &= f'(x) - (x(x+4)^3)' \\&= x(x+4)^3 - (1 \cdot (x+4)^3) + x \cdot 3(x+4)^2 \\&= (x+4)^2(x^2 - 4) = 0.\end{aligned}$$

פתרונותם הם $x_D = 1 - \sqrt{5}$, $x_C = -4$ ו- $x = -2$.

הערך היחיד בתחום בין $x = -4$, $x = \pm 2$ הוא $x = -1.24$. נבדוק:

$$4 < -2 < 1 - \sqrt{5} = -1.24.$$

7.5 קיז תשע"ז מועד א

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}$$


- א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
- (2) מצא את נקודות החיתוך של גраф הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
- (3) מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f(x)$.
- (4) מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).
- ב. סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $f(x)$ בתחום $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$.
- ג. נתון: $0 < a < \frac{\pi}{2}$.
השטח המוגבל על ידי גраф הפונקציה $f(x)$, הישר $x = a$ וציר ה- x שווה ל-1.
מצא את a .

סעיף א

- (1) הפונקציה מוגדרת כאשר המכנה לא מתאפס, כאשר $\pi n \neq \frac{\pi}{2} \pm$.
- (2) נקודות החיתוך עם ציר ה- x הן כל הנקודות עבורן $\sin x = 0$ ו- 0 , שכן πn כאשר $x = 0, x = \pi, x = 2\pi, \dots$ והנקודה היא גם נקודת חיתוך עם ציר ה- y .
- (3) כאשר $\pi n \neq \frac{\pi}{2} \pm x$, הפונקציה לא מוגדרת כי המכנה מתאפס והמונה לא מתאפס, ולכן אין אסימפטוטות אנכיות. אין אסימפטוטה אופקית: ככל $|x|$ גדול, כל פעם שהוא מתקרב ל- $\pi n \pm \frac{\pi}{2}$, הפונקציה לא חסומה.
- (4)

$$f'(x) = \left(\frac{2 \cos x \cdot \cos^3 x - (2 \sin x \cdot 3 \cos^2 x \cdot -\sin x)}{\cos^6 x} \right) = \frac{2 \cos^2 x + 6 \sin^2 x}{\cos^4 x},$$

כאשר צימצמנו $\cos^2 x$ בתחום ההגדרה. כל הגורמים בביטוי חיוביים ולכן הפונקציה עולה בכל תחום ההגדרה.

סעיף ב**סעיף ג**

$$\int_0^a \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} dx = \cos^{-2} x \Big|_0^a = \frac{1}{\cos^2 a} - \frac{1}{1^2} = 1.$$

מכאן ש- $a = \frac{\pi}{4}$ והוא הפתרון היחיד בתחום $0 < a < \frac{\pi}{2}$, $\cos a = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

7.6 חורף תשע"ז

$$\text{נתונה הפונקציה: } f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}}, \quad a \text{ הוא פרמטר.}$$

עננה על הסעיפים א-ו עבור $x > a$. הבע את תשובותיך באמצעות a במידת הצורך.

- א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
- ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.
- ג. מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).
- ד. סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $f(x)$.
- ה. (1) רשם את האסימפטוטות המאונכות לצירים של גраф הנגזרת $(x')^f$.
- (2) סרטט סקיצה של גраф הנגזרת $(x')^f$.
- ו. מצא את ערך הביטוי:

$$\cdot \int_{2a}^{3a} f(x) dx + \int_{-3a}^{-2a} f(x) dx$$

עננה על סעיף ז' עבור $a = 0$.

- ז. (1) מצא את תחום ההגדרה של $f(x)$.
- (2) סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $f(x)$.

סעיף א'

הפונקציה לא מוגדרת כאשר המכנה מתאפס $a = \pm x$, או כאשר הביטוי בשורש שלילי $x > a, x < -a$ שהוא $|x| > a$.

סעיף ב'

המכנה תמיד חיובי אבל $-x$ במונח גורם להסימן של האסימפטוטות האכניות להיות תלויות בכוון ההתקשרות לנקודות בהן הפונקציה לא מוגדרת. כאשר $f(x) \rightarrow +\infty, x \rightarrow +a$, וכאשר $f(x) \rightarrow -\infty, x \rightarrow -a$.

$$\frac{\frac{x}{\sqrt{x^2}}}{\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}} = \frac{\frac{x}{|x|}}{\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}} = \pm 1.$$

האסימפטוטה האופקית היא $y = 1$ כאשר $x = a$ ו- $y = -1$ כאשר $x = -a$.

סעיף ג'


נבדוק את הסימן של הנגזרת הראשונה:

$$f'(x) = 1 \cdot (x^2 - a^2)^{-\frac{1}{2}} + x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) (x^2 - a^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x = \frac{-a^2}{(x^2 - a^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

המכנה חיובי והמונה שלילי, לכן הנגזרת שלילי והפונקציה יורדת בכל תחום ההגדרה שלה.


סעיף ד

יש לנו את האסימפטוטות מסעיף ב, ומסעיף ג אנו יודעים שהפונקציה תמיד יורדת. הגרף הוא:



סעיף ה

- (1) המכנה של $f'(x)$ מתאפסת כאשר $x = \pm a$ ולכן יש אסימפטוטות אנכיות ב- $x = \pm a$. כאשר $\infty \rightarrow x$, המכנה חיובי והמכנה שואפת ל- $+\infty$, ולכן יש אסימפטוטה אופקית ב- $y = 0$.
- (2) לפי סעיף ג הנגזרת תמיד שלילי ויש אסימפטוטות ב- $x = \pm a$. הגרף הוא:



סעיף ו


$$f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 - a^2} = -\frac{x}{x^2 - a^2} = -f(x).$$

הפונקציה אי-זוגית ולכן אינטגרציה של קטעים סימטריים מצדדי ציר ה- y מctrצמים והסכום = 0.


סעיף ז

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2}} = \frac{x}{|x|} = \pm 1 \quad (1)$$

$$(2)$$



7.7 קיז תשע"ו מועד ב



בສרטוט שלפניך מתואר גраф הפונקציה (x) .
הfonקציות (x) , $g'(x)$, $g''(x)$ מוגדרות לכל x השונה מ-0, ואין להן נקודות קיצון או נקודות פיתול.
הישר $0 = x$ הוא האסימפטוטה האנכית לכל אחד מן הגרפים של הפונקציות האלה.

- א. (1) סרטט סקיצה של גраф פונקציית הנגזרת (x) .
نمק את שיקולין.

- (2) סרטט סקיצה של גраф פונקציית הנגזרת השנייה (x) .
نمק את שיקולין.

נתון כי השטח המוגבל על ידי הגראף של פונקציית הנגזרת השנייה (x) על ידי ציר x ועל ידי הישרים $1 = x$ ו- $2 = x$ שווה ל- 5.25.
ב. הישר $1 = x$ חותך את הגראף של פונקציית הנגזרת (x) בנקודה A, והישר $2 = x$ חותך גראף זה בנקודה B.


מצא את ההפרש בין שיעור ה- y של הנקודה A ובין שיעור ה- y של הנקודה B. נמק.

ג. הביטוי $\frac{a}{x^3}$ מתאר אחת מן הפונקציות (x) , $g''(x)$, $g'(x)$, $g(x)$.
a הוא פרמטר גדול מ-0.

- (1) קבע איזו מן הפונקציות הביטוי מתאר. נמק את קביעתך.

- (2) מצא את הערך של a .

נוח לי להציג את כל שלושת הגרפים במערכת צירים אחת, למרות שאייפיון הגרפים יתברר רק במקרה פתרון השאלה. (x) : קו רגיל. $(x)'g$: קו מקווקו. $(x)''g$: קו מנוקד.




סעיף א

- (1) משמאלי לימין עבור ערכים שליליים של x , השיפוע של פונקציה שלילי וירדת תמיד ולכון הנגזרת תמיד שלילית. ערכה של הנגזרת מתחילה קרוב לאפס, יורדת לאט ואז יורדת מהר ושואפת $-\infty$. משמאלי לימין עבור ערכים חיוביים של x , השיפוע של פונקציה חיובי ויורדת תמיד ולכון הנגזרת חיובית. ערכה של הנגזרת מתחילה קרוב $+\infty$, יורדת מהר ואז יורדת לאט ושואפת 0.
- (2) משמאלי לימין עבור ערכים שליליים של x , הנגזרת הראשונה מתנהגות בדיק כמו הפונקציה, ולכון הגראף של הנגזרת השנייה דומה לגראף של הנגזרת הראשונה. משמאלי לימין עבור ערכים חיוביים של x , השיפוע של הנגזרת הראשונה שלילי ועולה תמיד ולכון הנגזרת השנייה שלילית. ערכה של הנגזרת השנייה מתחילה קרוב $-\infty$, עולה מהר ואז עולה לאט ושואפת 0.

סעיף ב

התרשים להלן מראה את $(g'(x), g''(x))$ עבור ערכים חיוביים. השטח המתוור מודגם.



чисוב השטח:

$$S = \int_1^2 -g''(x)dx = -g'(x)|_1^2 = g'(1) - g'(2) = 5.25.$$

אבל זה בדיק ההפרש בין ערך ה- y של נקודה A לבין ערך ה- y של נקודה B .

סעיף ג

- (1) הביטוי לא מותאפס ולכון לא יכול להיות $(x)g$. הביטוי חיובי עבור $0 < x$ ולכון לא יכול להיות $\frac{a}{x^3} \cdot g''(x)$. נשאר $g'(x) = \frac{a}{x^3}$. (2) מסעיף ב:

$$\begin{aligned} g'(1) - g'(2) &= 5.25 \\ \frac{a}{1^3} - \frac{a}{2^3} &= \frac{21}{4} \\ a &= \frac{8}{7} \cdot \frac{21}{4} = 6. \end{aligned}$$

7.8 קיז תשע"ו מועד א

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{ax^3 + 2ax}{\sqrt{x^4 + 4x^2 + 4}}$

א הוא פרמטר גדול מ-0.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. האם הפונקציה $f(x)$ היא זוגית או אי-זוגית? נמק.

ג. השטח, המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי ציר ה- x

ועל ידי הישרים $1 = x$ ו- $-1 = x$, שווה ל- 4.

מצא את הערך של a .

ד. נתון כי הפונקציה $f(x)$ מקיימת $f(g(x)) = g(f(x))$.

אחת מנקודות החיתוך בין הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ היא

נקודה שבה $x = 0$.

(1) הראה כי הפונקציה $f(x)$ מקיימת: $f(g(x)) = g(f(x))$.

(2) מצא את התחום שבו מתקיים $f(x) > g(x)$.

סעיף א

השאלה פשוטה יותר אם נשים לב ש:

$$f(x) = \frac{ax^3 + 2ax}{\sqrt{x^4 + 4x^2 + 4}} = \frac{ax(x^2 + 2)}{\sqrt{(x^2 + 2)^2}} = \frac{ax(x^2 + 2)}{x^2 + 2} = ax.$$

אנחנו משתמשים על העובדה $\sqrt{x^2 + 2} > x^2 + 2 > 0$ כך שניתן לחשב את השורש במכנה ולצמצם את השבר, בלי לשנות את התכונות של הפונקציה.
ברור ש- $f(x)$ מוגדרת לכל x .


סעיף ב

$x^2 + 2$ זוגית כך שהזוגיות תלויות רק בזוגיות של ax ו- $a(-x) = -(ax)$ והפונקציה אי-זוגית.

סעיף ג

כאן צריך להיזהר. **הaintgral** של פונקציה אי-זוגית בתחום הסימטרי בין k ו- $-k$ הוא אפס כי התרומה של הערכים החיוביים והשליליים מctratzim. אבל השטח בתחום על ידי תחום סימטרי כולל את השטח מתחת לציר ה- x והשטח מעל לציר ה- x . עברו פונקציה אי-זוגית, השטחים שווים.

$$S = 2 \int_0^1 ax dx = ax^2 \Big|_0^1 = a = 4.$$



סעיף ז'

$$(1) \quad g(x) = \int g'(x) dx = \int f(x) dx = \int ax dx = \frac{1}{2}ax^2 + c.$$

לפי הנתון על נקודות החיתוך:

$$f(0) = a \cdot 0 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot 0^2 + c = g(0),$$


$$\therefore g(x) = \frac{1}{2} \cdot 4x^2 + 0 = 2x^2 \text{. } \text{לכן } c = 0 \text{.}$$

(2)

$$\begin{aligned} f(x) & \stackrel{?}{>} g(x) \\ 4x & \stackrel{?}{>} 2x^2 \\ 2 & > x. \end{aligned}$$

אפשר לצמצם $f(0) = 0 \not> g(0) = 0$ כי $x = 0$ עבור $f(x) > g(x)$ שיליי ו- $f(x) \not> g(x)$ חיובי, וברור שה- $f(x) < 0, x < 0$. לכן התחום בו הוא $0 < x < 2$.

7.9 חורף תשע"ו



נתונות הפונקציות: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{3-x}}$

$g(x) = \frac{2x-3}{\sqrt{x(3-x)}}$
(ראה ציור).

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$, $g(x)$.
ואת תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים
של הפונקציה $f(x)$,
ואת האסימפטוטות המאונכות לצירים
של הפונקציה $g(x)$.

ב. מצא את השטח המוגבל על ידי הגרפים
של הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$, על ידי ציר x ועל ידי הישר $x = 1$.

ג. נתונות הפונקציות: $t(x) = \frac{2x-3}{\sqrt{x(3-x)}} + 2$, $h(x) = \frac{1}{\sqrt{3-x}} + 2$

S_1 הוא השטח המוגבל על ידי הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ ועל ידי הישר $x = 2.5$.

S_2 הוא השטח המוגבל על ידי הגרפים של הפונקציות $h(x)$ ו- $t(x)$ ועל ידי הישר $x = 2.5$.

האם השטח S_1 גדול מהשטח S_2 , קטן ממנו או שווה לו? נמק.

סעיף א

(1) $f(x)$: השורש לא שלילי לכן $3 \leq x$. המכנה לא אפס לכן $3 \neq x$. ביחיד $x < 3$.

כמו עבור $g(x)$, אבל x בשטרש לא יכול להיות אפס. כמו כן, עבור $0 < x$, בגלל $x-0 > 3-x$ אנו מקבלים $0 < x(3-x)$, והשורש לא מוגדר. תחום ההגדרה הוא $0 < x < 3$.


(2) אסימפטוטות אנכיות: $x = 3$ מאפס את המכנה של שתי הפונקציות, ו- $x = 0$ מאפס גם את $g(x)$. בכל אחד מהערכים האלה המונה לא מתאפס ולכן הם מגדירים אסימפטוטות.

אסימפטוטות אופקיות: שתי הפונקציות לא מוגדרות עבור $x > 3$ ולכן אין אסימפטוטות כאשר $x \rightarrow \infty$. כאשר $x \rightarrow -\infty$, $f(x) \rightarrow 0$, ולכן יש ל- $f(x)$ אסימפטוטה אופקית $y = 0$. הפונקציה $g(x)$ אינה מוגדרת עבור $x < 0$ ולכן אין אסימפטוטה כאשר $x \rightarrow -\infty$.

סעיף ב

שאלת זו ממש לא מוצאת חן בעני בלבד כמות חישובים הרבה!

השטח התחום גם על ידי ציר x וגם על ידי גרף מעט קשה לדמיון, אבל תרשימים גבולות השטח מסומנים בקו עבה, וברור שצריך להחשב בשני חלקים. אחד מ- $x = 1$ ועד לנקודת החיתוך של $g(x)$ עם ציר x , והשני, המשך עד לנקודת החיתוך של שתי הפונקציות.



נקודות החיתוך של $g(x)$ עם ציר ה- x : המכנה חיובי בתחום ההגדרה והמונה מתאפס כאשר $x = \frac{3}{2}$.
נחשב את נקודת החיתוך של שתי הפונקציות:

$$\frac{1}{\sqrt{3-x}} = \frac{2x-3}{\sqrt{x(3-x)}}.$$

בתחום ההגדרה, $x < 3$ חיוביים. נמצא $\sqrt{3-x} = x - \frac{9}{4}$ ונקבל $x = \frac{9}{4}$. נקודת החיתוך היא $(\frac{9}{4}, \frac{2}{\sqrt{3}})$.
נחשב את שני חלקיו השטח בנפרד (לא הבאתית את החישובים המינייגעים):

$$S_1 = \int_1^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{3-x}} - 0 \right) dx = -2\sqrt{3-x} \Big|_1^{\frac{3}{2}} = -2 \left(\sqrt{\frac{3}{2}} - \sqrt{2} \right) = 0.379$$

$$S_2 = \int_{\frac{3}{2}}^{\frac{9}{4}} \left(\frac{1}{\sqrt{3-x}} - \frac{2x-3}{\sqrt{x(3-x)}} \right) dx = -2 \left(\sqrt{3-x} - \sqrt{x(3-x)} \right) \Big|_{\frac{3}{2}}^{\frac{9}{4}} =$$

$$(-1.732 + 2.598) + (2.449 - 3) = 0.315$$

$$S = 0.379 + 0.315 = 0.694.$$

סעיף ג

בניגוד לשאלת בסעיף ב, כאן הצירם לא תוחמים את השטח. השטח מחושב על ידי ההפרש בערכי הפונקציות, ולכן הוספות קבועות לפונקציות מצטמצם וערך השטח לא משתנה.

7.10 קיז תשע"ה מועד ב

$$\text{נתונה פונקציית הנגזרת } f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$$

הישר $y = \frac{1}{3}x + 3$ חותך את הגרף של הפונקציה $f(x)$ בנקודת שבה $x = 0$.
א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

- ב. (1) מהו תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת $(x)f'$ ושל הפונקציה $(x)f$?
 (2) מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של פונקציית הנגזרת $(x)f'$.
 (3) מצא את נקודות החיתוך של גרף פונקציית הנגזרת $(x)f'$ עם הצירים (אם יש כאלה).
 (4) מצא את תחומי העליה והירידה של פונקציית הנגזרת $(x)f'$ (אם יש כאלה).
 (5) סרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $(x)f'$.

ג. נתונות שתי משוואות, I ו- II :
 $\text{II. } \sqrt{x^2 + 9} = k$, I. $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}} = k$
 $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}$.
 הוסף לסקיצה שרטטת בתת-סעיף ב (5) סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
 נתון כי $k > 0$.

מצא את תחום הערכים של k שעבורם
 אין פתרון למשוואת I וגם אין פתרון למשוואת II.

סעיף א

$$f(x) = \int f'(x)dx = \int \frac{1}{2}(x^2 + 9)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x dx = (x^2 + 9)^{\frac{1}{2}} + c.$$

לפי הנתון, $3 = \sqrt{0^2 + 9}$, ולכן $c = 0$.

סעיף ב

- (1) $x^2 + 9$ חיובי עבור כל x ולכן $f'(x) = \frac{1}{2}(x^2 + 9)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x$ מוגדרות עבור כל x .
 (2) $f'(x) = \frac{1}{2}(x^2 + 9)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x$ איז אסימפטוטות אנכיות.

$$\frac{\frac{x}{|x|}}{\sqrt{1 + \frac{9}{x^2}}} \xrightarrow{\pm\infty} \pm 1,$$

לכן $y = 1$ היא אסימפטוטה אופקית כאשר $x \rightarrow +\infty$ ו- $y = -1$ היא אסימפטוטה אופקית כאשר $x \rightarrow -\infty$.

- (3) על ידי הצבה של $x = 0$ יש נקודת חיתוך ב- $(0, 0)$.
 המכנה חיובי שכן $0 = x$ רק אם $0 = x$ וכבר קיבלנו נקודת חיתוך זו.


(4)

$$f''(x) = \frac{1 \cdot \sqrt{x^2 + 9} - x \cdot \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 9}} \cdot 2x}{x^2 + 9} = \frac{9}{(x^2 + 9)\sqrt{x^2 + 9}}.$$

הנגזרת השנייה תמיד חיובי ולכן הנגזרת הראשונה עולה בכל התחומים.

(5, 6) $f(x)$ היא פרבולה עם נקודת מינימום ב- $(0, 3)$.

לפי (3) ל- $f'(x)$ יש נקודת חיתוך ב- $(0, 0)$. לפי (2) יש אסימפטוטות ב- $x = \pm 1$ כאשר השאיפה היא $x \rightarrow -\infty$, והשאיפה היא $x \rightarrow +\infty$, ועבור $x \rightarrow -1$ עבור $x \rightarrow +1$.



סעיף ג

הערך הקטן ביותר של $\sqrt{x^2 + 9}$ הוא 3, ולכן אין פתרון למשוואה II כאשר $3 < k < 0$. זה ברור גם מהגרף כי $(0, 3)$ היא נקודת מינימום של $f(x)$.

מהגרף של $f'(x)$ ברור שאין פתרון למשוואה I כאשר $1 \leq k \geq 1$. אפשר גם בחישוב:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{x^2 + 9} &= k^2 \\ x &= \frac{3k}{\sqrt{1 - k^2}}. \end{aligned}$$

כדי שניתנו להוציא שורש חייב להתקיים $k < 1$, ולכן אין פתרון כאשר $1 \leq k \leq 1$. שימוש לב שהשאלה בקישה את התחומים בו אין פתרון ל- I וגם ל- II . צירוף שתי התוצאות נותן שאין פתרון לשתי המשוואות כאשר $3 < k < 1$.

7.11 קיז תשע"ה מועד א

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{(x+2)^2}{(x-1)^3}$$

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

(3) מצא את נקודות החיתוך של גורף הפונקציה עם הצירים.

(4) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגן.

(5) סרטט סקיצה של גורף הפונקציה.

ב. לפונקציה $f(x)$ יש שתי נקודות פיתול בלבד.

על סמך הגורף של הפונקציה $f(x)$, ציין באיזה תחום נמצאת כל אחת מן נקודות אלה.

ג. האם השטח, המוגבל על ידי גורף הפונקציה $f(x)$ ועל ידי הצירים,

גדול מ-4, קטן מ-4 או שווה לו? נמק.

סעיף א

(1) הפונקציה לא מוגדרת כאשר המכנה מתאפס ב- $x = -1$. תחום ההגדרה הוא $x \neq -1$.

(2) כאשר $x = 1$ המכנה מתאפס אבל המונה לא מתאפס, לכן $x = 1$ היא אסימפטוטה אנכית.

$$\begin{array}{c} \frac{x^2}{x^3} + \frac{4x}{x^3} + \frac{4}{x^3} \\ \hline \frac{x^3}{x^3} - \frac{3x^2}{x^3} + \frac{3x}{x^3} - \frac{1}{x^3} \end{array} \xrightarrow{\pm\infty} 0.$$

לכן יש אסימפטוטה אופקית ב- $y = 0$.

$$(3) \text{ כאשר } y = \frac{4}{-1} = -4, x = 0.$$

כדי ש- $y = 0$, $x = -2$, $(x+2)^2 = 0$,

נקודות החיתוך הן $(0, -4), (-2, 0)$.

(4)

$$f'(x) = \frac{2(x+2)(x-1)^3 - (x+2)^2 \cdot 3(x-1)^2}{(x-1)^6} = -\frac{(x+2)(x+8)}{(x-1)^6}.$$


המכנה לא מתאפס בתחום ההגדרה, לכן נקודות הקיצון הן $(-2, 0), \left(-8, -\frac{4}{81}\right)$.

המכנה חיובי ולכן סימן הנגזרת השנייה היא סימן הנגזרת של המונה (−).

< 0 ולבן $-2(-2+5) < 0$ היא מקסימום.

$$\left(-8, -\frac{4}{81}\right) \text{ היא מינימום.}$$

(5) לא ניתן לראות את כל המידע החשוב בגרף בקנה מידה אמיתית. הבהיר שני גרפים, אחד מימין לציר ה- y מהראה את האסימפטוטות, ואחד משמאלו לציר ה- x המראה את נקודות הקיצון.



סעיף ב

בין $-\infty$ ל- -8 , השיפוע יורד ואז עולה ויש נקודת פיתול. בין -2 ל- 0 , השיפוע עולה ואז יורד ויש נקודת פיתול.

סעיף ג

הקו בין $(-2, 0)$ לבין $(0, -4)$ תוחם משולש (ישר זווית) שטחו $4 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4$. הגרף נמצא מעלcko לכן השטח שהוא תוחם פחות מ-4.

בגלל קנה המידה בתרשים קשה לראות שהגרף תמיד מעלה לקו המכווקו, אז נבדוק בחישוב. ב- $x = -1$, $f(-1) = -\frac{1}{8} = -0.125$. לפי מושלים דומים, $x = -1$ חוצה את הבסיס ולכן הנקודה על היתר של המשולש היא $(-2, -0.125)$. הגרף מעלה לקו כי $-0.125 > -2$.

7.12 חורף תשע"ה

$$f(x) = \sqrt{\frac{x}{1+x^2}}$$

נתונות הפונקציות:

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{3x^2 + 2}}$$

א. מצא עבור כל אחת מהפונקציות:

(1) את תחום ההגדרה.

(2) את האסימפטוטות המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

(3) את השיעורים של נקודות הקיצון (אם יש כאלה), וקבע את סוגן.

ב. סרטט במערכת צירים אחת סקיצה של גוף הפונקציה $f(x)$

וסקיצה של גוף הפונקציה $g(x)$, אם ידוע כי הפונקציות נחתכות בנקודה אחת בלבד.

ג. נתונה הפונקציה $h(x) = g(x) - k$.

עבור אילו ערכים של k אין לפונקציה $h(x)$ נקודות חיתוך עם הפונקציה $f(x)$? נמק.

סעיף א

- (1) המכנה של שתי הפונקציות חיובי, ולכן $f(x) = g(x) = \sqrt{\frac{x}{1+x^2}}$ לא מוגדרת עבור $x < 0$ בגלל ה- x במונה, כך שתחום ההגדרה הוא $x \geq 0$.
(2) אין אסימפטוטות אנכיות כי כל אחת מהפונקציות מוגדרת בכל התחומים שלה.

$$\sqrt{\frac{\frac{x}{x^2}}{\frac{1}{x^2} + 1}} \xrightarrow{+∞} 0,$$

ולכן $y = 0$ היא אסימפטוטה אופקית.

כאשר $\xrightarrow{±∞} x$, המכנה של $g(x)$ שהוא חיובי שואף ל- $+\infty$, ולכן $y = 0$ היא אסימפטוטה אופקית.

(3)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2} \left(\frac{x}{1+x^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{1 \cdot (1+x^2) - x \cdot (2x)}{x} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{1-x^2}{\left(\frac{x}{1+x^2} \right)^{\frac{3}{2}}}. \end{aligned}$$


המכנה חיובי שכן הנזරת מתאפשרת כאשר המונה מתאפשר $x = \pm 1$.
 $x < 0$ ולכן נקודת הקיצון היחיד היא $(1, \sqrt{\frac{1}{2}})$. הסימן של הנזירת השנייה הוא הסימן של הנזירת של המונה של $f'(x)$: $\frac{1}{2} \cdot (-2x) = -x$.

הנגזרת הראשונה היא:

$$g'(x) = -\frac{1}{2} \left(3x^2 + 2\right)^{-\frac{3}{2}} \cdot 6x$$

המכנה חיובי שכן הנגזרת מתאפסת כאשר $x = 0$. נקודת הקיצון היא $\left(1, \sqrt{\frac{1}{2}}\right)$. הנגזרת של המונה היא $0 < -3$, ונקודות הקיצון היא מקסימום.

סעיף ב



ההערה "אם ידוע כי הפונקציות תחתכות בנקודת אחת בלבד" הייתה לי די מוזרה, אבל לאחר מחשבה הבנתי שההערה באה למנוע אפשרות של חיתוך כאשר $x > 1$ וושאך לאינסוף. רציתי להשתכנע שאכן ההערה נכונה. כאשר משווים $f(x) = g(x)$ ומפשיטים, מקבלים פולינום ממעלה שלישי:

$$3x^3 - x^2 + 2x - 1 = 0.$$

לא התרשם לי לחפש את הנוסחה (המסובכת) למציאת פתרונות למשוואות ממעלה שלישי, אבל לבסוף שמתי לב שם אם $1 > x$ אז $3x^3 - x^2 + 2x - 1 > 0$, ולכן לא יכול להיות פתרונות נוספים.

סעיף ג

הערך המינימלי של $f(x)$ הוא 0 , והערך המקסימלי של $g(x)$ הוא $\sqrt{\frac{1}{2}}$. אם $k > \sqrt{\frac{1}{2}}$ לא יהיו נקודות חיתוך בין שתי הפונקציות.

7.13 קיז תשע"ד מועד ב

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{(x-2)^2}{x^2 - 1}$$

- א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
 (2) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המקבילות לציר.
 (3) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
 (4) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגם.
- ב. רק על פי סעיף א, סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
- ג. רק על פי הסקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ שרטט, מצא את התחום שבו מתקיים:
 פונקציית הנגזרת $f'(x)$ שלילית ופונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$ חיובית.
 נמק.

סעיף א

- (1) הפונקציה לא מוגדרת כאשר המכנה מתאפס $x = \pm 1$.
 (2) האסימפטוטות האנכיות הן במקומות שבהפונקציה לא מוגדרת $x = \pm 1$.
 חישוב האסימפטוטה האופקית:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 - \frac{4}{x} + \frac{4}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{1} = 1.$$

- (3) כאשר $y = -4, x = 0$.
 כאשר $x = 2$ המונה מתאפס והמכנה לא מתאפס.
 נקודות החיתוך הן $(2, 0), (0, -4)$.
 (4) חישוב הנגזרת הראשונה:

$$f'(x) = \frac{2(x-2)(x^2-1) - (x-2)^2 \cdot 2x}{(x^2-1)^2} = \frac{2(2x^2-5x+2)}{(x^2-1)^2}.$$

המכנה חיובי בתחום ההגדרה ולכן נקודות הקיצון הן הפתרונות של:


$$2x^2 - 5x + 2 = (2x-1)(x-2) = 0.$$

המכנה חיובי ולכן סימן הנגזרת השנייה הוא הסימן של המונה של הנגזרת הראשונה
 $2(4x-5)$. ביטוי זה חיובי עבור $x = 2$, ושלילי עבור $x = \frac{1}{2}$. נקודות הקיצון הן:

$$(2, 0), \text{ מינימום} \quad \left(\frac{1}{2}, -3\right) \text{ מקסימום}.$$

סעיף ב

בסעיפים הקודמים חישבנו את האסימפטוטות, נקודות החיתוך עם הצירים ונקודות הקיצון. מידע זה מספיק לצירר תרשימים עבור $-1 < x$. עבור $-1 < x$ נבדוק אם הגרף מעלה לאסימפטוטה האופקית או מתחתיה. $f(-2) = \frac{16}{3}$ ולכן הגרף מעלה לאסימפטוטה.



סעיף ג

כדי שהנגזרת הראשונה תהיה שלילית, הפונקציה צריכה לרדת:

$$\frac{1}{2} < x < 1, 1 < x < 2.$$

כדי שהנגזרת השנייה תהיה חיובית, הנגזרת הראשונה חייב לעלות:

$$x < -1, -1 < x < \frac{1}{2}, 1 < x < x_1,$$

כאשר x_1 היא נקודת הפיתול אי-שם מימין ל-2.

החותוך בין שני התחומים הוא $1 < x < 2$.

7.14 קיז תשע"ד מועד א

נתונה הפונקציה $f(x) = \sqrt{ax^2 + 9}$. a הוא פרמטר גדול מ-0.

- א. (1) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?
 (2) הראה כי לפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.
- ב. (1) מהו תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת $(x)f'$?
 (2) הבן באמצעות a את האסימפטוטות האופקיות של פונקציית הנגזרת $(x)f'$.
 (3) מצא תחומי עלייה וירידה של פונקציית הנגזרת $(x)f'$ (אם יש כאלה).
 (4) סרטט סキיצה של גרף פונקציית הנגזרת $(x)f'$.
- ג. השטח, המוגבל על ידי הגраф של פונקציית הנגזרת $(x)f'$, על ידי ציר ה- x ועל ידי הישר $x = -4$, שווה ל-2.

בלי לחשב את הערך של a , חשב את הערך המספרי של $f(-4)$ ואות הערך המספרי של $f(4)$.

סעיף א

- (1) הפונקציה לא מוגדר כאשר $0 \leq ax^2 + 9 < a$. נתון $a > 0$ אז הביטוי תמיד גדול מאפס והפונקציה מוגדרת עבור כל x .
 (2) נחשב את הנגזרת הראשונה והנגזרת השנייה:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2}(ax^2 + 9)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2ax = \frac{ax}{\sqrt{ax^2 + 9}} \\ f''(x) &= \frac{a\sqrt{ax^2 + 9} - ax \cdot \frac{ax}{\sqrt{ax^2 + 9}}}{ax^2 + 9} \\ &= \frac{9a}{(ax^2 + 9)\sqrt{ax^2 + 9}}. \end{aligned}$$

(א) הנגזרת השנייה מוגדרת לכל x , ו-(ב) גם המונה וגם המכנה חיוביים, ולכן הנגזרת השנייה לא מתאפסת. המשקנה היא שאין נקודות פיתול.


סעיף ב

- (1) $f'(x) = \frac{ax}{\sqrt{ax^2 + 9}}$ מוגדרת כאשר $0 < ax^2 + 9$, ולכן היא מוגדרת לכל x בבדיקה כמו $x = \sqrt{\frac{9}{a}}$
 (2) נחלק את המונה והמכנה ב- $\sqrt{x^2}$:

$$f'(x) = \frac{\frac{ax}{|x|}}{\sqrt{a + \frac{9}{x^2}}} \xrightarrow{\pm\infty} \pm\sqrt{a}.$$

(3) ראיינו בסעיף א שהנגזרת השנייה תמיד חיובית ולכן הנגזרת הראשונה תמיד עולה.

(4)



סעיף ג

הaintגרל של הנגזרת של פונקציה הוא הפונקציה עצמה.

$$\int_{-4}^0 0 - f'(x) dx = - \int_{-4}^0 f'(x) dx = -f(x)|_{-4}^0 = -f(0) + f(-4) = 2.$$

קל לחשב ש $f(-4) = \sqrt{16a+9}$ ו $f(0) = \sqrt{9} = 3$. הפתויו הוא לחשב את הערך של a אבל השאלה דורשת את הערך של $f(-4)$ בלי לחשב את הערך של a . החישוב אפילו קל יותר:

$$f(-4) = 2 + f(0) = 2 + 3 = 5.$$

הפונקציה זוגית, לכן $f(4) = f(-4) = 5$

מי שמעוניין יכול לחשב את ערכו של a :

$$\begin{aligned} \sqrt{16a+9} &= 2 + 3 \\ a &= 1. \end{aligned}$$

7.15 חורף תשע"ד

במשולש שווה-שוקיים $\triangle ABC$ ($AB = AC$) אורך השוק הוא b .


BD הוא גובה לשוק AC . DE הוא אנך לבסיס BC .

סמן $2x = \angle BAC$, ומצא מה צריך להיות הגודל של $\angle BAC$,

כדי שאורך האנך DE יהיה מקסימלי.

בתשובתך דיקUD שתיקודן נקבעה העשויות.

בבחינה זו היו שלוש שאלות בפרק השני לנוכח השאלה הוא 8 ולא 7.



נבדק את סימון הזווית בתרשים. זווית הבסיס $\angle ACB, \angle ABC$ של המשולש שווה-שוקיים הן:

$$\frac{180 - 2x}{2} = 90 - x.$$

במשולש ישר-זווית $\triangle BDC$ $\angle DBC = 90 - (90 - x) = x$.

במבחן הראשון נראה שאפשר למצוא את הערך המקסימלי של $DE = e$ על ידי מציאת הנגזרת $e' = d(\sin x)' = d \cos x$. אבל זה לא נכון כי d קבוע ולכן אי אפשר להוציאו מתוך הנגזרת. נתון ש- b קבוע, כך שעליינו למצואו ביטוי מחרורה $e = b \cdot f(x)$.

את החישוב נבע בצע בשני שלבים, תחילת נבטא את e כפוקציה של x, d , ואח"כ נבטא את d כפונקציה של b, x . אפשר להשתמש בחוק הסינוסים, אבל פשוט יותר להשתמש בהגדרת הפונקציות $\triangle BED, \triangle BDA$ הטריגונומטריות במשולשים ישר-זווית

$$e = d \sin x$$

$$d = b \sin 2x$$

$$e = (b \sin 2x) \sin x$$

$$= b(2 \sin x \cos x) \sin x = 2b \sin^2 x \cos x$$

$$\begin{aligned} e' &= 2b(2 \sin x \cos x \cos x + \sin^2 x \cdot (-\sin x)) \\ &= 2b \sin x (2 \cos^2 x - \sin^2 x) = 0. \end{aligned}$$


הנגזרת מתאפסת אם $\sin x = 0$, $x = 180^\circ$ כי אין יכולים להיות זוויות במשולש. הנגזרת גם מתאפסת אם:

$$\begin{aligned} 2 \cos^2 x - \sin^2 x &= 0 \\ \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^2 &= 2 \\ \tan x &= \pm\sqrt{2} \\ x &= 54.74^\circ, 125.26^\circ. \end{aligned}$$

אבל $x = 2x = 54.74^\circ$ והוא הפתרון האפשרי היחיד.
השאלה מבקשת את ערכו של זוויות $\angle BAC = 109.47^\circ$.

פרק 8 חדו"א שאלה 8

8.1 קיז תשע"ח מועד ב



בציר שלפניך מתואר גраф הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x^2}$ בתחום $x > 0$ ומלבן ששתים מצלעותיו נמצאות על הצירים והוא נמצא בריבוע הראשוני. נתון: שטח המלבן הוא 4.


נסמן ב- a את אורך צלע המלבן שנמצאת על ציר ה- x . נתון: $a \geq \frac{1}{4}$.

א. הבע באמצעות a את השטח המוגבל על ידי הצירים,

על ידי צלעות המלבן ועל ידי גраф הפונקציה $f(x)$

(השטח המוקוקו בציור).

ב. עבור איזה ערך של a השטח שמצוות בסעיף א הוא מקסימלי?



סעיף א

נתון שהשטח של המלבן הוא 4 ולכן הצלע האנכית שלו הוא $\frac{4}{a}$. נסמן ב- X נקודת על ציר ה- x , ונסמן את האורך בין X למרכז הצירים ב- a' . לפי ההגדרה של הפונקציה $f(a') = \frac{1}{(a')^2} = \frac{4}{a}$ ו- $a' = \frac{\sqrt{a}}{2} \cdot a$. נחשב את השטח המבוקש כסכום השטח של המלבן עד הנקודה X והשטח מתחת לפונקציה מ- X ועד $x = a$:

$$\begin{aligned} S &= \frac{4}{a} \cdot \frac{\sqrt{a}}{2} + \int_{\frac{\sqrt{a}}{2}}^a \frac{1}{x^2} dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{a}} + (-1) \cdot x^{-1} \Big|_{\frac{\sqrt{a}}{2}}^a \\ &= \frac{2}{\sqrt{a}} - \frac{1}{a} + \frac{1}{\frac{\sqrt{a}}{2}} = \frac{4\sqrt{a} - 1}{a}. \end{aligned}$$


סעיף ב

ברור ש- $S = \frac{4\sqrt{a}-1}{a}$ יורדת בעיקביות ככל ש- a עולה, لكن הערך המקסימלי צריך להיות בערך הקטן ביותר של התחום הנתון $a = \frac{1}{4}$. אם רוצים ניתן לחשב את הנגזרת הראשונה:

$$\left(\frac{4\sqrt{a}-1}{a} \right)' = \frac{\left(4 \cdot \frac{1}{2} \cdot a^{-\frac{1}{2}} \cdot a \right) - ((4\sqrt{a}-1) \cdot 1)}{a^2} = \frac{-2\sqrt{a}+1}{a^2},$$

שمتאפסת ב- $a = \frac{1}{4}$

8.2 קיז תשע"ח מועד א



הוא ריבוע שאורך צלעו 6 ס"מ.
K ו-L הן נקודות על הצלע AB.


נתון כי הישרים CK ו-DL חותכים זה את זה בנקודה E, הנמצאת מחוץ לריבוע ABCD (ראה ציר).

נסמן: $LK = x$.

א. הבע באמצעות x את גובה המשולש KLE.

ב. עבור أيיה ערך של x סכום שטחי המשולשים ADL, BCK ו-CKE הוא מינימלי? נמק.

תוכל להשאיר שורש בתשובתך.



סעיף א

לאחר שנשלים סימונים בתרשימים, אנו רואים שה- $DC \parallel LK$. $\triangle CDE \sim \triangle KLE$ כי $DC \parallel LK$. בנוסף, נשים לב שהגובה של $\triangle CDE$ הוא $6 + h$. לכן:

$$\begin{aligned} \frac{h}{x} &= \frac{h+6}{6} \\ h &= \frac{6x}{6-x}. \end{aligned}$$

סעיף ב

נחשב את שטוש שלושת השטחים:

$$\begin{aligned} S_{\triangle KLE} &= \frac{1}{2} \cdot x \cdot h = \frac{1}{2} \cdot x \cdot \frac{6x}{6-x} \\ S_{\triangle ADL} &= \frac{1}{2} \cdot AL \cdot 6 \\ S_{\triangle BCK} &= \frac{1}{2} \cdot BK \cdot 6. \end{aligned}$$

המצב נראה אבוד כי AL, BK לא ידועים ואין נתונים עליהם. אבל, נשים לב ש- AB הוא צלע של הריבוע ולכן x . לכן סכום השטחים המשולשים הוא:

$$\begin{aligned} S = S_{\triangle KLE} + S_{\triangle ADL} + S_{\triangle BCK} &= \frac{1}{2} \cdot x \cdot \frac{6x}{6-x} + \frac{1}{2} \cdot (6-x) \cdot 6 \\ &= 6 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2(x^2 - 6x + 18)}{6-x} \right). \end{aligned}$$

נחשב את נגזרת הראשונה (ללא הקבועים 2, $\frac{1}{2}$, 6):

$$\begin{aligned} S' &= \frac{(2x-6)(6-x) - (x^2 - 6x + 18)(-1)}{(6-x)^2} \\ &= \frac{-x^2 + 12x - 18}{(6-x)^2}. \end{aligned}$$

המכנה חיובי ולכן המונה מתאפס בעבר:

$$x = \frac{-12 \pm \sqrt{144 - 4 \cdot 18}}{-2} = 6 \mp 3\sqrt{2}.$$

הערך $6 - 3\sqrt{2} < 6 + 3\sqrt{2}$ אינו פתרון כי LK הוא קטע של צלע שאורכו 6. נקודת הקיצון היא $6 - 3\sqrt{2}$. המכנה של S' חיובי ולכן הסימן של הנגזרת השנייה יהיה הסימן של המונה של S' בעבר נקודת הקיצון. הנגזרת היא $-2x + 12$. עבור נקודת הקיצון:

$$-2(6 - 3\sqrt{2}) + 12 = 6\sqrt{2} > 0,$$

והנקודת הקיצון היא מינימום.

8.3 חורף תשע"ח

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{1}{x^3}.$$

העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = t$.

נתון: $1 \leq t \leq 5$.

המשיק חותך את ציר ה- x בנקודה A ואת ציר ה- y בנקודה B . הנקודה O היא ראשית הצירים.

a. מצא את שיעור ה- x של נקודת ההשקה שעבורו סכום ניצבי המשולש AOB הוא מינימלי.


b. מצא את שיעור ה- x של נקודת ההשקה שעבורו סכום ניצבי המשולש AOB הוא מקסימלי.

אני מודה שהסתובכתי כאן בಗלל שלא תירגali מזמן את המשוואה לeko ישר. נדמה לי, שזו הפעם היחידה שהמשוואה נדרשת בכל הבדיקות הללו.

סעיף א

ערך הפונקציה חיובית עבור ערכי x חיוביים, ולכן המשיק נמצא בربיע הראשון.

(הערכים בציר ה- y בתရשים הוכפלו פי שמונה כדי לאפשר הצגת תרשימים ברורים.)



הנגזרת של הפונקציה היא $f'(x) = \frac{-3}{x^4}$ לכןeko המשיק לגרף הפונקציה הוא:

$$y - \frac{1}{t^3} = \frac{-3}{t^4}(x - t).$$

נחשב את הנקודות על הצירים:

$$0 - \frac{1}{t^3} = \frac{-3}{t^4}(x_A - t)$$

$$x_A = \frac{t}{3} + t = \frac{4t}{3}$$

$$y_B - \frac{1}{t^3} = \frac{-3}{t^4}(0 - t)$$

$$y_B = \frac{1}{t^3} + \frac{3}{t^3} = \frac{4}{t^3}.$$

השאלה מבקשת את נקודת הקיצון של:

$$g(t) = x_A + x_B = \frac{4t}{3} + \frac{4}{t^3}.$$

הנגזרת הראשונה והנגזרת השנייה הן:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{4}{3} + \frac{-12}{t^4} \\ g''(x) &= \frac{48}{t^5}. \end{aligned}$$

הנחשב את t כאשר הנגזרת הראשונה מתאפסת:

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{4}{3} + \frac{-12}{t^4} = 0 \\ t^4 &= \frac{3}{4} \cdot 12 = 9 \\ t &= \pm\sqrt{3}. \end{aligned}$$

נתון ש- $t > 0$ ולכן נקודת הקיצון היא $t = \sqrt{3}$. הנגזרת השנייה חיובית עבור כל $t > 0$ ולכן נקודת הקיצון היא מינימום.

סעיף ב

אם יש רק נקודת קיצון פנימית אחת שהיא מינימום, אז המקסים חייב להיות בקצה התוחום.

$$\begin{aligned} g(1) &= \frac{4 \cdot 1}{3} + \frac{4}{1^3} = \frac{16}{3} \\ g(5) &= \frac{4 \cdot 5}{3} + \frac{4}{5^3} = \frac{20}{3} + \frac{4}{125}. \end{aligned}$$

ברור ש- $t = 5$ ולכן המקסים הוא ב-

8.4 קיז' תשע"ז מועד ב


(x) היא פונקציה המוגדרת לכל x .

גרף הפונקציה (x) חותך את ציר ה- y בחלקו השילי.

נקודות החיתוך היחידה של גרף הפונקציה (x) עם ציר ה- x היא $(0, \frac{\pi}{2})$ (ראה ציור).

נתון: השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה (x), על ידי הצירים ועל ידי הישר $x = 2\pi$

(השטח האפור בציור) שווה ל- $16 + 10\pi^2$.



$$\text{נתון גם: } \int_0^{2\pi} f(x) dx = 8\pi^2$$

. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה (x) ועל ידי הצירים

(השטח S_1 המסומן בציור).

. $F(0) = 0$ היא פונקציה קדומה לפונקציה (x). נתון:

$$\text{ב. } F(\frac{\pi}{2})$$

נתון: $f'(x) = 8 \sin x + 8$

ג. מצא את (x).

בשאלה זו צריך לשים לב להבדל בין חישוב אינטגרל של פונקציה ובין השימוש באינטגרל לחישוב שטח. בתרשים בשאלה, אם מחשבים אינטגרל מ-0 ל- $\pi/2$, הערכים השיליליים עד $\frac{\pi}{2}$ "מורדים" מערך האינטגרל. כאשר מחשבים את השטח $S_1 + S_2$ התרומה של S_1 חיובית ויש לחשב את האינטגרל של השילילה של הפונקציה.

סעיף א

הערך של (x) שלילי בין 0 ל- $\frac{\pi}{2}$ ולכן:

$$S_1 + S_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} -f(x) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} f(x) dx = 10\pi^2 + 16.$$

נתון ש:

$$-S_1 + S_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} f(x) dx = \int_0^{2\pi} f(x) dx = 8\pi^2.$$

נחסיר את המשוואה השנייה מהראשונה ונקבל:

$$S_1 = \pi^2 + 8.$$

סעיף ב

$$-S_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = F\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F(0) = F\left(\frac{\pi}{2}\right) = -(\pi^2 + 8).$$

סעיף ג

$$\text{נתון } f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int (8 \sin x + 8) dx$$


$$= -8 \cos x + 8x + c$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -8 \cos \frac{\pi}{2} + 8 \cdot \frac{\pi}{2} + c = 0$$

$$c = -4\pi$$

$$f(x) = -8 \cos x + 8x - 4\pi.$$

8.5 קיז תשע"ז מועד א



בציר שלפניך מתואר גרף הפונקציה $f(x) = -x^2 + 2x + c$ בתחומי האיליות שלה.

ו B הן נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר x .

$$\text{נתון: } (t > 0) \quad x_B = 2t, \quad x_A = -t$$

א. מצא את t ואת c .

M היא נקודת החיתוך של ציר הסימטריה של הפרבולה עם ציר x .

K היא נקודה כלשהי על גרף הפונקציה $f(x)$ מעל לציר x .

מהנקודה K הורידו אנך לציר x , החותך את הקטע AB בנקודה L .

ב. מצא עבור אילו שיעורי x של הנקודה K שטח המשולש KLM הוא מקסימלי.

מצא את שני הפתרונות האפשריים.

תוכל להשאיר שורש בתשובה.

סעיף א

נציב את הביטויים הנתונים עבור A, B ונקבל שתי משוואת בשני נעלמים c, t שנוכל לפתור:

$$\begin{aligned} -(2t)^2 + 2(2t) + c &= 0 \\ -(-t)^2 + 2(-t) + c &= 0 \\ t(6t - 3) &= 0 \\ t &= 2. \end{aligned}$$

פסלנו את הפתרון $t = 0$ כי נתון $t > 0$. נחשב את c :

$$\begin{aligned} -(-2)^2 + 2(-2) + c &= 0 \\ c &= 8. \end{aligned}$$

הfonקציה היא $f(x) = -x^2 + 2x + 8$

סעיף ב

נקודות החיתוך של ציר הסימטריה של הפרבולה עם הפונקציה היא נקודת המקסימום של $f(x) = -x^2 + 2x + 8$. מהנגזרת הראשונה $f'(x) = -2x + 2 = 0$ מתקבל $x = 1$.

הקודקודים של $\triangle KLM$ הם:

$$\begin{aligned} M &= (1, 8) \\ L &= (x, 0) \\ K &= (x, -x^2 + 2x + 8). \end{aligned}$$

השטח של $\triangle KLM$ הוא:

$$S(x) = \frac{1}{2}(x-1)(-x^2 + 2x + 8),$$

והגזרת הראשונה היא:

$$\begin{aligned} S'(x) &= \frac{1}{2} \cdot -3x^2 + 6x + 6 \\ &= -\frac{3}{2} \cdot (x^2 - 2x - 2). \end{aligned}$$

הנגזרת מתאפסת ב:

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 4 \cdot 2}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

השיטחים מקסימליים כי חישוב הנגזרת השנייה נותנים:

$$\begin{aligned} S''(x) &= -3(x-1) \\ S''(1 + \sqrt{3}) &= -\sqrt{3} < 0. \end{aligned}$$

הפתרונות $1 + \sqrt{3}$ ו- $1 - \sqrt{3}$ מותאים למשולש בתרשימים.

הפתרונות $1 - \sqrt{3}$ מותאים למשולש הסימטרי משמאלו ל- M . אורך הבסיס יהיה $x - 1$, הסימנים יתהפך ונקבל שטח חיובי ומקסימלי.

פתרונות אחרים משתמשים במונח "קודקוד הפרבולה". לא נתקלתי בו בספרי לימוד או בבחינות אחרות. עבור פרבולה $ax^2 + bx + c$ ערך ה- x של הקודקוד הוא $\frac{-b}{2a}$. אין צורך לזכור את הנוסחה כי ניתן לשחזר אותה על ידי חישוב הנגזרת:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$f'(x) = 2ax + b = 0$$

$$x = \frac{-b}{2a}.$$

8.6 חורף תשע"ז

נתונה גזרת עיגול BAC שהיא $\frac{1}{6}$ מעיגול שרדיוסו R ומרכזו A .

מנקודה כלשהי P , הנמצאת על הקשת BC ,

הוריידן אנק ל- AC החותך את הרדיוס AC בנקודה L

(ראה ציור).

השטח האפור שבציוור הוא השטח הכלוא בין הקשת BC

ובין הרדיוסים AB ו- AP , והקטועים LP ו- LC .

נתון שהשטח האפור המינימלי הוא $36 - 24\pi$.

א. (1) מצא את הזווית PAC שעוברה

השטח האפור שמתתקבל הוא מינימלי.

(2) מצא את R .

ב. מהו השטח המקסימלי של המשולש APL ? נמק.

סעיף א

(1) במקום לחשב את השטח האפור שצורה ישרה (משימה שנראית די קשה) נחשב את שטחו כהפרש בין השטח של גזרת המעגל BAC לבין שטח של המשולש $\triangle APL$.

שטח הגזרה הוא שישית משטח המעגל כולם $\frac{1}{6} \pi R^2$.

שטח המשולש הוא מחצית המכפלת הבסיס AL והגובה PL , אבל ניתן להביע אותם באמצעות הרדיוס $AP = R$ והזווית $\alpha = \angle PAC$

$$\cos \alpha = \frac{AL}{R}$$

$$\sin \alpha = \frac{PL}{R}$$

$$S_{\triangle APL} = \frac{1}{2} \cdot R \cos \alpha \cdot R \sin \alpha.$$

השטח האפור הוא:

$$S_{\text{אפור}} = \frac{R^2}{2} \left(\frac{\pi}{3} - \cos \alpha \sin \alpha \right)$$

בלי הקבוע $\frac{R^2}{2}$ הנגזרת הראשונה היא:

$$-((- \sin \alpha) \cdot \sin \alpha + \cos \alpha \cdot \cos \alpha) = \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha.$$

הנגזרת מתאפסת כאשר $\cos \alpha = \sin \alpha$. בגזרה $2\pi < \alpha < \frac{1}{6}$, הפתרון היחיד הוא $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

(2) הנזרת השנייה היא $4 \sin \alpha \cos \alpha$ בヅלה, ולכן נקודות הקיצון היא מינימום.
נשווה את החישוב שקיבלנו עם השטח הנוכחי:

$$\begin{aligned}\frac{R^2}{2} \left(\frac{\pi}{3} - \cos \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4} \right) &= 24\pi - 36 = 12(2\pi - 3) \\ R^2 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) &= 24(2\pi - 3) \\ \frac{R^2}{6} (2\pi - 3) &= 24(2\pi - 3) \\ R &= 12.\end{aligned}$$

סעיף ב


השטח המקסימלי של $\triangle APL$ הוא שטח הגזרה פחות השטח המינימלי של השטח האפור:

$$\begin{aligned}S_{\triangle APL} &= \frac{\pi R^2}{6} - (24\pi - 36) \\ &= 24\pi - (24\pi - 36) = 36.\end{aligned}$$

8.7 קיז תשע"ו מועד ב

- במשולש ישר זווית $\angle ABC = 90^\circ$ אורך היתר הוא k ס"מ (k הוא פרמטר).
 הניצב AB הוא גם יתר במשולש ADB , שהוא שווה-שוקיים וישר זווית ($\angle ADB = 90^\circ$).
 א. סמן $x = AB$ והבע את BC באמצעות x ו- k .
 ב. נתון כי הערך המקסימלי של המכפלה $BC \cdot AD^2$ הוא $3\sqrt{3}$.
 מצא את שטח המשולש ADB (ערך מסוים), כאשר המכפלה $BC \cdot AD^2$ היא מקסימלית.

ביזבוזי הרבה זמן על השאלה כי בהעדר תרשימים שמתי את הנקודה D על היתר AC !



סעיף א

הביטויים עבור BC, AD, BD נובעים ממשפט פתגורס ומהנתון ש- $\triangle ADB$ שווה-שוקיים.

סעיף ב

$$\begin{aligned}
 (BC \cdot AD^2)' &= \left(\sqrt{k^2 - x^2} \cdot \frac{x^2}{2} \right)' \\
 &= \frac{-2x}{2\sqrt{k^2 - x^2}} \cdot \frac{x^2}{2} + \sqrt{k^2 - x^2} \cdot x \\
 &= \frac{2k^2x - 3x^3}{2\sqrt{k^2 - x^2}}.
 \end{aligned}$$

נניח כਮובן שהמשולש לא מנוקן כך ש- $0 \neq x$. הנגזרת מתאפסת כאשר:

$$k = \sqrt{\frac{3}{2}}x, \quad x = \sqrt{\frac{2}{3}}k.$$

סימן הנגזרת השנייה הוא סימן הנגזרת של המונה של הנגזרת הראשונה:

$$(2k^2 - 3x^2)' = -6x < 0,$$

נקודת הקיצון היא מקסימלית.

נחשב $x = \sqrt{\frac{2}{3}}k$ כדי לקבל ערך מסוימי עבור k . נציב $BC \cdot AD^2 = 3\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} \sqrt{k^2 - x^2} \cdot \frac{x^2}{2} &= \sqrt{k^2 - \frac{2}{3}k^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}k^2 \\ &= k^3 \sqrt{\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{3} = 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$k^3 = 27$$

$$k = 3.$$

מכאן ש:

$$x = \sqrt{\frac{2}{3}}k = \sqrt{6}.$$

השטח המקסימלי של $\triangle ADB$ הוא:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{x}{\sqrt{2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{2}} = \frac{x^2}{4} = \frac{(\sqrt{6})^2}{4} = 1.5.$$


8.8 קיז תשע"ו מועד א

נתונה הפונקציה $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^n$, $x \neq 0$.

א. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $(x)f$ המאונכות לצירים.

ב. הראה כי עבור x אי-זוגי $0 \leq f'(x) \leq 0$ לכל $x \neq 0$.

לפניך שני גרפים, I ו- II . (בגרפים מוצגות כל נקודות הקיצון.)



אחד הגראפים מייצג סקיצה של פונקציית הנגזרת $(x)f'$ עבור x זוגי,

והגרף האחר מייצג סקיצה של פונקציית הנגזרת $(x)f'$ עבור x אי-זוגי.

היעזר בגרפים I ו- II , וענה על הסעיפים ג, ד, ו- ה.

ג. עבור x אי-זוגי:

(1) מצא כמה נקודות קיצון (אם יש בכלל) יש לפונקציה $(x)f$. נמק.

(2) מצא כמה נקודות פיתול יש לפונקציה $(x)f$. נמק.

ד. עבור x זוגי:

(1) מצא כמה נקודות קיצון (אם יש בכלל) יש לפונקציה $(x)f$. נמק.

(2) מצא כמה נקודות פיתול יש לפונקציה $(x)f$. נמק.

(3) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $(x)f$.

ה. נתונות הפונקציות: $h(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^4$, $g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^3$. מהו הסימן של המכפלה $(x)''h \cdot g'''(x)$ עבור $x > 0$? נמק.

השאלת ארוכה מאוד אבל התשובות קצרות!

אני הסתובכתי כי לא פעלתי לפי הirection: "היעזר בגרפים ...".

סעיף א

$f(x) \xrightarrow[+\infty]{} 1$ ויש אסימפטוטה אופקית ב- $x = -1$. עבור $\infty \rightarrow x$, עדיין יש אסימפטוטה אופקית ב- $x = -1$, רק $f(x)$ שואפת ל-0 מעל לציר ה- x עבור $x < -1$ זוגית, ומתחת לציר עבור $x < -1$ אי-זוגית. הפונקציה לא מוגדרת עבור $x = 0$ ולכן $x = 0$ היא אסימפטוטה אנכית.

סעיף ב

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left((1 + x^{-1})^n \right)' \\ &= n (1 + x^{-1})^{n-1} \cdot -x^{-2}. \end{aligned}$$


נתון $x < -1$ חיובית. אם n אי-זוגית, $1 - n$ זוגית, ו- $(1 + x^{-1})^{n-1}$ חיובית או אפס. כמובן ש- x^{-2} חיובית (ולא אפס כי נתון $x \neq 0$). לכן סימן המינוס לפני x^{-2} גורם לכל הביטוי להיות שלילי. מכאן שגרף I מתאים ל- n אי-זוגית וגרף II ל- n זוגית.

סעיף ג

- (1) בנקודת קיצון של $f(x)$ הנגזרת הראשונה f' חוצה את ציר ה- x , שכן אין נקודות קיצון.
- (2) בנקודת פיתול הנגזרת השנייה מתאפסת. זה קורה פעם אחת משמאלי למינימום של f' ופעם אחת כאשר $f'(x) = 0$ יש נקודות מקסימום ללא שינוי בסימן. לכן יש שתי נקודות פיתול.

סעיף ד


- (1) בנקודת קיצון של $f(x)$ הנגזרת הראשונה f' חוצה את ציר ה- x , שכן יש נקודה קיצון אחת.
- (2) נקודות פיתול הנגזרת השנייה מתאפסת, כמובן, יש נקודה קיצון לנגזרת הראשונה, שכן יש נקודות פיתול אחת.
- (3) לפי גרף II, עבור $x < 0$, השיפוע קרוב לאפס באסימפטוטה האופקית. השיפוע יורד משמאלי עד לנקודה פיתול שם השיפוע עולה עד לנקודות מינימום של f , ואז השיפוע עולה. עבור $x > 0$ השיפוע תמיד עולה מעלה מילוי נמוך מאד ועד קרוב לאפס בכיוון האסימפטוטה האופקית.



סעיף ה

רואים בשני הגרפים שעבור $x > 0$, השיפוע, הנגזרת הראשונה, עולה, כך שהנגזרת השנייה חיובית. מכפלה של שני ערכים חיוביים היא חיובית.

8.9 חורף תשע"ו



$$f(x) = \frac{x-1}{x+1}$$

(ראה צור).

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה,

ואת האסימפטוטות של הפונקציה
המקבילות לצירים.

ב. העבירו ישר המקביל לציר ה- x .

הישר חותך את גרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה C
ואת הישר $x = 2$ בנקודה D .

נסמן את שיעור ה- x של הנקודה C ב- t .

מצא מה צריך להיות הערך של t , כדי שהאורך של הקטע CD יהיה מינימלי:

$$(1) \text{ עבור } t > -1.$$

$$(2) \text{ עבור } t < -1.$$

ג. מצא את האורך המינימלי של הקטע CD עבור כל $t \neq -1$.

סעיף א


הפונקציה לא מוגדרת כאשר המכנה מתאפס: $x = -1$.
ב- $x = -1$ יש אסימפטוטה אנכית כי המכנה מתאפס והמונה לא מתאפס.

$y = 1$ היא אסימפטוטה אופקית כי:

$$\frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 1.$$

סעיף ב

בתרשים סימנו את ערכי ה- x ליש שמות הנקודות:



יש כאן מלכודת שנייתן להימנע ממנה רק אם מציררים תרשימים מדויק. אמן t מוגדר כערך ה- x של $f(x)$ אבל האורך בין הפונקציה והקו $y = 2x$ תלוי במקומם היחסי בין הקו וגרף הפונקציה. ניתן גם לראות את החלוקה לשני תת-סעיפים רמז שיש לטפל בשני המקרים בנפרד.

(1) כאשר $t < -1$ אורך הקטע DC (נסמן a) הוא $a = -x - (-t) = t - x$. (מדובר במקרה ש- x, t שליליים, אבל הנוסחה מתאימה גם אם קטע הקו במקומות אחרים). ערכי ה- y של שתי הנקודות שוים, ולכן ניתן להציב בנוסחה עבור a : $x = \frac{y}{2} = \frac{f(t)}{2}$

$$\begin{aligned} a &= t - x = t - \frac{t - 1}{2(t + 1)} \\ &= \frac{2t^2 + t + 1}{2(t + 1)} \\ a' &= \frac{(4t + 1) \cdot 2(t + 1) - (2t^2 + t + 1)(2)}{4(t + 1)^2} \\ &= \frac{4t^2 + 8t}{4(t + 1)^2} = \frac{t(t + 2)}{(t + 1)^2} = 0. \end{aligned}$$

ערכי t של נקודות הקיצון נמצאות במקומות שהנגזרת הראשונה מתאפסת: $t = 0, t = -2$. את סוג נקודות הקיצון קיבל מהנגזרת השנייה: $t = 0, t = -2$. כאשר $t = 0$, הנגזרת חיובית והנקודה היא מינימום. כאשר $t = -2$ הנגזרת שלילית והנקודה היא מקסימום. לכן האורך המינימלי הוא:

$$t - x = 0 - \frac{0 - 1}{2(0 + 1)} = \frac{1}{2}.$$

. $a = x + (-t) = x - t$ הוא (2) כאשר $t > -1$ אורך הקטע a

$$\begin{aligned} a &= x - t = \frac{t - 1}{2(t + 1)} - t \\ &= \frac{-(2t^2 + t + 1)}{2(t + 1)} \\ a' &= \frac{-(4t + 1) \cdot 2(t + 1) + (2t^2 + t + 1)(2)}{4(t + 1)^2} \\ &= \frac{-4t^2 - 8t}{4(t + 1)^2} = \frac{-t(t + 2)}{(t + 1)^2} = 0. \end{aligned}$$

ערכי t של נקודות הקיצון נמצאות במקומות שהנגזרת הראשונה מתאפסת,שוב ב- -2 . הנגזרת השנייה היא $(2t + 2)^{-2}$. כאשר $t = 0$, הנגזרת שלילית והנקודה היא מקסימום. כאשר $t = -2$ הנגזרת חיובית והנקודה היא מינימום. לכן, האורך המינימלי הוא:

$$x - t = -\frac{-2 - 1}{2(-2 + 1)} - (-2) = \frac{7}{2}.$$

סעיף ג

לכן האורך המינימלי עבור $-1 \neq t \neq 0$ הוא $\frac{7}{2}$

8.10 קיז תשע"ה מועד ב

נתונה הפונקציה $f(x)$, ונตอน כי כל אחת מהפונקציות $f'(x)$, $f''(x)$ ו- $f'''(x)$ מוגדרת בתחום $x > 0$.

נתון גם: הגרף של $f'(x)$ חותך את ציר ה- x בנקודה שבה $x = 1$,

$f'(x) < 0$ עליה בתחום $0 < x < 3$, ו יורדת בתחום $x > 3$

האסימפטוטות של $f'(x)$ הן $x = 0$ ו- $y = 0$.

א. סרטט סקיצה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתון גם כי לפונקציה $f(x)$ יש אסימפטוטה אחת שמשוואתה $x = 0$.

ב. מצא את שיעורי ה- x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה), וקבע את סוגן.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה \cup וככלפי מטה \cap של הפונקציה $f(x)$. נמק.

ד. הפונקציה $f(x)$ מקבלת את כל הערכים בטוחה $y \geq 4$ וرك אותם.

סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $f(x)$.


צין על ציר ה- x ועל ציר ה- y את הערכים שמצאת.

ה. נתונה הפונקציה $g(x) = -[f(x)]^3$.

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

סעיף א

(בשאלה אין נוסחה לפונקציה, גם לא לאחר פתרון השאלה, ולכן התשובים הוא ממש "סקיצה".)



סעיף ב


קיים נקודת קיצון ב- $x = 1$ כי הנגזרת הראשונה מתאפסת ומחילפה סימן. הנקודה היא מינימום כי הנגזרת עולה.

סעיף ג

הנגזרת השנייה היא השיפוע של הנגזרת הראשונה, שהוא חיובי עבור $3 < x < 0$ ושלילי עבור $x < 3$. לכן הפונקציה קעורה כלפי מעלה ב- $3 < x < 0$ וקעורה כלפי מטה ב- $x < 3$.

סעיף ד

אם הפונקציה מקבלת ערכים $4 \geq y$ אז נקודות המינימום שמתקבלת ב- $1 = x$ צריכים לקבל את הערך $y = 4$. נשתמש בכך שلفונקציה יש אסימפטוטה ב- $0 = x$, וכיוני הקוירות מסעיף ג כדי להשלים את צורת הגרף:



סעיף ה

($f(x)$ חיובית בכל תחום ההגדרה, לכן גם $f^3(x)$ חיובית. סימן המינוס הופך את הסימן של ערך הפונקציה. ($f(x)$ יורד ב- $1 < x < 0$ ולכן $g(x)$ עולה בתחום זה. ($f(x)$ עולה ב- $x < 1$ ולכן $g(x)$ יורד בתחום זה.

אפשר להשתמש בנגזרת של $g(x)$:

$$g'(x) = -3f^2(x)f'(x).$$

$f^2(x)$ תמיד חיובי, ולאחר מכן המינוס בתחילת הביטוי, תחומי העליה והירדה הם התחומים שערכי $f'(x)$ חיוביים או חיוביים בהתאם. ($f'(x)$ חותך את ציר ה- x ממשיליים לחיוביים ב- $1 = x$, ולכן $g(x)$ עולה ב- $1 < x < 0$ ויורד ב- $x < 1$).

8.11 קיז תשע"ה מועד א

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - a^2x + a^2$, a הוא פרמטר גדול מ-0.

א. הראה כי המקסימום של הפונקציה מתקיים בנקודת שבה $y > 0$.

ב. מצא עבורו איזה ערך/איזה תחום ערכים של a נקודת המינימום של הפונקציה:

(1) נמצאת על ציר $\text{ה-}x$.

(2) נמצאת מעל ציר $\text{ה-}x$.

(3) נמצאת מתחת לציר $\text{ה-}x$.

ג. סדרת סקיצה של גרף הפונקציה עבור כל אחד משלושת המקרים שבסעיף ב.

ד. כמה פתרונות יש למשוואה $\frac{1}{3}x^3 - x + 1 = 0$? נמק.

סעיף א

נוצרת ראשונה:

$$f'(x) = x^2 - a^2 = 0$$

$$x = \pm a$$

$$f''(x) = 2x$$

$$f''(+a) = 2a > 0$$

$$f''(-a) = -2a < 0.$$

בשתי השורות האחרונות השתמשנו בנתון $a > 0$.

המаксימום הוא ב- $x = -a$ והמינימום הוא ב- $x = a$.

סעיף ב

המינימום הוא ב- $x = a$.

$$f(a) = -\frac{2}{3}a^3 + a^2 = a^2 \left(-\frac{2}{3}a + 1 \right).$$

a^2 חיובי ולא משנה על סימן של נקודות המינימום. הפתרון מתקיים על ידי השוואת 1 לאפס:

$$a = \frac{3}{2} \quad \text{על ציר ה-}x$$


$$a < \frac{3}{2} \quad \text{מעל ציר ה-}x$$

$$a > \frac{3}{2} \quad \text{ מתחת לציר ה-}x$$

סעיף ג

נקודות המינימום מסומנות.

קו רציף: על הציר. קו מקווקו: מעל לציר. קו מנוקד: מתחת לציר.



סעיף ד

משווהה זו היא המשווהה הנתונה בשאלת כאשר $a = 1$, אבל $\frac{3}{2} < 1$, ולכן לפי סעיף ב המינימום נמצא מעל לציר ה- x . מכאן שאין פתרון אחר פרט לנקודת החיתוך של הגרף לפניו המקסימום.

8.12 חורף תשע"ה

נתון כי הפונקציה $f(x)$ ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מקיימות
נתון גם: $f(0) = 1$, $f'(x) = kx + 2$. k הוא פרמטר.

א. מצא את הערך המספרי של $f(3)$, ומצא את הפונקציה $g(x)$ (בלי פרמטרים).

ב. הפונקציה $g(x)$ מקיימת $g(x) = \sqrt{f(x)}$.

$$g(x) = |x + 1| \quad (1)$$

סרטט במערכת צירים אחת סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ (2)

וסקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

סעיף א

לפי הנוסחה לנגזרת של חזקה של פונקציה, $(f(x)^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2}f(x)^{-\frac{1}{2}}f'(x)$, שהיא הפונקציה המופיעה באינטגרל. נחשב את ערך האינטגרל:

$$\begin{aligned} \int_0^3 \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}} dx &= \left[\sqrt{f(x)} \right]_0^3 \\ &= \sqrt{f(3)} - \sqrt{f(0)} = \sqrt{f(3)} - 1 = 3 \\ f(3) &= 4^2 = 16. \end{aligned}$$

הפונקציה $f(x)$ מתקבלת מאינטגרציה של הנוסחה הנתונה לנגזרת ומחישוב הקבוע והפרמטר מהערכים הידועים של $f(0), f(3)$:

$$f(x) = \int (kx + 2) dx = \frac{1}{2}kx^2 + 2x + c$$

$$f(0) = c = 1$$

$$f(3) = \frac{9}{2}k + 7 = 16$$

$$k = 2$$

$$f(x) = x^2 + 2x + 1.$$


סעיף ב

$$g(x) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{x^2 + 2x + 1} = \sqrt{(x+1)^2} = |x+1|.$$


אם $x \geq -1$ לא שלילי ו- $.g(x) = x + 1$,

אם $x < -1$ שלילי ו- $.g(x) = -(x+1)$,

ביחד יש לנו $.g(x) = |x+1|$

סעיף ג

8.13 קיז תשע"ד מועד ב




נתון מלבן $ABCD$.
הצלע DC מונחת על הקוטר של חצי מעגל
שהרדיוס שלו R ומרכזו R כך ש- $DC \geq R$.
הצלע AD משיקת לחצי המעגל בנקודה D ,
והקדקוד B נמצא על המעגל (ראה ציור).

$$\angle BMC = x \quad \text{נסמן:}$$

$$ABCD - \text{שטח המלבן } S(x)$$

- א. מצא מה צריך להיות x , כדי ששטח המלבן $(x) S$ יהיה מקסימלי.
ב. הביע באמצעות R את השטח המוגבל על ידי גוף הפונקציה $S(x)$ ועל ידי ציר ה- x

$$\text{בתוחם } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$



סעיף א

עם הסימונים בתרשימים:

$$S(x) = a(R + b) = R \sin x(R + R \cos x) = R^2 \sin x(1 + \cos x).$$

נחשב את הנגזרת:

$$\begin{aligned} S'(x) &= R^2(\cos x(1 + \cos x) + \sin x \cdot -\sin x) \\ &= R^2(\cos x + \cos^2 x - \sin^2 x) \\ &= R^2(\cos x + \cos^2 x - (1 - \cos^2 x)) \\ &= R^2(2 \cos^2 x + \cos x - 1) = 0 \\ &= R^2(2 \cos x - 1)(\cos x + 1) = 0. \end{aligned}$$

אנחנו פוסלים את הפתרון $x = 180^\circ$ כי $\cos x = -1$ לא יכול להיות זווית במשולש.

$$\text{לכן, } x = 60^\circ, \cos x = \frac{1}{2}$$

הנגזרת השנייה היא:


$$-(2\cos^2 x + \cos x - 1)' = -\sin x(4\cos x + 1)$$
$$-\sin 60(4\cos 60 + 1) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot (4 \cdot \frac{1}{2} + 1) = -\frac{3\sqrt{3}}{2} < 0,$$

ולכן נקודת הקיצון היא מקסימום.

סעיף ב

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} R^2 \sin x (1 + \cos x) dx = R^2 \cdot -\frac{1}{2} (1 + \cos x)^2 \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{R^2}{2} (1^2 - 2^2) = \frac{3R^2}{2}.$$

8.14 קיז תשע"ד מועד א



בציר שלפניך מוצג הגרף של פונקציית הנגזרת $(x)' f$. האסימפטוטה היחידה של הפונקציה $f(x)$ היא $x = 0$. נתון כי יש פתרון אחד בלבד למשוואה $f(x) = 2$. ופתרון אחד בלבד למשוואה $f(x) = -2$. רק על פי נתוני השאלה,

סרטט סקיצה של הפונקציה $f(x)$. נמק.

ב. נתון גם כי פונקציית הנגזרת $(x)' f$ היא: $f'(x) = \frac{ax^2 - b}{ax^2}$ ו- a ו- b הם פרמטרים שונים מד-0.


מצא את הפונקציה $f(x)$ (בלי פרמטרים).

סעיף א

כאשר x עולה בערכים חיוביים, הנגזרת עולה בצורה תלולה מערכיים שליליים ובצורה מתונה לערכים חיוביים, ולכן הפונקציה יורדת בצורה תלולה ואח"כ עולה בצורה מתונה.

כאשר x עולה בערכים שליליים, הנגזרת יורדת בצורה מתונה מערכים חיוביים ובצורה תלולה לערכים שליליים, ולכן הפונקציה עולה בצורה מתונה ואח"כ יורדת בצורה תלולה.

לפי התרשים הנתון בנקודה $-1 = x$ יש נקודת קיצון שהיא מינימום כי השיפוע יורד. בנקודת $x = 1$ יש נקודת קיצון שהיא מינימום כי השיפוע עולה. לפי המידע הנתון על הפתורונות של $f(x)$, נקודת הקיצון שהיא המינימום היא $(-2, -1)$ ונקודת הקיצון שהיא מינימום היא $(1, 2)$, כי אם יש רק פתרון אחד, גраф הפונקציה לא יכול לחצות את הקווים $y = 2$ ו- $y = -2$.



סעיף ב

. $a = b$ ו- $\frac{a-b}{a} = 0$, ונתון $a \neq 0$, ולכן $f'(1) = f'(-1) = 0$
שוב בגלל ש- $a \neq 0$ אפשר לצמצם את הפרמטרים:

$$f'(x) = \frac{a(x^2 - 1)}{ax^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

נחשב את האיטרגל של הנגזרת כדי למצוא את הפונקציה:

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) dx = x + \frac{1}{x} + c.$$

הנגזרת מתאפסת ב- $x = \pm 1$, ולכן נקודות המינימום והמקסימום גם הן ב- $x = \pm 1$:

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{1} + c &= 2 \\ -1 + \frac{1}{-1} + c &= -2, \end{aligned}$$

ולכן $c = 0$

$$f(x) = x + \frac{1}{x}$$

8.15 חורף תשע"ד

בטבלה שלפניך מוצגים ערכים מסוימים של הפונקציה $(x) f$ בקטע $1 < x < 2$.

x	1.1	1.2	1.3	1.4
f(x)	1.19	1.28	1.36	1.43

הfonקציה $(x) f$ חיובית בקטע הנתון, ואין לה נקודות קיצון פנימיות בקטע זה.

נתון כי פונקציית הנגזרת השנייה $(x) f'$ שלילית בקטע הנתון.

- א. קבוע מהו הסימן של $(1.2) f'$. נמק.
- ב. קבוע אם הטענה $(1.3) f' < f'(1.2) < f'(1.1)$ נכונה. נמק.

נתונה הפונקציה $(x) g = \sqrt{f(x)}$ בקטע $1 < x < 2$.

- ג. בקטע הנתון מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה $(x) g$ (אם יש כאלה). נמק.
- ד. הראה כי בתחום $1.1 \leq x \leq 1.3$ אין פתרון למשואה $(x) g' = f'(x)$.

בבחינה זו היו שלוש שאלות בפרק השני ולכן מספר השאלה הוא 9 ולא 8.

סעיף א

לפי הطבלה הפונקציה עולה מ-1 $x = 1.1$ דרך $x = 1.2$ ל-2 $x = 1.3$. נתון שאין נקודות קיצון פנימיות ולכן הנגזרת הראשונה חיובית.

סעיף ב

הנגזרת השנייה שלילית כך שהנגזרת הראשונה יורדת בתחום ולכן הטענה נכונה.

סעיף ג

$$g'(x) = \frac{1}{2} f(x)^{-\frac{1}{2}} f'(x).$$

מסעיף א, גם $f'(x)$ וגם $g'(x)$ חיוביים בתחום, ולכן $g'(x)$ חיובי, ו- $g(x)$ עולה בתחום.

סעיף ד

$$\begin{aligned} g'(x) &= f'(x) \\ \frac{1}{2\sqrt{f(x)}} f'(x) &= f'(x) \\ f(x) &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

מצאו שהנגזרת הראשונה חיובית כך שאפשר למצמצם אותה. לפי הטבלה, $f(x)$ אינה פונקציה קבועה בכל התחומים, אך לא יתכן ש- $f'(x) = f'(x)$.

המלצות: פרקים 8, 7, 6

- אי-אפשר להכין טבלה של עליות וירידות עד שלא מחשבים את תחום ההגדירה וגם כל נקודות הקיצון של הפונקציה, כי רק ביניהם אפשר לסמן על זה שאין שינוי בכיוון הפונקציה.
- אני אוהב להשתמש בתנאות ידיהם כדי "לראות שיפועים" ולקובע אם פונקציה עולה או יורדת, וכן אם נקודות קיצון היא מקסימום או מינימום. אני מזעוף בכך שטוחה לאורך הפונקציה מערכיים שליליים לחיבוביים על ציר ה- x . אם כיוון היד למטה הפונקציה יורדת, ואם הכיוון למטה הפונקציה עולה. אם היד עוברת מכיוון למטה לכיוון לעלה, השיפוע (הנגזרת) עולה, וכך שהנגזרת השנייה היא חיובית ונקודות הקיצון היא מינימום. שינוי הפוך בכיוון היד מראה שקיים מקסימום.
- אני מציע להתרחק מהמחשבון עד כמה שאפשר ולהשכ卜 עם סימנים אלגבריים. הסיבה היא שקשה למצוא שגיאות הנגרמות על ידי טעויות בຄלה על המחשבון, אבל אפשר לעבור שוב ושוב על חישוב אלגברי כדי לוודא את נכונותו.
- אל תקצרו בחישובים. לעיתים קרובות שגיתי כי השטוח סימן מינוס. לוקח מעט זמן לרשום שורה נוספת לעומת הזמן הדרוש לחפש שגיאה בחישוב מוקצה.
- אני מעדיף לסוג נקודות קיצון על ידי בדיקת הסימן של הנגזרת השנייה ולא על ידי חישוב טבלת עליות וירידות.
- ככלים יודעים שאם הסימן של המכנה של הנגזרת הראשונה חיובי, הסימן של הנגזרת השנייה זהה לסימן של הנגזרת של המונה של הנגזרת הראשונה. חשוב לא לטעון שהנגזרת השנייה שווה לנגזרת של המונה של הנגזרת הראשונה!¹ עם זאת, יש נוסחה לנגזרת השנייה התקפה רק עבור נקודות בהן הנגזרת האשונה מתאפסת והן **נקודות בנקודות הקיצון**.² עברו:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$$

$$\text{וכך ש } f'(a) = 0$$

$$f''(a) = \frac{g'(a)}{h(a)}.$$

ההוכחה פשוטה: חישבו את הנגזרת וצמכוו את השבר.

نبיא דוגמה:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2 + x - 1}{x^2 - x + 1} \\ f'(x) &= \frac{-2x^2 + 4x}{(x^2 - x + 1)^2}. \end{aligned}$$

נקודות הקיצון הן:

$$a_1 = (0, -1), \quad a_2 = \left(2, \frac{5}{3}\right).$$

¹ ראו: יונתן אחיטוב. 'גזרה שנייה מקוצרת' כדרך לאפיון נקודות קיצון. על"ה 20, 2002, עמ' 27–26.

² ראו במאמר של אחיטוב וגם "לŁימוד ולŁימוד אנגלייה", עמ' 323 – 322.

בגלל שהמכנה חיובי, הסימן של הנגזרת השנייה הוא הסימן של:

$$(-2x^2 + 4x)' = -4x + 4,$$

למרות שזו לא הנגזרת השנייה. עבור נקודות הקיצון, $0 > 4 \cdot 0 + 4 = 4$ ו- a_1 היא מינימום, ו- $0 < -4 \cdot 2 + 4 = -4$ ו- a_2 היא מקסימום.

עבור הנקודות $a = a_1, a = a_2$ אפשר לחשב את הנגזרת השנייה ולבודק ש:

$$f''(a) = \frac{-4a + 4}{a^2 - a + 1}.$$

- שימוש לב להגדירה של נקודת פיתול: נקודה בה משתנה הקוירוט של הפונקציה. בנקודת פיתול, הנגזרת השנייה מתאפשרת או לא מוגדרת, אבל יש פונקציות שמקיימות אחד מהתנאים האלה בנקודת מסוימת אבל אין שם נקודת פיתול. למשל, הנגזרת שנייה של $f(x) = x^4$ מתאפשרת ב- $x = 0$ אבל יש שם מינימום ולא נקודת פיתול.³

בנקודות פיתול **הנגזרת הראשונה** לא חייב להתאפס. למשל, עבור x :

$$\begin{aligned} f'(0) &= \cos 0 = 1 \\ f''(0) &= -\sin 0 = 0. \end{aligned}$$

- כאשר מופיע שורש בפונקציה הכוונה היא לשורש החיובי. אבל, כאשר לוקחים שורש של x^2 , הכוונה היא לערך המוחלט של x . למשל, אם $x = 3 = \sqrt{3^2} = 3 = x$, אבל אם $x = -3 = \sqrt{(-3)^2} = 3 = -x$.

כאשר מחשבים אסימפטוטות של פונקציות עם שורשים, יש לחתות את זה בחישובו:

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2}}}{\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}} = \frac{\frac{x}{|x|}}{\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}} \xrightarrow{x \pm \infty} \pm 1.$$

- אם השאלה מבקשת נקודות חיתוך עם הצירים או נקודות קיצון, יש נתיחה להסתפק בחישוב ערך ה- x , אבל התשובה חייבת להיות קוואדינטות (x, y) .

- כאשר מבקשים לחשב אינטגרל "mphid" של פונקציה, תמיד הפונקציה תהיה נגזרת של פונקציה שאפשר לנחש בקלות. למשל:

$$\int \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} dx$$


נראה "mphid" אבל אם נתבונן בו קצת נבין ש:

$$(\cos^{-2} x) = -2 \cdot (-\sin x) \cos^{-3} = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}.$$

לפעמים מבקשים $\int f'(x) dx$ כאשר $f(x)$ נתון, ואז אין מה לחשב!

³"לומוד וללמד אנליזה", עמ' 227

- שימושו לב להבדל בין שטח לאינטגרל.



אם מבקשים את האינטגרל של סינוס מאפס עד 2π , התשובה היא אפס:

$$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{2\pi} = -(1 - 1) = 0.$$


אבל אם מבקשים את השטח התחום על ידי הפונקציה וציר x התשובה היא:

$$\int_0^\pi \sin x \, dx + \int_\pi^{2\pi} -\sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^\pi + \cos x \Big|_\pi^{2\pi} = -(-1 - (1)) + (1 - (-1)) = 4.$$

- אינטגרל של פונקציה אי-זוגית בתחום סימטרי סביב ציר x הוא אפס, ואינטגרל של פונקציה זוגית בתחום סימטרי הוא פי שניים האינטגרל של התחום החיובי בלבד.

- ראו נספח ג' המסביר את החשיבות של מעגל היחידה בחישובים טריגונומטריים. הנספח מציג איך לשזר בקלות את הנוסחאות $\sin(90^\circ - \theta)$, $\sin(180^\circ - \theta)$, $\sin(2\theta)$ ונוסאות דומות עבור קיסינוס.

- בבעיות עם פונקציות טריגונומטריות, ציירו תרשימים של מעגל היחידה וסמןו עליו את תחומי ההגדרה. התרשימים יעזרו בקביעת סימני הפונקציות ובערכי הפונקציות כאשר מוסיפים או מחסירים כפולות רצינליות של π .



- נניח שהתחום הנתון הוא $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, ונניח שמקבלים את התוצאה $\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. בדרכו, $\sin 2\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ולא לשכוח את התשובה השנייה: $\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ו- $x = \frac{\pi}{3}$ בתחום, למרות $\sin 2x = \frac{2\pi}{3}$ אינו בתחום.

• בנוסחאות נთונן:

$$(x^t)' = tx^{t-1}, \quad (\text{ט' ממשי})$$

אולם משתמשים בנוסחה רק עבור t שלם וחובי. אני מעדיף להשתמש בנוסחה זו עבור **כל** t , כי קל לזכור את הנוסחה והчисובים פשוטים. למשל, מיותר לזכור את הנוסחה הנתונה:

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

כ"י:

$$(\sqrt{x})' = (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2}(x^{-\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

הчисוכון בולט כאשר צרכיים לחשב נגזרת רצינלית:

$$\left(\frac{1}{x^t}\right)'.$$

אני רואה שימושים בנוסחה המוסבכת עבור נגזרת של פונקציה שהיא חלוקה $\frac{f(x)}{g(x)}$ כאשר $f(x) = 1, g(x) = x^t$. פשוט יותר לחשב:

$$\left(\frac{1}{x^t}\right)' = (x^{-t})' = -t(x^{-t-1}) = \frac{-t}{x^{t+1}}.$$

כאשר במונה יש קבוע ובמכנה יש פונקציה מורכבת עדין החישוב לא מסובך במיוחד. למשל:

$$\begin{aligned} \left(\frac{14}{x^2 - 3x + 4}\right)' &= 14 \left((x^2 - 3x + 4)^{-1}\right)' \\ &= -14(x^2 - 3x + 4)^{-2}(2x - 3) \\ &= \frac{-14(2x - 3)}{(x^2 - 3x + 4)^2}. \end{aligned}$$

• אם $f(x) = 0$ או $f(x) = -0 = 0$. אמם התוצאה פשוטה אבל היא שימושית כאשר חושבו נקודות איפוס של נגזרת, וצריך למצוא נקודות איפוס של השילילה של הנגזרת, למשל:

$$(g(x) - f(x))' = (-1 \cdot (f(x) - g(x))' = -1(f(x) - g(x))',$$

ולכן אם $(f(x_1) - g(x_1))' = -1 \cdot 0 = 0$, מתקבל מייד $(f(x_1) - g(x_1))' = 0$


נספח א' אין לสมוך על איוורים

הנה הוכחה "נכונה" שכל משולש שווה שוקיים!


נתון משולש שירוטי ABC , תהי נקודת החיתוך בין חוצה הזווית של $\angle BAC$ לבין האמצעי של BC . סימנו ב- D, E, F את נקודות החיתוך של האנכים מ- P לצלעות BC, AB, AC בהתאמה. כי הם משולשים ישר זווית עם זוויות שוות α וצלע $AP \cong APF$

האמצעי ל- PD כי $PD \cong DPB \cong DPC$. כי $BD = DC = a$ צלע משותף, ו- $PD = PC$ כי $PB = PC$ לפי החפיפה הריאונה, ו- $EP = PF$ לפי החפיפה השנייה. נחבר את השוויונות ונקבל ש- $\triangle ABC$ שווה שוקיים:









$$AB = AE + EB = AF + FC = AC.$$











הבעיה בהוכחה היא שהאיור אינו נכון כי הנקודה P נמצאות מחוץ למשולש:



נספח ב' ייצוג גרפי של משפטים בגיאומטריה







נספח ג' מעגל היחידה

1.ג' רבעים של מעגל היחידה

מעגל שהרדיוס שלו 1 נקרא **מעגל היחידה**.



הצירים את מעגל היחידה באופן טבעי לארבעה **ربיעים**. זוויתות נמדדות **מעלות** בין 0° ל- 360° כאשר הכיוון החיבובי הוא נגד כיוון השעון. יחידה אחרת לזוויות היא **רדיאן**. רדיאן אחד הוא הזווית כוללת קשת על היקף המעגל שאורכו שווה לרדיוס. במעגל היחידה הרדיוס הוא 1 ולכן אורך היקף הוא 2π . כאשר קרן מסתובבת לאורך כל היקף (נגד כיוון השעון) היא עוברת מזוית 0 רדיאנים לזוית 2π רדיאנים. רדיאן אחד שווה בערך 57.3 מעלות.




מהחיתוכים של הצירים עם מעגל היחידה קיבל את ערכי הסינוס והקוסינוס של הזוויות:


זווית (מעלות)	זווית (רדיאנים)	\sin	\cos
0	0	0	1
90	$\pi/2$	1	0
180	π	0	-1
270	$3\pi/2$	-1	0

2.ג' חלוקת מעגל היחידה ל-8 קטעים

נחלק כל רביע בחצי ונקבל 8 קטעים. הזווית של כל קטע הוא 45° או $\pi/4$ רדיאנטים:



במשולש אם הזווית $\angle ABC$ הוא 45° , הזווית הנגדית $\angle BAC$ חייבת להיות גם היא 45° כדי שסכום הזוויות במשולש יהיה 180° . המשולש שווי-שוקיים כך שערך הסינוס והקוסינוס שווים.



ממשפט פיתגורס:

$$\sin^2 45 + \cos^2 45 = 1$$


$$2 \sin^2 45 = 1$$

$$\sin 45 = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 45 = \sin 45 = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

3.ג' סינוס וкосינוס של זווית הגודלות מ- 90°


עכשו שאנו ידעים את ערכי הסינוס והקוסינוס של 45° , נוכל לשאול על הזווית הסימטריות 135° , 225° , 315° . בעזרת חבירינו מעגל היחידה, נמצא מיד את ערכי הסינוס והקוסינוס שלן. תחילה נחשב את הערכים עבור זווית שירוטית θ בربיע הראשון. היטל הקרניים על הצירים x , y שווים כך שיש רק לשנות את הסימנים. בربיע השני:



$$\cos 135 = \cos(180 - 45) = -\cos 45 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 135 = \sin(180 - 45) = \sin 45 = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

נסתכל על הרביע השלישי והרביע הרביעי:



עבור הרביע השלישי:

$$\cos 225 = \cos(180 + 45) = -\cos 45 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 225 = \sin(180 + 45) = -\sin 45 = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

עבור הרביע הרביעי, נוח להשתמש בזווית השלילית θ – במקומות הזוגית החיובית $360 - \theta$ –

$$\cos 315 = \cos(-45) = \cos 45 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 315 = \sin(-45) = -\sin 45 = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

נסכם את הערכים בטבלה:



זווית (מעלות)	זווית (רדיאנים)	\sin	\cos
θ	θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$
$180 - \theta$	$\pi - \theta$	$\sin \theta$	$-\cos \theta$
$180 + \theta$	$\pi + \theta$	$-\sin \theta$	$-\cos \theta$
$-\theta$	θ	$-\sin \theta$	$\cos \theta$

עבור 45° :


זווית (מעלות)	זווית (רדיאנים)	\sin	\cos
45	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
135	$3\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$
225	$5\pi/4$	$-\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$
315	$7\pi/4$	$-\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$

א.4 הסינוס והקוסינוס של 30° ו- 60°


את מעגל היחידה ניתן לחלק ל-6 קטעים של 60° או ל-12 קטעים של 30° :




ברדייאנים:



נחשב תחילה את הסינוס של 30° . במשולש ישר-זווית:



ציר קו מ- C אל היתר כך שהזווית עם הצלע AC היא 30° :



מעובדות על זוויות במשולש השלמינו בציור את שאר הזוויות. המשולש $\triangle BCD$ שווי-צלעות ואורך כל צלע הוא a . בנוסף, $\triangle ACD$ שוו-שוקיים כך ש- $a = 1 - a$ (זכור שהמשולש נמצא במפגל היחידה ואורך היתר הוא 1). מכאן:


$$\sin a = a = 1 - a = \frac{1}{2}.$$

מהנוסחה $1 = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ מתקבל ערך הקוסינוס:

$$\cos 30 = \sqrt{1 - \sin^2 30} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

5.ג' סינוס וкосינוס של $(90 - \theta)$


נפנה עכשו לחישוב של סינוס וкосינוס של 60° . מ- $30 = 90 - 60$, את הקשר בין 60° ו- 30° ניתן לראות מהزاויות של $\theta - 90$ במעגל היחידה:



הזווית בנקודת המשולש נושך למעגל היחידה היא θ , כך שהפונקציות הטריגונומטריות של $\theta - 90$ מתקבילות לפחות של θ על ידי החלפת הצלע הנגיד והצלע השכן בהגדרות:

$$\begin{aligned}\cos(90 - \theta) &= \sin \theta \\ \sin(90 - \theta) &= \cos \theta.\end{aligned}$$

דרך אחרת לראות את הקשר היא לשים לב שהמשולש חופף את המשולש לחשב $\sin \theta$ ו- $\cos \theta$:



6.ג' סינוס וкосינוס של 2θ

אין צורך לזכור את הנוסחאות המאפשרות לבטא את הפונקציות הללו עם θ במקום 2θ , כי ניתן לשחרר אותן תוך מספר שניות מהנוסחאות הטריגונומטריות עבור חיבור של זוויות, נוסחאות הניתנות בנוסחאון:

$$\begin{aligned}\sin 2\theta &= \sin(\theta + \theta) \\ &= \sin \theta \cos \theta + \sin \theta \cos \theta \\ &= 2 \sin \theta \cos \theta \\ \cos 2\theta &= \cos(\theta + \theta) \\ &= \cos \theta \cos \theta - \sin \theta \sin \theta \\ &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ &= (1 - \sin^2 \theta) - \sin^2 \theta \\ &= 1 - 2 \sin^2 \theta.\end{aligned}$$