

פתרון בוחן 2024

7 ביולי 2024

שאלה 1

חשבו את האינטגרל הבא:

$$\int e^{2x} \cos\left(\frac{x}{4}\right) dx$$

פתרון:

באמצעות אינטגרציה בחלקים עבור $u = e^{2x}$, $v' = \cos\left(\frac{x}{4}\right)$ נקבל ש

$$\begin{aligned} \int e^{2x} \cos\left(\frac{x}{4}\right) dx &= e^{2x} \cdot 4 \sin\left(\frac{x}{4}\right) - 4 \int 2e^{2x} \cdot \sin\left(\frac{x}{4}\right) \cdot dx \\ &= 4e^{2x} \cdot \sin\left(\frac{x}{4}\right) - 8 \int e^{2x} \sin\left(\frac{x}{4}\right) dx \end{aligned}$$

על האינטגרל השני נפעיל אינטגרציה בחלקים פעם נוספת:

$$= 4e^{2x} \sin\left(\frac{x}{4}\right) - 8 \left[-e^{2x} \cdot \cos\left(\frac{x}{4}\right) \cdot 4 + \int 2e^{2x} \cdot 4 \cos\left(\frac{x}{4}\right) dx \right]$$

ובסך הכל נקבל ש

$$\int e^{2x} \cos\left(\frac{x}{4}\right) dx = 4e^{2x} \cdot \sin\left(\frac{x}{4}\right) + 32e^{2x} \cdot \cos\left(\frac{x}{4}\right) - 64 \int e^{2x} \cos\left(\frac{x}{4}\right) dx$$

נעביר אגפים ונקבל

$$65 \int e^{2x} \cos\left(\frac{x}{4}\right) dx = 4e^{2x} \left[\sin\left(\frac{x}{4}\right) + 8 \cos\left(\frac{x}{4}\right) \right]$$

ומכאן ש

$$\int e^{2x} \cos\left(\frac{x}{4}\right) dx = \frac{4}{65} e^{2x} \left[\sin\left(\frac{x}{4}\right) + 8 \cos\left(\frac{x}{4}\right) \right] + C$$

שאלה 2

בדקו אם האינטגרלים הבאים מתכנסים או מתבדרים.

סעיף א'

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{6x^3 dx}{(x^4 + 1)^2}$$

פתרון:

נשים לב כי המכנה מקיים $(x^4 + 1)^2 \geq 1$ לכל $x \in \mathbb{R}$ ולכן הנקודות הבעיות הן רק באינסוף.

$$\frac{6x^3}{(x^4 + 1)^2} < \frac{6x^3}{(x^4)^2} = \frac{6x^3}{x^8} = \frac{6}{x^5}$$

והרי האינטגרל הזה מתכנס ולכן לפי מבחן ההשוואה, גם האינטגרל שבשאלה מתכנס.

סעיף ב'

$$\int_1^4 \frac{dx}{x^2 + x - 6}$$

פתרון:

נשים לב כי

$$x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$$

כלומר נקודה בעייתית ב $x = 2$
נמצא את האינטגרל הלא מסוים

$$\int \frac{dx}{x^2 + x - 6} = \int \left[\frac{1}{5(x+3)} - \frac{1}{5(x-2)} \right] dx = \frac{1}{5} \left[\int \frac{dx}{x+3} - \int \frac{dx}{x-2} \right] = \frac{1}{5} [\ln |x-2| - \ln |x+3|]$$

כעת נבחן את האינטגרל מצדי הנקודה הבעייתית

$$\int_1^2 \frac{dx}{x^2 + x - 6} = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{1}{5} [\ln |x-2| - \ln |x+3|]_1^t = \frac{1}{5} [\lim_{t \rightarrow 2} \ln |x-2| - \ln |1-2| - \ln |2+3| + \ln |1+3|] = \infty$$

ולכן האינטגרל מתבדר
לא צריך לבדוק גם את הצד השני כדי להוכיח התבדרות

סעיף ג'

$$\int_{-\infty}^0 \frac{e^{\frac{1}{x}} dx}{x^2}$$

פתרון:

הנקודות הבעייתיות הן 0 ואינסוף
נגדיר $t = \frac{1}{x}$, $\frac{dt}{dx} = \frac{-1}{x^2}$ לכן פתרון לאינטגרל הלא מסוים יהיה

$$\int \frac{e^{\frac{1}{x}} dx}{x^2} = - \int e^t dt = -e^t = -e^{\frac{1}{x}}$$

עכשיו ננסה לפתור עבור $x = 0$

$$\int_{-1}^0 \frac{e^{\frac{1}{x}} dx}{x^2} = \lim_{t \rightarrow 0^-} -e^{\frac{1}{x}} \Big|_{-1}^t = \lim_{x \rightarrow 0^-} -e^{\frac{1}{x}} - \frac{1}{e} = -\frac{1}{e}$$

כלומר האינטגרל מתכנס. נבדוק את הצד השני

$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{e^{\frac{1}{x}} dx}{x^2} = \lim_{t \rightarrow -\infty} -e^{\frac{1}{x}} \Big|_t^{-1} = \frac{1}{e} - \lim_{x \rightarrow -\infty} -e^{\frac{1}{x}} = \frac{1}{e} + 1$$

כלומר האינטגרל מתכנס וערכו הוא

$$\int_{-\infty}^0 \frac{e^{\frac{1}{x}} dx}{x^2} = 1$$

סעיף ד'

$$\int_1^\infty \frac{\cos(e^{2x^2+x+\pi})}{x^2} dx$$

פתרון:

הנקודה הבעיתית היא רק ב $x \rightarrow \infty$
לכל $x > 1$ מתקיים

$$\left| \frac{\cos(e^{2x^2+x+\pi})}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}$$

והרי זה אינטגרל מתכנס, לכן לפי מבחן ההשוואה גם האינטגרל בשאלה מתכנס

שאלה 3

מצאו את פיתוח מקלורן עד לסדר n של הפונקציה הבאה:

$$\ln(3 + 4x)$$

פתרון: נזכור כי פיתוח מקלורן של פונקציה כלשהי נתון על ידי

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot x^k$$

עבור הפונקציה הנתונה בשאלה מתקיים ש

$$f^{(0)}(x) = \ln(3 + 4x)$$

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{3 + 4x} \cdot 4$$

$$f^{(2)}(x) = \frac{-1}{(3 + 4x)^2} \cdot 4 \cdot 4$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{1 \cdot 2}{(3 + 4x)^3} 4 \cdot 4 \cdot 4$$

\vdots

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} \cdot 4^n \cdot (n-1)!}{(3 + 4x)^n}$$

נציב את הנגזרת הכללית בנוסחא של $P_n(x)$ עבור $x = 0$ ובסך הכל נקבל ש

$$\ln(3+4x) \approx \ln(3) + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1} 4^k (k-1)!}{3^k \cdot k!} x^k = \ln(3) + \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^k \cdot \frac{x^k}{k}$$

שאלה 4

בדקו האם הטור הבא מתכנס:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-2)^{1+3n}(n+1)}{n^2 5^{1+n}}$$

פתרון:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-2)^{1+3n}(n+1)}{n^2 5^{1+n}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1} \cdot (-2)^{2n}(n+1)}{5^{n+1} \cdot n^2} = \sum_{n=2}^{\infty} \left(-\frac{2}{5}\right)^{n+1} \cdot 4^n \cdot \frac{n+1}{n^2}$$

נשתמש במבחן המנה כדי לבדוק את התכנסות הטור:

$$a_{n+1} = \left(-\frac{2}{5}\right)^{n+2} \cdot 4^{n+1} \cdot \left(\frac{n+2}{(n+1)^2}\right)$$

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \left|\left(\frac{2}{5}\right) \cdot 4 \cdot \frac{n^2(n+2)}{(n+1)(n+1)^2}\right| = \left|\frac{8}{5} \cdot \frac{n^3+2n^2}{n^3+3n^2+3n+1}\right|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{8}{5} \cdot 1 = \frac{8}{5} > 1$$

ולכן ממבחן המנה הטור מתבדר.