אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד

חדו"א 1 להנדסה – 214.1.9711

חוברת תרגילים

סמסטר א' תשפ"ז

החוברת מרכזת תרגילים על כל נושאי הקורס, ותעודכן במהלך הסמסטר.

רמזים ופתרונות מלאים, שנפתחים שלב אחר שלב, נמצאים באתר התרגול. אפשר גם להוריד משם את חוברת הרמזים והפתרונות.

https://motkep173.github.io/Ex2027A_9711/

עודכן לאחרונה: 12 בנובמבר 2026

תוכן העניינים

1 מספרים ממשיים 2

2 סדרות 3

3 פונקציות 8

1 מספרים ממשיים

1. **יהיו** $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ **ויהיו** $r_1, r_2 \notin \mathbb{Q}$.

(א) הראו כי $q_1 + q_2 \in \mathbb{Q}$, כי $q_1 q_2 \in \mathbb{Q}$, וגם כי $\frac{q_1}{q_2} \in \mathbb{Q}$ אם $q_2 \neq 0$.

(ב) הראו כי $q_1 + r_1 \notin \mathbb{Q}$, ושאם $q_1 \neq 0$ אז גם $\frac{r_1}{q_1} \notin \mathbb{Q}$.

(ג) הראו כי לא בהכרח מתקיים $r_1 + r_2 \notin \mathbb{Q}$.

---

2. **שאלת אתגר**

(א) הוכיחו כי $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

(ב) הוכיחו כי $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

הדרכה: חשבו את $(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})$, והראו כי אם $a, b \in \mathbb{R}$ מקיימים $ab = -1$ אז או ששניהם רציונליים או ששניהם אי רציונליים. לבסוף, הסבירו למה לא ייתכן ש $\sqrt{2} + \sqrt{3}, \sqrt{2} - \sqrt{3}$ שניהם רציונליים.

---

3. (א) מצאו $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$\frac{1}{n} < 0.003$.

(ב) מצאו $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$\frac{1}{\sqrt{n}} < 0.01$.

(ג) מצאו מספר רציונלי q כך ש-$\sqrt{2} < q < 1.415$. בתרגיל זה מותר להשתמש במחשבון כדי להעלות מספר בריבוע, אבל לא כדי להוציא שורש.

---

4. **בכל אחד מהזוגות הבאים, חשבו את** $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$:

(א) $A = (-1, 2)$, $B = [0, 3)$.

(ב) $A = (-\infty, 3]$, $B = (1, 5)$.

(ג) $A = (-\infty, 2]$, $B = (1, \infty)$.

---

5. **פתרו את אי השוויונות הבאים:**

(א) $|x + 2| < 0.3$

(ב) $|5 - \frac{1}{x}| \leq 1$

(ג) $|x + 2| + |x - 2| \leq 10$

(ד) $|x^2 - x - 6| > x^2 - x - 6$

---

6. **יהיו** $x, y \in \mathbb{R}$.

(א) הוכיחו כי $-|x| \leq x \leq |x|$.

(ב) הוכיחו את אי-שוויון המשולש: $|x + y| \leq |x| + |y|$.

(ג) הסיקו כי $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.

---

7. הוכיחו באינדוקציה את הטענות הבאות:

(א) לכל $x \in (-1, \infty)$ ולכל n טבעי מתקיים $(1+x)^n \geq 1 + nx$.

(ב) $2^n \geq n^3$ לכל $n \geq 10$ טבעי.

(ג) $n! < \frac{(n+1)^n}{2}$ לכל $n > 1$ טבעי.

(ד) לכל טבעי n: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

(ה) בארץ עוץ יש מטבעות בשווי של שלושה דולרי-עוץ וחמישה דולרי-עוץ. הראו כי כל סכום שלם הגדול ממש משבעה דולרי-עוץ ניתן לפרוט למטבעות של שלושה דולרי-עוץ וחמישה דולרי-עוץ.

(ו) לכל טבעי n: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$.

2 סדרות

8. רשמו חמישה איברים ראשונים של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר

(א) $a_n = \frac{n^3 - 1}{n^2 + 1}$.

(ב) $a_n = \frac{n^2}{2^n}$.

(ג) $a_n = 1 - \frac{(-1)^n}{n}$.

9. מצאו נוסחאות לאיבר הכללי של הסדרות הבאות:

(א) $1, 0, 1, 0, 1, 0 \ldots$.

(ב) $\frac{5}{3}, -\frac{10}{9}, \frac{20}{27}, -\frac{40}{81}, \ldots$.

(ג) $\frac{1}{1 \cdot 3}, \frac{1}{3 \cdot 5}, \frac{1}{5 \cdot 7}, \ldots$.

10. האם 42 הוא איבר של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר $a_n = n^2 - 5n$? אם כן, מהו מיקומו בסדרה? ענו על אותה השאלה עם המספרים 36, -4 ו--6.

11. בעזרת הגדרת הגבול, הוכיחו כי:

(א) $\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n-2} = 2$

(ב) $\lim_{n\to\infty} \left(17 + \frac{(-1)^n}{n}\right) = 17$

(ג) $\lim_{n\to\infty} \frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} = 0$

(ד) $\lim_{n\to\infty} \frac{5n-12}{2n+3} = \frac{5}{2}$.

(ה) $\lim_{n\to\infty} \frac{5n-12}{2n+3} \neq \frac{3}{2}$

12. (א) הוכיחו באינדוקציה כי לכל n טבעי מתקיים $2^n \geq n$.

(ב) בעזרת הגדרת הגבול הראו כי הסדרה $a_n = \frac{1}{2^n}$ מתכנסת ל-0.
(בשלב מסוים היעזרו במה שהוכח בסעיף הקודם)

---

13. **תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$.**

(א) הראו כי אם $a_n \to L$ אז $|a_n| \to |L|$.

(ב) הראו כי הכיוון ההפוך אינו נכון: מצאו a_n המקיימת $a_n \not\to L$ אבל $|a_n| \to |L|$.

(ג) הראו כי אם $a_n \to L$ אז $a_n^2 \to L^2$.

(ד) הראו כי הכיוון ההפוך אינו נכון: מצאו a_n המקיימת $a_n \not\to L$ אבל $a_n^2 \to L^2$.

---

14. הוכיחו לפי הגדרת הגבול שהסדרה $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ אינה מתכנסת.

---

15. **תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $a_n \to L$. הוכיחו או הפריכו:**

(א) אם קיים M כך ש-$b_n = a_n$ לכל $n > M$, אז $b_n \to L$.

(ב) אם $b_n = a_n$ עבור אינסוף ערכים של n, אז $b_n \to L$.

(ג) $a_{n+1} \to L$.

---

16. **עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו אם היא חסומה, חסומה מלעיל ולא מלרע, חסומה מלרע ולא מלעיל, או לא חסומה מלעיל ולא מלרע. נמקו.**

(א) $a_n = \dfrac{3n + (-1)^n}{n}$

(ב) $b_n = (-1)^n n$

(ג) $c_n = \dfrac{n^2 + 1}{n}$

(ד) $d_n = 5 - n^2$

(ה) $e_n = \dfrac{2n - 1}{n + 3}$

---

17. **תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות חסומות. הוכיחו או הפריכו:**

(א) הסדרה $(a_n + b_n)$ חסומה.

(ב) הסדרה $(a_n \cdot b_n)$ חסומה.

(ג) אם $b_n \neq 0$ לכל n, אז הסדרה $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ חסומה.

(ד) אם קיים $c > 0$ כך ש-$|b_n| \geq c$ לכל n, אז הסדרה $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ חסומה.

---

18. תהיינה $(a_n),(b_n)$ סדרות. הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

(א) אם (a_n) לא מתכנסת ואם (b_n) לא מתכנסת, אז (a_n+b_n) לא מתכנסת.

(ב) אם (a_n) מתכנסת ואם (b_n) לא מתכנסת, אז (a_n+b_n) לא מתכנסת.

(ג) אם (a_n+b_n) מתכנסת אז לפחות אחת מבין (a_n) או (b_n) מתכנסות.

(ד) אם (a_n+b_n) לא מתכנסת אז לפחות אחת מבין (a_n) או (b_n) לא מתכנסות.

(ה) אם $a_n<1$ לכל n ו-$a_n\to L$, אז $L<1$.

(ו) אם $a_n\le 1$ לכל n ו-$a_n\to L$, אז $L\le 1$.

(ז) אם $a_n\to L\neq 0$ ו-(b_n) אינה מתכנסת, אז (a_nb_n) אינה מתכנסת.

---

19. תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות. הוכיחו או הפריכו:

(א) אם $a_n\to L$ ו-$a_n\neq 0$ לכל n, אז $L\neq 0$.

(ב) אם $a_n+b_n\to 0$ ו-$a_n-b_n\to 0$, אז $a_n\to 0$ ו-$b_n\to 0$.

(ג) אם (a_n) מתכנסת, אז $a_{n+1}-a_n\to 0$.

(ד) אם $a_{n+1}-a_n\to 0$, אז (a_n) מתכנסת.

---

20. מצאו סדרות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ כך שהסדרה (a_n) מתכנסת, הסדרה (b_n) אינה מתכנסת, והסדרה (a_nb_n) מתכנסת.

---

21. לכל אחת מהסדרות הבאות, מצאו את הגבול $\lim_{n\to\infty}a_n$:

(א) $\lim\limits_{n\to\infty} n(\sqrt{3n^2+1}-\sqrt{3n^2})$

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\sin(n)}{n^2+n}$

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2+n\sin(n)-\cos(n)}{2n^2+\sqrt{n}}$

(ד) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+3^n+4^n}$

(ה) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^{0.9}}$

(ו) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n}$

(ז) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n^2+\sin n}$

---

22. חשבו את גבול הסדרה הבאה:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}}.$$

---

23. חשבו את גבול הסדרות הבאות ונמקו את צעדיכם.

(א) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2-2n-1}-\sqrt{n^2+2n-1}\right)$

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^3+1}{2n^2-n}-\dfrac{n^2}{2n+3}\right)$

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+\cos(n)}{\sqrt{n^2+5n+1}}$

24. חשבו את הגבולות הבאים:

(א) $\lim_{n\to\infty} \frac{2n^2-3n}{5n^2+1}$

(ב) $\lim_{n\to\infty} \frac{n^3+1}{2n^4-n}$

(ג) $\lim_{n\to\infty} \frac{(2n+1)(3n-2)}{n^2+4}$

(ד) $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+3n}-n\right)$

(ה) $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$

(ו) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{2n}\right)^{\frac{n+1}{n}}$

---

25. עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו האם היא:

- חסומה / מלעיל ולא מלרע / מלרע ולא מלעיל / לא מלעיל ולא מלרע.
- מונוטונית עולה / עולה ממש / יורדת / יורדת ממש/ אינה מונוטונית.

(א) $1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,\ldots$

(ב) $a_n=(-1)^n-n$

(ג) $b_n=\frac{1}{n^2+1}$

(ד) $c_n=\sqrt{n}-\lfloor\sqrt{n}\rfloor$

---

26. נתונה הסדרה $a_n=\frac{n}{n^2+1}$.

(א) הראו כי הסדרה מונוטונית.

(ב) הראו כי הסדרה חסומה.

---

27. הוכיחו כי הסדרות הבאות מתכנסות וחשבו את גבולותיהן:

(א) $a_1=\sqrt{2}, \quad a_{n+1}=\sqrt{2a_n}$.

(ב) $a_1=\sqrt{7}, \quad a_{n+1}=\sqrt{7+a_n}$.

(ג) $a_{n+1}=\frac{a_n+1}{2}$, כאן a_1 לא ידוע (הכוונה: הפרידו למקרים עבור a_1)

---

28. יהיו $a_1\geq b_1$ **מספרים חיוביים. נגדיר ברקורסיה שתי סדרות באופן הבא:**

$$a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2}, \quad b_{n+1}=\sqrt{a_nb_n}.$$

(א) הוכיחו שלכל $n\in\mathbb{N}$ מתקיים $b_n\leq b_{n+1}\leq a_{n+1}\leq a_n$.

(ב) הראו כי הסדרות (a_n) ו- (b_n) מתכנסות.

(ג) הראו שמתקיים $\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n$.

הגבול המשותף נקרא הממוצע הגאומטרי-אריתמטי של (a_n) ו- (b_n).

---

29. הוכיחו שהסדרה הבאה מתכנסת ומצאו את גבולה: $a_1=3$, $a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{4}{a_n}\right)$.

---

30. חשבו את הגבול הבא ונמקו את צעדיכם: $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+n}{n^2-1}\right)^{2n-1}$

---

31. הוכיחו או הפריכו:

(א) אם $(|a_n|)$ מתכנסת, אז (a_n) חסומה.

(ב) אם (a_nb_n) מתכנסת, אז שתי הסדרות (a_n) ו- (b_n) מתכנסות.

(ג) אם (a_nb_n) מתכנסת, אז לפחות אחת הסדרות (a_n) או (b_n) מתכנסת.

(ד) אם (a_n) אינה חסומה אז בהכרח $a_n\to\infty$ או $a_n\to-\infty$.

(ה) אם (a_nb_n) לא מתכנסת, אז (a_n) או (b_n) לא מתכנסות.

(ו) אם $a_n\to\infty$, אז (a_n) עולה.

(ז) אם $a_nb_n\to\infty$, אז $a_n\to\pm\infty$ או $b_n\to\pm\infty$.

(ח) אם $(a_n),(b_n)$ מתכנסות במובן הרחב, אז (a_nb_n) מתכנסת במובן הרחב.

(ט) אם (a_n) חסומה ואם $b_n\to\infty$ אז $a_n+b_n\to\infty$.

(י) אם (a_n) חסומה ואם $b_n\to\infty$ אז $a_nb_n\to\infty$.

---

32. בכל אחד מהסעיפים (השונים) הבאים, תנו דוגמה לסדרה המקיימת: $a_n\longrightarrow\infty$

(א) $\lim_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$

(ב) $\lim_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=\infty$

(ג) $\lim_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)$ לא קיים.

---

33. חשבו את גבול הסדרות הבאות ונמקו את צעדיכם.

(א) $\lim_{n\to\infty}\frac{(2-(-1)^n)(n^3+n)}{1+2n^2}$

(ב) $\lim_{n\to\infty}\frac{5n+\sqrt[6]{n^7-n^5-n+1}}{\sqrt[4]{1+2n+n^4}+\sqrt[3]{n^2+5}}$

(ג) $\lim_{n\to\infty}n+\sqrt{n^2-n}$

---

34. לכל אחת מהסדרות הבאות, מצאו את הגבול $\lim_{n\to\infty}a_n$**:**

(א) $\lim_{n\to\infty}\frac{n^{700}}{3^n}$

(ב) $\lim_{n\to\infty}\frac{100^n}{n!}$

(ג) $\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{n^n}$

---

35. עבור כל אחת מהסדרות הבאות, בדקו האם הגבול קיים במובן הרחב ומצאו אותו, או הסבירו מדוע לא קיים:

(א) $\lim_{n\to\infty}\frac{2+n^4\cdot\cos(\pi n)}{2+n^2}$

(ב) $\lim_{n\to\infty}\frac{(1+(-1)^n)(n+1)}{3+2n}$

(ג) $\lim_{n\to\infty}\frac{2+(-1)^nn^2+4n^3}{2+5n^3+n^2}$

36. בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו את כל הגבולות החלקיים במובן הרחב של הסדרה הנתונה:

(א) $a_n = \cos\left(\frac{\pi n}{6}\right)$

(ב) $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

(ג) $a_n = (1 + (-1)^n) \cdot n$

(ד) $a_n = (-1)^n \cdot 3^{\frac{n}{n^2+1}} + \frac{1}{n^2}\cos\left(\frac{n}{2}\right)$

(ה) $a_n = (-1)^n \cdot 2^{\frac{1}{2n-1}} \cdot \frac{n^2+5}{n^2-n+1} + \frac{1}{n}\sin\left(e^n\right)$

(ו) $a_n = \frac{((-1)^n - 1)\, n}{\sqrt{n+1}} + \frac{(-1)^n n^3 - 4}{2n^3}$

---

37. בכל אחד מהסעיפים (השונים) הבאים, תנו דוגמה לסדרה המקיימת:

(א) שיש לה גבול חלקי סופי יחיד אך היא אינה מתכנסת.

(ב) שיש לה חמישה גבולות חלקיים.

(ג) שיש לה אינסוף גבולות חלקיים.

---

38. חשבו את גבול הסדרות הבאות ונמקו את צעדיכם.

(א) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^{2n}$

(ב) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n^2+4n-2}{3n^2-6n-5}\right)^{\frac{n^2+3}{2n+5}}$

(ג) $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n$

(ד) $\lim_{n\to\infty} n\left(\ln(n+3) - \ln n\right)$

3 פונקציות

---

39. הגדירו את המושגים הבאים:

(א) תחום ההגדרה הטבעי של נוסחה.

(ב) תמונה של פונקציה.

(ג) פונקציה זוגית.

(ד) פונקציה אי-זוגית.

---

40. הסבירו את ההבדל בין המושג טווח של פונקציה ובין המושג תמונה של פונקציה. תנו דוגמה.

---

41. מצאו את תחום ההגדרה הטבעי של הפונקציות הבאות:

(א) $f(x)=\sqrt{x-1}$

(ב) $f(x)=\sqrt[6]{x^2+1}$

(ג) $f(x)=\dfrac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}$

(ד) $f(x)=\frac{x}{\sin x}$

(ה) $f(x)=\log_2\left(x^2-5x+6\right)$

(ו) $f(x)=\tan(\pi x)$

(ז) $f(x)=\sqrt{\dfrac{x+3}{|x^2-4|}}$

(ח) $f(x)=(-x)^{\frac{3}{2}}$

(ט) $f(x)=\sqrt{\sin(\sqrt{x})}$

(י) $f(x)=\sqrt[4]{\log_2(\tan x)}$

---

42. לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות, קבעו האם הפונקציה זוגית, והאם היא אי-זוגית.

(א) $f(x)=\frac{x}{x^2-1}$

(ב) $f(x)=x^4-3x^2+1$

(ג) $f(x)=\sin(2x)$

(ד) $f(x)=0$

(ה) $f(x)=\dfrac{x^2}{\sqrt{x^4+1}}$

(ו) $f(x)=x+1$

(ז) $f(x)=x^3$

(ח) $f(x)=\log_2\left(\dfrac{1-x^3}{1+x^3}\right)$

---

43. מצאו את התמונה של הפונקציות הבאות:

(א) $f(x)=\frac{2x}{x^2+1}$

(ב) $f(x)=\sqrt{2+x-x^2}$

---

44. עבור כל אחת מהפונקציות הבאות, קבעו האם הפונקציה מחזורית, ואם כן, מצאו מחזור שלה.

(א) $f(x)=x^2$

(ב) $f(x)=\sin(3x)$

(ג) $f(x)=\cos\left(\frac{x}{4}\right)$

(ד) $f(x)=\cos(x)+\sin(x)$

(ה) $f(x)=3.5$

(ו) $f(x)=\lfloor x\rfloor$

פונקציה זו נקראת "פונקציית הערך השלם", והיא מתאימה לכל מספר ממשי את המספר השלם הגדול ביותר שקטן ממנו או שווה לו.

(ז) $f(x)=x-\lfloor x\rfloor$

(ח) פונקצית דיריכלה: $D(x)=\begin{cases}1 & x \text{ רציונאלי}\\ 0 & x \text{ אי-רציונאלי}\end{cases}$

---

45. פונקציה f נקראת חסומה אם קיים מספר ממשי M כך שלכל x בתחום ההגדרה $|f(x)| \leq M$.
באופן שקול, f חסומה אם קיימים מספרים ממשיים $m < M$ כך שלכל x, $m \leq f(x) \leq M$.
הוכיחו כי הפונקציות הבאות חסומות בתחום ההגדרה הטבעי שלהם:

(א) $f(x) = 3 + 4\sin(2x)$

(ב) $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

(ג) $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$

---

46. תהי f פונקציה שהיא גם זוגית וגם אי-זוגית. הוכיחו כי $f(x) = 0$ לכל x בתחום ההגדרה שלה.

---

47. נזכיר שההרכבה $f \circ g$ היא הפונקציה שמוגדרת על ידי $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.
מצאו את ההרכבות $f(g(x)), g(f(x)), f(f(x)), g(g(x))$**:**

(א) $f(x) = x - 1$,$g(x) = x^3$

(ב) $f(x) = x^2 + 3x$,$g(x) = 2^x$

(ג) $f(x) = x^2$,$g(x) = 2^2$

(ד) $f(x) = x^2$,$g(x) = \ln(x)$

(ה) $f(x) = x^2$,$g(x) = 2^x$

(ו) $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$,$g(x) = 2^x$. בסעיף זה מצאו רק את $f(g(x))$ ואת $g(f(x))$.

---

48. הראו כי הפונקציה $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ חד חד ערכית בתחום הגדרתה.

---

49. מצאו פונקציה הופכית לפונקציה $f(x) = 2^{\frac{x+1}{x-1}}$.

---

50. **בדקו את ההפיכות של הפונקציות הבאות. מצאו פונקציות הופכיות בתחומים בהם קיימת פונקציה כזו. כמו כן ציינו באילו תחומים הפונקציות מונוטוניות עולות או יורדות:**

(א) $f(x) = 1 - x^3$

(ב) $f(x) = (x-4)^2 + 3$

(ג) $f(x) = x^2 + 2x + 2$

(ד) $f(x) = \lfloor x \rfloor$

(ה) $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$

(ו) $f(x) = 2^{2^x}$

---

51. **נתבונן בפונקציה** $f(x) = \frac{x^2-1}{x}$

(א) מה תחום ההגדרה של הפונקציה?

(ב) האם הפונקציה מחזורית?

(ג) האם הפונקציה זוגית?

(ד) באילו תחומים הפונקציה מונוטונית עולה או יורדת?

(ה) האם הפונקציה הפיכה? אם לא מצאו תחום בו הפונקציה הפיכה.
