

1- دراسة العقلاء المبرزين


التركيب الكيميائي

penul

سکریا

[illegible]

الشيخ



II- الغالبية والأغلبية

رأس الحمار الوحشي

التركيب الكيميائي

Chick
tall

2. اذكر اسمي

4- الطريق الى المدينة

الحمد لله

[illegible]

CMH I 0220

الشيخ

المجلس الوزاري

OMU II Class -

will

المجلس الولائي

الشيخ المولى

الوصف 04

الحل

٥٨ الذات والآلات

4 در 7

3- مجموعات الزمر الدموية




في مجموعات الزمر الدموية ABO:
 1- مميزات الزمر الدموية

مميزات
 مميزات

الزمر	A	B	AB	O
مستضادات غشائية	B	A	A و B	لا شيء
مستضادات في البلازما	لا شيء	لا شيء	لا شيء	A و B

مؤشر Rh: مادة
 بلا تجزئة فقط

2- تسمية الزمر الدموية

A	B	AB	O
 جزء من خلية الدم + جزء من بروتين H + قاعدة سكريج (حمض سكريج) + NaGAL: سكر طرفي + سكر: أنسيل + غلايكوزامين	 + جزء من بروتين H + قاعدة سكريج (حمض سكريج) + NaGAL: سكر طرفي + سكر: أنسيل + غلايكوزامين	 + جزء من بروتين H + قاعدة سكريج (حمض سكريج) + NaGAL: سكر طرفي + سكر: أنسيل + غلايكوزامين	 + جزء من بروتين H + قاعدة سكريج (حمض سكريج) + NaGAL: سكر طرفي + سكر: أنسيل + غلايكوزامين

4- النوع البيولوجي الكبير لمصاب CMH

مميزات مميزات CMH

لكل فرد تركيبة الاليلية

غير الشبادة
 من أليلات
 المورثة الواحدة

تنوع
 الأليلات

العدد
 المورثات


لكل فرد تركيبة خاصة من مجموعات CMH

تنوع بيولوجي كبير جدا


(ما يقرب من 10⁶ أليلات)

3. النمط الوراثي والأنماط التكوينية

مورثة H (مهيمن ١٩)




مورثة I (مهيمن ٩)




2. مكونات نظام Rh (البروتين):

1. الفئتين بين الموجبة (+) والسالبة (-)



2. النمط الوراثي: + الأنماط التكوينية

مورثة Rh (مهيمن ١٥)



مراحل الاستجابة الخلوية:

مرحلة التعرف: التعرف الحفوي على المستهدف كإحدى مصادره
 يتم ويا مع الضمان الخاصة BCR اختلافاً با إحدى المرات
 على مستوى الأداء الخطية الحفوية

ملاحظة: الزمكان في المتناهي
يكون له LB مستقيمة (أو نقطة) فريدة متساوية) أو خط
مستقيم (أو نقطة)، ثم نوضح البنية في كل LB فكل متساوية
والزمن (أو كل متناهي) خلال LB مستقيمة فريدة متساوية
أو نقطة، ثم نكتب في الفقرة عدد كبير من الأجسام المتساوية
المتساوية.

ما لا يتفق


تربط الأسماء المفردة عن موقع شريط الحدود المستند
في هذه الحالة من النوعية عند العقد متاحة لتتبع
عن موقع العقد على المسارات المتداخلة ، على المستويات
المتداخلة للمعاملات ، فيشكل أنزل كدفعة حول العقدات المتداخلة
في يتم إظهار (تتبع) لها ، فيما يخص بالعمليات ، التي يتم
في هذه العقدات ، فيشكل للقيام على المعاملات ، ثم يتم
الرجوع إلى نقطة المستند

تقريباً الألف والألفين

تكون الذات بمجموعة الجزئيات الخاصة بالفرد والموجودة
على أغشية خلايا الجسم ، أما الادات فهي مجموعة الجزئيات
المرتبعة عن الشخصية والقادرة على التأثير مستقلة
والتفاعل نوعيًا ما بين المستجابات مع الذات عليه.

2- الاستجابة الخاطئة

21.11.2023



- 1- سلسلة 10^2 -
- 2- سلسلة 10^3 -
- 3- موقد 10^4 -
- 4- موقد 10^5 -
- 5- موقد 10^6 -


الحرم ائمة حجة برؤية من طيبة غايية في حكاية
خروجها المختار في مكة المستند الذي هو على انساب

مسئله

افراد


د و ۱

ب و ۱




3 الاستجابة الخلوية

مميزات الخلايا LTC



التعرف على الخلايا المستهدفة




التعرف المناعي : شرح (قتل خلايا LTC على الخلايا المصابة)
ويتم ذلك عن طريق التعرف على المستضدات التي يتم معالجتها بواسطة TCR (خلايا
LTC و MHC) ذاتي معقد المستضدات (الخلايا
المستهدفة)



مراحل التعرف على الخلايا المستهدفة :

1. مرحلة التعرف المناعي : حدوث التفاعل بين خلايا TCR خلايا LTC و مستضدات (MHC) مستهدفة الخلايا المستهدفة.
2. التماس : يربط التماس بين خلايا LTC والخلايا المستهدفة.
3. الهجرة والاختراق : تتحرك الخلايا المستهدفة في خلايا LTC وتنفذ عملية قتلها عن طريق إفراز مواد سامة (تسمى
والإنزيمات القاتلة) في منطقة التماس.
4. تشكيل قنطرة : يتشكل البروتين على غشاء الخلية الخلية
المستهدفة فتتكون قنطرة (تسمى).
5. دخول الماء والسكريات : تسمح هذه القنطرة بدخول الماء والسكريات
إلى الخلية المصابة (والإنزيمات القاتلة).
6. الهدم الخلوي : يؤدي دخول الماء والسكريات إلى حدوث
صدمة خلوية تنتهي بانفجار الخلية وتدميرها.
7. نهاية العملية : تتم هذه العملية بدخول البالعات الكبيرة من
خلال آفة ناتجة عن الخلايا المستهدفة ومن ثم تهاجمها
لتطهير الوسط.

الباب الثاني في الجبر




استجد
خلوة




5. فقد المبدأ
SIDA - المبدأ

والتة فروع VEH

✓ 14. 10. 2020



LTg Wolff




السؤال
الكبير

د. محمد
الشيخ


تأجيل استدعاء النوم لأفروغ VII

يمكن فيروس $gp120$ VIH أن يتكاثر في خلايا CD4 القليلة
المستهدفة هنا ليس مع VIH بالتحديد بل مع
وجود مستقبل كيميائي $CD4$ في صورة أكبر من البنية
الكبرى أو البنية الصغيرة هو مستقبل $CD4$ البنية أكبر
من $CD4$ مما يزيد قوة ارتباط الفيروس بالخلايا $CD4$ بالتكاثر
الفيروسية $gp120$ $CD4$ و $CD4$ هذه الخلايا.

الجزء الثاني من الجغرافيا



قبل التعرف : LT_8 غير منشطة (غير مستقبلات IL_2) LT_4 غير منشطة (غير مستقبلات IL_2) LB غير منشطة (غير مستقبلات IL_2)



آلية التحفيز المناعي