


# Markov Chain Monte Carlo

## *TP 1: Simulation de variables aléatoires discrètes*



# Théorie

## ● Loi forte des grands nombres

Soient  $X_1, X_2, \dots, X_n$  des variables aléatoires de même loi. On note  $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ . Alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mathbb{E}(X) \quad \text{presque sûrement}$$

## ● Théorème Central Limite

Soient  $X_1, X_2, \dots, X_n$  des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées d'espérance  $\mu$  et de variance  $\sigma^2$ .

Alors la loi de

$$Y_n = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma}$$

tend vers la loi normale centrée réduite. En d'autre termes, pour tous  $a$  et  $b$  réels,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left[a \leq \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \leq b\right] = \mathbb{P}[a \leq Z \leq b]$$

ou  $Z$  est une variable gaussienne centrée réduite,  $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ .

# Intervalle de confiance

- On choisi  $a = -1.96, b = 1.96$ . Donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left[\left|\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma}\right| \leq 1.96\right] = 0.95$$

- Un échantillon de  $n$  valeurs de v.a.  $X_i$  est utilisé pour estimer l'espérance inconnue  $\mathbb{E}(X) = \mu$ .

Pour grand  $n$  la probabilité que  $\mu$  se trouve dans l'intervalle de confiance:

$$\bar{X}_n - \frac{1.96 \cdot \sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X}_n + \frac{1.96 \cdot \sigma}{\sqrt{n}}$$

est égale à 0.95.

- Pour grand  $n$  ce résultat reste vrai quand  $\sigma$  est remplacé par l'quart-type de variance empirique  $\sqrt{\text{Var}_{emp}(X)} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2\right)^{\frac{1}{2}}$ :

$$\bar{X}_n - \frac{1.96 \sqrt{\text{Var}_{emp}(X)}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X}_n + \frac{1.96 \sqrt{\text{Var}_{emp}(X)}}{\sqrt{n}}$$

# Simulation d'une v.a. de Bernoulli $X$

- V.a. de Bernoulli  $X$  modélise des succès et des échecs:

$$X = \begin{cases} 1 \text{ (succes)} & \text{avec proba } p_1 = 1/3 \\ 0 \text{ (echec)} & \text{avec proba } p_2 = 2/3 \end{cases}$$

- Simuler une v.a.  $X$  signifie simuler un échantillon des valeurs (réalisations indépendantes) de  $X$ .
- Comment simuler une chaîne de valeurs ( $N_{mc}$  valeurs) 0 et 1 telle que les fréquences d'apparition de 1 et de 0 sont respectivement 1/3 et 2/3?
- Soit une probabilité  $0 \leq p \leq 1$   
**IDEE PRINCIPALE**  $\mathbb{P}[rand() \leq p] = p$   
C'est la définition de la v.a. uniforme  $U$  par sa fonction de répartition:  $F_U(p) = p$

# Simulation d'une v.a. de Bernoulli $X$

- Intuitivement:
  - for  $n = 1 : N_{mc}$
  - $U = \text{rand}()$
  - if  $U < 1/3$ 
    - $X(n) = 1$
    - else  $X(n) = 0$
  - end if
  - end for
- Display( $X$ )
- L'autre possibilité
  - $U = \text{rand}(N_{mc})$
  - $X = (U < 1/3)$

# Vérification de la simulation. Convergence.

- On vérifie que les probabilités des succès et des échecs dans la chaîne sont en effet  $1/3$  et  $2/3$ .
- `function[proba1, proba2]=Freq( $N_{mc}$ )`
  - `counter1=0; counter2=0`
  - `for  $n = 1 : N_{mc}$`
  - `U= rand()`
  - `if U < 1/3`
  - `X( $n$ ) = 1`
  - `counter1=counter1+1`
  - `else X( $n$ ) = 0`
  - `counter2=counter2+1`
  - `end if`
  - `end for`
  - `proba1=counter1/ $N_{mc}$`
  - `proba2=counter2/ $N_{mc}$`
  - `endfunction`
- `for  $N_{mc} = 1 : 200$`
- `[proba1( $N_{mc}$ ),proba2( $N_{mc}$ )] = Freq( $N_{mc}$ )`
- `end for`
- `plot(proba1,'r')`
- `plot(proba2,'g')`

# Simulation d'une v.a. discrete $X$


● Variable aléatoire  $X$  est définie par un tableau:

$\mathbb{P}$	$p_1 = 0.25$	$p_2 = 0.3$	$p_3 = 0.1$	$p_4 = 0.18$	$p_5 = 0.05$	$p_6 = 0.08$
$X$	$a_1 = 1$	$a_2 = 2$	$a_3 = 3$	$a_4 = 4$	$a_5 = 5$	$a_6 = 6$


$\mathbb{P}$	$p_7 = 0.02$	$p_8 = 0.02$
$X$	$a_7 = 7$	$a_8 = 8$

$U = \text{Rand}$




● Idée de simulation: on cherche dans quel intervalle tombe une v.a. uniforme  $U$ .

# Inversion de la fonction de répartition.


$$\sum_{i=1}^{n-1} p_i < \textcolor{red}{Rand}(\text{ }) \leq \sum_{i=1}^n p_i \quad \Rightarrow X = a_{\textcolor{blue}{n}}$$



$$F_X(a_{n-1}) < \textcolor{red}{Rand}(\text{ }) \leq F_X(a_{\textcolor{blue}{n}}) \quad \Rightarrow X = a_{\textcolor{blue}{n}}$$


$$F_X(X) \text{ suit la loi } \textcolor{red}{Rand}(\text{ })$$


$$F_X^{-1}(\textcolor{red}{Rand}(\text{ })) = X$$



# Simulation d'une v.a. discrete $X$



# Simulation d'une v.a. discrete $X$

- **Algorithme 1A: Simulation d'une réalisation de variable aléatoire discrete**
  - Définir le vecteur de probabilité  $p(n)$
  - Définir le vecteur  $a$  des réalisations  $a(n)$  de la variable aléatoire  $X$ .
  - **function[  $X$  ]=V\_A\_Discrete( $p, a$  )**
    - Set  $n = 1, \quad F = p(1)$
    - Générer  $U$  % U=rand()
    - While  $U > F$
    - Set  $F = F + p(n + 1), \quad n = n + 1$
    - end while
    - Set  $X = a(n)$
  - **endfunction**
- On applique **l'Algorithme 1A**  $N_{mc}$  fois pour générer  $N_{mc}$  réalisations de  $X$

# Algo 1B: Simulation d'un échantillon

- On répète l'algorithme 1A  $N_{mc}$  fois pour simuler une chaîne de  $N_{mc}$  valeurs.
- Algorithme 1B de simulation d'une chaîne de valeurs de v.a. discrete.
  - function [ X ]= Chaîne\_valeurs\_V\_A\_Discrete (p, a)
    - for  $n = 1 : N_{mc}$
    - $X(n)=V\_A\_Discrete(p, a)$
    - end
  - endfunction
- Simuler et visualiser une chaîne de réalisations de  $X$ .

# Verification de simulation.

- On vérifie que la loi simulée est bien la loi demandée.  
Il existe trois tests de validation.
- **Test1** On compare l'espérance d'un échantillon simulé avec l'espérance théorique.
- **Test2** On compare la variance d'un échantillon simulé avec la variance théorique.
- **Test3** On construit la fonction de repartition et la fonction de densité d'un échantillon simulé (les fonctions de repartition et de densité empiriques) et on les compare avec les fonctions de repartition et de densité analytiques de la loi demandée.

# Verification de simulation.

## Espérance et variance

- Calcul théorique pour l'espérance et la variance.
  - Calculer l'espérance théorique :  $\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^8 p_i a_i$
  - Calculer la variance théorique  $\mathbb{V}ar(X) = \sum_{i=1}^8 p_i a_i^2 - \mathbb{E}(X)^2$
- Travail à faire. Calcul empirique. Soit  $N_{mc} = 100$ 
  - Calculer l'espérance empirique :  $\mathbb{E}_{emp}(X) = \frac{1}{N_{mc}} \sum_{i=1}^{N_{mc}} X_i$
  - Calculer la variance empirique :  
$$\mathbb{V}ar_{emp}(X) = \frac{1}{N_{mc}} \sum_{i=1}^{N_{mc}} (X_i)^2 - \left( \frac{1}{N_{mc}} \sum_{i=1}^{N_{mc}} X_i \right)^2$$
- Est-ce que le résultat est coherent avec la loi des Grands Nombres?

$$\lim_{N_{mc} \rightarrow \infty} \frac{1}{N_{mc}} \sum_{i=1}^{N_{mc}} X_i = \mathbb{E}(X)?$$

$$\lim_{N_{mc} \rightarrow \infty} \frac{1}{N_{mc}} \sum_{i=1}^{N_{mc}} (X_i)^2 - \left( \frac{1}{N_{mc}} \sum_{i=1}^{N_{mc}} X_i \right)^2 = \mathbb{V}ar(X)?$$

- Faites les mêmes calculs pour  $N_{mc} = 1000$ ,  $N_{mc} = 100000$ . Conclure.

# Simulation de v.a. de Poisson,1

- Soit  $X$  est v.a. de Poisson  $\mathbb{P}(X = n) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!}$ .
- Montrer  $\mathbb{P}(X = n + 1) = \frac{\lambda}{(n+1)} \cdot \mathbb{P}(X = n)$
- Algorithme 2A de simulation de v.a. de Poisson
  - **function**[X]=V\_A\_Poisson( $\lambda$ )
    - Set  $n = 0$ ,  $proba = e^{-\lambda}$ ,  $F = proba$ ;
    - Générer  $U$
    - While  $U > F$
    - Set  $proba = \frac{\lambda}{(n+1)} \cdot proba$ ,  $F = F + proba$ ,  $n = n + 1$
    - end
    - Set  $X = n$
    - end
  - **endfunction**

# Simulation de v.a. de Poisson,2

- Algorithme 2B de simulation de  $N_{mc}$  valeurs de v.a. de Poisson
  - `function [ X ]= Chaine_valeurs_V_A_Poisson (λ)`
  - `for n = 1 : Nmc`
  - `X(n)=V_A_Poisson(λ)`
  - `end`
  - `endfunction`
- Visualiser un échantillon simulé:  $N_{mc} = 100$  terms,  $\lambda = 2$
- Calcul théorique.
  - L'espérance théorique :  $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!} = \lambda$
  - La variance théorique  $\mathbb{V}ar(X) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!} = \lambda$
- Travail à faire. Calcul empirique. Soit  $N_{mc} = 10000$ ,  $\lambda = 2$ 
  - Calculer l'espérance empirique :  $\mathbb{E}_{empirique}(X) = \frac{1}{N_{mc}} \sum_{i=1}^{N_{mc}} X_i$  et comparer avec  $\lambda$
  - Calculer la variance empirique :  
 $\mathbb{V}ar_{empirique}(X) = \frac{1}{N_{mc}} \sum_{i=1}^{N_{mc}} (X_i)^2 - \left( \frac{1}{N_{mc}} \sum_{i=1}^{N_{mc}} X_i \right)^2$  et comparer avec  $\lambda$ .
- Conclure.

# Verification de simulation.

## Fonction de repartition.

- Il y a un échantillon de  $N_{mc}$  v.a. de Poisson. Nous utilisons la définition de la fonction de répartition  $F_X(x) = \mathbb{P}[X \leq x]$ ,  $x \in R$  est une variable classique,
- On choisit un intervalle  $[a, b]$  sur lequel on veut tracer la fonction de repartition, on discrétise cet intervalle en  $N_x$  parties :

$$\Delta x = \frac{b - a}{N_x}, \quad x_i = a + \Delta x \cdot i, \quad 0 \leq i \leq N_x$$

On définit  $F_X(x)$  en chaque point discrete  $x_i$ :

$$F_X(x_i) = \mathbb{P}[X \leq x_i].$$

- On définit la fonction empirique de répartition  $F_X(x)$  en chaque point discrete  $x_i$ :


$$F_X(x_i) = \mathbb{P}[X \leq x_i] = \mathbb{E}[1_{X \leq x_i}] = \frac{1}{N_{mc}} \sum_{n=1}^{N_{mc}} 1_{X_n \leq x_i}$$



# Verification de simulation.

## Fonctions de repartition.

- On calcule le nombre de réalisation  $n_{x_i}$  de v.a.  $X$  qui tombe dans l'intervalle  $] - \infty, x_i]$ , puis on calcule la probabilité:  $\mathbb{P}[X \leq x_i] = \frac{n_{x_i}}{N_{mc}}$ .
- On répète cette procedure pour chaque intervalle  $] - \infty, x_i]$ ,  $i = 1 : N_x$ .



# Verification de simulation.



## Algorithme de simulation de la fonction de repartition

- Simuler un échantillon de  $N_{mc}$  réalisations de v.a.  $X$  et utiliser le vecteur  $X$  comme l'entrée.
- `function [ ] = Repartition_Poisson (X)`
  - Définir  $a$ ,  $\Delta x$  et  $N_x$
  - `for i = 1 : N_x + 1`      % Par une boucle définir les points  $x_i$  d'un vecteur  $x$
  - $x(i) = a + \Delta x \cdot (i - 1)$
  - `counter = 0`      % Initialisation du Compteur
  - `for n = 1 : N_mc`
  - `if X_n ≤ x_i`
  - `counter = counter + 1`
  - `end if`
  - `end for`
  - $\text{Proba}(i) = \frac{\text{Counter}}{N_{mc}}$       % Calcul la probabilité empirique
  - `end for`
  - `plot(x, Proba)`      % Tracer le graphe de la fonction de repartition
- `endfunction`

# Verification de simulation.

## Fonction de la densité.

- Nous utilisons la définition de la fonction de densité  $f_X(x) = \frac{\mathbb{P}[x < X \leq x + \Delta x]}{\Delta x}$
- On choisit l'intervalle  $[a, b]$ , on discrétise cet intervalle en  $N_x$  parties :

$$\Delta x = \frac{b - a}{N_x}, \quad x_i = a + \Delta x \cdot i, \quad 0 \leq i \leq N_x$$

On définit  $f_X(x)$  en chaque point discrete  $x_i$ :

$$f_X(x_i) = \frac{\mathbb{P}[x_i < X \leq x_i + \Delta x]}{\Delta x}.$$

On utilise l'échantillon de v.a.  $X$ , on fixe  $x_i$ , on calcule le nombre de réalisation  $n_{x_i, x_i + \Delta x}$  qui tombe dans l'intervalle  $[x_i, x_i + \Delta x]$ , puis **on calcule la probabilité**:

$$\mathbb{P}[x_i < X \leq x_i + \Delta x] = \mathbb{E}[1_{x_i < X \leq x_i + \Delta x}] = \frac{1}{N_{mc}} \sum_{n=1}^{N_{mc}} 1_{x_i < X_n \leq x_i + \Delta x} = \frac{n_{x_i, x_i + \Delta x}}{N_{mc}}.$$

Cette procedure on répète pour chaque intervalle  $[x_i, x_i + \Delta x]$ ,  $i = 1 : N_x$ .

# Verification de simulation.

## ● Algorithme de simulation de fonction de densité

Pour un paramètre d'entrée on utilise un échantillon de  $N_{mc}$  réalisations de v.a.  $X$ .

- `function[Densite]= Densite_empirique(X)`
  - `for i = 1 : Nx`      % Par une boucle définir les points  $x_i$
  - $x(i) = a + \Delta x \cdot (i - 1)$
  - `counter=0`      %Initialisation du Compteur
  - `for n = 1 : Nmc`
  - `if X(n) ∈ [x(i), x(i) + Δx]`
  - `counter = counter +1`
  - `end if`
  - `end for`
  - $\text{Proba}(i) = \frac{\text{counter}}{N_{mc}}$       % probabilité empirique
  - $\text{Densité}(i) = \text{Proba}(i) / \Delta x$       %  $\Delta x = 1$  si la v. a. est discrete
  - `end for`
  - `plot(x, Densité)`      % Tracer le graphe de la fonction de densité
- `endfunction`

# Travail à faire pour Poisson

- Soient  $\lambda = 2$ ,  $N_{mc} = 10000$ 
  - Simuler la v.a. de Poisson
  - Tracer sa fonction de repartition:  $[a, b] = [0, 10]$ ,  $\Delta = 0.1$ ,  $N_x = 100$
  - Tracer sa fonction de densité:  $[a, b] = [0, 10]$ ,  $\Delta = 0.1$ ,  $N_x = 100$
- Soient  $\lambda = 4$ ,  $N_{mc} = 10000$ 
  - Simuler la v.a. de Poisson
  - Tracer sa fonction de repartition:  $[a, b] = [0, 15]$ ,  $\Delta = 0.15$ ,  $N_x = 100$
  - Tracer sa fonction de densité:  $[a, b] = [0, 15]$ ,  $\Delta = 1$ ,  $N_x = 15$
- Soient  $\lambda = 50$ ,  $N_{mc} = 10000$ 
  - Simuler la v.a. de Poisson
  - Tracer sa fonction de repartition:  $[a, b] = [0, 200]$ ,  $\Delta = 2$ ,  $N_x = 100$
  - Tracer sa fonction de densité:  $[a, b] = [0, 200]$ ,  $\Delta = 1$ ,  $N_x = 200$

# Travail à faire pour v.a. Binomial

- Soient  $N = 20, p = 0.5, N_{mc} = 10000$
- On définit la v.a. Binomiale  $X$  par la somme de  $N$  v.a.indépendantes de Bernoulli  $Y_i$ :

$$X = \sum_{i=1}^N Y_i, \quad Y_i = \begin{cases} 1 & \text{avec proba } p \\ 0 & \text{avec proba } 1 - p \end{cases}$$

- $p$  est la probabilité d'un succès et les valeurs de  $X$  représente le nombre de succès parmi  $N$  essais
- **Simuler la v.a. de Binomiale à partir de la définition à l'aide de v.a. de Bernoulli.**
- Tracer sa fonction de repartition
- Tracer sa fonction de densité

# Simulation 2 de v.a. Binomiale

- La v.a. de loi binomiale  $Bin(N, p)$  s'écrit comme une somme de  $N$  v. a. de Bernoulli  $B(p)$  indépendantes et représente  $k$  succès parmi  $N$  essais:

$$\mathbb{P}(X = k) = C_k^N p^k (1 - p)^{(N-k)}$$

- Monter  $\mathbb{P}(X = k + 1) = \frac{p(N-k)}{(1-p)(k+1)} \cdot \mathbb{P}(X = k)$

- Algorithme 4 de simulation d'une seule variable aléatoire Binomiale.

- `function[ X ]=V_A_Binomiale(p, N)`

- Set  $k = 0$ ,  $proba = (1 - p)^N$ ,  $F = proba$ ;

- Générer  $U$

- While  $U > F$

- Set  $proba = \frac{p(N-k)}{(1-p)(k+1)} \cdot proba$ ,  $F = F + proba$ ,  $k = k + 1$

- end

- Set  $X = k$

- end

- `endfunction`

# Travail à faire pour Binomial

- Soient  $N = 50, p = 0.2, N_{mc} = 10000$ 
  - **Simuler la v.a. Binomial par l'algorithme 4**
  - Calculer l'espérance et la variance empiriques, les comparer avec les valeurs théoriques  
 $\mathbb{E}(X) = Np, \quad \text{Var}(X) = Np(1 - p)$
  - Tracer sa fonction de repartition:  
 $[a, b] = [0, 50], \Delta = 0.5, N_x = 100$
  - Tracer sa fonction de densité:  
 $[a, b] = [0, 20], \Delta = 1, N_x = 20$



# Simulation de v.a. Géométrique

- Soit  $X$  v.a. géométrique avec le paramètre  $p$  telle que  $\mathbb{P}(X = n) = (1 - p)^{n-1} \cdot p$ .  
V. a. géométrique représente le nombre d'essais avant d'arrivé d'un premiere succès. La probabilité d'un succès est  $p$ .
  - Simuler la v.a. Géométrique par l'algorithme 4 avec  $p = 0.2$
  - Tracer sa fonction de densité
  - Simuler la v.a. Géométrique à l'aide de v.a. de Bernoulli.  
Simuler plusieurs fois la v.a. de Bernoulli. Compter le nombre des échecs ( $X = 0$ ) avant d'arrivé d'un premiere succès ( $X = 1$ ). Identifier une valeur de v.a. Géométrique à celle du compteur
  - Tracer la fonction de densité de v.a. Géométrique