

Chapitre Vecteurs et opérations

16

16.1 Somme de vecteurs

Théorème 16.1 L'enchaînement d'une translation de vecteur \vec{u} puis d'une translation de vecteur \vec{v} est aussi une translation.

Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ est le vecteur associé à la translation obtenue.





Figure 16.1 – C est l'image de A par l'enchaînement des translation de vecteur \vec{u} puis \vec{v} .
 $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
 En prenant un autre point de départ A' on obtient un autre représentant de $\vec{u} + \vec{v}$:
 $\overrightarrow{XZ} = \overrightarrow{AC} = \vec{u} + \vec{v}$

Relation de Chasles

Pour tout points A , B et C : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$

■ **Exemple 16.2** Placer les points B et Q tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}$ et $\overrightarrow{PQ} = \vec{v} + \vec{w}$



Pour tout points A et B . D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$$

On dira que $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ est l'opposé du vecteur \overrightarrow{AB} .

Opposé du vecteur

L'opposé du vecteur \vec{u} est le vecteur noté $-\vec{u}$.

$$\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$$

Deux vecteurs opposés ont même direction, même longueur, mais sont de sens contraires.


Soit un repère $(O; I, J)$ et les vecteurs $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $(\vec{u} + \vec{v}) \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$

Le vecteur $-\vec{u} \begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}$


16.2 Exercices : sommes de vecteurs

■ **Exemple 16.3** Placer les points B , D et F tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}$, $\overrightarrow{CD} = \vec{u} - \vec{v}$ et $\overrightarrow{EF} = \vec{v} - \vec{u}$




Pour les exercices 1 à 4, $ABCDEF$ est un hexagone régulier de centre O et rayon 1. Écrire le plus simplement possible les sommes ci-dessous en utilisant des points de la figure ou le vecteur nul, ou un nombre.

Exercice 1




- $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} =$
- $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} =$
- $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} =$
- $OA + OV =$
- $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{AB} =$
- $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{FA} =$

Exercice 2



- $\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{AF} =$
- $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{DE} =$
- $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OE} =$
- $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OC} =$
- $OA + OE + OC =$
- $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{DE} =$


Exercice 3

a) $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} =$

b) $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} =$

c) $\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{FA} =$

d) $\overrightarrow{DO} - \overrightarrow{AB} =$

Exercice 4

a) $\overrightarrow{DF} - \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{DB} =$

b) $\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{DE} =$

c) $\overrightarrow{OC} - (\overrightarrow{EO} + \overrightarrow{DE}) =$

■ **Exemple 16.4** En utilisant la relation de Chasles, compléter les égalités suivantes où « ... » représente le nom d'un point :

a) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \dots \overrightarrow{C}$

b) $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{F \dots} + \overrightarrow{U \dots}$

c) $\overrightarrow{OU} + \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{UR} = \dots \dots$

d) $\overrightarrow{RT} = \dots \overrightarrow{I} + \overrightarrow{I \dots}$

e) $\overrightarrow{XY} = \dots \overrightarrow{M} + \dots \overrightarrow{N} + \dots \dots$

Exercice 5 Simplifier les expressions suivantes à l'aide de la relation de Chasles :

a) $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DA} = \dots$

b) $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DB} = \dots$

c) $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AA} = \dots$

d) $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BA} = \dots$

e) $\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MD} = \dots$

f) $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BA} = \dots$

g) $\overrightarrow{KT} + \overrightarrow{TD} + \overrightarrow{KT} = \dots$

h) $\overrightarrow{BQ} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{QA} - \overrightarrow{QB} = \dots$

Exercice 6

En utilisant la relation de Chasles, compléter les égalités suivantes où « ... » représente le nom d'un point :

a) $\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{\dots A} + \overrightarrow{A \dots}$

b) $\overrightarrow{HG} + \overrightarrow{\dots} = \overrightarrow{HF}$

c) $\overrightarrow{D \dots} + \overrightarrow{C \dots} = \overrightarrow{\dots B}$

d) $\overrightarrow{A \dots} = \overrightarrow{A \dots} + \overrightarrow{B \dots} + \overrightarrow{CM}$

e) $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{\dots} = \vec{0}$

f) $\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{\dots} = \overrightarrow{AC}$

g) $\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{\dots} = \overrightarrow{DE}$

Exercice 7

Simplifier les expressions suivantes à l'aide de la relation de Chasles :

a) $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DB} =$

b) $\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{BD} =$

c) $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MD} =$

d) $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{DB} =$

e) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{EM} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{EC} =$

f) $-\overrightarrow{AU} + \overrightarrow{SM} - \overrightarrow{ST} + \overrightarrow{MU} =$

Exercice 8

Écrire les sommes demandées à l'aide de vecteurs dont les extrémités sont des points de la figure.

a) $\overrightarrow{GF} + \overrightarrow{CB} = \dots$


b) $\overrightarrow{BG} - \overrightarrow{HG} = \dots$

c) $\overrightarrow{HF} + \overrightarrow{FH} + \overrightarrow{HF} = \dots$

d) $\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{FE} = \dots$

e) $\overrightarrow{HF} - \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \dots$

f) $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{IH} - \overrightarrow{BH} - \overrightarrow{FD} = \dots$



solution de l'exercice 5.

- a) \overrightarrow{BA}
- b) $\vec{0}$
- c) \overrightarrow{BD}
- d) \overrightarrow{AD}
- e) \overrightarrow{DB}
- f) $2\overrightarrow{BD}$

solution de 6.


- a) $\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB}$
- b) $\overrightarrow{HG} + \overrightarrow{GF} = \overrightarrow{HF}$
- c) $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DB}$
- d) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CM}$
- e) $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EF} = \vec{0}$
- f) $\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AC}$
- g) $\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{DE}$

solution de 7.

- a) \overrightarrow{BD}
- b) $2\overrightarrow{DB}$
- c) $\vec{0}$
- d) \overrightarrow{CB}
- e) $\vec{0}$
- f) \overrightarrow{TA}

Exercice 9

Pour chaque cas, représentez $\vec{u} + \vec{v}$ (en bleu) et $\vec{u} - \vec{v}$ (en rouge). Aucune restriction sur l'origine du représentant choisi.



Exercice 10

Pour chacun des cas suivants placer le point M tel que $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ et représenter le parallélogramme $OAMB$ puis écrire le vecteur \overrightarrow{AB} sous la forme $a\vec{i} + b\vec{j}$.

a) $A(1; 4)$ et $B(3; 2)$.







c) $A(-1; 1)$ et $B(-1; 2)$.

e) $A(-2; 1)$ et $B(1; 2)$.

b) $A(-1; 2)$ et $B(3; 1)$.


d) $A(1; 5)$ et $B(1; 1)$.

f) $A(-3; -2)$ et $B(-1; -1)$.



Exercice 11 — décomposer un vecteur en fonction de deux autres.

La figure ci-dessous (répétée 3 fois) est formée de triangles équilatéraux. On pose $\overrightarrow{OC} = \vec{i}$ et $\overrightarrow{OD} = \vec{j}$. Écrire chacun des vecteurs suivants sous la forme $a\vec{i} + b\vec{j}$.



a) $\overrightarrow{BI} =$

b) $\overrightarrow{IA} =$

c) $\overrightarrow{IH} =$

d) $\overrightarrow{EB} =$

e) $\overrightarrow{OG} =$

f) $\overrightarrow{DG} =$

g) $\overrightarrow{GC} =$

h) $\overrightarrow{HE} =$


i) $\overrightarrow{AE} =$

j) $\overrightarrow{AF} =$

k) $\overrightarrow{BD} =$

l) $\overrightarrow{FB} =$

Exercice 12 — décomposer un vecteur en fonction de deux autres. La figure ci-dessous est formée de deux hexagones réguliers de centre O . I, J, K, L, M et N sont les milieux respectifs des segments $[OA], [OB], [OC], [OD], [OE]$ et $[OF]$.



Décomposer chacun des vecteurs suivants selon les vecteurs donnés.

a) $\overrightarrow{BF} = \dots \overrightarrow{OI} + \dots \overrightarrow{OJ}$

b) $\overrightarrow{JD} = \dots \overrightarrow{OI} + \dots \overrightarrow{OK}$

c) $\overrightarrow{CO} = \dots \overrightarrow{OI} + \dots \overrightarrow{OJ}$

d) $\overrightarrow{EA} = \dots \overrightarrow{OI} + \dots \overrightarrow{OK}$

Écrire chacun des vecteurs suivants sous la forme $a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}$.




a) $\overrightarrow{JF} = \dots \overrightarrow{OA} + \dots \overrightarrow{OB}$

b) $\overrightarrow{EK} = \dots \overrightarrow{OA} + \dots \overrightarrow{OC}$

c) $\overrightarrow{CI} = \dots \overrightarrow{OA} + \dots \overrightarrow{OB}$

d) $\overrightarrow{JD} = \dots \overrightarrow{OA} + \dots \overrightarrow{OC}$

solution de 11.



a) $\overrightarrow{BI} = -2\vec{i} + 3\vec{j}$

b) $\overrightarrow{IA} = \vec{i} - 3\vec{j}$

c) $\overrightarrow{IH} = 3\vec{i} - 3\vec{j}$

d) $\overrightarrow{EB} = 2\vec{i} - 2\vec{j}$

e) $\overrightarrow{OG} = -\vec{i} - \vec{j}$

f) $\overrightarrow{DG} = -\vec{i} - 2\vec{j}$

g) $\overrightarrow{GC} = 2\vec{i} + \vec{j}$

h) $\overrightarrow{HE} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$

i) $\overrightarrow{AE} = -\vec{i} + 2\vec{j}$


j) $\overrightarrow{AF} = -\vec{i} + \vec{j}$

k) $\overrightarrow{BD} = -\vec{i} + 2\vec{j}$

l) $\overrightarrow{FB} = 2\vec{i} - \vec{j}$

■

solution de 12.




Décomposer chacun des vecteurs suivants selon les vecteurs donnés.

a) $\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{OI} - 4\overrightarrow{OJ}$

b) $\overrightarrow{JD} = -3\overrightarrow{OI} - \overrightarrow{OK}$

c) $\overrightarrow{CO} = 2\overrightarrow{OI} - 2\overrightarrow{OJ}$

d) $\overrightarrow{EA} = 4\overrightarrow{OI} + 2\overrightarrow{OK}$



Écrire chacun des vecteurs suivants sous la forme $a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}$.

a) $\overrightarrow{JF} = \overrightarrow{OA} - \frac{3}{2}\overrightarrow{OB}$

b) $\overrightarrow{EK} = \overrightarrow{OA} + \frac{3}{2}\overrightarrow{OB}$

c) $\overrightarrow{CI} = \frac{3}{2}\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$


d) $\overrightarrow{JD} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{OA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$

■


16.3 Propriétés des opérations

Élément nul Pour tout vecteur \vec{u} , $\vec{0} + \vec{u} = \vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$.

La somme de 2 vecteurs est indépendante de l'ordre
 Pour tout vecteur \vec{u} et \vec{v} $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.



La somme de plusieurs vecteurs quelconques \vec{u} , \vec{v} et \vec{w} est aussi indépendante de l'ordre :




Pour tout vecteurs \vec{u} , et réel a et b , $a(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$.

Pour tout a et $b \in \mathbb{R}$ et vecteur \vec{u} on a : $a\vec{u} + b\vec{u} = (a+b)\vec{u}$

Pour tout vecteurs \vec{u} , \vec{v} et réel k , $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$.

Démonstration. La figure correspond au cas $k > 0$. Le cas $k < 0$ est similaire.



Exercices bilan opérations sur vecteurs

■ Exemple 16.5

Dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ on donne $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$; $A(1 ; -3)$ et $B(4 ; -5)$.

Calculer les coordonnées de chacun des vecteurs suivants :
 $-3 \overrightarrow{AB}$ $\vec{u} + \overrightarrow{AB}$ $-3\vec{u} + 2\overrightarrow{AB}$ $2 \vec{u} + 5 \overrightarrow{BA}$

Exercice 1

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$ deux vecteurs définis par leurs coordonnées dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

Calculer les coordonnées de chacun des vecteurs suivants :

a) $-\vec{u}$ | b) $\vec{u} + \vec{v}$ | c) $3\vec{u} + 2\vec{v}$ | d) $-5\vec{u} - \vec{v}$ | e) $\frac{1}{2}(\vec{u} - \vec{v})$

Exercice 2

Le plan est muni du repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ et des points $A(-3 ; 2)$, $B(1 ; -2)$, $C(-5 ; 3)$. Déterminer les coordonnées des vecteurs :

a) \overrightarrow{AB} | b) \overrightarrow{AC} | c) $\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$ | d) $2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{BC}$ | e) $\frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{5}\overrightarrow{BC}$

Exercice 3 — révision.

Le plan est muni du repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$. Soient les points $T(1 ; -2)$, $R(0 ; -1)$, $U(5 ; 3)$. Déterminer les coordonnées du point $E(x; y)$ tel que $TRUE$ est un parallélogramme, ainsi que celles du centre F du parallélogramme.

Exercice 4 Le plan est muni du repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$. Soient les points $A(2 ; -3)$, $B(1 ; -1)$, $C(4 ; 5)$

a) Le point $M(x; y)$ est tel que $\overrightarrow{AM} = -2\overrightarrow{BC}$.

Écrire les équations vérifiées par x et y et retrouver les coordonnées de M .

b) Déterminer les coordonnées du point $N(x; y)$ tel que $\overrightarrow{CN} = 2 \overrightarrow{AB} - 3 \overrightarrow{AC}$

c) Déterminer les coordonnées du point $G(x; y)$ tel que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$

Exercice 5

Le plan est muni du repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$. Soient les points $A(3 ; -3)$, $B(2 ; -4)$, $C(-5 ; 1)$

a) Déterminer les coordonnées des vecteurs \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AC} et \overrightarrow{BC} .

b) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{u} = \overrightarrow{AC} + 2 \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = -3\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}$.

c) Déterminer les coordonnées du point D tel que $\overrightarrow{BD} = 2 \vec{u} - \vec{v}$.

d) Déterminer les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{AE} = 2 \overrightarrow{BE} + 2 \vec{u}$

Exercice 6 — révision.

Soit les points $A(-1 ; 3)$; $B(-1 ; 2)$; $C(\frac{5}{2} ; 2)$ et $D(-8 ; 4)$ dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$. Montrer que les droites (AC) et (BD) sont parallèles.

Exercice 7 — révision.

Soit les points $M(1 ; -2)$; $N(0 ; -1)$ et $P(3 ; -4)$ dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$. Montrer que les points M , N et P sont alignés.

Exercice 8 — révision.

Soit les points $A(1 ; 1)$; $B(2 ; -3)$; $C(4 ; x)$ dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$. Trouvez x tel que les points A , B et C sont alignés.

Exercice 9

Dans un repère, on donne les points: $A(1 ; -1)$, $B(-1 ; -2)$ et $C(-2 ; 2)$

- 1) Déterminer les coordonnées du point G vérifiant $\vec{GA} + 2\vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.
- 2) Déterminer les coordonnées du point D vérifiant $\vec{BD} = \vec{BA} + \vec{BC}$.
- 3) Les points B , G et D sont-ils alignés ?

Exercice 10

Dans un repère, on donne les points: $A(-2 ; 2)$, $B(0 ; -3)$ et $C(4 ; 5)$.

- 1) Déterminer les coordonnées du point M vérifiant $\vec{AM} = 2\vec{AB} - 3\vec{AC}$.
- 2) I est le milieu de $[AB]$. Calculer les coordonnées de I
- 3) Montrer que les points C , I et M sont alignés.

Exercice 11


Dans un repère, on donne les points: $A(2 ; 4)$, $B(-2 ; 2)$ et $C(6 ; -1)$. I est le milieu de $[AC]$. G et H sont tels que $\vec{AG} = 2\vec{AB} - \frac{1}{2}\vec{AC}$ et $\vec{BH} = -\frac{1}{3}\vec{BC}$.

- 1) Déterminer les coordonnées de I , G et H .
- 2) Prouver que B est le milieu de $[GI]$
- 3) Montrer que les points A , G et H sont alignés.

Exercice 12 — un classique : approche vectorielle.


Sur la figure ci-contre, $ABCD$ est un carré et les triangles BCE et ABF sont équilatéraux. On considère le repère orthonormé $(A ; B, D)$.

- 1) Représenter les axes du repère.
- 2) Donner les coordonnées des points A , B , C et D .
- 3) Déterminer les coordonnées de F et E .
indice : trigonométrie
- 4) Démontrer que les points D , F et E sont alignés.



■ **Exemple 16.6** — Équation vectorielle sur une droite.


Soit les points A, B . Soit P et Q tel que $\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{QA} - 3\overrightarrow{QB} = \vec{0}$. Placer P et Q .



Exercice 13

Pour chaque cas, exprimer \overrightarrow{AP} en fonction de \overrightarrow{AB} , et placer le point P sur la figure.

- | | | |
|---|--|--|
| a) P est tel que $2\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = \vec{0}$. | | d) S est tel que $-3\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} = \vec{0}$. |
| b) Q est tel que $\overrightarrow{QA} + 2\overrightarrow{QB} = \vec{0}$. | | e) T est tel que $-\overrightarrow{TA} + 3\overrightarrow{TB} = \vec{0}$. |
| c) R est tel que $\overrightarrow{RA} + 5\overrightarrow{RB} = \vec{0}$. | | f) M est tel que $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$. |



■ **Exemple 16.7** — Équation vectorielle dans le plan.

Soit les points $A(1; 2)$, $B(3; 1)$ et $C(4; 5)$ dans le repère (O, \vec{i}, \vec{j}) .

On cherche les coordonnées des points $M(x; y)$ et $N(x; y)$ tel que

$$3\overrightarrow{BM} + 2\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{BN} + 3\overrightarrow{NA} = \overrightarrow{BC}$$

Exercice 14

On donne les points $A(-5; 2)$, $B(3; 0)$ et $C(-1; 4)$. Calculer les coordonnées du point $M(x; y)$ qui vérifie l'équation donné.

- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
| a) $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$ | | c) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{CB}$ | | e) $2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{CM}$ |
| b) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{BC}$ | | d) $\overrightarrow{MA} = 3\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{AC}$ | | f) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ |

16.4 Club maths : Cas particuliers du théorème de Menelaus

Exercice 1


ABC est un triangle. P est le milieu de $[AB]$, Q est un point de (AC) et R est sur le segment $[BC]$. Les graduations sur les droites sont régulières.

L'objectif de cet exercice est de démontrer que les points P , Q et R sont alignés.

- Donner les valeurs des réels a , b et c tel que :

$$\overrightarrow{AP} = a\overrightarrow{AB} \quad \overrightarrow{AQ} = b\overrightarrow{AC} \quad \overrightarrow{BR} = c\overrightarrow{BC}$$

- Montrer que $\overrightarrow{PQ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{5}{4}\overrightarrow{AC}$.
- Exprimer \overrightarrow{PR} en fonction de \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} .
- Montrer que \overrightarrow{PQ} et \overrightarrow{PR} sont multiples l'un de l'autre. Conclure.



Exercice 2


ABC est un triangle. P est le milieu de $[AB]$, Q est un point de (AC) . Les graduations sur les droites sont régulières. R est le point d'intersection des droites (PQ) et (BC) .

On sait que pour un certain nombre k : $\overrightarrow{BR} = k\overrightarrow{BC}$. L'objectif de cet exercice est de trouver k .

- Donner les valeurs des réels a et b tel que :

$$\overrightarrow{AP} = a\overrightarrow{AB} \quad \overrightarrow{AQ} = b\overrightarrow{AC}$$

- Montrer que $\overrightarrow{PQ} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{5}{4}\overrightarrow{AC}$.
- Montrer que $\overrightarrow{PR} = (\frac{1}{3} - k)\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{AC}$.
- Trouver k pour que les vecteurs \overrightarrow{PQ} et \overrightarrow{PR} soient multiples l'un de l'autre.



Exercice 3

ABC est un triangle; P est un point de (AB) , Q un point de (BC) et R un point de (AC) disposés comme sur le dessin (les graduations sur les droites sont régulières).

- Donner les valeurs des réels a , b , et c tels que :

$$\overrightarrow{AP} = a\overrightarrow{AB} \quad \overrightarrow{AR} = b\overrightarrow{AC} \quad \overrightarrow{BQ} = c\overrightarrow{BC}$$

- Exprimer \overrightarrow{PR} en fonction de \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} .
- Démontrer que $\overrightarrow{PQ} = \frac{9}{28}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{7}\overrightarrow{AC}$
- Justifier que $\overrightarrow{PQ} = -\frac{9}{7}\overrightarrow{PR}$. Que conclure ?

