Chapitre

Calculs algébriques 2

2.1 Multiplication de polynômes et simplifications

Règle 1 : Axiome de distributivité

Pour tout réels a,b,$x \in \mathbb{R}$: $(a+b) \times x = (a \times x) + (b \times x)$

interprétation simple : a paquets de $x + b$ paquets de $x = (a+b)$ paquets de x !

Règle 2

Pour tout réel a : $a \times (-1) = (-a)$

Développer est une activité qui consiste à exploiter les 2 règles précédentes jusqu'à plus possible pour écrire une expression égale sous forme d'une **somme de termes**.

■ **Exemple 2.1**

$A = -(a+b+c) = (-1)\times(a+b+c) = -a-b-c$

$B = -(2x-5) = -2x+5$

La double distributivité

Pour tout réels a,b,x, $y \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}(x+y)(a+b) &= x(a+b) + y(a+b)\\ &= xa + xb + ya + yb\end{aligned}$$

■ **Exemple 2.2** Pour $x \in \mathbb{R}$. Développer :

$A = -2(x-2) \times 5(x-3)$ | $B = -2(x-2) + 5(x-3)$

2.1.1 Exercices : développer

Exercice 1 Pour $x \in \mathbb{R}$. Développer simplifier réduire :

$A = 4(x+3) + 6(x+2)$
$B = 5(x-2) + 3(x-1)$

$C = 3(2x+3) - 4(x+1)$
$D = 5(2x+5) - 6(x-2)$

$E = x + 2(x-5) + 8(3-2x)$
$F = 5(x+2) - 2x(3x-4)$

■ **Exemple 2.3 — Je fais.** Développer simplifier et réduire les produits de radicaux :

$A = (\sqrt{3}-2)(\sqrt{6}+5)$
$=$
$=$
$=$
$=$

$B = (\sqrt{8}+3)(\sqrt{2}-1)$
$=$
$=$
$=$
$=$

Exercice 2 — À vous. Même consignes

$A = (\sqrt{7}+3)(\sqrt{3}+5)$
$B = (3+\sqrt{11})(3-\sqrt{11})$

$C = (\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})$
$D = (\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{8}+2)$

$E = (\sqrt{8}-\sqrt{5})(\sqrt{6}-\sqrt{3})$
$F = (4-\sqrt{2})(2-\sqrt{5})$

Exercice 3 Pour $x \in \mathbb{R}$. Développer simplifier réduire :

$A = (x+3)(x+2)$
$B = 2(x-2)(x+4)$
$C = 2 + (x-2)(x+4)$

$D = 2(x-2) + (x+4)$
$E = (x^2+4)(2x-3)$
$F = -(3x-4)(x-5)$

$G = 3(x+5)(x-5)$
$H = -2(3x+4)(4x+2)$
$I = (2x+\sqrt{3})(x-5\sqrt{3})$

■ **Exemple 2.4** Pour $x \in \mathbb{R}$. Développer simplifier et réduire :

$A(x) = (2x+3)^2 - (2x-5)(-3x-4)$
$=$
$=$
$=$
$=$

Exercice 4 Pour $x \in \mathbb{R}$. Développer simplifier réduire :

$A(x) = (2x-3) + (-x+5)(3x-7)$
$B(x) = 5x(3x+1) - (3x+1)(2x+1)$
$C(x) = (x-4)(x+1) + 3(3x+1)(x-1)$

$D(x) = (5x+1)(x+1) - (x-3)(2x-5)$
$E(x) = 2(2x+3)(3x-1) - 5(x+1)(x-1)$

Exercice 5 — 🌵. Pour $x \in \mathbb{R}$. Développer, simplifier et réduire les expressions suivantes.

$A(x) = (x-1)(x^2+x+1)$

$B(x) = (3\sqrt{3}-1)^3$

$C(x) = (a+b+c)^2$

solution exercice 1. $A(x) = 10x+24$; $B(x) = 8x-13$; $C(x) = 2x+5$; $D(x) = 4x+37$; $E(x) = 14-13x$; $F(x) = -6x^2 + 13x + 10$; ■

solution exercice 2. $A(x) = \sqrt{21} + 3\sqrt{3} + 5\sqrt{7} + 15$; $B(x) = -2$; $C(x) = 1$; $D(x) = -2\sqrt{6} - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{5} + 2\sqrt{10}$; $E(x) = -\sqrt{30} - 2\sqrt{6} + \sqrt{15} + 4\sqrt{3}$; $F(x) = -4\sqrt{5} - 2\sqrt{2} + \sqrt{10} + 8$; ■

solution exercice 3. $A(x) = x^2 + 5x + 6$; $B(x) = 2x^2 + 4x - 16$; $C(x) = x^2 + 2x - 6$; $D(x) = 3x$; $E(x) = 2x^3 - 3x^2 + 8x - 12$; $F(x) = -3x^2 + 19x - 20$; $G(x) = 3x^2 - 75$; $H(x) = -24x^2 - 44x - 16$; $I(x) = 2x^2 - 9\sqrt{3}x - 15$; ■

solution de l'exercice 4. $A(x) = -3x^2 + 24x - 38$; $B(x) = 9x^2 - 1$; $C(x) = 10x^2 - 9x - 7$; $D(x) = 3x^2 + 17x - 14$; $E(x) = 7x^2 + 14x - 1$; ■

solution de l'exercice 5. $A(x) = x^3 - 1$; $B(x) = 18 + 13\sqrt{2}$; $C(x) = -82 + 90\sqrt{3}$; ■

2.2 Identités remarquables

Théorème 2.2.1 — Le produit de conjuqués. Pour tout réels a et $b \in \mathbb{R}$:

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$(a-b)$ est le terme conjugué de $(a+b)$.
$(a+b)$ est le terme conjugué de $(a-b)$

Démonstration.
$(a+b)(a-b) =$

$=$

$=$

$=$

■

■ **Exemple 2.5**

$A = (2x-3)(2x+3)$

$=$

$=$

$=$

$B = (\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)$

$=$

$=$

$=$

$(ab)^2 = a^2b^2$



Figure 2.1 – Illustration géométrique du carré de la somme de nombres positifs $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$

Théorème 2.2.2 — Carré de somme. Pour deux nombres $a \neq 0$ et $b \neq 0$:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Démonstration.
$(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$

$=$

$=$

$=$

$(a-b)^2 = (a-b)(a-b)$

$=$

$=$

$=$

■

■ **Exemple 2.6**

$A(x) = (2x-3)^2$

$B(x) = (2x+3)^2$

2.2.1 Exercices : identités remarquables

Exercice 1 $x \in \mathbb{R}$. Développer à l'aide de l'identité remarquable adaptée :

$A = (3x+5)^2$
$B = (x-8)(x+8)$
$C = (1+\sqrt{5})^2$

$D = (\sqrt{2}-1)^2$
$E = (2\sqrt{3}-5)^2$
$F = 2(4x-3)^2$

$G = (6x-5)(6x+5)$
$H = 2(3x-\sqrt{5})^2$
$I = (9\sqrt{2}-7)(9\sqrt{2}+7)$

Exercice 2 Même consignes.

$A(x) = (5x+\sqrt{3})^2 - x^2$
$B(x) = (6x+9)^2 - (x-5)(x-5)$

$C(x) = (5x+2)^2 - (2x+3)(2x-3)$
$D(x) = (3x+2)(3x-2) - 2(x-5)^2$

■ **Exemple 2.7 — Je fais.** Transformer les fractions suivantes, pour obtenir une fraction égale ayant un dénominateur entier :

$$\frac{7}{3\sqrt{5}} = \frac{7\times\sqrt{5}}{3\sqrt{5}\times\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{\sqrt{25}} = \frac{7\sqrt{5}}{5}$$

$$\frac{3}{\sqrt{12}} = \quad = \quad = \quad =$$

$$\frac{4}{\sqrt{8}} = \quad = \quad = \quad =$$

Exercice 3 — À vous. Mêmes consignes.

$A = \dfrac{5}{\sqrt{7}}$
$B = \dfrac{10}{\sqrt{6}}$

$C = \dfrac{2}{\sqrt{10}}$
$D = \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$

$E = \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$
$F = \dfrac{-\sqrt{9}}{\sqrt{3}}$

$G = \dfrac{14}{3\sqrt{7}}$
$H = \dfrac{7}{2\sqrt{3}}$

$I = \dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{10}}$
$J = \dfrac{\sqrt{12}}{2}$

■ **Exemple 2.8 — Je fais.** Mêmes consignes.

$$\frac{3}{2+\sqrt{3}} = \quad = \quad = \quad =$$

$$\frac{4}{\sqrt{5}-2} = \quad = \quad = \quad =$$

$$\frac{6}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} = \quad = \quad = \quad =$$

Exercice 4 — À vous. Mêmes consignes.

$A = \dfrac{2}{4+\sqrt{3}}$
$B = \dfrac{5}{7-\sqrt{5}}$

$C = \dfrac{10}{5+\sqrt{2}}$
$D = \dfrac{15}{\sqrt{7}-5}$

$E = \dfrac{4}{3\sqrt{2}-10}$
$F = \dfrac{3}{4-7\sqrt{3}}$

$G = \dfrac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$
$H = \dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

Transformer les fractions pour rendre le dénominateur entier

Cas 1 Le dénominateur est un produit ayant pour facteur $\sqrt{a}$. On multiplie numérateur et le dénominateur par $\sqrt{a}$.

Cas 2 Le dénominateur est de la forme $a \pm \sqrt{b}$ (ou $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$) on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué.

Exercice 5 — ⊠. Dans la figure ci-contre, $AEFD$, $EGHF$ et $GBJI$ sont des carrés.



1) Exprimer les dimensions du rectangle $IJCH$ en fonction de $\sqrt{5}$
2) Démontrer que $\dfrac{IH}{IJ} = \sqrt{5}$.
3) Quel est le rapport de réduction entre les rectangles $ABCD$ et $IJCH$?

Exercice 6 — classique.

a) Développer simplifier et réduire $(3+5\sqrt{2})^2$. En déduire une écriture simplifiée de $\sqrt{59+30\sqrt{2}}$.

b) Développer simplifier et réduire $(2-\sqrt{5})^2$. En déduire une écriture simplifiée de $\sqrt{9-4\sqrt{5}}$.

solution de l'exercice 1. $A = 9x^2+30x+25$; $B = x^2-64$; $C = 2\sqrt{5}+6$; $D = 3-2\sqrt{2}$; $E = 37-20\sqrt{3}$; $F = 32x^2-48x+18$; $G = 36x^2-60x+25$; $H = 18x^2-12\sqrt{5}x+10$; $I = 113$; ■

solution de l'exercice 2. $A(x) = 24x^2+10\sqrt{3}x+3$; $B(x) = 35x^2+108x+106$; $C(x) = 21x^2+20x+13$; $D(x) = 7x^2+20x-54$; ■

solution de l'exercice 3. $A = \dfrac{5\sqrt{7}}{7}$; $B = \dfrac{5\sqrt{6}}{3}$; $C = \dfrac{\sqrt{10}}{5}$; $D = \dfrac{\sqrt{21}}{7}$; $E = -\sqrt{3}$; $F = \dfrac{2\sqrt{7}}{3}$; $G = \dfrac{\sqrt{7}}{2}$; $H = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$; $I = \sqrt{3}$; ■

solution de l'exercice 4. $A = \dfrac{8-2\sqrt{3}}{13}$; $B = \dfrac{5\sqrt{5}+35}{44}$; $C = \dfrac{50-10\sqrt{2}}{23}$; $D = \dfrac{-25-5\sqrt{7}}{6}$; $E = \dfrac{-20-6\sqrt{2}}{41}$; $F = \dfrac{-21\sqrt{3}-12}{131}$; $G = 4\sqrt{2}+8$; $H = 1$; ■

2.3 Factorisation à l'aide d'un facteur commun

- Factoriser c'est écrire une expression comme somme de facteurs
- En présence de puissances, les transformer en produit de termes.
- « Règle du 1 »

Exemple 2.9

$A = 3x + 45$

$=$

$=$

$B = 3x + 5x^2$

$=$

$=$

$C = 3x + 3$

$=$

$=$

$D = (2x-3)(5x-1) + 2(3x-1)(2x-3)$

$=$

$=$

$=$

$D = 2(3x-2)(5x-1) - (3x-1)(3x-2)$

$=$

$=$

$=$

$D = (2x-3)^2 + (3x-1)(2x-3)$

$=$

$=$

$=$

$E = (2x-3)(5x+1) - (2x-3)$

$=$

$=$

$=$

Exercice 1 — Nous faisons. Pour $x \in \mathbb{R}$. Factoriser au maximum les expressions suivantes :

$A(x) = 25x(2x+1) + 15(2x+1)$
$B(x) = 25(2x+1)^2 - 5x(2x+1)$
$C(x) = (3x+5)(7x-4) - (5x-3)(3x+5)$

$D(x) = 5(2x-1)^2 + (3x-4)(2x-1)$
$E(x) = 5(2x-1)^2 - (3x-4)(2x-1)$
$F(x) = (9x+10)(8x+7) + 8x + 7$

Exercice 2 — À vous. Même consignes :

$A(x) = (2x+5)(2x+7) + 4(2x+5)(x+2)$
$B(x) = (2x+3)(5x+7) + 3(2x+3)(-2x+9)$
$C(x) = (2x+5)(2x+7) - (6x+15)(x+2)$

$D(x) = 2(2x+5)(7x+5) - 3(2x+5)(x+2)$
$E(x) = 3(2+3x) - 2(5+2x)(2+3x)$
$F(x) = 2(x+3)^2 - x - 3$

solution de l'exercice 1 . $A(x) = 5(2x+1)(5x+3)$; $B(x) = 5(2x+1)(9x+5)$; $C(x) = (2x-1)(3x+5)$; $D(x) = (2x+1)(13x+1)$; $E(x) = (2x-1)(7x-1)$; $F(x) = (8x+7)(9x+11)$; ■

solution de l'exercice 2 . $A(x) = 3(2x+5)^2$; $B(x) = -(x-34)(2x+3)$; $C(x) = -(x-1)(2x+5)$; $D(x) = (2x+5)(11x+4)$; $E(x) = -(3x+2)(4x+7)$; $F(x) = (x+3)(2x+5)$; ■

2.4 Factorisations par essai-erreur de $1x^2 + sx + p$

Pour x, a et $b \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} A &= (x+a)(x+b) \\ &= \\ &= x^2 + \dots\dots\dots x + \dots\dots\dots \end{aligned}$$

développer

réduire

Pour factoriser : $B = 1x^2 + sx + p$

Consignes Pour tout $x \in \mathbb{R}$, les expressions suivantes se factorisent sous la forme $(x+a)(x+b)$ avec a et $b \in \mathbb{Z}$. Retrouver les formes factorisées

■ **Exemple 2.10 — Cas p>0.** On cherche des entiers a et b de même signe.

$A = x^2 + 7x + 10$

$B = x^2 - 9x + 20$

Exercice 1 — À vous. Mêmes consignes

$A(x) = x^2 + 6x + 5$	$C(x) = x^2 - 17x + 16$	$E(x) = x^2 + 7x + 10$	$G(x) = x^2 + 8x + 12$
$B(x) = x^2 + 10x + 16$	$D(x) = x^2 + 6x + 8$	$F(x) = x^2 - 7x + 12$	$H(x) = x^2 - 13x + 40$

Exercice 2

En remarquant que $x^2 + 25 = x^2 + 0x + 25$, expliquer pourquoi il n'est pas possible de trouver $a, b \in \mathbb{R}$ tel que « pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $x^2 + 25 = (x+a)(x+b)$ ».

■ **Exemple 2.11 — Cas p<0.** On cherche des entiers a et b de signes contraires.

$A = x^2 + 2x - 3$

$B = x^2 - 5x - 15$

Exercice 3 — À vous. Mêmes consignes

$A(x) = x^2 + x - 6$	$C(x) = x^2 - 6x - 40$	$E(x) = x^2 + 2x - 8$	$G(x) = x^2 + x - 30$
$B(x) = x^2 - 5x - 14$	$D(x) = x^2 - x - 12$	$F(x) = x^2 + 5x - 24$	$H(x) = x^2 - 19x - 20$

Exercice 4 Pour tout $x \in \mathbb{R}$ tel que les dénominateurs sont non nuls, Factoriser numérateurs et dénominateurs puis simplifier au maximum les fractions algébriques suivantes :

$$A(x) = \frac{x^2+5x+6}{x^2+3x} \quad \Bigg| \quad B(x) = \frac{x^2+6x-7}{x^2-x} \quad \Bigg| \quad C(x) = \frac{x^2-9}{x^2+10x+21} \quad \Bigg| \quad D(x) = \frac{x^2-3x-28}{x^2-8x+7}$$

■ **Exemple 2.12** Mettre sous forme d'une fraction algébrique simplifiée au maximum les expressions suivantes. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ tel que les dénominateurs sont non nuls :

$$A(x) = \frac{x}{x^2+3x+2} + \frac{2}{x^2+3x+2}$$
$$=$$
$$=$$
$$=$$

$$B(x) = \frac{x^2}{x^2-4x+5} - \frac{2x+3}{x^2-4x+5}$$
$$=$$
$$=$$
$$=$$

Exercice 5 Mêmes consignes :

$$A(x) = \frac{x^2}{x+1} - \frac{1}{x+1}$$
$$B(x) = \frac{3x}{6x+8} + \frac{4}{6x+8}$$
$$C(x) = \frac{x^2}{x^2-3x+2} + \frac{3x-4}{x^2-3x+2}$$

$$D(x) = \frac{x^2}{x^2+5x-14} - \frac{3x-2}{x^2+5x-14}$$
$$E(x) = \frac{x^2+8x}{x^2+10x+25} + \frac{15}{x^2+10x+25}$$
$$F(x) = \frac{x^2}{x^2-2x+1} - \frac{6x-5}{x^2-2x+1}$$

solution de l'exercice 1 .

$A(x) = (x+1)(x+5)$; $B(x) = (x+2)(x+8)$; $C(x) = (x-16)(x-1)$; $D(x) = (x+2)(x+4)$; $E(x) = (x+2)(x+5)$; $F(x) = (x-4)(x-3)$; $G(x) = (x+2)(x+6)$; $H(x) = (x-8)(x-5)$; ■

solution de l'exercice 3 .

$A(x) = (x-2)(x+3)$; $B(x) = (x-7)(x+2)$; $C(x) = (x-10)(x+4)$; $D(x) = (x-4)(x+3)$; $E(x) = (x-2)(x+4)$; $F(x) = (x-3)(x+8)$; $G(x) = (x-5)(x+6)$; $H(x) = (x-20)(x+1)$; ■

solution de l'exercice 4 .

$A(x) = \dfrac{x+2}{x}$; $B(x) = \dfrac{x+7}{x}$; $C(x) = \dfrac{x^2-96}{x^2+10x+21}$; $D(x) = \dfrac{x+4}{x-1}$; ■

solution de l'exercice 5 .

$A(x) = x-1$; $B(x) = \dfrac{1}{2}$; $C(x) = \dfrac{x+4}{x-2}$; $D(x) = \dfrac{x-1}{x+7}$; $E(x) = \dfrac{x+3}{x+5}$; $F(x) = \dfrac{x-5}{x-1}$; ■

2.5 Factorisation à l'aide d'identités remarquables

Exercice 1 Compléter les égalités suivantes par des identités remarquables :

$$\begin{aligned}
(x - \ldots\ldots)^2 &= \ldots\ldots x^2 - \ldots\ldots x + 36 \\
(\ldots\ldots + \ldots\ldots)^2 &= 9x^2 + \ldots\ldots x + 16 \\
(\ldots\ldots x + \ldots\ldots)^2 &= \ldots\ldots + 20x + 4 \\
(\ldots\ldots x + \ldots\ldots)(\ldots\ldots - \ldots\ldots) &= 4x^2 - 36 \\
(\ldots\ldots x + \ldots\ldots)(\ldots\ldots - \ldots\ldots) &= 36x^2 - 4
\end{aligned}$$

■ **Exemple 2.13 — factoriser des expressions sous la forme $a^2 \pm 2ab + b^2$.**

$$\begin{aligned}
A &= x^2 + 8x + 16 \\
&= (\quad)^2 \ldots 2 \times (\quad) \times (\quad) \ldots (\quad)^2 \\
&= (\qquad\qquad)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
B &= x^2 - 6x + 9 \\
&= (\quad)^2 \ldots 2 \times (\quad) \times (\quad) \ldots (\quad)^2 \\
&= (\qquad\qquad)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C &= 25x^2 + 80x + 64 \\
&= (\quad)^2 \ldots 2 \times (\quad) \times (\quad) \ldots (\quad)^2 \\
&= (\qquad\qquad)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D &= \frac{1}{4}x^2 + x + 1 \\
&= (\quad)^2 \ldots 2 \times (\quad) \times (\quad) \ldots (\quad)^2 \\
&= (\qquad\qquad)^2
\end{aligned}$$

Exercice 2 Pour $x \in \mathbb{R}$. Factoriser au maximum les expressions suivantes à l'aide d'identités remarquables :

$A(x) = x^2 + 2x + 1$	$D(x) = 4x^2 + 4x + 1$	$G(x) = x^2 + x + \frac{1}{4}$
$B(x) = 1 - 2x + x^2$	$E(x) = 4x^2 + 12x + 9$	$H(x) = 9x^2 - 6\sqrt{5}x + 5$
$C(x) = x^2 + 6x + 9$	$F(x) = 4x^2 - 12x + 9$	$I(x) = 3x^2 - 2\sqrt{3}x + 1$

Exercice 3 Pour $x \in \mathbb{R}$. Factoriser au maximum :

$A(x) = x^2 - 36$	$D(x) = (2x-1)^2 - 25$	$G(x) = 9(2x-1)^2 - 4x^2$
$B(x) = 4x^2 - 36$	$E(x) = (3x+7)^2 - 16$	$H(x) = 4(2x-1)^2 - 25x^2$
$C(x) = 36x^2 - 4$	$F(x) = 4(2x-1)^2 - 100$	$I(x) = 4(2x-1)^2 - 25(x+3)^2$

solution de l'exercice 2 . $A = (x+1)^2$; $B = (x-1)^2$; $C = (x+3)^2$; $D = (2x+1)^2$; $E = (2x+3)^2$; $F = (2x-3)^2$; $G = 1.0\,(1.0x + 0.5)^2$; $H = (3x-5)^2$; $I = (\sqrt{3}x - 1)^2$. ■

solution de l'exercice 3 . $A = (x-6)(x+6)$; $B = 4(x-3)(x+3)$; $C = 4(3x-1)(3x+1)$; $D = 4(x-3)(x+2)$; $E = 3(x+1)(3x+11)$; $F = 16(x-3)(x+2)$; $G = (4x-3)(8x-3)$; $H = -(x+2)(9x-2)$; $I = -(x+17)(9x+13)$; ■

2.6 Fractions algébriques

■ **Exemple 2.14 — Je fais.** Simplifier les expressions suivantes en trouvant un facteur commun :

$A = \dfrac{14x+8}{2x^2+2}$ $\quad B = \dfrac{5x^2+2x}{3x}$ $\quad C = \dfrac{8+4x}{6x+12}$ $\quad C = \dfrac{x^2+4x+4}{x^2-4}$

$=$ $\quad =$ $\quad =$ $\quad =$

$=$ $\quad =$ $\quad =$ $\quad =$

$=$ $\quad =$ $\quad =$ $\quad =$

Exercice 1 — À vous. Pour $x \in \mathbb{R}$ tel que les dénominateurs sont non nuls, simplifier au maximum les fractions algébriques suivantes :

$A(x) = \dfrac{2x-8}{12x-4}$	$D(x) = \dfrac{x^2-9}{x+3}$	$G(x) = \dfrac{x^2+4x^2}{x^2+x}$	$J(x) = \dfrac{x^2+x}{x^2+1}$
$B(x) = \dfrac{2x^2+8x}{4x}$	$E(x) = \dfrac{x-2}{x^2-2x}$	$H(x) = \dfrac{x^3+4x^2}{6x^2+4x}$	$K(x) = \dfrac{x^2+x^2}{3x^3}$
$C(x) = \dfrac{5x-15}{6x-18}$	$F(x) = \dfrac{x^2-10x+25}{x-5}$	$I(x) = \dfrac{x+5}{x^2-25}$	$L(x) = \dfrac{9x^2-12x+4}{9x^2-4}$

■ **Exemple 2.15** Écrire sous la forme d'une unique fraction, pour $x \in \mathbb{R}$ tels que les dénominateurs sont non nuls. Laisser si possible le dénominateur sous forme factorisée.

$A = \dfrac{2}{x+1} + 1$ $\quad B = \dfrac{3}{5x} + \dfrac{11x}{x+1}$ $\quad C = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x-1}$ $\quad D = \dfrac{2}{x+3} + \dfrac{2}{x-3}$

$=$ $\quad =$ $\quad =$ $\quad =$

$=$ $\quad =$ $\quad =$ $\quad =$

$=$ $\quad =$ $\quad =$ $\quad =$

Exercice 2 Même consignes. Simplifier les fractions au maximum.

$A(x) = \dfrac{2x-3}{4} - x$	$E(x) = 2x+1 - \dfrac{2}{2x+1}$	$I(x) = \dfrac{1}{2(x-1)} + \dfrac{1}{6(x+1)}$
$B(x) = \dfrac{3x}{2} + \dfrac{4x+1}{5}$	$F(x) = \dfrac{2}{x-2} + \dfrac{5}{x+3}$	$J(x) = \dfrac{-2}{3(x+3)} + \dfrac{1}{x+2}$
$C(x) = \dfrac{1}{2x-3} + x$	$G(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{3}{x-5}$	$K(x) = \dfrac{1}{2x-7} - \dfrac{1}{2x+9}$
$D(x) = \dfrac{2}{x^2} - \dfrac{5}{3x}$	$H(x) = \dfrac{-2}{x+3} + \dfrac{2}{x-5}$	$L(x) = \dfrac{3}{4(x-3)} - \dfrac{5}{8(x-4)}$

solution de l'exercice 1.

$$A = \frac{x-4}{6x-2};\quad B = \frac{x}{2}+2;\quad C = \frac{5}{6};$$

$$D = \frac{x-3}{x+3};\quad E = \frac{1}{x^2-x-2};\quad F = 1;$$

$$G = \frac{5x}{x+1};\quad H = \frac{x^2+4x}{6x+4};\quad I = \frac{1}{x^2-25};$$

$$J = \frac{x^2+x}{x^2+1};\quad K = \frac{2}{3x};\quad L = \frac{3x-2}{9x^2-4};$$

■

solution de l'exercice 2 .

$$A = -\frac{x}{2} - \frac{3}{4};\quad B = \frac{23x}{10} + \frac{1}{5};\quad C = \frac{2x^2-3x+1}{2x-3};$$

$$D = \frac{6-5x}{3x^2};\quad E = \frac{4x^2+4x-1}{2x+1};\quad F = \frac{7x-4}{(x-2)(x+3)};$$

$$G = \frac{-2x-5}{x(x-5)};\quad H = \frac{16}{(x-5)(x+3)};\quad I = \frac{2x+1}{3(x-1)(x+1)};$$

$$J = \frac{x+5}{3(x+2)(x+3)};\quad K = \frac{16}{(2x-7)(2x+9)};\quad L = \frac{x-9}{8(x-4)(x-3)};$$

■