Chapitre

Equations du second degré 3

3.1 Notion d'équations quadratiques

Soit une fonction quadratique f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0, b, c \in \mathbb{R})$.

L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ est dite **forme standard** d'une équation quadratiques d'inconnue x. Les équations équivalentes sont dites quadratiques.



Figure 3.1 – Les 3 différents cas: (1) f ne s'annule pas et ne change pas de signe, (2) f s'annule mais ne change pas de signe, (3) change de signe 2 fois

Les solutions de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$, inconnue x avec $a \neq 0, b, c \in \mathbb{R}$ peuvent être :

- aucune solution
- 1 solution, la racine double de f
- 2 solutions les racines de f.

L'inéquation $ax^2 + bx + c > 0$, inconnue x avec $a \neq 0, b, c \in \mathbb{R}$ peut avoir comme ensemble de solution :

- $\mathscr{S} = \emptyset$
- $\mathscr{S} = \mathbb{R}$
- $\mathscr{S} =]r_1; r_2[$
- $\mathscr{S} =]-\infty; r_1[\cup]r_2; \infty[$

Exercices : notion d'équation quadratique, rappels de 2ndes

> $ax^2 + bx + c = 0$, avec $a \neq 0$ est la forme standard d'une équation quadratique d'inconnue x.

Exercice 1 Entourez les équations quadratiques à une inconnue.

(E_1) $3(x+1)^2 = 2(x+1)$	(E_3) $\dfrac{1}{x^2} - 1 = 0$	(E_5) $3x^2(x-3) = x$
(E_2) $x^2 + 2x = x^2 - 1$	(E_4) $2x^2 = -3x$	(E_6) $x^2 = 9$

Exercice 2 Complétez les espaces.

1) La forme standard de l'équation $5x^2 = 6x - 8$ est $\ldots\ldots x^2 + \ldots\ldots x + \ldots\ldots = 0$.

2) Si 3 est solution de l'équation $\frac{4}{3}x^2 - 2a + 1 = 0$, inconnue x. Alors $2a = \ldots\ldots$.

3) Si $a - b + c = 0$ et $a \neq 0$, alors une des solutions de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ d'inconnue x est $x = \ldots\ldots$.

4) Si l'équation $mx^2 + 3x - 4 = 0$ est quadratique d'inconnue x, alors $m \neq \ldots\ldots$.

5) Si $k \ldots\ldots$ alors l'équation $(k-3)x^2 + 2x - 1 = 0$ d'inconnue x est une équation quadratique.

6) La forme standard de l'équation $3x^2 = x$ est .....

7) La forme standard de l'équation $x(x+3) = 2x - 5$ est .....

8) Si $a \ldots\ldots$ alors l'équation $(a^2-1)x^3 - (a+1)x^2 + 4 = 0$ est quadratique d'inconnue x.

Exercice 3 Cochez parmi les valeurs proposées celles qui sont solutions de l'équation inconnue x.

$3x^2 - 2x - 1 = 0$ et $\left\{\sqrt{2};\ 1;\ -\dfrac{1}{3}\right\}$

$2x^2 - 3x + 1 = 0$ et $\left\{\dfrac{1}{2};\ 1;\ 2\right\}$

Exercice 4 🌵 Soit l'équation $kx^2 - k(x+2) = x(2x+3) + 1$ d'inconnue x.

a) Ecrire cette équation sous la forme standard $ax^2 + bx + c = 0$.

b) Pour quelles valeurs de k l'équation est-elle quadratique ?

c) Pour quelle(s) valeur(s) de k l'équation est affine ?

d) -1 est-elle une solution de cette équation ?

e) 0 est solution de l'équation. Trouvez k.

■ **Exemple 3.1 — vu en 2nde : résoudre une équation quadratique en prenant les racines carrées.**

$3x^2 - 6 = 21$ $\quad 2x^2 + 8 = 0$ $\quad 4(x+2)^2 - 8 = 0$ $\quad 4(2x+2)^2 = 12$

Exercice 5 Résoudre les équations suivantes.

(E_1) $2x^2 - 18 = 0$	(E_3) $(2x+1)^2 - 32 = 0$	(E_5) $(2x+1)^2 = (3x-2)^2$
(E_2) $3x^2 - 5 = 0$	(E_4) $\sqrt{3}(x+6)^2 - 27\sqrt{3} = 0$	(E_6) $(2x+1)^2 = (x+1)^2$

Exercice 6 L'équation $(2x-1)^2 = a$ d'inconnue x admet deux solutions réelles différentes, $(2x-1)^2 = b$ admet une solution unique, et $(2x-1)^2 = c$ n'a pas de solutions. Comparer les valeurs de a, b et c.

Exercice 7 Complétez les espaces.

1) Si l'équation $(x-a)^2 + b = 0$ admet une solution unique alors b prend le(s) valeur(s) .....

2) Les deux racines de l'équation $(2x-c)^2 - 60$ sont positives alors $c \geqslant$ .....

■ **Exemple 3.2 — vu en 2nde : résoudre par factorisation (facteurs communs ou identités remarquables).**

$4x^2 - 25 = 0$ $\quad 2x(x-3) = 5(x-3)$ $\quad (2x-1)^2 = 2x - 1$ $\quad (3x-1)^2 - (x+2)^2 = 0$

Exercice 8 Factoriser à l'aide de facteurs commun ou différence de carrés puis résoudre.

(E_1) $5x^2 = 4x$	(E_3) $(x+1)^2 - 25 = 0$	(E_5) $9(x+6)^2 + 4 = 0$
(E_2) $x - 2 = x(x-2)$	(E_4) $(x+4)^2 - (2x-1)^2 = 0$	(E_6) $4(x-3)^2 - 5 = 0$

solutions des exercices 5 et 8.

$S_1 = \{-3, 3\}$;	$S_3 = \left\{-\frac{1}{2} + 2\sqrt{2}, -2\sqrt{2} - \frac{1}{2}\right\}$;	$S_5 = \left\{\frac{1}{4}\right\}$;	$S_6 = \left\{-\frac{2}{3}, 0\right\}$;
$S_2 = \left\{-\frac{\sqrt{15}}{3}, \frac{\sqrt{15}}{3}\right\}$;	$S_4 = \left\{-6 - 3\sqrt{3}, -6 + 3\sqrt{3}\right\}$;		

$S_1 = \left\{0, \frac{4}{5}\right\}$;	$S_2 = \{0, 2\}$;	$S_4 = \{-1, 5\}$;	$S_6 = \left\{3 - \frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2} + 3\right\}$;
	$S_3 = \{-6, 4\}$;	$S_5 = \{\}$;	

■

3.2 Le discriminant

Définition 3.1 Pour tout fonction quadratique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$. On appelle discrimant le réel :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
f(x) &= ax^2 + bx + c \\
&= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) \\
&= a\left(x\left(x + \frac{b}{a}\right) + \frac{c}{a}\right) \\
&= a\left(\left(x + \frac{b}{2a} - \frac{b}{2a}\right)\left(x + \frac{b}{2a} + \frac{b}{2a}\right) + \frac{c}{a}\right) \\
&= a\left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a}\right) \\
&= a\left(\left(x - \left(-\frac{b}{2a}\right)\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right) \\
&= a\left[\left(x - \left(-\frac{b}{2a}\right)\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]
\end{aligned}$$

■

Théorème 3.1 — forme factorisée. Pour tout fonction quadratique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

- Si $\Delta < 0$, f n'a pas de racines. Son signe est celui de a.
- Si $\Delta = 0$, f admet une racine double $r = -\dfrac{b}{2a}$. f s'annule mais reste du même signe que a.
- Si $\Delta > 0$. f admet deux racines distinctes :

$$r_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad r_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

.

Exercices : résolution par complétion au carré ou formule quadratique

■ **Exemple 3.3** Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations quadratiques d'inconnue x :

$x^2 - 12 = 0$ $\quad x^2 - 12x = 0$ $\quad x^2 - 12x - 12 = 0$ $\quad x^2 - 12x - 12 > 0$

$x^2 - 2x + 5 = 0$ $\quad x^2 + 4x = 10$ $\quad x^2 + 4x < 10$

À vous : $x^2 - 0.6x - 0.16 = 0$ $\quad 2x^2 + 3x = 7$

Exercice 1 — renforcement. Mêmes consignes.

(E_1) $x^2 - 8x + 13 = 0$	(E_3) $x^2 - 4x + 1 = 0$	(E_5) $3x^2 - 12x + 5 = 0$
(E_2) $x^2 + x - 1 = 0$	(E_4) $4x^2 + 3x + 1 = 0$	(E_6) $3x^2 - 10 = 6x$

solutions de l'exercice 1. $S_1 = \left\{4 - \sqrt{3}, \sqrt{3} + 4\right\}$; $S_2 = \left\{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}, -\frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2}\right\}$; $S_3 = \left\{2 - \frac{\sqrt{21}}{3}, \frac{\sqrt{21}}{3} + 2\right\}$; $S_4 = \{\}$; $S_5 = \left\{2 - \sqrt{3}, \sqrt{3} + 2\right\}$; $S_6 = \left\{1 - \frac{\sqrt{39}}{3}, 1 + \frac{\sqrt{39}}{3}\right\}$; ■

Pour une équation quadratique sous forme standard $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$. Si $\Delta = b^2 - 4ac \geqslant 0$, alors le(s) solution(s) de l'équations quadratique sont données par l'expression :

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Exercice 2 — Formule quadratique. Complétez le tableau à l'aide de la formule quadratique.

Equation	Formule quadratique	simplification	Solutions
$x^2 + 4x + 2 = 0$	$\frac{-(\quad) \pm \sqrt{(\quad)^2 - 4(\quad)(\quad)}}{2(\quad)}$	$\frac{-4 \pm \sqrt{8}}{2}$	$r_1 = -2 + \sqrt{2}$ $r_2 = -2 - \sqrt{2}$
$x^2 - 5x + 3 = 0$	$\frac{-(\quad) \pm \sqrt{(\quad)^2 - 4(\quad)(\quad)}}{2(\quad)}$	$\frac{5 \pm \sqrt{\quad}}{2}$	$r_1 =$ $r_2 =$
$x^2 + x - 2 = 0$	$\frac{-(\quad) \pm \sqrt{(\quad)^2 - 4(\quad)(\quad)}}{2(\quad)}$	$\frac{\quad \pm \sqrt{\quad}}{\quad}$	$r_1 =$ $r_2 =$
$3x^2 + 4 = 12x$	$\frac{-(\quad) \pm \sqrt{(\quad)^2 - 4(\quad)(\quad)}}{2(\quad)}$	$\frac{\quad \pm \sqrt{\quad}}{\quad}$	$r_1 =$ $r_2 =$
$3x^2 + 2\sqrt{3}x = 2$	$\frac{-(\quad) \pm \sqrt{(\quad)^2 - 4(\quad)(\quad)}}{2(\quad)}$	$\frac{\quad \pm \sqrt{\quad}}{\quad}$	$r_1 =$ $r_2 =$
$x^2 + x + \quad = 0$	$\frac{-(\quad) \pm \sqrt{(\quad)^2 - 4(\quad)(-3)}}{2(\quad)}$	$\frac{\quad \pm \sqrt{\quad}}{\quad}$	$r_1 =$ $r_2 =$
$2x^2 \quad x \quad = 0$	$\frac{-(7) \pm \sqrt{(7)^2 - 4(2)(1)}}{2(\quad)}$	$\frac{\quad \pm \sqrt{\quad}}{\quad}$	$r_1 =$ $r_2 =$
$x^2 \quad x \quad = 0$	$\frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4(3)(-4)}}{2(3)}$	$\frac{\quad \pm \sqrt{\quad}}{\quad}$	$r_1 =$ $r_2 =$
$x^2 \quad x \quad = 0$	$\frac{-(\quad) \pm \sqrt{(\quad)^2 - 4(\quad)(\quad)}}{2(\quad)}$	$\frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$	$r_1 =$ $r_2 =$
$x^2 \quad x \quad = 0$	$\frac{-(\quad) \pm \sqrt{(\quad)^2 - 4(\quad)(\quad)}}{2(\quad)}$	$\frac{2 \pm \sqrt{24}}{2}$	$r_1 =$ $r_2 =$
$x^2 \quad x \quad = 0$	$\frac{-(\quad) \pm \sqrt{(\quad)^2 - 4(\quad)(\quad)}}{2(\quad)}$	$\frac{6 \pm \sqrt{28}}{4}$	$r_1 =$ $r_2 =$

Exercice 3 — renforcement. Résoudre les équations suivantes d'inconnue x.

(E_1) $x^2 - 3x - 4 = 0$	(E_3) $x^2 - 4\sqrt{3}x + 10 = 0$	(E_5) $5x^2 - 2x - 7 = 0$
(E_2) $x^2 = 2(x-1)$	(E_4) $-5x^2 - 3x + 2 = 0$	(E_6) $-2x^2 + 6x + 1 = 0$

solutions. $S_1 = \{-1, 4\}$; $S_2 = \{\}$; $S_3 = \left\{-\sqrt{2} + 2\sqrt{3}, \sqrt{2} + 2\sqrt{3}\right\}$; $S_4 = \left\{-1, \frac{2}{5}\right\}$; $S_5 = \left\{-1, \frac{7}{5}\right\}$; $S_6 = \left\{\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{11}}{2}, \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{11}}{2}\right\}$; ■

Défi Exprimer à l'aide de $m \neq 0$ les solutions de $mx^2 + (4m+1)x + 4m + 2 = 0$ d'inconnue x.

3.3 Exercices : le discriminant

Exercice 1 Sans résoudre, entourez l'équation quadratiques ayant deux solutions réelles distinces.

(E_1) $x^2 + 1 = 0$	(E_2) $x^2 + 2x + 3 = 0$	(E_3) $x^2 + 2x + 1 = 0$	(E_4) $x^2 + 2x - 2 = 0$

Exercice 2 Sans résoudre, entourez l'équation quadratiques ayant deux solutions réelles distinces.

(E_1) $x^2 + 2 = 0$	(E_2) $x^2 + x + 3 = 0$	(E_3) $x^2 + x - 1 = 0$	(E_4) $4x^2 - 4x + 1 = 0$

Exercice 3 Complétez les espaces.

1) Pour une équation quadratique sous forme standard $ax^2 + bx + c = 0$, $(a \neq 0)$ le discriminant est donné par $\Delta =$ .....

   Si Δ est ....., l'équation a deux solutions disctinces.
   Si Δ est ....., l'équation a une unique solution.

   Si $\Delta <$, l'équation ..... solutions réelles.

   Si $\Delta \geqslant 0$, les solutions de l'équation sont $r_1 =$ ..... et $r_2 =$ .....

2) Le discriminant de l'équation $2x^2 + 4x - 1 = 0$ vaut $\Delta =$ .....

3) Le discriminant de l'équation $\frac{2}{3}x - x^2 - \frac{1}{3} = 0$ vérifie Δ ..... 0. L'équation ..... solution(s).

4) Le discriminant de l'équation $x^2 - x = \frac{1}{2}$ vérifie Δ ..... 0. L'équation ..... solution(s).

5) L'équation $x^2 + 4x + a = 0$ d'inconnue x admet une unique solution. $a =$ .....

6) L'équation $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 5 = 0$ d'inconnue x admet une unique solution. $m =$ .....

Exercice 4 Sans cherchez à les résoudre donner le nombre de solutions dans $\mathbb{R}$ des équations suivantes d'inconnue x.

(E_1) $2x^2 + 3x = 4$	(E_3) $7x^2 + 1 = 2\sqrt{7}x$	(E_5) $\sqrt{3}x^2 + x = \sqrt{2}$
(E_2) $3x^2 = 2(2x-1)$	(E_4) $4x(x-1) - 3 = 0$	(E_6) $(2x-1)^2 + x(x+2) = 0$

Exercice 5 Sans chechez à la résoudre, donner le nombre de solution de l'équation $x^2 - 2mx + 4(m-1) = 0$ d'inconnue x.

■ **Exemple 3.4** Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations quadratiques d'inconnue x suivantes.

(I_1) $x^2 - 3x - 5 < 0$ | (I_2) $-2x^2 + 3x + 1 \geqslant 0$ | (I_3) $2x^2 + 3x + 5 > 0$

$\Delta =$

La fonction $f(x) = x^2 - 3x - 5$

admet ..... racine(s) réelle(s).

Exercice 6 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

(I_1) $3x^2 - 4x + \dfrac{4}{3} \leqslant 0$ | (I_2) $5x^2 - 50,5x + 5 < 0$ | (I_3) $x^2 + x + 1 > 0$ | (I_4) $-2x^2 + 3x + 1 < 0$

Exercice 7 À l'aide du tableau de signe, résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes d'inconnue x.

(I_1) $(3x^2 + x + 2)(x + 3) \leqslant 0$ | (I_2) $(-5x^2 + x + 4)(3 - 2x) < 0$

x	$-\infty$					$+\infty$
$3x^2 + x + 2$						
$x + 3$						
$\times$						

x	$-\infty$					$+\infty$
$-5x^2 + x + 4$						
$3 - 2x$						
$\times$						

Exercice 8 À l'aide du tableau de signe, résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes d'inconnue x.

(I_1) $\dfrac{3x^2 - 4x + 7}{2x + 1} \leqslant 0$ | (I_2) $\dfrac{3x^2 + 9x + 6}{(x + 3)^2} < 0$

x	$-\infty$					$+\infty$
$3x^2 - 4x + 7$						
$(2x + 1)^2$						
$\dfrac{3x^2 - 4x + 7}{2x + 1}$						

x	$-\infty$					$+\infty$
$3x^2 + 9x + 6$						
$(x + 3)^2$						
$\dfrac{3x^2 + 9x + 6}{(x + 3)^2}$						

solution de l'exercice 6. $\mathscr{S}_1 = \emptyset$; $\mathscr{S}_2 =]0.1, 10.0[$; $\mathscr{S}_3 =]-\infty, \infty[$; $\mathscr{S}_4 = \left]-\infty, \frac{3}{4} - \frac{\sqrt{17}}{4}\right[\cup \left]\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{17}}{4}, \infty\right[$; ■

solution de l'exercice 7. $\mathscr{S}_1 =]-\infty, -3]$; $\mathscr{S}_2 = \left]-\infty, -\frac{4}{5}\right[\cup \left]1, \frac{3}{2}\right[$; ■

solution de l'exercice 8. $\mathscr{S}_1 = \left]-\infty, -\frac{1}{2}\right[$; $\mathscr{S}_2 =]-2, -1[$; ■

3.4 Problèmes : systèmes d'équations

■ **Exemple 3.5** Dans un repère, on se donne la parabole $\mathscr{P}$: $y = 2x^2 + 12x - 31$.

Les coordonées $(x; y)$ des point M intersections de $\mathscr{P}$ avec l'axe des abscisses vérifient :

$$\begin{cases} y = 0 \\ y = 2x^2 + 12x - 29 \end{cases}$$

Le(s) coordonnées $(x; y)$ des points M intersections de $\mathscr{P}$ avec la droite d : $y = -8x + 19$ vérifient le système :

$$\begin{cases} y = -8x + 19 & \text{car} \\ y = 2x^2 + 12x - 29 & \text{car} \end{cases}$$

Exercice 1

Détérminer les coordonnées des points d'intersection entre la parabole $\mathscr{P}$: $y = -x^2 + 2x + 3$ et la droite d : $y = x + 1$

Exercice 2

Détérminer les coordonnées des points d'intersection entre la parabole $\mathscr{P}$: $y = 2x^2 - 3x + 2$ et la droite d : $y = 3x - 2$

Exercice 3

Quel est le nombre de points d'intersection de la parabole $\mathscr{P}$: $y = 3x^2 - 5x + 2$ et la droite d : $y = x - 1$?

Exercice 4 Complétez.

La parabole $\mathscr{P}$: $y = 0.25x^2$ et la droite d : $y = 0.5x + m$ ont un unique point commun $M(x; y)$.

Les coordonnées de M vérifient le système $\begin{cases} \\ \\ \\ \end{cases}$

L'équation $\ldots x^2 + \ldots x + \ldots = 0$ admet une unique solution.

$\Delta = \ldots\ldots\ldots\

Exercice 5 La parabole $\mathscr{P}$: $y = 7x^2 - 5x + 1$ et la droite d : $y = mx$ ont un unique point commun. Déterminer les valeurs possibles de m.

Exercice 6

Détérminer les points d'intersection des paraboles $\mathscr{P}$: $y = x^2 - 3x + 4$ et $\mathscr{Q}$: $y = -x^2 + 4x - 1$

Exercice 7

On a représenté dans le repère ci-contre, la parabole de sommet $S(2; 10)$ passant par $R(4; -10)$ et la droite d.

a) À partir de la représentation graphique, retrouver l'équation réduite de la droite d et la forme standard de l'équation de la parabole $\mathscr{P}$.

b) En déduire les coordonnées exactes des points d'intersection de $\mathscr{P}$ et d.



■ **Exemple 3.6** Résoudre les systèmes suivants par substitution.

$$\begin{cases} y &= x + 1 \\ xy &= 2 \end{cases}$$

à vous : $\begin{cases} y &= 2x + 5 \\ xy &= 12 \end{cases}$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 &= 9 \\ y &= x + 3 \end{cases}$$

à vous : $\begin{cases} x^2 + y^2 &= 17 \\ y &= x + 5 \end{cases}$

Exercice 8 — renforcement. Mêmes consignes.

$$\begin{cases} y &= x + 1 \\ xy &= 12 \end{cases} \qquad \begin{cases} 4xy &= 12 \\ y &= 2x - 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x^2 + y^2 &= 13 \\ x + y &= 5 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x^2 - y^2 + x + 13 &= 0 \\ 2x - y &= 1 \end{cases}$$

3.5 Problèmes : applications des équations quadratiques

Exercice 1

Une entreprise produit un total de 500 tonnes de frites en janvier. En mars, la production est de 720 tonnes. x désigne le **taux d'augmentation** mensuel moyen.

Entourez l'équation vérifiée par x :

(E_1) $500(1+2x) = 720$ | (E_2) $500(1+x)^2 = 720$ | (E_3) $500(1+x^2) = 720$ | (E_4) $720(1+x)^2 = 500$

Exercice 2

Un enclos rectangulaire est adossé à un mur sur un des côtés. La longueur du grillage sur les 3 côtés restant est de 13 m et l'aire de l'enclos est de 20 m^2. x désigne la longueur du côté perpendiculaire au mur.

a) Montrer que x vérifie l'équation $2x^2 - 13x + 20 = 0$.

b) Trouvez les solutions possibles.

Exercice 3

Chaque membre d'un group doit envoyer une photo à tous les autres membres. Un total de 90 photos ont été échangés. x désigne le nombre de membres du groupe.

Donner une équation vérifiée par x et la mettre sous forme standard.

Exercice 4

Un entier à deux chiffres a une valeur égale à 3 fois le carré du chiffre des unités. Le chiffre des dizaines est 2 de plus que le chiffre des unités.

x désigne le chiffre des unités. Donner une équation vérifiée par x et la mettre sous forme standard.

Exercice 5

Quark place 1000 € sur un compte qui rapporte un taux d'intérêts de x par an. À la fin de la première année, il retire 200 € en laissant les 800 € et les intérêts accumulés pour une année supplémentaire. Quark pense en tirer 892.50 € à la fin de la seconde année.

Donner une équation vérifiée par x et la mettre sous forme standard.

Exercice 6

En ligue, chaque équipe joue exactement 1 fois chez elle, et 1 fois en déplacement. Il y a 182 matchs durant la saison. Quel est le nombre d'équipes de cette ligue ?

Exercice 7

Un triangle rectangle a pour hypothénuse de longueur 17 et de périmètre 40. Trouver les longueurs des deux petits côtés.

Exercice 8

Un rectangle a pour aire 225 cm^2. Sa longueur est 16 cm de plus que ca largeur. Trouvez la largeur.

Exercice 9 — résoudre pour factoriser. Complétez.

a) Les solutions de $x^2 + px + q = 0$ d'inconnue x sont 3 et 4.

La forme factorisée de $x^2 + px + q =$ .....

b) Les solutions de l'équation $3x^2 + 4x - 1 = 0$ sont $r_1 = \dfrac{-2+\sqrt{7}}{3}$ et $r_2 = \dfrac{-2-\sqrt{7}}{3}$.

La forme factorisée de $3x^2 + 4x - 1 =$ .....

c) La forme factorisée de $-2x^2 - 3x + 6 =$ .....

d) $y > 0$.Soit l'équation $2x^2 - 8xy - 5y^2 = 0$ d'inconnue x. $\Delta =$ .....

Les solutions de l'équation sont :

$r_1 = \dfrac{-\left(\quad\right) + \sqrt{\quad}}{2\left(\quad\right)} =$ .....; $r_2 = \dfrac{-\left(\quad\right) + \sqrt{\quad}}{2\left(\quad\right)} =$ .....

La forme factorisée de $2x^2 - 8xy + 5y^2 = 2\left(x - \dfrac{\quad + \sqrt{\quad}}{\quad} y\right)\left(x - \dfrac{\quad - \sqrt{\quad}}{\quad} y\right)$

e) Soit $y > 0$. Les solutions de l'équation $3x^2 - 4xy - 4y^2 = 0$ d'inconnue x, sont :

$r_1 =$ .....; $r_2 =$ .....

La forme factorisée de $3x^2 - 4xy - 4y^2 =$ .....

f) Si $x^2 + kx + 5(k-5)$ se factorise en un carré d'une expression, alors $k =$ .....

g) Si $2x^2 - 3x + m + 1$ est factorisable alors $m \in$ .....

Exercice 10 — renforcement. Factoriser les expressions suivantes.

$f_1 = x^2 - 5x + 6$ | $f_2 = 4x^2 - 5$ | $f_3 = 4x^2 + 8x - 1$ | $f_4 = 3x^2y^2 - 5xy - 1$

solution de l'exercice 10 . $f_1(x) = (x-3)(x-2)$; $f_2(x) = 4\left(x - \frac{\sqrt{5}}{2}\right)\left(x + \frac{\sqrt{5}}{2}\right)$; $f_3(x) = 4\left(x + 1 + \frac{\sqrt{5}}{2}\right)\left(x - \frac{\sqrt{5}}{2} + 1\right)$; ■