

ટિશ્યૂકલ્ચરથી કંકોડાના પાકની ખેતી



નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી
આણંદ



-: પ્રસ્તાવના :-

શાકભાજી પાકોમાં કંકોડાનું સ્થાન ખૂબ જ ઊંચુ છે. કંકોડાનો સમાવેશ ક્યુકરબીટેશી વર્ગમાં કરવામાં આવેલ છે. ભારતમાં આ પાકનું વાવેતર પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, ઓરિસ્સા, ઝારખંડ, પૂર્વાંચલ અને આસામ રાજયમાં જોવા મળે છે. ગુજરાતમાં આ પાકની ખેતી જૂજ વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે. તેમાં મુખ્યત્વે વડોદરા, જુનાગઢ, સુરત જીલ્લા તેમજ મહી નદીના કોતર વિસ્તારમાં થાય છે. આ પાકની વ્યવસ્થિત ખેતી વડોદરા અને જૂનાગઢ જિલ્લાનો ઘડો વિસ્તારો કરવામાં આવે છે. કંકોડાનાં ફળનાં ઉંચા બજારભાવ જોતાં આ પાકનું વ્યાપારિક ધોરણે વાવેતર વધવાની પૂરી શક્યતા છે. આમ તો કંકોડા ના પાકને શેઢા પાળા કે નદીના કોતરોમાં થતો પાક કહે છે.

આ પાકની આયુર્વેદિક દૃષ્ટિએ તેમજ પોષક દ્રવ્યોની દૃષ્ટિએ મહત્વ ખૂબ જ ઊંચુ જોવા મળે છે. કંકોડાના મૂળ હરસ, મધુપ્રમેહ, આંતરડાની બિમારી તેમજ પેશાબની તકલીફમાં ખૂબ જ ઉપયોગી માલૂમ પડેલ છે. કોડાનાં ફળ ગોળ અને રંગે લીલાં હોય છે. ફળ ઉપર કાંટા હોય છે અને એટલા માટે જ એને અંગ્રેજો પાન કાર તરીકે ઓળખાવામાં આવે છે. ફળમાં વિટામીન 'સી' અને આયોડીન તત્વ સારા પ્રમાણમાં છે.





-: જમીન અને આબોહવા :-

જમીન:

આ પાકને ગોરાડુ, બેસર, મધ્યમ કાળી સારા નિતારવાળી જમીન વધુ અનુકુળ આવે છે. પ્રથમ જમીનને ઊંડી ખેડી સૂર્યતાપમાં તપવા દેવી ત્યારબાદ કરબથી બે થી ત્રણ વાર ખેડ કરી ઢેફા ભાંગી જમીનને સમતલ કરવી. ખેતરમાંથી પાણીનો નિકાલ સમયસર ન થાય તો જમીનમાં રહેલ કંકોડાની ગાંઠને નુકસાન થઈ શકે છે. જેથી વધારાનાં પાણીનાં નિકાલ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી.

આબોહવા :

કંકોડાનાં પાકને સામાન્ય રીતે ગરમ અને ભેજવાળું હવામાન માફક આવે છે. ફૂલ અવસ્થાએ વાદળછાયુ વાતાવરણ ખૂબજ અનુકુળ આવે છે. પરંતુ ભારે વરસાદ અને વધુ પડતી ઠંડી દરમ્યાન પાકની વૃધ્ધિ ઉપર માઠી અસર પડે છે.



-: વાવેતર :-

કંકોડાના પાકમાં ફલીનીકરણ સારી રીતે થઇ શકે તે માટે દર ૧૦ માદા છોડ દીઠ ૧ નર છોડનું વાવેતર કરવું જરૂરી છે. આ પાકનું વાવેતર જૂન-જુલાઇ માસમાં કરી શકાય છે. જે વિસ્તારોમાં પિયતની સગવડ છે અને બીજથી વાવેતર કરવામાં આવે છે ત્યાં માર્ચ/એપ્રિલ દરમ્યાન પણ વાવેતર થઇ શકે છે. કંકોડાનું વાવેતર બીજ, કંદ અને વેલાનાં કટકા રોપી કરી શકાય છે.

બીજથી વર્ધન:

કંકોડાનું વાવેતર બીજથી કરવામાં આવે તો ઉગેલ છોડમાં નર અને માદા છોડ ૪૦:૬૦ નાં પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ફૂલ આવ્યા બાદ જ નર અને માદા છોડ ઓળખી શકાય છે. જેથી હારમાં દર થાણે જરૂર કરતાં વધુ બીજનું વાવેતર કરવું પડે છે. અને ફૂલ આવ્યા બાદ દર ૧૦ માદા છોડ દીઠ ૧ નર છોડ રાખી બાકીનાં નરનાં છોડ ઉખાડી દૂર કરવામાં આવે છે. આમ બીજથી વાવેતર કરવામાં આવે તો શરૂઆતમાં ફૂલ આવે ત્યાં સુધી વધારાનાં બિનજરૂરી નર છોડની જાળવણી કરવી પડે છે. જેના નર ફૂલો ભમરી આકારના હોય છે. તેથી દરેક થાણે બે થી ત્રણ બીજ થાણવાની જરૂરિયાત પડે છે. વળી બીજથી વર્ધન કરવામાં આવે ત્યારે શરૂઆતમાં વેલાની વૃધ્ધિ ઘણી ધીમી થાય છે. પરિણામે ફૂલો મોડા આવે છે. બીજથી વાવણી માટે એપ્રિલ





-: વાવેતર :-

અંત અથવા મે ના પ્રથમ પખવાડીયામાં કરવી જરૂરી છે જેથી સમયસર વૃધ્ધિ વિકાસ થઈ શકે અને ફૂલ આવ્યા બાદ નર માદા ૯:૧ પ્રમાણમાં રાખી વધારાના નર છોડની પારવણી કરવી જરૂરી છે. સામાન્યતઃ હેકટરે ૨ થી ૨.૫ કિ.ગ્રા. બીજની પ્રતિ જરૂરીયાત પડે છે.

કંદથી વર્ધનઃ

શેઢાપાળા કે વાડમાં કુદરતી રીતે ઉગતા કંકોડાના વેલામાં જમીનમાં કંદ બેસે છે. ચોમાસાની ઋતુ પૂર્ણ થયા બાદ પાકનું જીવન ચક્ર પુરુ થાય છે એટલે આ કંદ જમીનમાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં જળવાય રહે છે અને ત્યારપછીનાં ચોમાસાની ઋતુમાં પ્રથમ વરસાદ થયા પછી આ સુષુપ્ત કંદમાંથી નવા વેલા ફૂટતા હોય છે. આવા છોડ પૂરતી માત્રામાં મળી રહે તો તેમાંથી મળતા કંદથી પણ વાવેતર થઈ શકે છે. આ વાનસ્પતિક વૃધ્ધિની રીત હોય, નર અને માદા છોડના તંદુરસ્ત કંદ અલગ અલગ પસંદગી કરી ૯:૧ પ્રમાણમાં બે હાર વચ્ચે ૧.૫ મીટર અને બે છોડ વચ્ચે ૬૦ સે.મી. ના અંતરે જમીનમાં પોલાણ ન રહે તેમ રોપણી કરવી. ઉપરાંત કંકોડાનાં અગાઉનાં વર્ષનાં વાવેતરમાંથી પાક પૂરો થયે જરૂરી નર માદાની ગાંઠો અલગ અલગ એકત્ર કરી તેને સંગ્રહી રાખી વાવણી સમયે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. કંદથી વાવેતર કરવાથી નર અને માદા છોડનું







-: વાવેતર :-

પ્રમાણ ચોકકસ પણે જાળવી શકાય છે. વળી બીજની સરખામણીએ કંદથી કરેલ વાવેતરમાં વેલાની વૃધ્ધિ ઝડપી અને સારી થાય છે. પાક પણ વહેલો મળે છે. પ્રતિ હેકટરે ૧૪૦૦ નર અને ૧૨,૬૦૦ માદા કંદની જરૂરિયાત રહે છે. એપ્રિલ-અંત થી જૂન રોપવા હિતાવહ છે.

વેલાનાં કટકાથી વર્ધન

ધરૂવાડિયામાં સારી માત્રામાં કહોવાયેલ છાણિયું ખાતર નાંખી ગાદી કયારા બનાવવા. કંકોડાનાં ફળનાં કદ, રંગ, આકાર તથા ઉત્પાદનને ધ્યાનમાં લઇ પસંદગીનાં છોડ ઉપરથી વેલા એકત્ર કરી ત્રણ થી ચાર આંખવાળા ૪૦ થી ૪૫ સે.મી. લંબાઇના પાકટ ટુકડા પસંદ કરી ગાદી કયારા ઉપર ૨૫ થી ૩૦ સે.મી. નાં અંતરે હારમાં ૧૦ થી ૧૫ સે.મી. નાં અંતરે ટૂકડા રોપવા, ગાદી કયારા ઉપર નિયમિત પાણી આપતા રહેવું રોપેલ ટૂકડામાં મૂળો ફૂટી નવી વૃધ્ધિ શરૂ થાય પછી ફેરરોપણી માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાય છે અથવા તો પોલીથીન બેગમાં ૧:૧:૧ નાં પ્રમાણમાં માટી + છાણિયું ખાતર + રેતીનું મિશ્રણ ભરી દરેક બેગમાં એક ટૂકડો રોપવો આ રીતે બેગમાં ટૂકડા રોપ્યા પછી છાંયાવાળી જગ્યામાં ગોઠવવી. બેગમાં નિયમિત પાણી આપતા રહેવું, રોપેલ ટૂકડામાં નવી ફૂટ ચાલુ થયા બાદ ફેરરોપણી કરી શકાય. મે-જૂન માસમાં અનુકૂળ વાતાવરણમાં જમીન ઉપર રોપણી કરવી જોઈએ.





-: પેશી સંવર્ધન :-

પેશી સંવર્ધન એટલે કોઇપણ જીવંત કોષને વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટેનું સાનુકૂડ વાતાવરણ પોષક તત્વો, ૨૬°- ૨૮°સે. ઉષ્ણતાપમાન, પાણી, પ્રકાશ અને પ્રાણવાયુ મળે તો એક કોષમાંથી ફરી સંપૂર્ણ છોડ તૈયાર કરી શકાય છે. જીવંત કોષની તેના પ્રાયોગિક અને વ્યાપારી ધોરણે ઉપયોગને પેશીસંવર્ધન (ટિશ્યૂકલ્ચર) કહેવામાં આવે છે. આમાં કોષ અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી મહદ્ અંશે છોડના કોઈ પણ ભાગ જેવા કે પાન, થડ, ફૂલ, અગ્રકલિકા, કક્ષકલિકા વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

કૃષિ ક્ષેત્રે ઉપયોગી પેશી સંવર્ધનની વિવિધ ઉપયોગીતાઓ :

પાકોમાં સંશોધનનો મુખ્ય હેતુ વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતો/સંકર જાતો તૈયાર કરી તેનું ખૂબ જ ઝડપી રીતે રોપણી માટેના છોડ તૈયાર કરી વાવેતર નીચેનો વિસ્તાર વધારવો જેથી એકમદીઠ ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા વ. પેશી સંર્વધન પધ્ધતિથી વિવિધ પાકોમાં પસંદ કરેલ વિરલ છોડમાંથી ઝડપી રીતે લાખો છોડ તૈયાર કરી ખેડૂતોને રોપણી માટે આપી શકાય છે. માઇક્રોપ્રોપેગેશનની રીતથી વિરલ છોડની અગ્રકલિકા, કાલિકા, પાન, થડ વગેરેનો ઉપયોગ કરી મૂળ માતૃછોડ જેવા (સમાન જીનનિક પોષક તત્વોના માધ્યમમાં છોડનાં યોગ્ય ભાગને મૂકી બંધારણવાળા) અસંખ્ય છોડ ખૂબ જ ઝડપથી તૈયાર કરી શકાય છે.



-: પેશી સંવર્ધન :-

બાગાયત ક્ષેત્રના ઘણા બધા પાકોમાં પેશી સંવર્ધન ધ્વારા વ્યાપારિક ધોરણે અસંખ્ય છોડ તૈયાર કરી ખેડૂતોને આપી શકવાની તાંત્રિક માહિતી ઉપલબ્ધ છે. આ પૈકી ઘણા બધા પાકોમાં પેશીસંવર્ધનથી ઉછરેલા છોડની ક્ષેત્રિય ચકાસણીમાં પ્રચલિત પદ્ધતિથી થતાં વાવેતર કરતાં સારા પરિણામો મળેલ છે.



કંકોડામાં પેશી સંવર્ધન :

હાલમાં બજારમાં મળતાં શાકભાજી તરીકે કંકોડા ખેતરની વાડ અને જંગલોમાંથી વીણીને લાવવામાં આવે છે. આ પાકની વ્યવસ્થિત ખેતી છેલ્લા થોડા વર્ષોથી સૌરાષ્ટ્રમાં કેશોદ અને વડોદરામાં કરજણ તાલુકાનાં



-: પેશી સંવર્ધન :-

કેટલાંક વિસ્તારોમાં થવા લાગી છે. સીઝનમાં આ શાકભાજીનો ભાવ અંદાજિત ₹ ૨૦ પ્રતિ કિલો રહેતો હોવાથી પરવળ-ટીંડોળાની ખેતી કરતાં ખેડૂતો પણ કંકોડાની ખેતી તરફ આકર્ષાયા છે. હાલમાં કંકોડાની કોઈ સુધારેલ જાત ન હોવાથી અને કંકોડા લીલા ફળ તરીકે શાક માટે વપરાતા હોવાથી ખેતી માટે જરૂરી બીજની તીવ્ર ખેંચ વરતાય છે. કંકોડા પરપરાગિત અને દ્વિગૃહી (નર માદા છોડ અલગ) પાક હોવાથી બીજથી વાવેતરમાં લગભગ ૬૦% નર થાય છે તથા મૂળ માતૃ છોડ જેવુ ઉત્પાદન તથા ગુણવત્તા જળવાતી નથી. બીજથી વાવેતરના ઉપરોક્ત પ્રશ્નો ધ્યાનેલેતાં પેશી સંવર્ધનનો ઉપયોગ કરી ગુણવત્તા ને ઉત્પાદનના આધારે સારા માદા છોડ પસંદ કરી મોટી સંખ્યામાં છોડ તૈયાર કરી ખેડૂતોને રોપણી માટે આપવામાં આવે કે જેથી તમામ છોડ માદા હોવાના કારણે વધુ ઉત્પાદન મળે તથા એક સમાન આકાર, કદ અને રંગના ફળ પણ મૂળ માતૃ છોડ જેવા જ મળે અને આ રીતે એકસમાન ઉત્પાદનનો જથ્થો મળવાથી બજારભાવ પણ ઊંચા મળે. આણંદ ખાતેની પેશીસંવર્ધન પ્રયોગશાળામાં આ પાકના પ્રશ્નો અને જરૂરિયાત ધ્યાને લઈ પસંદ કરેલ છોડમાંથી મોટા પાયા ૫૨ છોડ તૈયાર કરવા માટેના વિવિધ પાસાનો અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આ રીતે ઉછરેલા છોડનાં ક્ષેત્રિય પરિણામો પ્રાથમિક તબક્કામાં પ્રોત્સાહનજનક જણાય છે.



-: પેશી સંવર્ધન :-







-: વાવણીનું અંતર :-

કંકોડાનું વાવેતર બે હાર વચ્ચે ૧૨૦ થી ૧૩૫ સે.મી. અને હારમાં બે છોડ વચ્ચે ૪૫ થી ૬૦ સે.મી. નું અંતર રાખી કરવામાં આવે છે. કંકોડાનું વાવેતર જોડિયા હાર પધ્ધતિથી પણ કરી શકાય, જેમાં બે હાર વચ્ચે ૪૫ થી સે.મી. નું અંતર અને બે જોડિયા ચાસ વચ્ચે ૧૨૦ થી ૧૫૦ સે.મી. નું અંતર રાખવામાં આવે છે.

-: માવજત, પિયત અને ખાતર :-

છોડના ઉગાવા બાદ પ્રથમ ત્રણ અઠવાડિયા દરમ્યાન બે થી ત્રણ વખત આંતરખેડ અને બે વખત જરૂરત મુજબ નીંદામણ કરવું.

એપ્રિલ-મે માં ૮ થી ૧૦ દિવસના અંતરે નિયમિત પિયત આપી કંદ, કટકાનો ઉછેર કરવો, જૂન માસમાં વરસાદ મોડો પડે તો હળવું પિયત આપતા રહેવું.

હેકટર દીઠ ૧૫ ટન સારૂ છાણિયુ ખાતર જમીન તૈયાર કરતી વખતે આપવું. રોપણી સમયે ફોસ્ફરસ માટે ૫૪ કિ.ગ્રા. ડી.એ.પી. અને ૫૨ કિ.ગ્રા. પોટાશ હેકટર દીઠ આપવા જોઈએ. નાઈટ્રોજન ખાતર રોપણી બાદ એક થી દોઢ માસે યુરિયા ૩૦ કિ.ગ્રા. પૂર્તિ ખાતર તરીકે આપવું જરૂરી છે.





-: મંડપ અને ટેકા પધ્ધતિ :-

કંકોડા એ વેલાવાળો પાક હોઈ તેને આધારની ખાસ જરૂરિયાત રહે છે. જમીન ઉપર પાથરીને લેતા ફળોનો બગાડ તેમજ ગુણવત્તા જળવાતી ન હોવાથી આ પાકને મંડપ તૈયાર કરી વેલા ચઢાવવામાં આવે છે સામાન્ય રીતે ૨૦ થી ૨૫ દિવસનો પાક થાય, ત્યારબાદ સિમેન્ટનો પોલ અથવા લાકડાના થાંભલા દર ત્રણ હારે એક અને લાઈનમાં ચાર મીટરે એક પ્રમાણે ગોઠવણી કરી તેને ગેલ્વેનાઈઝ તારથી આડા ઊભા બાંધી મંડપ તૈયાર કરવો. આ ટેલીફોન પધ્ધતિમાં તાર ઉપર વેલા ચઢાવવામાં આવે છે, લાકડાનાં થંભા અને ગેલ્વેનાઈઝ તારની કિંમત વધુ હોઈ આ પધ્ધતિ થોડી ખર્ચાળ છે. જે ધ્યાને લેતાં વેલાની કેળવણી માટે કપાસની કરાંઠીનો ઉપયોગ કરી શકાય, ખાસ કરીને જોડિયા હાર પધ્ધતિથી કરેલ વાવેતરમાં બંને ચાસમાં કરાંઠી જમીનમાં ખોસી સામસામે ઉભી કરી ઉપરનાં ભાગે બાંધી દેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ કરાંઠી ઉપર વેલા ચઢાવવામાં આવે છે.







-: લણણી અને ગ્રેડિંગ :-

સામાન્ય રીતે ૩૫ થી ૪૦ દિવસે ફૂલની શરૂઆત થાય છે. ફૂલ આવ્યા બાદ ૧૫ થી ૨૦ દિવસે ઊતારવા લાયક ફળો તૈયાર થાય છે. કંકોડાના પૂર્ણ વિકસેલ તંદુરસ્ત, મધ્યમ કદના, લીલા રંગનાં ફળો ઉતારવાં, ફળો મોડાં ઉતારવામાં આવે તો ફળમાં રહેલ બીજ કઠણ થઈ જાય છે અને ગર્ભનો રંગ સફેદમાંથી ગુલાબી રંગનો થઈ જાય છે. આવાં ફળો શાકભાજી માટે યોગ્ય રહેતાં નથી વળી લણણી મોડી કરવામાં આવે તો ફળોનો રંગ લીલામાંથી પીળો થવા માંડે છે જેથી બજારભાવ ઓછા મળે છે.

ફળો ઉતાર્યા બાદ રોગિષ્ટ, પાકટ ફળો ને અલગ કરી ગ્રેડિંગ કરી ફળોને નુકશાન ન થાય તેમ કપડામાં બાંધી બજારમાં મોકલવા જરૂરી છે. દર અઠવાડિયે ફળોની નિયમિત વિણી કરવી જોઇએ. કંકોડા દોઢ થી બે માસ સુધી ફળો આપે છે. વધુમાં કંકોડાના ફળોને પાણી છાંટવું નહી. પરવળની માફક પાણી છાંટવાથી ફળોના કાકર ખરી પડે છે અને ગુણવત્તા બગડે છે. ફળોનો ઢગલો ન કરતા પહોળા પથરાયેલા રાખવા હિતાવહ છે. ઢગલામાં રાખતાં ફળોના કાકર ખરી પડે છે.









-: પાક સંરક્ષણ :-

કંકોડાના પાકમાં મોલોમશી, તડતડિયાં અને થ્રિપ્સ જેવી ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો કુમળા વેલા અને પાનમાંથી રસ ચૂસી નુકસાન કરે છે. જેનાં નિયંત્રણ માટે ટ્રાયઝોફોસ ૧૦ મી.લી. અથવા એસીફેટ ૧૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

કેટલીક વાર પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ પણ જોવા મળે છે. જેના નિયંત્રણ માટે મીથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૧૦ મી.લી. અથવા ડાયમીથોએટ ૧૦ મી.લી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

કંકોડાનાં ફળોને ફળમાખી પણ નુકસાન કરે છે જેનાં નિયંત્રણ માટે નુકસાન પામેલ તથા ખરી પડેલ ફળો નિયમિત વીણી લઈ નાશ કરવો. આ સિવાય ૫૦ લીટર પાણીમાં ૫૦૦ ગ્રામ ગોળ બરાબર ઓગાળી તેમાં ક્વિન્થીઓન ૫૦ મી.લી. અથવા મેલાથીઓન ૫૦ મી.લી. દવા મિશ્ર કરી વેલા ઉપર મોટાં ફોરાં પડે તે રીતે છાંટવી.









-: વિશિષ્ટ માવજત અને કાળજી :-

1. કંકોડાનો પાક એ દ્વિગૃહી પાક હોઇ, નર અને માદા છોડ અલગ અલગ હોય છે એટલે નર:માદા ગુણોત્તર, પ્રમાણ ૧:૯ રાખવું જરૂરી છે.
2. કંકોડાના ફૂલ સાંજના સમયે ખીલતા હોય છે. આ સમયે પરાગનયન માટેના કીટકોનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે જેથી ફલિનીકરણ પૂરતા પ્રમાણમાં થઇ શકતું નથી અને અવિકસિત ફળો પીળા પડી ખરી જાય છે આમ આર્થિક નુકશાન થાય છે. આમ કૃત્રિમ રીતે હાથથી પરાગનયન કરવાથી ઉત્પાદનમાં વધારો મેળવી શકાય છે. આ ઉપરાંત ગોળ ૫૦૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી સાવરણીથી મોટાફોરે છંટકાવ કરીને પણ મધમાખી જેવા ઉપયેગી કિટકોને આકર્ષી શકાય છે.
3. શિયાળાની શરૂઆતમાં પાક પુરો થાય ત્યારે સુકાઇ ગયેલા વેલાને થડમાંથી કાપી નાખી રહેવા દેવા. આ ગાંઠોને ઉનાળુ ઋતુમાં કરબડીથી ખેડ કરી, હળવું પિયત આપવાથી ફુટી નીકળે છે અને આ પ્રમાણે ગાંઠો ત્રણ વર્ષ સુધી ઉપયોગી બને છે.
4. કંકોડાના પાકને કરસાંઠી, મંડપ કે ટેલિફોન પધ્ધતિથી આધાર આપવાથી ફળોનો બગાડ, ક્હોવારો ઓછો થાય છે.
5. કંકોડાનું બીજ વાવીને વાવેતર કરવા કરતાં કંદથી કરવાથી ફુટ અને વિકાસ વધુ થતા ઉત્પાદન વહેલુ અને વધારે મળે છે.
6. કંદથી રોપણી વખતે કંદની આંખ જમીનની બહાર રાખી કંદને જમીનમાં બરાબર દબાવીને પોલાણ ન રહે તેમ રોપવા.
7. કંકોડાના પાક ને હળવું જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. વધુ પડતા પિયતથી કંદ કહોવાઇ જવાની શક્યતા રહેલી છે.





એનાલ્જેસિક સર્દી ખાંસી માં રાહત પ્રદાન કરે

કંકોડામાં રહેલા મોમોરેડીસિન તત્વ એંટીઓક્સીડેંટ ની જેમ કામ કરે છે

આયુર્વેદ માં કેટલાક રોગો ના ઇલાજ માટે ઉપયોગ કરે છે

કંકોડામાં રહેલા લ્યુટેન જેવા કેરોટોનોઇડ્સ આંખના રોગ અને હૃદય રોગ માં સહાય આપે છે



નાયબ બાગાયત નિયામક

જિલ્લા સેવા સદન, ચોથો માળ,
રૂમ નં. ૪૨૭ થી ૪૨૯, બોરસદ ચોકડી પાસે, આણંદ
ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૨૩