Azadi Ka Amrit Mahotsav

બાગાયત ખાતુ

બાગાયત ખાતુ, ગુજરાત રાજ્ય

બાગવાની મિશન
Horticulture Mission

જામફળની ખેતી



નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી
A/S/12, જિલ્લા સેવા સદન,
ખસ રોડ, બોટાદ - ૩૬૪ ૭૧૦

ફોન નં. ૦૨૮૪૯ - ૨૭૧૩૨૧
Email : ddhbotad@gmail.com, dydir-bag-botad@gujarat.gov.in







જામફળ (GUAVA) :

Scientific name : *Psidium guajava* L.

જમરૂખ તરીકે ઓળખાતો આ પાક ભારતનો સામાન્ય પરંતુ મહત્વનો વેપારી ફળપાક છે અને ફળ પાકોમાં અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે અને આપણા દેશમાં અતિલોકપ્રિય છે. કેરી, કેળા અને મોસંબી પછી તે ચોથો સૌથી મહત્વપૂર્ણ પાક છે તે સમગ્ર ભારતમાં ઉગાડી શકાય છે. ગુજરાત, બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, ઓરિસ્સા, વેસ્ટ બંગાળ, આંધ્ર પ્રદેશ અને તમિલનાડુ એ મુખ્ય રાજ્યો જામફળનું વાવેતર ધરાવે છે. જામફળનો પાક સખત પ્રકારનો હોવાથી, અનુકુળ ન હોય તેવી પરિસ્થિતીઓમાં પણ સારી રીતે થાય છે. આ પાકની ખેતીમાં ફળોનો ઉત્પાદન ખર્ચ ઘણો ઓછો આવે છે. જ્યારે તેના ફળોમાં પોષક તત્વોનું પ્રમાણ ઘણું હોય છે. ફળમાંથી વિટામીન- સી,પેક્ટીન અને શર્કરા જેવા મહત્વના તત્વો રહેલા હોય છે.

હવામાન :

જામફળનો પાક ઉષ્ણ અને સમશીતોષ્ણ કટિબંધ વિસ્તારમાં સારો થાય છે. ઉષ્ણકટિબંધમાં ગરમી અને ઠંડીને લીધે ઝાડ સારી વૃધ્ધિ કરી ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા મીઠા ફળ આપે છે, ઓછો વરસાદ અને સુકુ હવામાન જામફળના પાકને વધુ માફક આવે છે.

જમીન :

નબળી, ક્ષારયુક્ત અને ખાર નિકાલવાળી જમીનમાંથી તમામ પ્રકારની જમીનમાં વાવી શકાય છે તથા ૬.૫ થી ૭.૫ સુધીની pH ધરાવતી જમીનમાં ઉગી શકે છે. તે ઊંડી, સારી રીતે નિકાળવાળી, રેતાળ લોમી જમીનમાં ઉગાડવામાં આવે ત્યારે શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપે છે.

જમીનની તૈયારી અને રોપણી :

જામફળનાં છોડની રોપણી માટેનો ઉત્તમ સમય ચોમાસાની ઋતુમાં જુલાઈ - ઓગસ્ટ માસ ગણાય છે. બે છોડ વચ્ચે ૬ X ૬ મીટર અંતર રાખવામાં આવે છે. ઉનાળાની ઋતુમાં મે માસમાં જમીનની ઊંડી ખેડ, આડી-ઊભી ખેડ અને ખેતરનું સમતલીકરણ એ પ્રથમ કરવું જોઈએ ત્યારબાદ ૦.૬૦ સે.મી. X ૦.૬૦ સે.મી. X ૦.૬૦ સે.મી.ના મોટા ખાડા ખોદવા અને તેને તપવા દેવા જરુરી છે અને તેમાં ૧૦ કિ.ગ્રા . છાણીયું ખાતર માટી સાથે ભેળવી ચોમાસાની શરૂઆતમાં પુરી દેવા. ચોમાસામાં સારો વરસાદ થયા બાદ જામફળની કલમ ખાડાની મધ્યમાં રોપી જરૂર જણાય તો તુરંત પિયત આપવું. રોપણી બાદ કલમને ટેકો આપવો અને ઉછેર માટે કાળજી લેવી.

જાતો :

(૧) અલ્હાબાદ સફેદ :

ઉત્તરપ્રદેશની પ્રખ્યાત આ જાતનાં ઝાડ મધ્યમ ઊંચાઈ ધરાવે છે અને સીધા વધે છે. ફળ મોટા, સુંવાળી છાલવાળા, પીળા રંગનાં અને ખાવામાં ખુબજ મીઠાશવાળા હોય છે, માવો એકદમ સફેદ, મુલાયમ અને સુગંધિત હોય છે. બીજનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. ગુજરાતમાં વાવેતર માટે ભલામણ કરેલ જાત છે.

(૨) લખનૌ -૪૯ (સરદાર) :

આ જાતનું ઝાડ ફળ વધુ આપે છે. ફળ, ગોળ, અંડાકાર, મધ્યમ અને થોડી ખરબચડી છાલ ધરાવતાં પીળા રંગના હોય છે. ફળનો માવો સફેદ, મુલાયમ, સુગંધિત અને થોડા પ્રમાણમાં ખાટો - મીઠો લાગે છે. ફળ પાકે ત્યારે તેના ઉપર ગુલાબી રંગની છાંટ પડે છે. ગુજરાતમાં વાવેતર માટે ભલામણ કરેલ જાત છે.

(૩) ધોળકા :

ભાવનગરી તરીકે ઓળખાતી આ જાત ગુજરાતની સ્થાનિક જાત છે. ધોળકા અને ભાવનગર વિસ્તારમાં વધુ પ્રમાણમાં તેનું વાવેતર થાય છે. આ જાતનાં ઝાડ મોટા અને ભરાવદાર હોય છે અને વધુ ફળ આવે છે. ફળ મોટા, પીળા રંગના, સફેદ માવાવાળા અને નરમ બી વાળા હોય છે. આ જાતનાં ફળ સ્વાદમાં ખૂબજ મીઠા હોય છે.

(૪) રેશમડી :

આ જાત ભાવનગર વિસ્તારમાં ખૂબજ પ્રચલિત છે. ફળ મધ્યમ આકારનાં, ઉપરથી લાંબી ડોકવાળા, રેશમ જેવા મુલાયમ અને પાતળી છાલવાળા હોય છે. માવો સહેજ ગુલાબી રંગનો સુગંધિત અને ઓછા બીજવાળો હોય છે.

(૫) લાલ જામફળ :

આ જાતનાં ફળનાં માવાનો રંગ લાલાશ પડતો હોય છે. તેના ફળ સુગંધિદાર અને મીઠા હોય છે. આ જાત ઘણી આકર્ષક અને પ્રચલિત છે. માવાના લાલ - ગુલાબી રંગના કારણે ૨૦-૨૫ % ઉંચા ભાવ મળે છે તથા તેમાંથી બનતી બનાવટો જેવીકે, જામ, જેલી, સ્કવોશનો રંગ પણ જળવાઈ રહે છે, જેથી પ્રોસેસીંગ માટે ઉત્તમ જાત છે.

(૬) સીડલેસ :

આ જાતનાં ઝાડ ખૂબ જ વૃધ્ધિ પામતાં, ઊંચા અને ઘણી શાખાઓ ધરાવતા, ઓછા ફળ આપનારા હોય છે. ફળ અનિયમિત આકારની, ખરબચડી છાલવાળા, બેડોળ હોય છે, બીજની સંખ્યા ઘણી જ ઓછી જોવા મળે છે. સીડલેસ જામફળની વ્યાપારિક ઉપયોગિતા ખાસ નથી.

(૭) હાઈબ્રીડ -૧ :

આઈ.આઈ.એચ.આર., બેંગ્લોર ખાતેથી બહાર પાડવામાં આવેલી સંકર જાત છે. ઝાડ મધ્યમ કદના વધુ ઉત્પાદન આપે છે. ફળ મધ્યમ કદનાં, સફેદ માવો અને ઓછા અને પોચા બીજવાળા હોય છે. ફળની ગુણવત્તા ખૂબજ સારી છે.

(૮) હાઈબ્રીડ - ૧૬-૧ :

આ જાત પણ બેંગ્લોર ખાતેથી બહાર પાડવામાં આવેલી સંકર જાત છે. ઝાડ મધ્યમ કદનો અને વધુ સારૂ ઉત્પાદન આપે છે. ફળની છાલ ઘણી જ આકર્ષક અને ઓછો લાલ રંગ ધરાવે છે. માવો મુલાયમ અને ઓછા તેમજ પોચા બીજ ધરાવે છે. ખાવા માટે સારી જાત છે.

આ ઉપરાંત મેચલેસ, એપલ કલર, સિલેકશન-૮, મિસરી, ચીત્તદાર, તેહસીલદાર, બનારસી, સુરખા વગેરે જાતો જોવા મળે છે, પરંતુ તેનું વાવેત્તર ગુજરાતમાં વ્યાપારિક ધોરણે કરવામાં આવતું નથી.

ખાતર :

છોડને જરૂરી પોષક તત્વો સેન્દ્રિય ખાતરો જેવા કે છાણીયું ખાતર, કમ્પોસ્ટ, અળસીયાનુ ખાતર, લીલો પડવાશ, તદ્ઉપરાંત બજારમાં મળતાં વિવિધ તત્વો ધરાવતા જૈવિક ખાતરો

જેવા કે એઝેટોબેકર, પી.એસ.બી, વામ જેવા ખાતરો આપ વા આવા સેન્દ્રિય ખાતરોના વપરાશ કરતા પહેલા દરેક ખેડૂત ભાઈ પોતાની જમીનના નમુના લઇ પ્રયોગશાળામાં પૃથ્થકરણ કરાવે અને જે તત્વોની ઉણપ હોય તેની જાણકારી મેળવી જરૂરી માત્રામાં આવા ખાતરો વાપરવા. સામાન્ય રીતે ખાતર ખામણામાં થડથી ઝાડના ઘેરાવા મુજબ અંદાજે ૨-૩ ફુટ દુર અને ૧ ફુટ ઉંડુ કરી તેમાં આપવું જોઈએ. ખાતર આપ્યા બાદ તેને માટીથી ઢાંકી પાણી આપવું.

જામફળના પાક માટે ૫૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન, ૨૫૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ અને ૨૫૦ ગ્રામ પોટાશ તત્વોની જરૂરીયાત રહે છે. આ ખાતરોમાંથી નાઈટ્રોજન અડધો જથ્થો તથા ફોસ્ફરસ અને પોટાશનો સંપૂર્ણ જથ્થો સપ્ટેમ્બર માસમાં આપવો ઉપરોક્ત તત્વો મેળવવા માટે રાસાયણીક તેમજ સેંદ્રીય એમ બંને પ્રકારના ખાતરો વાપરવા જોઈએ જામફળના પાકમાં જસત તથા લોહ તત્વની ખામીથી પાન જાડા થઈ ટોચની ડાળીઓ સુકાય છે. જ્યારે લોહ તત્વની ખામીના કારણે પાનની નસો લીલી રહે છે. અને વચ્ચેનો ભાગ પીળો પડી જાય છે. પાન લાલ થઈ જાય છે. જસતની ખામી નિવારવા છોડ દિઠ ૨૫૦ ગ્રામ બજારમાં મળતું ઝિંક સલ્ફેટ અન્ય ખાતરો સાથે આપવું અથવા જૂન- જૂલાઈમાં નવી ફુટ આવે ત્યારે ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ૧ કિલો ઝિંક સલ્ફેટનું દ્રાવણ બનાવી છંટકાવ

કરવો અથવા છોડ દિઠ ૧૦૦ થી ૧૫૦ ગ્રામ જમીનમાં આપવું.

પિયત :

જામફળનાં ઉછરતાં છોડને ભેજનું પ્રમાણ ખાસ જળવાઈ રહે તે માટે શિયાળામાં ૧૨ થી ૧૫ દિવસે અને ઉનાળામાં ૮ થી ૧૦ દિવસે પિયત આપવું. જયારે ફળાઉ ઝાડને ફેબ્રુઆરીથી જૂન સુધી આરામ આપ્યા બાદ બહારની માવજત પછી (જૂનમાં) તરત જ પાણી આપવું. ત્યારબાદ ૨૦ થી ૨૫ દિવસનાં અંતરે કુલ ૩-૪ પાણી પૂરતાં થઈ રહે છે. એટલે ઓછા પિયતની સગવડવાળા વિસ્તારમાં આ પાક ખાસ અનુકૂળ આવે છે.

જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટીની થયેલ ભલામણ મુજબ ૧.૦ કિ.ગ્રા. યુરિયા ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિ ધ્વારા ચાર સરખા હપ્તામાં એટલે કે જુન, ઓગષ્ટ, ઓકટોબર અને ડિસેમ્બર મહિનામાં આપવું. જયારે પોટાશ ખાતર (મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ – ૦.૪ કિ.ગ્રા.) જમીનમાં ચાર સરખા હપ્તામાં એટલે કે જુન, ઓગષ્ટ, ઓકટાબર અને ડિસેમ્બર મહિનામાં આપવું. પરંતુ ફોસ્ફરસ ખાતર (સીંગલ સુપર ફાસ્ફેટ-૧.૫ કિ. ગ્રા.) જમીનમાં પાયાના ખાતર તરીકે આપવું એટલે કે જૂન માસમાં આપવું.

જામફળના ઉછરતા છોડને ભેજનું પ્રમાણ ખાસ જળવાઈ રહે તે માટે શિયાળામાં ૧૨-૧૫ દિવસે અને ઉનાળામાં ૮ થી

૧૦ દિવસે પિયત આપવું. જયારે ફળાઉ ઝાડને ફેબ્રુઆરીથી જૂન સુધી આરામ આપ્યા બાદ બહારની માવજત પછી (જૂન) તુરંત પાણી આપવું. ચોમાસામાં વરસાદ ૨૦ દિવસ કરતાં વધારે ખેંચાય તો પાણી આપવું. ત્યારબાદ ૨૦-૨૫ દિવસના અંતરે કુલ ૩- ૪ પાણી પુરતા થઈ રહે છે. એટલે ઓછા પિયતની સગવડતાવાળા વિસ્તારોમાં આ પાક ખાસ અનુકૂળ આવે છે. જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટીની ઉપરોક્ત ફર્ટીગેશન સીસ્ટમની ભલામણ મુજબ ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિ ઓકટોબર થી ડિસેમ્બર માસ સુધી દરરોજ ૩ કલાક અને જાન્યુઆરી થી માર્ચ મહિના સુધી દરરોજ ૪ કલાક માટે દરેક ઝાડ દીઠ ૦૪ લીટર પ્રતિ કલાકની ક્ષમતા વાળા ૦૪ ટપકણીયાં, ઝાડનાં થડથી એક મીટર દૂર રાખીને ચલાવવાથી ૪૦.૬૯% સિંચાઈનાં પાણીની બચત થાય છે.

કેળવણી અને છાંટણી :

કેળવણી :

જામફળના પાકમાં શરૂઆતના વર્ષોમાં કેળવણીની માવજત આપવી ખુબ જરૂરી છે. કેળવણીની માવજત નીચે મુજબ આપવી

(૧) છોડની શરૂઆતની અવસ્થામાં એટલે કે બે થી ત્રણ વર્ષ દરમ્યાન ૬૦ થી ૯૦ સે.મી. સુધી એક થડે સીધો વધવા દેવો.

(૨) ત્યારબાદ થડથી ૩૦ થી ૩૫ સે.મી.ના અંતરે ૩ થી ૪ ડાળીઓ શક્ય હોય તો દરેક દીશામાં વિકસવા દેવી અને છોડની ઉપરની ટોચનો ભાગ કાપી નાખવો.

(૩) શરૂઆતમાં મુખ્ય થડની આજુબાજુ નીકળતા પીલાને પણ દૂર કરતાં રહેવું. શરૂઆતમાં થડે નીકળતા પીલા સતત કાઢતા મજુરી ખર્ચ તથા કાળજી વિશેષ માંગી લે છે. જેને માટે આણંદ ખાતેથી પીલા દૂર કરવાની વિક્સાવેલ રાસાયણિક પધ્ધતિ પ્રમાણે NAA ૧૦,૦૦૦ મી.ગ્રા.લીટર ચુના સાથે મલમ બનાવી થડ પર લગાડવો.

છાંટણી :

આમતો આ પાક બારમાસી પ્રકારનો હોય, છાંટણીની બહુ જરૂરત રહેતી નથી. આમ છતાં ઝાડનો ઘેરાવો બહુ વધી ન જાય તેમજ ઋતુ મુજબ ફળ મળી રહે તે માટે છાંટણી કરવી જોઈએ.

આ પાકમાં છાંટણી નીચે મુજબ કરવી જોઈએ :

(૧) છોડની કેળવણી સાથે છોડના વિકાસ અને ફળ ઉત્પાદન પર કાબુ રાખવા માટે છાંટણી કરવામાં આવે છે.

(૨) સામાન્ય રીતે જો સતત પાણી મળે તો સતત ફૂલ આવતા હોય છે. એટલે કોઈ ચોકકસ ઋતુમાં ફાલ લેવા માટે ચોકકસ સમયે તેને બહારની માવજત આપવી જરૂરી છે.

(૩) ગુજરાતમાં જૂન માસના મૃગ નક્ષત્ર દરમ્યાનની મૃગબહારની ભલામણ છે. આ સમય દરમ્યાન થતાં ફળો શિયાળામાં પાકે છે. આ ફળો ઉતમ પ્રકારના અને સ્વાદિષ્ટ હોય છે તથા વિટામીન -સીનું પ્રમાણ વિશેષ હોય છે. તેમજ તેમાં ફળમાખીનો ઉપદ્રવ પણ ઓછા હોય છે.

(૪) બહારની માવજત માટે ફાલ ઉતાર્યા બાદ ઉનાળાની ઋતુમાં ફેબ્રુઆરી–મે માસ સુધી પાણી બંધ કરી આરામ આપવામાં આવે છે.

(૫) આરામબાદ ટોચની ડાળીઓ દુર કરી હળવી છાંટણી કરવી, રોગ જીવાતવાળી સૂકી ડાળીઓ પણ દુર કરવી.

(૬) ખેડ કરી ગોડ કરવો અને ભલામણ મુજબના ખાતરો આપી પાણી શરૂ કરવું. આણંદ ખાતે થયેલ સંશોધન પ્રમાણે સારી ગુણવતાવાળા ફળો મેળવવા માટે મે માસનાં છેલ્લા અઠવાડિયા દરમ્યાન ડાળીની ટોચના ભાગેથી ૬૦ સે.મી. સુધી છાંટણી કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. છાંટણી કર્યા સિવાયના ઝાડ કરતાં ૨૧.૬ % વધુ ઉત્પાદન મળે છે.

બહાર માવજત :

શરૂઆતમાં છોડની રોપણી બાદ બે વર્ષ સુધી છોડને સખત ગરમી અને વધુ પડતી ઠંડીથી બચાવવા જોઈએ. જમીનમાં ભેજ

જળવાઈ રહે અને છોડનું રોગ-જીવાતથી રક્ષણ થાય એ પ્રમાણે પાણી આપવું જોઈએ. અમુક વખતે જામફળના છોડને બીજા વર્ષે જ ફુલ આવતા હોય છે. જેને દૂર કરી દેવા જોઈએ. ત્રીજા કે ચોથા વર્ષથી ફળનો ઉતાર લેવો હિતાવહ છે. છોડની કેળવણી સાથે છોડના વિકાસ અને ફળ ઉત્પાદન પર કાબૂ રાખવા માટે છાંટણી કરવામાં આવે છે.

બહાર	ફુલ આવવાનો સમય	ફળ આવવાનો સમય	ફળની ગુણવતા
અમ્બે	ફેબ્રુઆરી- માર્ચ	જુલાઇ –સપ્ટેમ્બર	નબળી
મૃગ	જુન – જુલાઇ	નવેમ્બર- જાન્યુઆરી	ઉત્તમ
હસ્ત	ઓક્ટોમ્બર	ફેબ્રુઆરી- એપ્રિલ	સારી (ઓછુ ઉત્પાદન)

સંવર્ધન /પ્રસર્જન :

જામફળમાં પ્રસર્જન બીજ અને વાનસ્પતિક એમ બે રીતે કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે બીજમાંથી ઉછેરવાની પ્રસર્જનની પદ્ધતિ ઘણી સરળ અને સસ્તી છે, પરંતુ આ રીતે તૈયાર કરેલા છોડમાં ઘણી ભિન્નતા જોવા મળે છે અને ફળ મોડા આવે છે. સારી ગુણવત્તા, માતૃત્વના ગુણો ધરાવતાં અને વધુ તથા વહેલું ઉત્પાદન મેળવવા માટે વાનસ્પતિક પ્રસર્જનથી તૈયાર કરેલ કલમનું વાવેતર કરવું હિતાવહ છે. જામફળમાં વાનસ્પતિક પ્રસર્જન ભેટકલમ,

ગુટી કલમ, દાબ કલમ અને આંખ ચઢાવીને કરવામાં આવે છે. આ બધી કલમ કરવાની રીતો પૈકી ગુટી કલમ, દાબ કલમ (જમીન દાબ કલમ) માં વિશેષ સફળતા મળે છે, જેથી ગુટી કલમથી પ્રસર્જન કરવું હિતાવહ છે.

પાકસંરક્ષણ :

જીવાત નિયંત્રણ :

(૧) ફળમાખી : માદા ફળમાખી પાકવાલાયક પોચા પડેલાં ફળમાં ઈંડા મુકે છે. તેમાંથી ઈયળ નિકળી ફળનો માવો ખાય છે. આવા ફળોમાં ફૂગ લાગે અને પછી સડીને ખરી પડે છે.

નિયંત્રણ : જામફળની વાડીમાં સ્વચ્છતા રાખવી. રોગ - જીવાત લાગેલાં અને નીચે પડેલાં સડેલાં ફળોને ખાડામાં દાટી દેવા. મિથાઈલ યુજીનોલ ટ્રેપની મદદથી નર ફળમાખીનો નાશ કરવો ટ્રેપ ૧૦ થી ૧૫ પ્રતિ હેકટરે મૂકવા.

(૨) થડ અને ડાળીની છાલ કોરી ખાનાર ઈયળ : આ ઈયળો થડ અને ડાળીના સાંધામાં છાલ કોરી ખાય છે તેમજ ડાળીઓ અને થડના ભાગમાં કાણું બનાવી તેમાં ભરાઈ રહે છે . ડાળીના સાંધામાં ઉપદ્રવ થતો હોવાથી ડાળી સૂકાઈ જાય છે.

નિયંત્રણ : ઈયળે કરેલ જાળી સાફ કરવા તથા ડાળીના સાંધામાં ઈયળે પાડેલા કાણામાંથી ઈયળ કાઢી મારી નાંખી ચીકણી માટીથી કાણું બંધ કરી દેવું.

(૩) ચિકટો (મિલીબગ) : આ સફેદ રૂવાટી ધરાવતી જીવાત ડાળીઓ, છોડના પાન અને ફળોની ડંખમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે, જેનાં કારણે ડાળીઓ નબળી પડી કોકડાઈ જાય છે અને વિકાસ અટકી જવા પામે છે . જામફળના ફળ ઉપર જીવાત લાગતા તેની ગુણવત્તા પર ઘણી અસર જોવા મળે છે અને ફળ ઉતરતી કક્ષાના મળે છે.

નિયંત્રણ : ઉપદ્રવવાળી ડાળીએની છાંટણી કરવી અને ડાળીઓને બાળી નાખવી. જૈવિક ફૂગ જેવી કે બીવેરિયા બાસીયાના , ૪૦ ગ્રામ પાવડર ૧૦ લીટર પાણીમાં મેળવી છંટકાવ કરવો. મીલીબગના બચ્ચા ઝાડ ઉપર ન ચડે તે માટે ઝાડની ડાળીઓના છેડા જમીનને ન અડે તેમ કાપતા રહેવું તેમજ ઝાડના થડને ફરતે પ્લાસ્ટિકનો પટ્ટો લગાડી તેની ઉપર ચીકણું પદાર્થ લગાડવું જેથી મીલીબગના બચ્ચા ઝાડ ઉપર ચડે નહિ.

રોગ નિયંત્રણ :

સૂકારો (ફાટિયો) : જામફળના પાકમાં આ રોગ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે તે ફયુઝેરિયમ અને મેક્રોફોમીના નામની જમીનજન્ય ફૂગથી થાય છે. આ રોગ માટે ખેતી વિષયક માવાજતોની ખામી પણ કારણભૂત છે. રોગની શરૂઆતમાં ડાળીની ટોચનાં પાન પીળા અને ભૂરા થવા માંડે છે. પાનની નસોનો ભાગ પીળો પડે છે. પાન ઉપર લાલ રંગનાં ટપકાં જોવા મળે છે. ડાળીની તથા થડની

છાલ ફાટતી જોવા મળે છે અને ડાળી ટોચથી માંડી ધીરે ધીરે ઝાડ સૂકાવા માંડે છે. સપ્ટેમ્બર - ઓક્ટોબર માસ દરમ્યાન આ રોગનો ફેલાવો ખૂબ જ ઝડપી થાય છે. ત્યારબાદ શિયાળાની ઋતુમાં અટકી જાય છે.

નિયંત્રણ : ઉપદ્રવવાળી ડાળીએની છાંટણી કરવી અને ડાળીઓને બાળી નાખવી. ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરી તપવા દેવું. ટ્રાયકોડર્મા ૩ કિ.ગ્રા./ હેકટર પ્રમાણે આપવું.

ફળો ઉતારવા :

જામફળ જયારે લીલા રંગમાંથી આછા પીળા રંગના થાય તે સમયે ઉતારવાની શરૂઆત થાય છે. સારા પાકવાલાયક ફળોને ઉતાર્યા બાદ છાંયડામાં એકઠાં કરી કદ, રંગ તેમજ થયેલ ઈજા પ્રમાણે વર્ગીકરણ કરવું. ત્યારબાદ ટોપલીઓમાં વ્યવસ્થિત ભરીને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા.

ઉત્પાદન :

સારી માવજતથી ઉછરેલ ઝાડ ૩૦ થી ૪૦ વર્ષ સુધી સારૂં ઉત્પાદન આપે છે. પરંતુ ૨૦ વર્ષ સુધી જામફળનું ઝાડ પોષણક્ષમ ઉત્પાદન આપે છે. જામફળમાં અંદાજે ઝાડ દીઠ ઉત્પાદન ૫૦ થી ૭૫ કિ.ગ્રા. મળે છે. સારી માવજતથી હેક્ટરે ૨૦ ટન જેટલું ઉત્પાદન મળે છે.

ખેડુત ઉપયોગી ભલામણો :

(૧) જામફળની ખેતીમાં ફર્ટિગેશન દ્વારા પોષણ વ્યવસ્થાપન મધ્ય ગુજરાત ખેત આબોહવાકીય વિસ્તાર-૩માં ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ અપનાવી જામફળની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ઝાડ દીઠ ૩૭૫-૧૮૮-૧૮૮ ગ્રામ એન.પી.કે. પાણીમાં દ્રાવ્ય ખાતર (જેના માટે ઝાડ દીઠ એન.પી.ગ્રેડ ૩૧૦ ગ્રામ, યુરિયા ૭૪૦ ગ્રામ અને મ્યુરેટ ઑફ પોટાશ ૩૧૫ ગ્રામ) ચાર સરખા હપ્તામાં જૂન અને સપ્ટેમ્બર મહિનાના બીજા અને ચોથા સપ્તાહમાં આપવા ભલામણ છે જેનાથી ખાતરની ૨૫ ટકા જેટલી બચત થાય છે.

(૨) જામફળના પાકમાં ટપક પિયત પદ્ધતિ મધ્ય ગુજરાત ખેત આબોહવાકીય વિભાગ-૩ ના જામફળી (જાત : એલ-૪૯) ઉગાડતા ખેડૂતોએ ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ ૦.૭ એફપીઈ અપનાવવાથી ઉત્પાદનને અસર કર્યા વગર ૩૪ ટકા પાણીનો બચાવ થાય છે. આ માટે ટપક પ્રણાલી એકાંતરે દિવસે ઓકટોબર અને ફેબ્રુઆરી માસમાં ૩ કલાક અને નવેમ્બરથી જાન્યુઆરી માસમાં ૨ કલાક અને ૩૦ મિનિટ ચલાવવી. આ ટપક પદ્ધતિમાં ઝાડ દીઠ ૮ લિટર પ્રતિ કલાકની ક્ષમતા પ્રતિ ડ્રિપરના ૮ ડ્રિપર અને ડ્રિપ લાઈન ૬ મી.ના અંતરે ગોઠવી, ટપક પ્રણાલીને ૧.૨ કિ.ગ્રા./સે.મી. ના દબાણે ચલાવવાની ભલામણ છે.

(૩) જામફળની વિવિધ જાતો અને તેના જીનોટાઈપનું ઘનિષ્ટ વાવેતર પદ્ધતિમાં મુલ્યાંકન સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારનાં ઘનિષ્ઠ વાવેતર પદ્ધતિથી (૩.૦ મી. × ૧.૫ મી.) જામફળની ખેતી કરતાં ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, જામફળની એલ-૪૯ અથવા લલીત અથવા શ્વેતા જાતનું વાવેતર કરવાથી વધુ ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મળે છે.















બાગાયત ખાતુ

કૃષિભવન, સેક્ટર ૧૦/એ, ગાંધીનગર, ગુજરાત

ફોન નં. ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૦૪, ફેક્સ : ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૧૩

Email: dir-bag@gujarat.gov.in

Website : www.ikhedut.gujarat.gov.in, www.doh.gujarat.gov.in