ઘર આંગણની ખેતી
(કિચન ગાર્ડન)



:: કચેરીનું સરનામું ::

બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી

બાગાયત ખાતુ, ગુજરાત રાજય

કૃષિ ભવન, સેક્ટર ૧૦/એ, ગાંધીનગર,

ફોન : ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૦૪, Email : dir-bag@gujarat.gov.in

Web Site : doh.gujarat.gov.in, ikhedut.gujarat.gov.in

ઘર-આંગણની ખેતી (કિચન ગાર્ડનીંગ) :

ઘરની આજુબાજુની ખુલ્લી ફાજલ જમીન, અગાશી, છત કે બાલ્કનીમાં ફળ અને શાકભાજી પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવે છે. તેને ઘર-આંગણની ખેતી (કિચન ગાર્ડનીંગ) કહેવાય છે.

શાકભાજીમાં પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટસ, ખનીજ તત્વો, વિટામીનો સારા પ્રમાણમાં હોવાથી તંદુરસ્તી જાળવવામાં દરેકના રોજીંદા ખોરાકમાં શાકભાજીનો ઉપયોગ અનિવાર્ય છે. દુધ અને ફળોની માફક શાકભાજી પણ મહત્વનો જરૂરી સંરક્ષક ખોરાક છે. પાંદડાવાળા શાકભાજીઓમાં પાણી અને સેલ્યુલોઝ અથવા તંતુઓ સારા પ્રમાણમાં હોય છે.

મકાનના કમ્પાઉન્ડમાં ઉગાડવાની શાકભાજી માટે જમીનનો પ્રકાર બહુ મહત્વની બાબત છે. જે જમીન પથ્થરવાળી હોય અને તેની સપાટીની જમીન છીછરી હોય તો બહારથી સારી માટી લાવીને ૨૦ થી ૩૦ સે.મી. સુધી ક્યારીની ઊંચાઈ કરવી જોઈએ. કમ્પાઉન્ડમાં જગ્યા ઓછી હોય ત્યાં લાકડાના ખોખાં, છાબડીઓ અને માટીનાં મોટા કુંડામાં ટામેટા, કોબીજ, ફ્લાવર, પાલખ, લેટ્યુસ, કાકડી, દુધી, ગલકાં, તુરીયા, રીંગણાં વગેરે જેવાં શાકભાજી સરળતાથી ઉગાડી શકાય. સામાન્ય રીતે શાકભાજી ઉગાડવા માટેની જમીન સમતળ, પોચી અને ભરભરી હોવી જોઈએ.

શાકભાજીની કેટલીક જાતોમાં પ્રથમ તેમના ધરૂ ઉછેરવામાં આવે છે અને પાછળથી તેમને ક્યારામાં રોપવામાં આવે છે. આ જાતોમાં ટામેટાં, કોબીજ, ફુલાવર, મરચાં, રીંગણ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ધરૂ જ્યારે ઓછા પ્રમાણમાં જોઈતા હોય ત્યારે માટીના કુંડામાં, લાકડાની પેટીમાં અથવા ટોપલીમાં ઉગાડી શકાય છે. સામાન્ય રીતે ધરૂ રોપવા લાયક ત્રણ થી ચાર અઠવાડિયામાં થઈ જાય છે.

જ્યારે ભીંડા, દુધી, કારેલાં, તુરીયા, ગુવાર, ચોળી વગેરેનાં બીજ ક્યારામાં સીધા વાવી શકાય છે. જે ધરૂ રોપવા લાયક થયું હોય તે ધરૂ કાળજીથી ઉપાડીને તૈયાર ક્યારામાં રોપીને તુરત જ પાણી આપવું. બીજને રોપતી વખતે પણ જમીનમાં ભેજ હોવો જરૂરી છે. ધરૂની ફેરરોપણી સવારના અથવા મોડી સાંજે કરવી જેથી ધરૂ તાપથી બચી શકે.

શાકભાજીને સફળતાપૂર્વક ઉગાડવામાં પાણી આપવાની બાબત ઘણી જ અગત્યની છે. છોડનાં પાંદડાં ખરવા માંડે એ પાણીની જરૂરિયાતની નિશાની છે. માટીના રંગની તપાસ અને સ્પર્શથી પણ શાકભાજીને પાણી આપવાની જરૂરિયાત છે કે નહિં તે જાણી શકાય છે. સામાન્ય રીતે ઉનાળામાં ચાર થી છ દિવસે અને શિયાળામાં

સાત થી દસ દિવસે પાણી આપવું. ચોમાસામાં વરસાદ ખેંચાય ત્યારે પાણી આપવું. શાકભાજીને સાધારણ રીતે સાંજે પાણી આપવું. સૂર્યના તાપમાં પાણી આપવું હિતાવહ નથી.

શહેરી ખેતીના વિવિધ પ્રકાર :-



- **કિચન ગાર્ડન :** ઘરની આસપાસની ખુલ્લી જગ્યામાં શાકભાજી અને ફળો ઉગાડવાની પધ્ધતિ



- **ટેરેસ કે રુફટોપ ગાર્ડન :** ઘરની છત પર કે છાપરા પર ફળ, શાકભાજી કે ફૂલ છોડ ઉગાડવાની પધ્ધતિ



- **બાલ્કની ગાર્ડન :** બહુમાળી મકાનમાં અગાશી કે ઝરૂખામાં ફળ, શાકભાજી કે ફૂલછોડ ઉગાડવાની પધ્ધતિ



- **વર્ટીકલ ગાર્ડન :** જમીન સિવાયના મકાનના ભાગો જેવા કે ઊભી દિવાલ, બાલ્કની કે વરંડાની જાળી, લટકટા કુંડા વગેરે પર શાકભાજી કે ફૂલછોડ ઉગાડવાની પધ્ધતિ



- **જળકૃષિ :** માટી વગર ફક્ત પોષક દ્રવ્યોના દ્રાવણ અને પાણીથી ફળ, શાકભાજી કે ફૂલછોડ ઉગાડવાની પધ્ધતિ

કિચન ગાર્ડનનીંગના ફાયદા :-

- ઘરની આજુબાજુની ફાજલ પડી રહેલ જમીનનો સદ્‌ઉપયોગ કરી સુંદર અને સ્વચ્છ રાખી શકાય છે.
- કિચન ગાર્ડનથી ઘરની શોભામાં વધારો કરી શકાય છે.
- ઘર વપરાશમાં લેવામાં આવતા નકામા પાણીનો યોગ્ય રીતે વપરાશ કરી શકાય છે.
- કુટુંબની જરૂરિયાત મુજબ ઋતુ પ્રમાણે મનપસંદ, તાજા અને જંતુનાશક દવાથી મુક્ત શાકભાજીનું ઉત્પાદન કરી શકાય.
- કિચન ગાર્ડનમાં કાર્યરત રહેવાથી શારીરિક કસરત મળે છે. જેથી સ્વાસ્થ્ય તંદુરસ્ત રાખી શકાય છે.
- ઘર આંગણે બાળકોને વિવિધ છોડ, પાકની ઓળખ, ખેતી પદ્ધતિ અને તેની ઉપયોગિતા સમજાવી શકાય છે.
- ઘર ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે.

ઘર આંગણે શાકભાજી ઉગાડવા માટેના અગત્યના મુદ્દાઓ :-

- શાકભાજી ઉગાડવાની જગ્યાએ દિવસ દરમ્યાન પુરતો સૂર્યપ્રકાશ રહેતો હોવો જોઈએ.
- કિચન ગાર્ડન માટે રસોડામાંથી નીકળતું વધારાનું પાણી શાકભાજી માટે વપરાય છે. પરંતુ બાથરૂમમાં સ્નાન કે કપડા ધોતા બહાર આવતું સાબુ / કેમિકલવાળું પાણી કિચન ગાર્ડન માટે વાપરવું હિતવાહ નથી.
- પિયતની સગવડ અને નિતારની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. (ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ પણ અપનાવી શકાય છે).
- રસોડા કે ઘરમાંથી નીકળતા વધારાના પાણીને સીધા જ ક્યારામાં ન વહેવડાવતાં કુંડી કે ટાંકીમાં એકઠુ કરી જરૂર પડે ત્યારે જ તેનો ઉપયોગ થાય તેવી વ્યવસ્થા કરવી કેમ કે છોડને ભેજની જરૂર છે, પાણીની નહિં.
- કિચન ગાર્ડનમાં છોડની આજુબાજુ ખુરપી વડે નિંદણ (વધારાનું ઘાસ) દૂર કરી ગોડ કરવી.
- ફળ અને શાકભાજી ખાવાલાયક યોગ્ય અવસ્થાએ જ ઉતારવા.
- ઋતુના અંતે પાક પૂર્ણ થાય કે તરત જ છોડ ઉખાડી નાંખવાં. જીવાતથી નુકશાન પામેલા અવશેષો ભેગા કરી તેનો યોગ્ય નિકાલ કરવો અથવા બાળી નાંખવાં.
- વેલાવાળા શાકભાજીના પાકોના વેલા ઝાડ, અગાશી પર ચઢાવી શકાય અથવા ટેકા મંડપ બનાવી રોપણી કરવી.
- કંદમૂળવાળા શાકભાજી પાકો જેવાં કે ડુંગળી, લસણ, બટાટા, મૂળા, ગાજર, બીટની રોપણી ક્યારાની પાળીઓ પર કરવી. જેથી જમીનનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરી શકાય.
- છાંયડાવાળી જગ્યામાં મેથી, ધાણા, પાલક અને અળવી ઉગાડી શકાય.
- કિચન ગાર્ડનમાં સરગવો અને મીઠો લીમડાના છોડની રોપણી કરી શકાય.
- કુટુંબના સભ્યોની જરૂરિયાત મુજબ શાકભાજી પાકનો વાવેતર વિસ્તાર રાખવો.
- કેળ, પપૈયા, લીંબું, જામફળ, સીતાફળ વગેરેનો કિચન ગાર્ડનમાં સમાવેશ કરવો જોઈએ.


સામાન્ય રીતે ક્યા સીઝનની શાકભાજી ક્યા માસમાં વાવેતર કરવું તેની માહિતી હોવી જોઈએ. શિયાળુ પાકોની વાવણી ઓક્ટોબર - નવેમ્બર માસમાં, ચોમાસુ પાકોની વાવણી જુન - જુલાઈ માસમાં અને ઉનાળું પાકોની વાવણી ફેબ્રુઆરી - માર્ચ માસમાં કરવી જોઈએ.

કઈ ઋતુમાં કયા સાકભાજી પાકો વાવવા જોઈએ તેની વિગતો પ્રમાણે છે.

શિયાળુ : રીંગણ, ટામેટા, મરચા, ગાજર, મૂળા, કોબીજ, ફુલાવર, શક્કરીયા, ડુંગળી, લસણ, ધાણા વગેરે.

ઉનાળુ : ભીંડા, ગુવાર, રીંગણ, દુધી, તુરીયા, કારેલા, ચોળી, તાંદળજો વગેરે.

ચોમાસુ : રીંગણ, તુરીયા, ગલકા, પાપડી, દુધી, પરવળ, કાકડી, ગીલોડા, ભીંડા વગેરે.



આ ઉપરાંત કિચન ગાર્ડનમાં રોજીંદા ખેતી કાર્ય માટે કોદાળી, પાવડો, દાતરડી / ખુરપી, પાણી પાવાનો ઝારો, હાથ કરબડી, હેન્ડ સ્પ્રેયર, તગારૂ વગેરે તેમજ પિયત માટે પ્લાસ્ટિકની પાઈપ વગેરે હોવા જોઈએ.

કિચન ગાર્ડનના રોગ અને જીવાત માટે ઘરગથ્થુ ઉપચાર :-

૧. **ડુંગળી / લસણ :** ડુંગળી અને લસણ તીવ્ર વાસ ધરાવે છે. તેના નાના ટુકડા કરીને મિક્ષરમાં કશ કરી પેસ્ટ બનાવવી. આ તૈયાર કરેલ પેસ્ટને પાણીમાં નાંખી આ પાણીને છોડ પર સ્પ્રે કરવાથી કીડી - મકોડા જીવાતોથી છુટકારો મળે છે.

૨. **મીઠું :** ૪ લિટર પાણીમાં ૨ ચમચી મીઠું ઓગાળીને સ્પ્રે કરવાથી જીવાતો મરી જશે.

૩. ચુસિયા પ્રકારની જીવાતો / ઈયળોનો ઉપદ્રવ ન થાય તે માટે લીંબોડીના મીંજનું દ્રાવણ અથવા લીંબોડીના તેલનો ઉપયોગ છંટકાવ માટે કરવો.

૪. ફુગજન્ય રોગો માટે છાશ / ગૌ-મૂત્રનો ઉપયોગ કરવો.

નોંધ :- રોગ જીવાતના વધારે ઉપદ્રવ જણાય ત્યારે બીજા ઉપાય કરવા જરૂરી છે.



શાકભાજીના પાકોની ખેતી પદ્ધતિ અંગેની સંક્ષિપ્ત માહિતી

અ.ન.	પાકનું નામ	વાવણીનો સમય	બિયારણનો જથ્થો (૩ ચો.મી. માટે)	વાવણીની પદ્ધતિ	વાવણીનું અંતર સે.મી. / મી.	વાવણી બાદ ઉતારવા લાયક દિવસ
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
૧.	રીંગણ	મે - જૂન / ઓક્ટો. / નવે.	૦.૫ ગ્રામ	ધરૂ તૈયાર કરી ફેર રોપણીથી	૬૦ x ૯૦	૭૫ થી ૯૦
૨.	ટામેટા	ઉપર મુજબ	૦.૫ ગ્રામ	ઉપર મુજબ	૭૫ x ૬૦	૬૦ થી ૭૫
	ટામેટા હાઈબ્રીડ	સપ્ટે. - ઓક્ટો.	૦.૫ ગ્રામ	ઉપર મુજબ	૭૫ x ૬૦	૬૦ થી ૭૫
૩.	મરચા	ઉપર મુજબ	૦.૫ ગ્રામ	ઉપર મુજબ	૪૫ x ૪૫	૬૦ થી ૭૦
૪.	દુધી	જુન - જુલાઈ - ફેબ્રુઆરી	ખાડા દીઠ બે બીજ	બીજ થાણીને	૨ x ૧.૫	૬૦ થી ૭૫
૫.	કારેલા	જુન - જુલાઈ ફેબ્રુઆરી - માર્ચ	ખાડા દીઠ બે બીજ	બીજ થાણીને	૧.૨ x ૦.૯	૬૦
૬.	ગલકા	ઉપર મુજબ	ઉપર મુજબ	ઉપર મુજબ	૧.૨ x ૧.૫	૪૫ થી ૬૦
૭.	તુરીયા	ઉપર મુજબ	ઉપર મુજબ	ઉપર મુજબ	૨.૦ x ૨.૦	૪૫ થી ૬૦

૮.	કાકડી	જુન - જૂલાઈ - ફેબ્રુ. - માર્ચ	ખાડા દીઠ બે બીજ	બીજ થાણીને	૧.૫ x ૧.૦	૪૫ થી ૬૦
૯.	વાલોળ પાપડી	જુન - જુલાઈ	ખાડા દીઠ બે બીજ	બીજ થાણીને	૧.૨ x ૦.૯	૧૦૦ થી ૧૨૦
૧૦.	ગાજર	ઓક્ટો. - નવે.	૨ થી ૫	બીજ થાણીને	૧૨૦ x ૯૦	૨૧૦ થી ૨૪૦
૧૧.	ડુંગળી	નવે. - ડિસે.	૫ થી ૬	ધરૂ તૈયાર કરીને	૧૫ x ૧૦	૯૦ થી ૧૦૦
૧૨.	ભીંડા	જુન - જુલાઈ ફેબ્રુ. - માર્ય	૮ થી ૧૦ ૬ થી ૭	બીજ થાણીને	૨૦ x ૩૦	૪૫ થી ૬૦
૧૩.	ગુવાર	જુન - જુલાઈ ફેબ્રુ. - માર્ય	૮ થી ૧૦ ૬ થી ૭	બીજ થાણીને	૪૫ x ૨૦	૬૦
૧૪.	ચોળી	જુન - જુલાઈ ફેબ્રુ. - માર્ય	૫ થી ૬	બીજ થાણીને	૪૫ x ૧૫	૬૦ થી ૭૫
૧૫.	હળદર	મે - જુન	૧ થી ૧.૨૫	ગાંઠ રોપીને	૩૦ x ૧૫	૨૬૦ થી ૨૮૦
૧૬.	ધાણા	ઓક્ટો. - નવે.	૪ થી ૫	પુંખીને	- - -	૩૦
૧૭.	મેથી	સપ્ટે. - ઓક્ટો.	૧૫	પુંખીને	૧	૩૦ ભાજી
૧૮.	પાલક	બારેમાસ	૧૦	પુંખીને	- - -	૪૫
૧૯.	કોબીજ	સપ્ટે. - નવે.	૦.૫ થી ૧	ધરૂ કરી ફેર રોપણીથી	૬૦ x ૪૫	૯૦ થી ૧૦૦