

# BIO \* NATURAL

7a Av. A 3-54 Zona 9, Ciudad de Guatemala

(502) 2331-7935

## RECETA MEDICA

Paciente Nombre Completo  
47 Erick Moises Racancoj Amperez

Proxima Consulta  
Jueves 19 De Marzo Del  
2015

**\*\* LE ROGAMOS TRAER SU RECETA A LA PRÓXIMA CONSULTA \*\***

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR A TOMAR SU MEDICINA  
DEJAR 15 o 20 MINUTOS DE DIFERENCIA ENTRE CADA MEDICAMENTO, NO TOMARLOS JUNTOS  
TODO LO ESCRITO ES PARA USTED, HAGALO PORQUE ES PARTE DE SU TRATAMIENTO**

### **MEDICAMENTOS**

#### **ALASKA (OMEGA 3, 6, 9)**

Tomar una en la mañana y otra en la tarde.

#### **OSTENOSIS**

FORMA DE USO: VIA ORAL, Para tomar.

Agitar el frasco No. \_\_\_\_ Aplicar diez (10) gotas bajo la lengua y tragarlas.

O diluir 7 globulitos bajo la lengua. Hacerlo dos (2) veces al día. Por la mañana y por la tarde.

Si tiene que tomar otra medicina, deje (5) cinco minutos de separación entre una y otra.

NIÑOS LA MITAD DE LA DOSIS.

#### **JUGO PARA RECUPERACION**

FORMA DE USO ORAL PARA TOMAR

1/2 Litros de miel

3 gramos de aloe

3 cucharadas de whisky (40 grados)

PRIMER DIA: 1 cucharada

SEGUNDO DIA: 1 cucharada

TERCER DIA: 1 Cucharada

Luego de de los tres días una cucharadita tres veces al dia no con las comidas, preferiblemente despues de cada una.

### **INDICACIONES**

#### **ATAXIA LOCOMOTRIS**

FORMA DE USO: vIA ORAL, Para tomar.

MEDICINA: Para ATAXIA.

Agitar el frasco No. \_\_\_\_ Aplicar diez (10) gotas bajo la lengua y tragarlas 2 veces al dia.

O diluir 7 globulitos bajo la lengua. Hacerlo dos (2) veces al día. Por la mañana y por la tarde.

Si tiene que tomar otra medicina, deje (5) cinco minutos de separación entre una y otra.

NIÑOS LA MITAD DE LA DOSIS.A DOSIS.

**ADELGAZAR 2**

Tomar una por la mañana y otra por la tarde 1/2 hora antes de la comida.

**ADELGAZAR TABLETAS**

FORMA DE USO: Vía Oral, para tomar.

Tomar una (1) càpsula de ADELGAZAR al día. En la mañana 1/2 hora antes de la comida.

Èsta fòrmula està compuesta de Apio, Boldo, Cola de Caballo, Ortiga.

Plantas medicinales que tienen principios activos Diurèticos, hepatoprotectores, colàgogos y desintoxicantes. como Uricosùricos e hipertensores. Incluso le bajan la Presiòn Arterial.

**SINTOMAS**

**ULCERA GASTRICA**

Una úlcera péptica es una erosión o herida en la mucosa del estómago (úlcer­a gástrica) o en la parte superior del intestino delgado, llamado duodeno (úlcer­a duodenal). Las úlceras suelen tener un tamaño entre 0.5 y 1.5 cm de diámetro.

Las úlceras son un problema gastrointestinal frecuente en la población. La úlcera gástrica suele aparecer a partir de los 50-60 años de edad.

**DOLOR DE MUÑECA**

ESTO ES UN DOLOR DE MUÑECA SENCILLO.

**Dolor de Meñique**

Rasguño de gato

**NOTAS**