BIO * NATURAL

7a Av. A 3-54 Zona 9, Ciudad de Guatemala (502) 2331-7935

RECETA MEDICA

Paciente Nombre Completo

47 Erick Moises Racancoj Amperez

Proxima Consulta
Jueves 19 De Marzo Del
2015

** LE ROGAMOS TRAER SU RECETA A LA PRÓXIMA CONSULTA **

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR A TOMAR SU MEDICINA
DEJAR 15 o 20 MINUTOS DE DIFERENCIA ENTRE CADA MEDICAMENTO, NO TOMARLOS JUNTOS
TODO LO ESCRITO ES PARA USTED, HAGALO PORQUE ES PARTE DE SU TRATAMIENTO

INDICACIONES

ATAXIA LOCOMOTRIS

FORMA DE USO: vIA ORAL, Para tomar.

MEDICINA: Para ATAXIA.

Agitar el frasco No. ____ Aplicar diez (10) gotas bajo la lengua y tragarlas 2 veces al dia.

O diluir 7 globulitos bajo la lengua. Hacerlo dos (2) veces al día. Por la mañana y por la tarde.

Si tiene que tomar otra medicina, deje (5) cinco minutos de separación entre una y otra.

NIÑOS LA MITAD DE LA DOSIS.A DOSIS.

ADELGAZAR 2

Tomar una por la mañana y otra por la tarde 1/2 hora antes de la comida.

ADELGAZAR TABLETAS

FORMA DE USO: Vía Oral, para tomar.

Tomar una (1) càpsula de ADELGAZAR al día. En la mañana 1/2 hora antes de la comida.

Esta fòrmula està compuesta de Apio, Boldo, Cola de Caballo, Ortiga.

Plantas medicinales que tienen principios activos Diurèticos, hepatoprotectores, colàgogos y desintoxicantes. como Uricosùricos e hipertensores. Incluso le bajan la Presión Arterial.

MEDICAMENTOS

ALASKA (OMEGA 3, 6, 9)

Tomar una en la mañana y otra en la tarde.

OSTENOSIS

FORMA DE USO: VIA ORAL, Para tomar.

Agitar el frasco No. _____ Aplicar diez (10) gotas bajo la lengua y tragarlas.

O diluir 7 globulitos bajo la lengua. Hacerlo dos (2) veces al día. Por la mañana y por la tarde.

Si tiene que tomar otra medicina, deje (5) cinco minutos de separación entre una y otra.

NIÑOS LA MITAD DE LA DOSIS.

JUGO PARA RECUPERACION

FORMA DE USO ORAL PARA TOMAR

1/2 Litros de miel

3 gramos de aloe

3 cucharadas de wisky (40 grados)

PRIMER DIA: 1 cucharada
SEGUNDO DIA: 1 cucharada
TERCER DIA: 1 Cucharada

Luego de de los tres dias una cucharadita tres veces al dia no con las comidas, preferiblemente despues de cada una.

SINTOMAS

ULCERA GASTRICA

Una úlcera péptica es una erosión o herida en la mucosa del estómago (úlcera gástrica) o en la parte superior del intestino delgado, llamado duodeno (úlcera duodenal). Las úlceras suelen tener un tamaño entre 0.5 y 1.5 cm de diámetro.

Las úlceras son un problema gastrointestinal frecuente en la población. La úlcera gástrica suele aparecer a partir de los 50-60 años de edad.

DOLOR DE MUÑECA

ESTO ES UN DOLOR DE MUÑECA SENCILLO.

Dolor de Meñique

Rasguño de gato

NOTAS