

BIO * NATURAL

7a Av. A 3-54 Zona 9, Ciudad de Guatemala

(502) 2331-7935

RECETA MEDICA

Paciente Nombre Completo

47 Erick Moises Racancoj Amperez

Proxima Consulta

Jueves 19 De Marzo Del
2015

**** LE ROGAMOS TRAER SU RECETA A LA PRÓXIMA CONSULTA ****

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR A TOMAR SU MEDICINA

DEJAR 15 o 20 MINUTOS DE DIFERENCIA ENTRE CADA MEDICAMENTO, NO TOMARLOS JUNTOS

TODO LO ESCRITO ES PARA USTED, HAGALO PORQUE ES PARTE DE SU TRATAMIENTO

Fecha creación: 19/02/2015 05:20:43 p.m.

MEDICAMENTOS

ALASKA (OMEGA 3, 6, 9)

Tomar una en la mañana y otra en la tarde.

OSTENOSIS

FORMA DE USO: VIA ORAL, Para tomar.

Agitar el frasco No. ____ Aplicar diez (10) gotas bajo la lengua y tragarlas.

O diluir 7 globulitos bajo la lengua. Hacerlo dos (2) veces al día. Por la mañana y por la tarde.

Si tiene que tomar otra medicina, deje (5) cinco minutos de separación entre una y otra.

NIÑOS LA MITAD DE LA DOSIS.

JUGO PARA RECUPERACION

FORMA DE USO ORAL PARA TOMAR

1/2 Litros de miel

3 gramos de aloe

3 cucharadas de whisky (40 grados)

PRIMER DIA: 1 cucharada

SEGUNDO DIA: 1 cucharada

TERCER DIA: 1 Cucharada

Luego de de los tres días una cucharadita tres veces al día no con las comidas, preferiblemente despues de cada una.

INDICACIONES

ATAXIA LOCOMOTRIS

FORMA DE USO: vIA ORAL, Para tomar.

MEDICINA: Para ATAXIA.

Agitar el frasco No. ____ Aplicar diez (10) gotas bajo la lengua y tragarlas 2 veces al día.

O diluir 7 globulitos bajo la lengua. Hacerlo dos (2) veces al día. Por la mañana y por la tarde.

Si tiene que tomar otra medicina, deje (5) cinco minutos de separación entre una y otra.

NIÑOS LA MITAD DE LA DOSIS.A DOSIS.

ADELGAZAR 2

Tomar una por la mañana y otra por la tarde 1/2 hora antes de la comida.

ADELGAZAR TABLETAS

FORMA DE USO: Vía Oral, para tomar.

Tomar una (1) cápsula de ADELGAZAR al día. En la mañana 1/2 hora antes de la comida.

Èsta fòrmula està compuesta de Apio, Boldo, Cola de Caballo, Ortiga.

Plantas medicinales que tienen principios activos Diuréticos, hepatoprotectores, colàgogos y desintoxicantes. como Uricosùricos e hipertensores. Incluso le bajan la Presiòn Arterial.

SINTOMAS

ULCERA GASTRICA

Una úlcera péptica es una erosión o herida en la mucosa del estómago (úlcera gástrica) o en la parte superior del intestino delgado, llamado duodeno (úlcera duodenal). Las úlceras suelen tener un tamaño entre 0.5 y 1.5 cm de diámetro.

Las úlceras son un problema gastrointestinal frecuente en la población. La úlcera gástrica suele aparecer a partir de los 50-60 años de edad.

DOLOR DE MUÑECA

ESTO ES UN DOLOR DE MUÑECA SENCILLO.

Dolor de Meñique

Rasguño de gato

NOTAS

Fecha creación: 19/02/2015 05:20:44 p.m.