BIO * NATURAL

7a Av. A 3-54 Zona 9, Ciudad de Guatemala (502) 2331-7935

RECETA MEDICA

Paciente Nombre Completo

42 ADAN MEDINA GUERRA AM

Proxima Consulta Lunes 27 De Octubre Del 2014

** LE ROGAMOS TRAER SU RECETA A LA PRÓXIMA CONSULTA **

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR A TOMAR SU MEDICINA
DEJAR 15 o 20 MINUTOS DE DIFERENCIA ENTRE CADA MEDICAMENTO, NO TOMARLOS JUNTOS
TODO LO ESCRITO ES PARA USTED, HAGALO PORQUE ES PARTE DE SU TRATAMIENTO

Fecha creación: 28/09/2014 10:41:53 p.m.

MEDICAMENTOS

ULCERA BOCA

FORMA DE USO: VIA ORAL, Para tomar.

Agitar el frasco No. _____ Aplicar diez (10) gotas bajo la lengua y tragarlas.

O diluir 7 globulitos bajo la lengua. Hacerlo dos (2) veces al día. Por la mañana y por la tarde.

Si tiene que tomar otra medicina, deje (5) cinco minutos de separación entre una y otra.

NIÑOS LA MITAD DE LA DOSIS.

EN CASOS ESPECIALES:

5 gotitas bajo la lengua, a cada hora (el primer dia)

5 gotitas bajo la lengua, a cada dos horas (el segundo dia)

5 gotitas bajo la lengua, a cada tres horas (tercer dia)

Luego seguir con la dosis normal, dos veces al dia 10 gotas.

Si tiene que tomar otra medicina, deje (5) cinco minutos de separación entre una y otra.

NIÑOS LA MITAD DE LA DOSIS.

ULCERA DEL ESTOMAGO (GASTRITIS)

FORMA DE USO: VIA ORAL, Para tomar.

Agitar el frasco No. _____ Aplicar diez (10) gotas bajo la lengua y tragarlas.

O diluir 7 globulitos bajo la lengua. Hacerlo dos (2) veces al día. Por la mañana y por la tarde.

Si tiene que tomar otra medicina, deje (5) cinco minutos de separación entre una y otra.

NIÑOS LA MITAD DE LA DOSIS.

EN CASOS ESPECIALES:

5 gotitas bajo la lengua, a cada hora (el primer dia)

5 gotitas bajo la lengua, a cada dos horas (el segundo dia)

5 gotitas bajo la lengua, a cada tres horas (tercer dia)

Luego seguir con la dosis normal, dos veces al dia 10 gotas.

Si tiene que tomar otra medicina, deje (5) cinco minutos de separación entre una y otra.

NIÑOS LA MITAD DE LA DOSIS.

ULCERA MATRIZ

FORMA DE USO: VIA ORAL, Para tomar.

Agitar el frasco No. _____ Aplicar diez (10) gotas bajo la lengua y tragarlas 2 veces al dia.

O diluir 7 globulitos bajo la lengua. Hacerlo dos (2) veces al día. Por la mañana y por la tarde. Si tiene que tomar otra medicina, deje (5) cinco minutos de separación entre una y otra. NIÑOS LA MITAD DE LA DOSIS.
NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS 3 GLOBULITOS BAJO LA LENGUA 2 VECES AL DIA. EN CASOS ESPECIALES:
5 gotitas bajo la lengua, a cada hora (el primer dia)
5 gotitas bajo la lengua, a cada dos horas (el segundo dia)
5 gotitas bajo la lengua, a cada tres horas (tercer dia)
Luego seguir con la dosis normal, dos veces al dia 10 gotas.
Si tiene que tomar otra medicina, deje (5) cinco minutos de separación entre una y otra.
NIÑOS LA MITAD DE LA DOSIS.

INDICACIONES

SINTOMAS

NOTAS