

Compléments sur les groupes

Je me souviens	2
1.1 Loi de composition interne	2
1.2 Structure de groupe	2
1.3 Morphisme de groupes	2
1.4 Les entiers	2
Cours	3
2 Sous-groupe engendré par une partie	3
3 Interlude : le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$	3
4 Groupes monogène et groupes cycliques	4
5 Ordre d'un élément dans un groupe	4
Exercices	5
Exercices et résultats classiques à connaître	5
Le centre d'un groupe	5
Les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$	5
Exercices	6
Petits problèmes d'entraînement	6

Je me souviens

1.1 Loi de composition interne

1. Qu'est-ce qu'une loi de composition interne ?
2. Comment noter une loi de composition interne ?
3. Que signifient :
 - associatif ?
 - commutatif ?
 - élément neutre ? Comment le note-t-on ?
 - inversible ?
4. Soit E un ensemble, muni d'une loi de composition interne $*$. On suppose l'existence d'un élément neutre noté e . Soit a et b deux éléments de E , inversibles. Est-ce que $(a * b)$ est inversible ?
5. Pour un élément a et un entier n , qu'est-ce que a^n ?
6. Qu'est-ce qu'une **partie stable** de E pour $*$?

1.2 Structure de groupe

7. C'est quoi, un groupe ?
8. Donner des exemples de groupes.
9. Comment définir le **groupe produit** de deux groupes ?
10. C'est quoi, un sous-groupe ?
11. Quels sont les deux sous-groupes triviaux de $(G, *)$?

1.3 Morphisme de groupes

12. Qu'est-ce qu'un morphisme de groupe ?
13. Donner des exemples de morphismes de groupes.

On considère $f : (G, *) \rightarrow (H, \cdot)$ un morphisme de groupe.

14. Quelle est l'image du neutre, de l'inverse, par f ?
15. Que dire de l'image (directe) d'un sous-groupe par f ?
16. Que dire de l'image réciproque d'un sous-groupe par f ?
17. C'est quoi, le noyau de f ? Quel lien avec l'injectivité de f ?
18. C'est quoi, l'image de f ? Quel lien avec la surjectivité de f ?
19. Qu'est-ce qu'un **isomorphisme** de groupes.
20. Comment montrer qu'une application est un isomorphisme ?

1.4 Les entiers

21. Que désigne \mathbb{Z} ? $7\mathbb{Z}$?
22. Énoncer le théorème de la division euclidienne dans \mathbb{Z} .

2 Sous-groupe engendré par une partie

Proposition. Une intersection de sous-groupes est un sous-groupe : si $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes de $(G, *)$, alors $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G .

Définition. Soit $(G, *)$ un groupe et A une partie de G . On appelle **sous-groupe engendré par A** le plus petit sous-groupe H de $(G, *)$ qui contient A .

Remarque. On note $\langle A \rangle$ le sous-groupe engendré par A , mais cette notation n'est pas dans le programme officiel.

Remarque. La définition signifie que H est le sous-groupe de $(G, *)$ engendré par A si et seulement si :

- H est un sous-groupe de $(G, *)$
- $A \subset H$
- Pour tout sous-groupe K de $(G, *)$, $A \subset K \implies H \subset K$

Définition. La partie A de $(G, *)$ est dite **génératrice de G** lorsque le sous-groupe de $(G, *)$ engendré par A est G .

Remarque. On peut décrire le sous-groupe engendré par A : C'est l'ensemble des éléments de G qui s'écrivent sous la forme :

$$a_1^{\varepsilon_1} * \dots * a_n^{\varepsilon_n}$$

où $n \in \mathbb{N}$, $a_1, \dots, a_n \in A$, $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n = \pm 1$.

Lorsque G est commutatif et noté additivement, le sous-groupe engendré par A est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme :

$$k_1 a_1 + \dots + k_p a_p$$

où $p \in \mathbb{N}$, $a_1, \dots, a_p \in A$ sont distincts, et $k_1, \dots, k_p \in \mathbb{Z}$. Ce ne sont pas tout à fait des combinaisons linéaires, puisque les « scalaires » sont ici entiers.

3 Interlude : le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

Proposition. Pour $n \in \mathbb{N}$, la relation de **congruence modulo n** sur \mathbb{Z} est définie par :

$$a \equiv b [n] \iff a - b \in n\mathbb{Z}$$

C'est une relation d'équivalence.

Remarque. Si $n = 0$, il s'agit simplement de l'égalité. Si $n = 1$, tous les entiers sont en relation.

Proposition. Pour $n \geq 2$, il y a exactement n classes d'équivalences :

$$\{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

Définition. On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, appelé « \mathbb{Z} sur $n\mathbb{Z}$ ».

Remarque. On a bien $\text{Card}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n$.

Proposition. Pour $n \geq 2$, il existe une unique loi de groupe sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, encore notée $+$, pour laquelle l'application $k \mapsto \overline{k}$ soit un morphisme de groupes, i.e. :

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, \overline{a+b} = \overline{a} + \overline{b}$$

Remarque. Muni de cette loi, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est donc bien un groupe commutatif.

Exemple. Construire la table de la loi $+$ dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Corollaire. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\overline{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{Z}$,

$$k \cdot \overline{a} = \overline{ka}$$

Théorème.

Soit n entier ≥ 2 . Alors $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est engendré par chaque \bar{k} , où $k \in \{0, \dots, n-1\}$ est premier avec n .

Exemple. Donner la liste des éléments qui engendrent $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$.

4 Groupes monogène et groupes cycliques

Exemple-proposition. Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les $H = n\mathbb{Z}$, où $n \in \mathbb{N}$.

Proposition. Le sous-groupe de $(G, *)$ engendré par a est

$$\langle a \rangle = \{a^n, n \in \mathbb{Z}\}$$

Il est toujours commutatif.

Définition. Soit $(G, *)$ un groupe. On dit que G est **monogène** s'il est engendré par un seul élément, appelé **générateur de G** :

$$\exists x \in G, G = \langle x \rangle$$

Lorsque G est monogène et fini, on dit que G est un **groupe cyclique**.

Exemple.

- $(\mathbb{Z}, +)$ est monogène, car $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$, mais n'est pas fini.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est cyclique car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \bar{1} \rangle$ et de cardinal n .

Théorème.

Deux situations se présentent : un groupe monogène est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$ lorsqu'il est infini, et isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ lorsqu'il est de cardinal n .

Corollaire. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, (\mathbb{U}_n, \times) et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ sont isomorphes.

5 Ordre d'un élément dans un groupe

Définition. Soit $(G, *)$ un groupe et $a \in G$. On dit que a est **d'ordre fini** si le sous-groupe $\langle a \rangle$ qu'il engendre est de cardinal fini, appelé **l'ordre de a** .

Remarque. On note $\text{ordre}(a)$ l'ordre de a , mais cette notation n'est pas dans le programme officiel.

Rappel. Si a est un élément d'ordre d de G , l'application :

$$\begin{aligned} \phi_a : \mathbb{Z} &\rightarrow G \\ k &\mapsto a^k \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes, avec $\text{Im}(\phi_a) = \langle a \rangle$ et $\text{Ker } \phi_a = d\mathbb{Z}$.

De plus, l'application :

$$\begin{aligned} \phi_a : \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} &\rightarrow \langle a \rangle \\ \bar{k} &\mapsto a^k \end{aligned}$$

est un isomorphisme de groupes.

Théorème.

Si a est un élément d'ordre $d \in \mathbb{N}^*$ dans un groupe $(G, *)$, alors :

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{d-1}\}$$

et :

$$\text{ordre}(a) = \text{Min}\{k \in \mathbb{N}^*, a^k = e\}$$

Corollaire. On conserve les notations précédentes. Alors, pour tout $n \in \mathbb{Z}$:

$$a^n = e \iff d \mid n$$

Théorème.

Soit (G, \star) un groupe fini. Alors tous ses éléments sont d'ordre fini.

Plus précisément, pour tout $a \in G$:

$$\text{ordre}(a) \mid \text{Card}(G)$$

c'est-à-dire que $a^{\text{Card}(G)} = e$.

Corollaire. Tout groupe fini dont le cardinal est premier est cyclique, et engendré par chacun de ses éléments différent du neutre.

Exercices et résultats classiques à connaître

Le centre d'un groupe

11.1

Soit (G, \star) un groupe. On définit son **centre** comme l'ensemble des éléments de G qui commutent avec tous les éléments de G :

$$C = \{g \in G, \forall h \in G, g \star h = h \star g\}$$

Montrer que C est un sous-groupe de (G, \star) .

Les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$

11.2

Montrer que, si G est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, alors il est soit de la forme $\alpha\mathbb{Z}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$, soit dense dans \mathbb{R} . Dans le cas où $G \neq \{0\}$, on s'intéressera à $\alpha = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*)$ et on discutera selon que $\alpha > 0$ ou $\alpha = 0$.

Exercices

11.3

Soit E un ensemble non vide muni d'une loi $*$ possédant un neutre e . Montrer que a admet un inverse si et seulement si l'application $f : E \rightarrow E$

$$x \mapsto a * x$$
est bijective.

11.4

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C}, z^n = 1\}$ l'ensemble des racines n -èmes de l'unité. Montrer que (\mathbb{U}_n, \times) est un groupe.

11.5

Soit E un ensemble non vide, $a \in E$. On considère :

$$H = \{f \in \mathfrak{S}(E), f(a) = a\}$$

l'ensemble des permutations de E fixant a . Montrer que (H, \circ) est un groupe.

11.6

Montrer que :

$$\mathrm{SL}_n(\mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det(M) = 1\}$$

est un groupe pour la multiplication.

11.7

Montrer que :

$$H = \{x + y\sqrt{3}, x, y \in \mathbb{Z}, x^2 - 3y^2 = 1\}$$

est un sous-groupe de (\mathbb{R}^*, \times) .

11.8

Déterminer tous les morphismes de groupes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.

11.9

Soit $(G, *)$ un groupe commutatif. On considère g_1, g_2 deux éléments d'ordre d_1, d_2 respectivement. On suppose que $d_1 \wedge d_2 = 1$. Montrer que $g_1 * g_2$ est d'ordre fini, et calculer cet ordre.

11.10

Démontrer que la matrice :

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

est d'ordre fini dans $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$.

11.11

Dans \mathfrak{S}_{10} , déterminer l'ordre de :

$$(14378)(257)$$


11.12

Voici la liste des éléments de \mathfrak{S}_3 :

$$\{\mathrm{Id}, (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

Indiquer pour chaque élément son ordre.

Petits problèmes d'entraînement

11.13 

Soit (G, \star) un groupe, et \mathfrak{S} l'ensemble des permutations de G . On rappelle que (\mathfrak{S}, \circ) est un groupe. Pour $g \in G$, on définit :

$$\begin{aligned} \phi_g : G &\rightarrow G \\ h &\mapsto g \star h \star g^{-1} \end{aligned}$$

- Montrer que $\phi : g \mapsto \phi_g$ est un morphisme de (G, \star) dans (\mathfrak{S}, \circ) .
- Caractériser les éléments du noyau de ϕ .