

1 Exercices de niveau 1**907.1**

cc-INP

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note :

$$f_n(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}^n(x)}$$

- (a) Justifier que f_n est intégrable sur $[0, +\infty[$

On pose $I_n = \int_0^{+\infty} f_n(x) \, dx$.

- (b) Montrer la convergence de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Donner sa limite.

- (c) Déterminer la nature de $\sum (-1)^n I_n$ et de $\sum I_n$.

Indication : on pourra montrer que, pour $x \geq 0$, $\operatorname{ch} x \leq e^x$.

- (d) Quel est le rayon de convergence de $\sum I_n x^n$?

Examinateur bavard avec lequel j'ai pu dialoguer. Ça m'a mis en confiance durant l'exercice.

907.2

Mines-Télécom

Calculer :

$$\int_1^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^2)^2} \, dt$$

907.3

Mines-Télécom

- (a) Soit $\alpha > 0$. Utiliser une intégration par parties pour montrer la convergence de l'intégrale :

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} \, dt$$

- (b) Justifier que $|\sin t| \geq \sin^2 t$.

- (c) Montrer que $f_\alpha : t \mapsto \frac{\sin t}{t^\alpha}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$ si et seulement si $\alpha > 1$.

907.4

Mines-Télécom

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} \, dx$$

- (a) Justifier l'existence de I_n .

- (b) Déterminer une relation de récurrence satisfaite par I_n .

- (c) En déduire une expression de I_n faisant intervenir des factorielles.

907.5

Mines-Télécom

On définit, pour $x \in \mathbb{R}$: $\varphi(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{\int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} \, dt}$

- (a) Montrer que φ est bien définie.
- (b) Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et que : $\varphi'(x) = \varphi(x)(\varphi(x) - x)$
- (c) Montrer une égalité « compliquée » qui s'obtient immédiatement (j'ai oublié l'expression mais c'était polynomial).

907.6

cc-INP

On note, pour $n, p \in \mathbb{N}^*$: $I_{n,p} = \int_0^1 \ln(x)^n x^p dx$ et $f(x) = \frac{1}{x^x}$ pour $x \in D_f$.

- (a) Montrer que $I_{n,p}$ existe.
- (b) Montrer que, pour $n > 1$ et $p > 0$: $I_{n,p} = -\frac{n}{p+1} I_{n-1,p}$
- (c) Montrer que f est intégrable sur $]0, 1]$.
- (d) Montrer que : $\int_0^1 f(x) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}$

907.7

cc-INP

On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt$.

- (a) Pour tout $t \in [0, \pi/2]$, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos^n(t)$.
- (b) b1. Montrer que (u_n) converge vers 0.
- b2. Via une intégration par parties, montrer que $\forall n$, $u_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} u_n$.
- b3. Montrer que $\forall n$, $u_{2n+1} \neq 0$ et trouver le rayon de convergence de $\sum u_{2n+1} x^{2n+1}$.

On pose $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_{2n+1} x^{2n+1}$ lorsque ça existe.

- (c) Montrer que g est solution d'une équation différentielle.
- (d) Donner l'expression de $g(x)$.

2 Exercices de niveau 2**907.8**

Mines-Ponts

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ telle que $\int_0^{+\infty} (f'(t)^2 + t^2 f(t)^2) dt$ existe.

Montrer que f^2 est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et que $\int_0^{+\infty} f(t)^2 dt \leq 2 \sqrt{\int_0^{+\infty} f'(t)^2 dt} \sqrt{\int_0^{+\infty} t^2 f(t)^2 dt}$.

907.9

Mines-Ponts

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle strictement positive de limite nulle, et $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue bornée. On définit :

$$I_n(f) = \int_0^{+\infty} \frac{a_n}{a_n^2 + x^2} f(x) dx$$

Montrer la convergence de cette suite, et déterminer la valeur de sa limite.

907.10

Centrale

Pour $s \in]1, +\infty[$, on pose :

$$\zeta(s) = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^s}$$

(a) Montrer que ζ est bien défini, et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x+\dots+x^{n-1}} dx$$

(b) Étudier la convergence et déterminer la limite éventuelle de $(u_n)_n$.

(c) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$u_n = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{(np+1)(np+2)}$$

(d) Démontrer l'existence d'une suite de rationnels $(r_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ telle que :

$$\forall n \geq 3, u_n = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{r_k \zeta(k+1)}{n^{k+1}}$$

907.11

Centrale

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\text{Sp}(A)$ son spectre et $\rho(A) = \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda|$ son rayon spectral.

On admet que, pour toute norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$:

$$\rho(A) = \lim_{p \rightarrow +\infty} \|A^p\|^{1/p}$$

Pour tout réel $r > \rho(A)$ et $k \in \mathbb{Z}$, on pose :

$$J(r, k) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} r^{k+1} e^{i(k+1)\theta} (re^{i\theta} I_n - A)^{-1} d\theta$$

(a) Pour $M \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$, rappeler et justifier l'expression de M^{-1} à l'aide de $\text{Com}(M)$.

(b) Justifier l'existence de $J(r, k)$.

(c) Calculer $J(r, k)$ pour tout $r > \rho(A)$ et $k \in \mathbb{Z}$.

(d) En déduire, toujours pour $r > \rho(A)$:

$$\chi_A(A) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} re^{i\theta} (\text{Com}(re^{i\theta} I_n - A))^{\top} d\theta$$

(e) Dédire de ce qui précède une démonstration du théorème de Cayley-Hamilton.

907.12

Centrale

(a) Montrer l'existence d'une constante γ telle que :

$$\sum_{p=1}^n \frac{1}{p} - \ln(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \gamma$$

(b) Démontrer que la fonction $x \mapsto \ln(x)e^{-x}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.

(c) Démontrer la relation :

$$\int_0^{+\infty} \ln(x)e^{-x} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \ln(x) dx$$

(d) Conclure que :

$$\int_0^{+\infty} \ln(x)e^{-x} dx = -\gamma$$

907.13

Mines-Ponts

On définit $f : [-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 + x \cos^2(t)) dt$$

(a) Justifier le domaine de définition.

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, +\infty[$.

(c) Montrer que f est continue en -1 .

(d) Calculer $f'(x)$ en posant $u = \tan(t)$.

(e) En déduire $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(t)) dt$.

(f) f est-elle dérivable en -1 ?

Exercice très calculatoire, pendant la préparation j'avais les bonnes pistes mais je ne pensais pas qu'elles aboutissaient vers les calculs. Mais c'était pourtant cela.

907.14

Mines-Ponts

(a) Soit φ une fonction $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. Montrer que : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \varphi(t) \sin((2n+1)t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

(b) Pour $n \in \mathbb{N}$, on note :

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin(t)} dt, \quad J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)t)}{t} dt \text{ et } I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

Montrer l'existence de ces intégrales.

(c) Calculer $I_n - I_{n-1}$. En déduire la valeur de I_n .

(d) En déduire que $I = \frac{\pi}{2}$.

(Ce «en déduire» fait très mal!)

J'étais le dernier à passer, et ça se sentait. Examinateur calme et discret, qui donne quelques indications lorsque je bloquais mais qui ressemblaient plus à des pistes qu'à des éléments de solution.

907.15

Mines-Ponts

Pour $x > 0$, on note $\varphi(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^2} dt$.

(a) Montrer que φ est bien définie.

- (b) Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$.
- (c) Montrer qu'au voisinage de 0, $\varphi(x) = O(\ln(x))$.
- (d) Montrer que φ est intégrable sur $]0, +\infty[$.
- (e) Calculer $\int_0^{+\infty} \varphi(x) dx$.

Remarque On donne $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.
Examinateur sympa qui valide souvent ce qu'on écrit.

3 Exercices de niveau 3

907.16

X

- (a) Soit $a > 0$. Calculer les intégrales :

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+t^a)}{t} dt \text{ et } \int_0^1 \frac{\ln(1-t)}{t} dt$$

- (b) Soit $(a_n)_n \in (\mathbb{N}^*)^{\mathbb{N}}$ telle que $I \in \mathcal{P}_f(\mathbb{N}) \mapsto \sum_{n \in I} a_n$ soit injective, $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ désignant l'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$. Montrer que :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{a_n} \leq 2$$

4 Exercices de la banque CC-INP

25 à 18, 49