



Ricerca Operativa

1

Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi



Prima Parte



Introduzione

Testi consigliati

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

- ✓ S. Martello, M.G. Speranza, **Ricerca Operativa per l'Economia e l'Impresa**, Ed. Esculapio, 2012.

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

- ✓ M. Caramia, S. Giordani, F. Guerriero, R. Musmanno, D. Pacciarelli, **Ricerca Operativa**, ISEDI, 2014.

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

- ✓ F.S. Hillier, G.J. Lieberman, **Introduction to Operations Research**, 10/ed, McGraw-Hill, 2014.

Forma Canonica

- ✓ H.A. Taha, **Operations Research: An Introduction**, 9/ed, Pearson Prentice Hall, 2010.

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Definizione

La **Ricerca Operativa** (RO) si configura come un approccio scientifico in grado di orientare le decisioni di qualunque soggetto, chiamato a risolvere un problema di scelta, verso la linea più razionale e conveniente.

Problema di riferimento: occorre svolgere un certo numero di attività e si dispone di una quantità limitata di risorse, oppure si devono rispettare dei vincoli nelle assegnazioni delle risorse disponibili alle singole attività. Le risorse possedute (siano esse scarse o meno) vanno distribuite tra le varie attività in modo da ottimizzare l'efficienza complessiva.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Origine

Durante la seconda guerra mondiale i Servizi Militari Britannici chiesero a ingegneri e matematici di applicare un **criterio scientifico** alla soluzione di **problemi militari** (posizionamento di radar e collocazione di mine marine per ostacolare l'avanzata delle navi nemiche).

Alla fine della guerra, le tecniche di RO sperimentate con successo in ambito militare vennero trasferite in contesti civili per supportare le decisioni nella **pianificazione**, nella **gestione** e nel **controllo** di sistemi complessi.



Introduzione

Applicazioni

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

✓ Pianificazione e controllo della produzione;

Richiami di Algebra
Lineare

✓ Gestione delle scorte;

Programmazione
Lineare

✓ Organizzazione delle attività logistiche e di trasporto;

Risoluzione
Grafica

✓ Definizione dei turni del personale nelle grandi organizzazioni (es. ospedali, aeroporti);

Forma Standard

✓ Gestione delle risorse idriche e protezione dell'ambiente;

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

✓ Gestione dei sistemi di energia elettrica;

Forma Canonica

✓ Pianificazione a medio e lungo periodo di attività finanziarie (da parte di banche);

Metodo del
Simplexso

✓ Organizzazione dei servizi pubblici;

Regola di Bland

✓ ...

Metodo delle Due
Fasi



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare


Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simpleso
Regola di Bland
Metodo delle Due
Fasi

Metodologia

Uno studio di RO si articola in 5 fasi fondamentali





Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Metodologia

1. La prima fase consiste nell'individuazione degli obiettivi che si vogliono perseguire e dei fattori che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'analisi del problema da risolvere è un passo estremamente delicato che quasi sempre coinvolge il raggiungimento di un equilibrio fra interessi contrastanti. Ad esempio, nella pianificazione della produzione, una riduzione dei costi totali (costi di produzione + costi di inventario) si ottiene riducendo le scorte in magazzino. Tuttavia, la riduzione delle scorte può nuocere alle vendite in quanto impedisce pronte consegne e non consente di far fronte a brusche variazioni della domanda.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Metodologia

2. Un modello (di Programmazione Matematica) può essere visto come uno schema rappresentativo della realtà in esame, volto a semplificare la stessa realtà e consentire l'uso delle tecniche proprie della RO. Nella fase di costruzione del modello, il problema viene formulato mediante l'utilizzo di **variabili decisionali, funzione obiettivo, funzioni di vincolo**. Le variabili decisionali quantificano le grandezze su cui il decisore può direttamente intervenire (incognite del problema). La funzione obiettivo esprime una misura dell'efficacia delle decisioni prese e deve essere massimizzata (rispettivamente minimizzata) se rappresenta un profitto (rispettivamente un costo).



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Metodologia

Le funzioni di vincolo esprimono i legami fra le variabili decisionali e individuano limitazioni sul valore che esse possono assumere (limitazioni derivanti da considerazioni di carattere fisico, economico, ecc.). In sintesi, occorre esprimere, mediante relazioni matematiche, i legami di interdipendenza esistenti fra le grandezze in gioco.

3. Nella terza fase si prevede la deduzione di alcune proprietà (in riferimento a determinate classi di problemi): l'**esistenza** e l'**unicità** della soluzione ottima, la condizione di **ottimalità** (caratterizzazione analitica della soluzione ottima), ecc.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Metodologia

4. Nella quarta fase, vengono definiti opportuni **algoritmi** di risoluzione. Un algoritmo è una sequenza finita di operazioni elementari (aritmetiche, di confronto, ecc.) tale da fornire la soluzione corretta a ogni istanza del problema in esame (per istanza si intende ogni specifico caso del problema). La soluzione numerica ottenuta tramite l'utilizzo di questi algoritmi deve essere poi interpretata dal punto di vista applicativo in modo da evitare che abbia scarso rilievo pratico.
5. Infine si verifica se il modello costruito rappresenta accuratamente la realtà. In caso contrario, si esegue una fase di revisione.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Metodologia

In particolare, occorre verificare se sono stati commessi degli errori nella definizione degli obiettivi, nella scelta dei parametri, nella definizione delle relazioni di interdipendenza fra le variabili decisionali. Se il modello costruito rappresenta una fedele riproduzione del sistema reale, occorre sviluppare strumenti software di corredo necessari per il suo utilizzo nella pratica (fase di ingegnerizzazione).

☛ una soluzione rimane valida fino a quando rimane valido il modello



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di ottimizzazione

$$\text{Min (o Max)} f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

s.v.

$$g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{cases} \geq \\ = \\ \leq \end{cases} b_i, i=1, \dots, m$$

- ✓ x_1, x_2, \dots, x_n : variabili decisionali (incognite del problema);
- ✓ $f(\cdot)$: funzione obiettivo;
- ✓ $g_i(\cdot), i=1, \dots, m$: funzioni di vincolo.



Modello di Programmazione Matematica



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso
Regola di Bland
Metodo delle Due
Fasi


Problema di ottimizzazione

Per illustrare gli aspetti fondamentali relativi ai problemi di ottimizzazione si consideri un **problema monodimensionale** nella forma

$$\text{Min } f(x)$$

s.v.

$$a \leq x \leq b$$





Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di ottimizzazione

Una soluzione x^* tale che $f(x^*) \leq f(x)$ per ogni $x \in [a, b]$ è detta **minimo globale** della funzione $f(\cdot)$ nell'intervallo chiuso $[a, b]$.

Una soluzione x' tale che $f(x') \leq f(x)$ per ogni $x \in I(x') \subset [a, b]$ è detta **minimo locale** della funzione $f(\cdot)$ in $[a, b]$ (dove $I(x')$ indica un intorno di x').

La difficoltà a risolvere il problema, ossia a individuare il minimo globale, dipende dalle proprietà della funzione $f(\cdot)$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica


Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di ottimizzazione

Se la funzione obiettivo è lineare, la soluzione del problema è estremamente semplice: è sufficiente confrontare i valori di $f(a)$ e $f(b)$ e scegliere il minore.





Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di ottimizzazione

Caso generale (più dimensioni)

$\text{Min (o Max)} f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

s.v.

$$g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{cases} \geq \\ = \\ \leq \end{cases} b_i, i=1, \dots, m$$

✓ $f(\cdot)$: lineare

✓ $g_i(\cdot), i=1, \dots, m$: lineari



Modello di Programmazione Lineare



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di Programmazione Lineare

$$\text{Min (o Max)} \quad c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

s.v.

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \begin{cases} \geq \\ = \\ \leq \end{cases} b_i, i=1, \dots, m$$

con c_j e a_{ij} ($i=1, \dots, m; j=1, \dots, n$) costanti note.

In particolare:

- ✓ se x_1, x_2, \dots, x_n possono assumere valori reali, si parla di problemi di Programmazione Lineare (**PL**);
- ✓ se x_1, x_2, \dots, x_n possono assumere solo valori interi, si parla di problemi di Programmazione Lineare Intera (**PLI**).



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplex

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Costruzione del modello

Formulazione di problemi di PL e PLI (esempi):

- ✓ problema di **produzione**;
- ✓ problema di **miscelazione**;
- ✓ problema di **schedulazione**;
- ✓ problema di **trasporto**;
- ✓ problema di **investimento finanziario**;
- ✓ problema di **inventario**;
- ✓ problema di **assegnamento**.

Passi fondamentali:

- ✓ individuazione delle variabili decisionali;
- ✓ identificazione dei vincoli e della funzione obiettivo e loro rappresentazione in termini di variabili decisionali.



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di produzione

Una industria automobilistica utilizza due differenti linee di montaggio (A e B) per l'assemblaggio di veicoli industriali e veicoli agricoli. Il settore marketing ha previsto una forte richiesta dei due tipi di veicoli per il mese successivo, per cui è possibile vendere un qualsiasi quantitativo che l'industria è in grado di assemblare. Nello stabilire il piano di produzione per il mese successivo gli elementi da considerare sono:

- a) dalla vendita dei veicoli l'industria è in grado di realizzare un profitto unitario pari a 6.000 € per i veicoli industriali e a 2.000 € per i veicoli agricoli;



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di produzione

- b) nel mese successivo, per l'assemblaggio dei due tipi di veicoli, la linea A potrà essere impegnata per un totale di 180 ore complessive, la linea B per 135 ore;
- c) ciascun veicolo industriale richiede 20 ore per l'assemblaggio sulla linea A e 10 sulla linea B, mentre per un veicolo agricolo sono richieste 12 ore sulla linea A e 15 sulla linea B;
- d) l'industria utilizza un ulteriore impianto per il controllo di qualità, specificatamente per i veicoli industriali e agricoli assemblati. A seguito di accordi sindacali l'impianto deve rimanere attivo per un numero di ore pari almeno al 25% della capacità a regime, calcolata in 100 ore mensili;



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di produzione

- e) sono richieste 20 ore per testare un veicolo industriale e 10 ore per un veicolo agricolo;
- f) il settore “gestione del personale” ha individuato che, per garantire una distribuzione ottimale del personale lungo le linee di montaggio, il numero di veicoli agricoli assemblati deve essere pari almeno alla metà del numero di veicoli industriali assemblati;
- g) il responsabile della distribuzione ha segnalato che la più grande concessionaria di zona ha richiesto per il mese successivo almeno 4 veicoli, senza specificare il numero per ogni tipo.



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di produzione

Sulla base di tali considerazioni, il problema è pianificare la produzione di veicoli industriali e agricoli per il mese successivo, ovvero, stabilire il mix ottimale di prodotti con l'obiettivo di massimizzare il profitto.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di produzione: Formulazione

Si indichi con:

x_1 = numero di veicoli industriali da assemblare nel mese successivo;

x_2 = numero di veicoli agricoli da assemblare nel mese successivo.

Vincoli per le linee di assemblaggio. Il numero di ore per cui la linea A sarà utilizzata per l'assemblaggio dei veicoli sarà pari a $20x_1 + 12x_2$. Tale numero non potrà eccedere il monte orario disponibile sulla linea. Ciò può essere espresso formalmente dal vincolo $20x_1 + 12x_2 \leq 180$. Analogamente si ricava il vincolo per la linea B: $10x_1 + 15x_2 \leq 135$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di produzione: Formulazione

Vincoli per l'impianto per il controllo di qualità. Il 25% di 100 ore è pari a 25. Pertanto, l'impianto per il controllo di qualità dei veicoli industriali e agricoli dovrà essere attivato per almeno 25 ore e per non più di 100 durante il mese successivo. Il numero di ore richieste per testare complessivamente i veicoli sarà pari a $20x_1 + 10x_2$.

Si avranno allora i vincoli:

$$20x_1 + 10x_2 \geq 25;$$

$$20x_1 + 10x_2 \leq 100.$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di produzione: Formulazione

Vincolo per il settore “gestione del personale”.

Il numero di veicoli agricoli assemblati deve essere pari almeno alla metà del numero di veicoli industriali assemblati. Formalmente ciò significa che

$$x_1 - 2x_2 \leq 0.$$

Vincolo per la distribuzione. Complessivamente è necessario produrre almeno 4 veicoli nel mese successivo. Quindi dovrà risultare $x_1 + x_2 \geq 4$.

Dal momento che non avrebbe senso se le variabili x_1 e x_2 assumessero valori negativi (o frazionari), è necessario considerare vincoli aggiuntivi di non negatività (e interezza) delle variabili.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di produzione: Formulazione

Funzione obiettivo. Il profitto totale z (in migliaia di euro) risultante dalla vendita dei veicoli sarà pari a $z=6x_1+2x_2$.

E' evidente che dovranno essere presi in considerazione soltanto i piani di produzione ammissibili, cioè i valori di x_1 e x_2 tali da soddisfare contemporaneamente i vincoli di produzione.



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di produzione: Formulazione

Il problema da risolvere è pertanto il seguente:

Max z

$$z = 6x_1 + 2x_2$$

S.V.

$$20x_1 + 12x_2 \leq 180$$

$$10x_1 + 15x_2 \leq 135$$

$$20x_1 + 10x_2 \geq 25$$

$$20x_1 + 10x_2 \leq 100$$

$$x_1 - 2x_2 \leq 0$$

$$x_1 + x_2 \geq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$(x_1, x_2 \text{ int.})$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di produzione: Formulazione

Ammissibilità e ottimalità giocano un ruolo fondamentale per i problemi di ottimizzazione. Ad esempio, la soluzione $x_1=3$ e $x_2=2$, con $z=22$, è una soluzione **ammissibile**, dal momento che soddisfa tutti i vincoli del problema, ma a essa non corrisponde il profitto ottimo. Viceversa, la soluzione $x_1=5$ e $x_2=3$, pur realizzando un profitto migliore del caso precedente ($z=36$), non può essere presa in considerazione giacché il vincolo sul massimo numero di ore disponibili per l'impianto per il controllo di qualità verrebbe violato. La soluzione **ottima**, a cui corrisponde un valore di profitto pari a $z^*=28$, si raggiunge quando $x_1^*=4$ e $x_2^*=2$. Il modo in cui si determina questa soluzione verrà spiegato in seguito.



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di miscelazione

Una industria alimentare leader nella produzione di cibo per gatti ha deciso di lanciare sul mercato un nuovo prodotto in confezioni da gr. 500. Il controllo di qualità sul prodotto ha imposto che in ogni confezione devono essere contenuti almeno gr. 120 di proteine, gr. 115 di carboidrati e gr. 210 di grassi. Per questo nuovo prodotto l'industria intende utilizzare tre composti di base che verrebbero opportunamente miscelati.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di miscelazione

Prezzo e contenuto di gr. 100 di composto sono riassunti nella seguente tabella:

Composto	P	C	G	A	Prezzo
1	14	25	57	4	0,80
2	15	37	40	8	0,55
3	40	20	25	15	0,40

Contenuto (gr.) e prezzo (€) di gr. 100 di composto
(P = proteine; C = carboidrati; G = grassi; A = altro)

L'obiettivo dell'industria è determinare il mix di composti in modo tale da soddisfare i vincoli sulla qualità del prodotto e minimizzare i costi.



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplex

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di miscelazione: Formulazione

Si indichi con:

x_i = percentuale di composto i contenuto in gr. 100 di prodotto ($i=1,2,3$).

Nota che la percentuale è intesa come un numero che varia fra 0 e 1 (0,4 \rightarrow 40%).

Il quantitativo di proteine contenuto in gr. 100 di prodotto ottenuto miscelando i tre composti sarà dato da: $14x_1 + 15x_2 + 40x_3$.

Il controllo di qualità ha imposto che in gr. 500 di prodotto devono essere contenuti almeno gr. 120 di proteine. Ciò significa formalmente che

$14x_1 + 15x_2 + 40x_3 \geq 24$ (poiché $120/5=24$).



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di miscelazione: Formulazione

Analogamente si ricavano i vincoli sul quantitativo di carboidrati e grassi:

$$25x_1 + 37x_2 + 20x_3 \geq 23$$

$$57x_1 + 40x_2 + 25x_3 \geq 42.$$

È necessario, inoltre, considerare che per il nuovo prodotto possono essere utilizzati soltanto i tre composti. Ciò impone che:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1.$$

Infine, si impone il vincolo di non negatività delle variabili.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di miscelazione: Formulazione

L'obiettivo è minimizzare il costo di produzione che si può esprimere come la minimizzazione del costo di gr. 100 di prodotto, espresso come $z = 0,80x_1 + 0,55x_2 + 0,40x_3$.

Riassumendo si avrà:

Min z

$$z = 0,80 x_1 + 0,55 x_2 + 0,40 x_3$$

S.V.

$$14x_1 + 15x_2 + 40x_3 \geq 24$$

$$25x_1 + 37x_2 + 20x_3 \geq 23$$

$$57x_1 + 40x_2 + 25x_3 \geq 42$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Soluzione ottima (spiegazione successiva): $x_1^* = 0,451$; $x_2^* = 0,171$; $x_3^* = 0,378$ ($z^* = 0,606$).



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di miscelazione

Esercizio:

Riformulare il modello di miscelazione modificando il significato delle variabili decisionali:

x_i = numero di etti del composto i contenuti in una confezione da gr. 500 ($i=1,2,3$).



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di schedulazione

Il responsabile della gestione del personale di un'azienda manifatturiera ha il compito di organizzare i turni di lavoro per una catena di montaggio a ciclo continuo. Sono previste sei fasce orarie per ognuna delle quali è richiesto un numero minimo di unità lavorative, come riassunto dalla seguente tabella:

Fascia oraria	Minimo numero di lavoratori
00.00 - 04.00	6
04.00 - 08.00	9
08.00 - 12.00	14
12.00 - 16.00	9
16.00 - 20.00	11
20.00 - 24.00	8



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplex

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di schedulazione

A seguito di accordi sindacali sono stati individuati sei turni di lavoro ciascuno dei quali di 8 ore lavorative:

Turno	Orario di lavoro per turno
1	20.00 - 04.00
2	00.00 - 08.00
3	04.00 - 12.00
4	08.00 - 16.00
5	12.00 - 20.00
6	16.00 - 24.00

Si vuole determinare il numero di unità lavorative da assegnare a ogni turno in modo tale da impiegare la minor forza lavoro complessiva.



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di schedulazione: Formulazione

Si indichi con:

x_i = unità di personale da assegnare al turno i -esimo
($i=1, \dots, 6$).

È evidente che la fascia oraria compresa tra le 00.00 e le 04.00 sarà coperta dalle unità lavorative del primo e del secondo turno. Dovendo garantire una disponibilità di personale di almeno 6 unità, si impone il vincolo: $x_1 + x_2 \geq 6$.

Analogamente si ottiene per le altre fasce orarie:

$x_2 + x_3 \geq 9$; $x_3 + x_4 \geq 14$; $x_4 + x_5 \geq 9$; $x_5 + x_6 \geq 11$; $x_6 + x_1 \geq 8$.

Occorre, infine, imporre il vincolo di non negatività (e interezza) delle variabili decisionali.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di schedulazione: Formulazione

L'obiettivo è minimizzare il numero di unità impiegate, cioè $z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$. Il problema risulta quindi:

Min z

$$z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$$

s.v.

$$x_1 + x_2 \geq 6$$

$$x_2 + x_3 \geq 9$$

$$x_3 + x_4 \geq 14$$

$$x_4 + x_5 \geq 9$$

$$x_5 + x_6 \geq 11$$

$$x_1 + x_6 \geq 8$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \text{ int.})$$



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di schedulazione: Formulazione

La soluzione ottimale prevede:

$$x_1^*=6, x_2^*=0, x_3^*=9, x_4^*=5, x_5^*=9, x_6^*=2,$$

per un numero complessivo di unità lavorative
utilizzate pari a: $z^* = 31$ (spiegazione successiva).

Da notare che soltanto per la fascia oraria compresa
tra le 12.00 e le 16.00 saranno utilizzate unità di
personale in un numero superiore rispetto al minimo
richiesto.



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di trasporto

Un'azienda possiede due centri di distribuzione e tre punti vendita dislocati sul territorio. Di un prodotto sono disponibili al più 250 unità presso il primo centro di distribuzione e al più 400 presso il secondo. Alla direzione centrale risulta una richiesta di rifornimento dai tre punti vendita pari ad almeno 120, 270, 130 unità rispettivamente. Presso i punti vendita ciascuna unità di prodotto viene venduta a € 14, 17 e 16. I costi unitari di trasporto (in €), legati alla distanza tra i centri di distribuzione e i punti vendita, sono così riassumibili:

Costo		
2	4	1
3	6	5



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di trasporto

Presso i punti vendita è possibile vendere qualsiasi quantità di prodotto disponibile.

Occorre determinare la quantità di prodotto da trasportare dai centri di distribuzione ai punti vendita, con l'obiettivo di massimizzare il profitto.



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di trasporto: Formulazione

Si definiscono le seguenti variabili decisionali:

x_{ij} = unità di prodotto inviate dal centro di distribuzione i ($i=1,2$) al punto di vendita j ($j=1,2,3$).

La quantità di prodotto inviata dal primo centro di distribuzione verso i punti vendita sarà pertanto pari a $x_{11} + x_{12} + x_{13}$. Tale quantità non può eccedere la disponibilità complessiva pari a 250 unità.

Si avrà quindi: $x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 250$.



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di trasporto: Formulazione

Analogamente, per il secondo centro di distribuzione: $x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 400$.

Il primo punto vendita ha richiesto almeno 120 unità di prodotto. La fornitura potrà avvenire utilizzando i due centri di distribuzione che invieranno un quantitativo pari a $x_{11} + x_{21}$. E' pertanto necessario imporre che: $x_{11} + x_{21} \geq 120$.

Similmente per gli altri due punti vendita, si avrà:

$$x_{12} + x_{22} \geq 270,$$

$$x_{13} + x_{23} \geq 130.$$



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di trasporto: Formulazione

Per calcolare il profitto complessivo derivante dalla vendita del prodotto è necessario considerare che i costi di trasporto dipendono dal centro di distribuzione e dal punto vendita interessato. Se, ad esempio, si considera il primo centro di distribuzione e il primo punto vendita, il profitto unitario, esprimibile come differenza tra ricavo e costo unitario, sarà dato da: $14 - 2 = 12$.

Pertanto il profitto complessivo da massimizzare sarà:

$$z = 12x_{11} + 13x_{12} + 15x_{13} + 11x_{21} + 11x_{22} + 11x_{23}.$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di trasporto: Formulazione

Max z

$$z = 12x_{11} + 13x_{12} + 15x_{13} + 11x_{21} + 11x_{22} + 11x_{23}$$

S.V.

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 250$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 400$$

$$x_{11} + x_{21} \geq 120$$

$$x_{12} + x_{22} \geq 270$$

$$x_{13} + x_{23} \geq 130$$

$$x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23} \geq 0$$

$$(x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23} \text{ int.})$$

Soluzione ottima (spiegazione successiva): $x_{11}^* = x_{12}^* = 0$; $x_{13}^* = 250$;
 $x_{21}^* = 120$; $x_{22}^* = 270$; $x_{23}^* = 10$ ($z^* = 8150$).



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di investimento finanziario

Una società di assicurazione deve formulare un piano di investimento quadriennale sulla base di una liquidità valutabile in € 300.000. Essa potrà contare, inoltre, sull'utilizzo di liquidità aggiuntiva per precedenti investimenti che si concluderanno al primo, secondo e terzo anno del seguente importo (in migliaia di euro):

Liquidità		
60	55	32

Sono stati formulati due possibili progetti di investimento per i quali la società può stabilire una quota di partecipazione compresa tra il 25% e il 100%.



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di investimento finanziario

Se la quota è pari al 100%, i piani di investimento si articolano nel modo seguente:

Liquidità				
Iniziale	Anno I	Anno II	Anno III	Finale
-140	-60	+150	+30	+65
-150	+50	-43	-22	+222

Flussi di denaro (in migliaia di euro). Il segno + indica recupero di capitale, il segno - indica investimento

Se la percentuale di investimento è minore del 100%, il flusso di liquidità dovrà essere rapportato alla percentuale di partecipazione.



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di investimento finanziario

Non è consentito ottenere prestiti nel corso del quadriennio ed eventuali eccedenze di liquidità iniziali o alle scadenze annuali possono essere investite in certificati di deposito bancari annuali al tasso di interesse stimato al 9%. Il problema è stabilire la quota di partecipazione iniziale per i due progetti di investimento e la liquidità investita annualmente in certificati di deposito in modo tale da massimizzare la liquidità al termine del quadriennio.



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di investimento finanziario: Formulazione

Si indichi con:

x_1 = percentuale di partecipazione al primo piano di investimento;

x_2 = percentuale di partecipazione al secondo piano di investimento;

x_3 = liquidità da investire inizialmente in certificati di deposito (in migliaia di euro);

x_4 = liquidità da investire in certificati di deposito al termine del primo anno (in migliaia di euro);

x_5 = liquidità da investire in certificati di deposito al termine del secondo anno (in migliaia di euro);

x_6 = liquidità da investire in certificati di deposito al termine del terzo anno (in migliaia di euro).



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di investimento finanziario: Formulazione

Nel determinare i vincoli del problema è sufficiente considerare che la quantità di denaro da investire annualmente in certificati di deposito dovrà essere pari alla liquidità disponibile al momento.

Si avrà allora inizialmente:

$$x_3 = 300 - (140x_1 + 150x_2),$$

mentre, al termine degli anni successivi:

$$x_4 = (60 + 1,09x_3 + 50x_2) - 60x_1 \quad (\text{primo anno})$$

$$x_5 = (55 + 1,09x_4 + 150x_1) - 43x_2 \quad (\text{secondo anno})$$

$$x_6 = (32 + 1,09x_5 + 30x_1) - 22x_2 \quad (\text{terzo anno}).$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di investimento finanziario: Formulazione

Inoltre dovrà essere $0,25 \leq x_1 \leq 1$ e $0,25 \leq x_2 \leq 1$, nonché $x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$.

Al termine della scadenza quadriennale la liquidità sarà pari a: $z = 65x_1 + 222x_2 + 1,09x_6$ che rappresenta, evidentemente, l'obiettivo da massimizzare.

La soluzione ottima

$x_1^* = 1; x_2^* = 0,25; x_3^* = 122,5; x_4^* = 146,025; x_5^* = 353,4173;$
 $x_6^* = 441,7248 (z^* = 601,9801)$

si ottiene risolvendo il seguente modello di PL
(spiegazione successiva)





Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di investimento finanziario: Formulazione

Max z

$$z = 65x_1 + 222x_2 + 1,09x_6$$

s.v.

$$140x_1 + 150x_2 + x_3 = 300$$

$$60x_1 - 50x_2 - 1,09x_3 + x_4 = 60$$

$$-150x_1 + 43x_2 - 1,09x_4 + x_5 = 55$$

$$-30x_1 + 22x_2 - 1,09x_5 + x_6 = 32$$

$$x_1 \leq 1$$

$$x_2 \leq 1$$

$$x_1 \geq 0,25$$

$$x_2 \geq 0,25$$

$$x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di inventario

Un'azienda specializzata nella lavorazione di lamierati riceve una commessa concernente la produzione di lamiera di zinco pari a $2,50 \times 2,50$ m. La quantità richiesta deve essere fornita periodicamente, improrogabilmente alla fine di ogni mese. Le richieste d_t coprono un intervallo temporale di 5 mesi, come mostrato in tabella:

Quantità				
270	290	250	240	310

Quantità di lamierati di zinco richiesto per i 5 mesi successivi



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di inventario

Per la lavorazione dei lamierati si utilizza un unico impianto a ciclo continuo caratterizzato, per il particolare prodotto, da costi unitari di produzione mensile c_f e da una capacità di produzione b_f (espressa in massimo numero di unità che si è in grado di lavorare mensilmente) così riassumibile:

Costi unitari e capacità mensile				
25	28	32	21	24
250	220	280	270	260

Costi unitari (in euro) e capacità mensile di
produzione di lamierati di zinco

Le unità di prodotto eventualmente non consegnate verranno immagazzinate.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplex

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di inventario

Ciò comporta un costo aggiuntivo di inventario, il cui valore unitario h_t varia mensilmente nel seguente modo:

Costi unitari				
10	12	8	10	11

Costi unitari mensili di inventario (in euro)

Nel magazzino sono disponibili inizialmente 100 lamiere di zinco della dimensione desiderata.

L'obiettivo per l'azienda è pianificare la produzione di lamierati di zinco in modo tale da minimizzare i costi di produzione e di inventario.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di inventario: Formulazione

Il problema rientra nella classe di problemi di inventario di singolo prodotto di tipo deterministico, giacché il livello di domanda da soddisfare nei periodi successivi è già noto con certezza all'inizio del primo periodo. Si indichi con:

x_t = numero di lamiera di zinco prodotte durante il mese t ($t=1, \dots, 5$).

Il valore dell'inventario I_t alla fine di ogni mese sarà pertanto dato da: $I_t = I_{t-1} + x_t - d_t, \forall t=1, \dots, 5$.

(“inventario alla fine del mese precedente” + “produzione nel mese corrente” – “quantità fornita all'acquirente nel mese corrente”).



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di inventario: Formulazione

Si avrà, inoltre, che $I_0=100$, che rappresenta la disponibilità iniziale di magazzino per la quale, senza perdita di generalità, non si assume alcun costo aggiuntivo.

Il modello risultante è riportato di seguito.

La soluzione ottima è:

$$x_1^*=240; x_2^*=220; x_3^*=270; x_4^*=270; x_5^*=260;$$

$$I_1^*=70; I_2^*=0; I_3^*=20; I_4^*=50; I_5^*=0 \quad (z^*=34070)$$

(spiegazione successiva).





Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di inventario: Formulazione

Min z

$$z = 25x_1 + 28x_2 + 32x_3 + 21x_4 + 24x_5 + 10l_1 + 12l_2 + 8l_3 + 10l_4 + 11l_5$$

S.V.

$$\begin{array}{rcllclclclcl}
 x_1 & & & & & -l_1 & & & & = 170 \\
 x_1 & +x_2 & & & & & -l_2 & & & = 460 \\
 x_1 & +x_2 & +x_3 & & & & & -l_3 & & = 710 \\
 x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & & & & & -l_4 & = 950 \\
 x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & +x_5 & & & & & -l_5 = 1260 \\
 x_1 & & & & & & & & & \leq 250 \\
 & x_2 & & & & & & & & \leq 220 \\
 & & x_3 & & & & & & & \leq 280 \\
 & & & x_4 & & & & & & \leq 270 \\
 & & & & x_5 & & & & & \leq 260 \\
 (x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & l_1, & l_2, & l_3, & l_4, & l_5 \geq 0, \text{ int.})
 \end{array}$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di assegnamento

In vista delle prossime elezioni, la Regione Calabria deve assegnare 5 località (L_1, L_2, L_3, L_4 e L_5) a 4 circoscrizioni elettorali (C_1, C_2, C_3 e C_4). In base alle posizioni geografiche delle 5 località e a fattori di tipo organizzativo, la Regione ha stimato i seguenti costi di assegnamento (in migliaia di euro):

	C_1	C_2	C_3	C_4
L_1	7,2	5,0	3,1	8,3
L_2	4,0	7,1	5,1	6,4
L_3	8,1	9,1	9,0	7,2
L_4	8,9	5,3	3,3	4,8
L_5	9,0	5,5	10,0	5,2



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di assegnamento

Ogni località deve essere assegnata esattamente a una circoscrizione. Inoltre, alla circoscrizione C_2 si devono assegnare esattamente due località.

Occorre decidere come assegnare le 5 località alle 4 circoscrizioni con l'obiettivo di minimizzare i costi complessivi.



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di assegnamento: Formulazione

Il modello prevede l'impiego di particolari variabili decisionali, dette **variabili binarie**.

Le variabili binarie possono assumere solo i valori 0 e 1; esse si presentano nei casi in cui si devono prendere delle decisioni di tipo si/no (associabili ai valori 1/0).

Variabili decisionali:

$x_{ij} \in \{0,1\}$. In particolare, x_{ij} vale 1 se la località L_i è assegnata alla circoscrizione C_j , 0 altrimenti ($i=1,\dots,5$; $j=1,\dots,4$).



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di assegnamento: Formulazione

Ciascuna località L_i ($i=1, \dots, 5$) deve essere assegnata esattamente a una circoscrizione C_j ($j=1, \dots, 4$).

Ciò significa che: $x_{i1} + x_{i2} + x_{i3} + x_{i4} = 1$ per ogni $i=1, \dots, 5$.

Inoltre, alla circoscrizione C_2 devono essere assegnate esattamente 2 località. Ne segue che $x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} + x_{52} = 2$.

L'obiettivo di minimizzare i costi complessivi di assegnamento è espresso come:

$$z = 7,2x_{11} + 5,0x_{12} + 3,1x_{13} + 8,3x_{14} + 4,0x_{21} + 7,1x_{22} + 5,1x_{23} + 6,4x_{24} + 8,1x_{31} + 9,1x_{32} + 9,0x_{33} + 7,2x_{34} + 8,9x_{41} + 5,3x_{42} + 3,3x_{43} + 4,8x_{44} + 9,0x_{51} + 5,5x_{52} + 10,0x_{53} + 5,2x_{54}.$$



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di assegnamento: Formulazione

Min z

$$z = 7,2x_{11} + \dots + 5,2x_{54}$$

S.V.

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 1$$

$$x_{51} + x_{52} + x_{53} + x_{54} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} + x_{52} = 2$$

$$x_{11}, \dots, x_{54} \in \{0, 1\}$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplex

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problema di assegnamento: Formulazione

Soluzione ottima (spiegazione successiva): le uniche variabili decisionali diverse da 0 sono $x_{13}^* = x_{21}^* = x_{32}^* = x_{43}^* = x_{52}^* = 1$ ($z^* = 25$). Si osservi che possono esistere più soluzioni ottime.

Indicando con λ_{ij} il costo di assegnamento della località L_i alla circoscrizione C_j ($i = 1, \dots, 5; j = 1, \dots, 4$), il problema può essere riformulato nel seguente modo:

Min z

$$z = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^4 \lambda_{ij} x_{ij}$$

s.v.

$$\sum_{j=1}^4 x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, 5$$

$$\sum_{i=1}^5 x_{i2} = 2$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, 5, j = 1, \dots, 4$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esercizio

Un'azienda deve **tagliare** assi di acciaio di 300 cm, per realizzare profilati di lunghezza variabile (problema di *cutting stock*). In particolare, l'azienda deve produrre almeno 400 unità di lunghezza pari a 120 cm (profilati di tipo A), almeno 600 unità di lunghezza pari a 80 cm (profilati di tipo B), almeno 800 unità di lunghezza pari a 60 cm (profilati di tipo C) e almeno 200 unità di lunghezza pari a 100 cm (profilati di tipo D).

Sono stati definiti 5 modelli (o schemi) di taglio:

- ✓ **Modello 1:** consente di ottenere profilati di tipo A (1 unità) e profilati di tipo C (3 unità);



Introduzione

**Problemi Decisionali
(Formulazioni)**

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esercizio

- ✓ *Modello 2: consente di ottenere profilati di tipo C (5 unità);*
- ✓ *Modello 3: consente di ottenere profilati di tipo A (1 unità), profilati di tipo B (1 unità) e profilati di tipo D (1 unità);*
- ✓ *Modello 4: consente di ottenere profilati di tipo D (3 unità);*
- ✓ *Modello 5: consente di ottenere profilati di tipo B (3 unità) e profilati di tipo C (1 unità).*

Stabilire quante volte occorre impiegare ogni modello per soddisfare le richieste e minimizzare il numero complessivo di assi da tagliare.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Algebra lineare (alla base della RO)

Vettore n -dimensionale: n -pla di numeri reali (punto nello spazio R^n) $\rightarrow v^T = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n]$.

Un vettore si dice **unitario** se ha una sola componente unitaria e le altre nulle; si dice **nullo** se ha tutte le componenti nulle.

Le principali operazioni sui vettori sono la somma (o la sottrazione) e la moltiplicazione per uno scalare.

- La **somma** di due vettori u e v ($u^T = [u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n]$ e $v^T = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n]$) è il vettore $u+v$ che si ottiene sommando le componenti corrispondenti:
 $(u+v)^T = [u_1+v_1 \ u_2+v_2 \ \dots \ u_n+v_n]$.



Introduzione

Vettori

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

- La **moltiplicazione** di un vettore v ($v^T = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n]$) **per uno scalare** k è il vettore kv ottenuto moltiplicando ogni componente di v per k :
 $(kv)^T = [k v_1 \ k v_2 \ \dots \ k v_n]$.
- La **sottrazione** di due vettori u e v si riconduce alla somma, considerando che $-v = -1v$; pertanto si ha:
 $u - v = u + (-v)$.
- Altre proprietà (u, v e w sono vettori in R^n , k è uno scalare e 0_n è il vettore nullo in R^n):

$$(u + v) + w = u + (v + w),$$

$$u + 0_n = u,$$

$$u + (-u) = 0_n,$$

$$u + v = v + u,$$

$$k(u + v) = ku + kv.$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Vettori

Inoltre, ai vettori u e v ($u^T = [u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n]$, $v^T = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n]$) può essere applicata un'altra operazione, detta **prodotto scalare**, che esprime lo scalare ottenuto moltiplicando le componenti corrispondenti e sommando i prodotti risultanti: $u^T v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$.

- I vettori u e v si dicono ortogonali se il loro prodotto scalare è zero: $u^T v = 0$.
- Proprietà del prodotto scalare: $u^T v = v^T u$.

✓ Dati m vettori n -dimensionali v_1, v_2, \dots, v_m e m scalari $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, allora il vettore $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m$ prende il nome di **combinazione lineare** dei vettori.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Vettori

Se gli scalari sono non negativi e tali che la loro somma è 1, il vettore $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m$ è, più specificamente, una **combinazione convessa**.

- ✓ m vettori v_1, v_2, \dots, v_m si dicono **linearmente indipendenti** se $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m = 0_n$ solo per $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$.
- ✓ Dati due vettori, l'insieme di tutte le loro combinazioni convesse è detto **segmento congiungente**.
- ✓ Un insieme V di vettori n -dimensionali si definisce **convesso** se per ogni coppia di vettori appartenenti all'insieme, il loro segmento congiungente è anch'esso completamente contenuto nell'insieme.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso


Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi


Vettori

$$\forall v_1, v_2 \in V \text{ e } \forall \lambda \in [0,1]: \lambda v_1 + (1-\lambda)v_2 \in V.$$

In caso contrario si parla di insieme *concavo*.



Insieme convesso



Insieme concavo

- ✓ Un vettore v è un *punto estremo* di un insieme convesso se non può essere espresso come combinazione convessa di altri due vettori dell'insieme stesso.



Introduzione

Matrici

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Matrice (dimensione $m \times n$): $m \times n$ numeri reali organizzati per *righe* e *colonne*.

- ✓ Esistono operazioni e proprietà analoghe a quelle riportate con riferimento ai vettori.
- ✓ Data una matrice A ($m \times n$) e una matrice B ($n \times p$) il risultato della loro **moltiplicazione** è una matrice C ($m \times p$) dove l'elemento c_{ij} è ricavato dal prodotto scalare dell' i -esima riga di A e della j -esima colonna di B .

Es.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = AB = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 19 & 5 \\ 11 & 1 \end{bmatrix}.$$



Introduzione

Matrici

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplex

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

- ✓ Una matrice con una sola riga è detta *vettore riga*; una matrice con una sola colonna è detta *vettore colonna*.
- ✓ Una matrice quadrata A ($n \times n$) si dice *matrice identità* I_n se ha tutti gli elementi sulla diagonale principale pari a 1 e i restanti pari a 0.
- ✓ Per le **matrici trasposte** valgono i seguenti risultati:
 - $(A^T)^T = A$,
 - Se A e B hanno le stesse dimensioni $(A+B)^T = A^T + B^T$.



Introduzione

Matrici

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

- ✓ Sia A una matrice quadrata ($n \times n$). Se esiste una matrice quadrata B ($n \times n$) tale che $AB = I_n$ e $BA = I_n$ allora B è detta **inversa** di A ed è indicata con A^{-1} . L'inversa, se esiste, è unica.
- ✓ A ha l'inversa (cioè è invertibile) se è **non singolare** (determinante diverso da 0).
- ✓ Il **determinante** di una matrice quadrata A ($n \times n$) ne specifica le caratteristiche e si indica con $|A|$ o con $\det(A)$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

**Richiami di Algebra
Lineare**

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Determinante di una matrice

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

fissato un qualsiasi j , se lo si calcola rispetto a una qualsiasi colonna ($j=1, \dots, n$) oppure, in maniera equivalente, da:

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad \text{fissato un qualsiasi } i,$$

se lo si calcola rispetto a una qualsiasi riga ($i=1, \dots, n$).



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Determinante di una matrice

A_{ij} ($i, j=1, 2, \dots, n$) può essere definito come segue:
fissato l'elemento di posto (i, j) si considera la matrice di ordine $(n-1)$, ottenuta dalla matrice A togliendo la riga i e la colonna j , e se ne calcola il determinante; moltiplicando tale numero per $(-1)^{i+j}$ si ottiene il valore di A_{ij} .

Così, partendo dalla matrice più piccola, di ordine (2×2)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

si ha: $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Determinante di una matrice

Si consideri una matrice 3×3 del tipo

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

In base agli elementi della prima colonna, si ottiene:

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + a_{31}A_{31} =$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}.$$

È evidente che il calcolo del determinante diventa sempre più articolato e complesso all'aumentare delle dimensioni della matrice.



Introduzione

Determinante di una matrice

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Proprietà:

**Richiami di Algebra
Lineare**

✓ Il determinante di A è uguale al determinante di A^T .

Programmazione
Lineare

✓ Se gli elementi di una riga o di una colonna di una matrice sono tutti nulli, il determinante di questa matrice è nullo.

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

✓ Se gli elementi di una riga o di una colonna sono uguali o proporzionali a un'altra riga o colonna, il determinante è nullo.

Forma Canonica

✓ Il determinante non cambia se agli elementi di una riga o di una colonna si aggiungono o si tolgono gli elementi di altre righe o colonne moltiplicati per delle costanti arbitrarie.

Metodo del
Simplex

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Rango di una matrice

Si consideri una matrice A ($m \times n$).

- ✓ Il rango-riga di A è il massimo numero di righe linearmente indipendenti (ogni riga di A è interpretabile come un vettore).
- ✓ Il rango-colonna di A è il massimo numero di colonne linearmente indipendenti (ogni colonna di A è interpretabile come un vettore).
- ✓ Il rango-riga è uguale al rango-colonna; quindi il **rango** di una matrice è il massimo numero di righe o colonne linearmente indipendenti.

$\text{Rango}(A) \leq \min(m, n)$.

Se $\text{Rango}(A) = \min(m, n)$, A si dice a **rango pieno**.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

**Richiami di Algebra
Lineare**

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Sottomatrici

Si consideri una matrice A ($m \times n$). Si può ottenere una sua **sottomatrice** scegliendo alcune righe e/o colonne di A .

Si considerino tutte le sottomatrici quadrate, con determinante non nullo, estraibili da A . Si indichi con r l'ordine della sottomatrice di ordine maggiore con queste caratteristiche. Il rango di A è pari a r .



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplex

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Sottomatrici

Una matrice A può essere *partizionata* in sottomatrici.
Si consideri, ad esempio:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \text{ dove}$$

$$A_{11} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}, \quad A_{12} = \begin{bmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{23} & a_{24} \\ a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}, \quad A_{21} = \begin{bmatrix} a_{41} & a_{42} \end{bmatrix},$$
$$A_{22} = \begin{bmatrix} a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}.$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
Lineare**Programmazione
Lineare**Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problemi di Programmazione Lineare

Nella prima parte del corso verranno studiati dettagliatamente **metodi risolutivi** per i modelli di Programmazione Lineare (PL).

E' opportuno ricordare che, date n **variabili reali** x_1, x_2, \dots, x_n , una **funzione lineare** di tali variabili $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ può sempre essere espressa nella forma

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = s_1 x_1 + s_2 x_2 + \dots + s_n x_n = \sum_{j=1}^n s_j x_j,$$

con s_1, s_2, \dots, s_n costanti reali.

Quindi, per $n=3$,

$$x_1 + 4x_2 - 3,5x_3$$

$$-2x_1 + (\ln 6)x_2 + \pi x_3$$

sono funzioni lineari;



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

**Programmazione
Lineare**

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problemi di Programmazione Lineare

mentre

$$(x_1)^2 + 4x_2 - 3,5x_3$$

$$x_1 + 4x_2 + 3,5 e^{x_3}$$

$$3x_1 + \sin x_2 - 4x_3$$

non sono funzioni lineari.

Equazione/disequazione lineare:

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{cases} \geq \\ = \\ \leq \end{cases} t,$$

con t costante reale e φ funzione lineare.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

**Programmazione
Lineare**

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problemi di Programmazione Lineare

Un problema di **Programmazione Lineare** (PL) è caratterizzato da:

- ✓ una funzione obiettivo lineare (da minimizzare o massimizzare),
- ✓ un gruppo di vincoli rappresentato esplicitamente mediante un numero finito di equazioni o disequazioni lineari.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

**Programmazione
Lineare**

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problemi di Programmazione Lineare

Un generico problema di PL potrebbe pertanto avere la forma seguente:

$$\begin{array}{ll} \text{Opt} & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.v.} & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i=1, \dots, m_1 \\ & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, i= m_1+1, \dots, m_1+m_2 \\ & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, i= m_1+m_2+1, \dots, m_1+m_2+m_3 \end{array}$$

dove:



Introduzione

Problemi di Programmazione Lineare

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

✓ $Opt=Min$ o $Opt=Max$,

Richiami di Algebra
Lineare

✓ x_j sono le variabili decisionali (continue) → **non ci sono i vincoli sull'interezza**,

Programmazione
Lineare

✓ n è il numero di variabili decisionali,

Risoluzione
Grafica

✓ c_j sono i coefficienti della funzione obiettivo (indicati come “coefficienti di costo” nei problemi di minimiz.),

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

✓ a_{ij} sono i coefficienti delle var. decisionali nei vincoli (talvolta indicati come “coefficienti tecnologici”),

Forma Canonica

✓ b_i sono i termini noti nei vincoli,

Metodo del
Simplexso

✓ m_1 , m_2 e m_3 indicano rispettivamente il numero di vincoli di uguaglianza, di disuguaglianza del tipo “ \leq ” e di disuguaglianza del tipo “ \geq ”.

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
Lineare**Programmazione
Lineare**Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problemi di Programmazione Lineare

Si noti che il problema precedente ingloba anche i cosiddetti **vincoli di segno** sulle variabili decisionali; tali vincoli, infatti, sono semplici disequazioni lineari.

Esempi (assumendo $n=3$):

✓ **Vincolo di non negatività** (i -esimo): $x_2 \geq 0$

$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + a_{i3}x_3 \geq 0$, con $a_{i1} = a_{i3} = 0$ e $a_{i2} = 1$.

✓ **Vincolo di non positività** (i -esimo): $x_1 \leq 0$

$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + a_{i3}x_3 \leq 0$, con $a_{i2} = a_{i3} = 0$ e $a_{i1} = 1$.

Tuttavia, in generale, si preferisce mantenere questi vincoli separati dagli altri vincoli del problema.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

**Programmazione
Lineare**

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problemi di Programmazione Lineare

Nel modello appena introdotto, la funzione obiettivo potrebbe anche essere “affine”, cioè avere la forma

$$d + \sum_{j=1}^n c_j x_j ,$$

con d costante reale.

Da un punto di vista algoritmico non vi è alcuna differenza nell'ottimizzare funzioni che differiscono fra loro per una costante!



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

**Programmazione
Lineare**

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problemi di Programmazione Lineare

Il modello potrebbe essere scritto in una forma più concisa:

$$\text{Opt } c^T x$$

s.v.

$$A_1 x = \beta_1$$

$$A_2 x \leq \beta_2$$

$$A_3 x \geq \beta_3$$

riunendo i coefficienti di costo e le variabili decisionali in distinti vettori n -dimensionali



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
Lineare**Programmazione
Lineare**Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problemi di Programmazione Lineare

$$C = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_n \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}$$

i termini noti in 3 vettori di diverse dimensioni (m_1, m_2 e m_3)

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{m_1} \end{bmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{bmatrix} b_{m_1+1} \\ b_{m_1+2} \\ \vdots \\ b_{m_1+m_2} \end{bmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{bmatrix} b_{m_1+m_2+1} \\ b_{m_1+m_2+2} \\ \vdots \\ b_{m_1+m_2+m_3} \end{bmatrix}$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
Lineare**Programmazione
Lineare**Risoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problemi di Programmazione Lineare

e i coefficienti delle variabili decisionali nei vincoli in 3 diverse matrici di dimensione $m_1 \times n$, $m_2 \times n$ e $m_3 \times n$ rispettivamente

$$A_1 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m_1 1} & a_{m_1 2} & \cdots & a_{m_1 n} \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} a_{m_1+1 1} & a_{m_1+1 2} & \cdots & a_{m_1+1 n} \\ a_{m_1+2 1} & a_{m_1+2 2} & \cdots & a_{m_1+2 n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m_1+m_2 1} & a_{m_1+m_2 2} & \cdots & a_{m_1+m_2 n} \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} a_{m_1+m_2+1 1} & a_{m_1+m_2+1 2} & \cdots & a_{m_1+m_2+1 n} \\ a_{m_1+m_2+2 1} & a_{m_1+m_2+2 2} & \cdots & a_{m_1+m_2+2 n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m_1+m_2+m_3 1} & a_{m_1+m_2+m_3 2} & \cdots & a_{m_1+m_2+m_3 n} \end{bmatrix}.$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

**Programmazione
Lineare**

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problemi di Programmazione Lineare

Il notevole peso dato ai modelli lineari si può spiegare in vari modi:

- ✓ molti concetti e proprietà relativi ai modelli lineari si possono ritrovare, con opportune varianti, anche in modelli più complessi;
- ✓ i modelli lineari possono essere risolti molto efficientemente;
- ✓ moltissimi modelli applicativi sono effettivamente modelli lineari o possono ricondursi a essi;
- ✓ molti modelli non lineari possono essere approssimati efficacemente mediante opportuni modelli lineari.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
Lineare**Programmazione
Lineare**Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Definizioni

Si consideri un problema P di PL con n incognite x_1, x_2, \dots, x_n che possono essere viste come le componenti di un vettore n -dimensionale x (come in precedenza).

- ✓ Si definisce **regione ammissibile** l'insieme X dei vettori $x \in R^n$ che soddisfano tutti i vincoli.
- ✓ P è detto **ammissibile** se $X \neq \emptyset$. In caso contrario, si parla di problema **inammissibile**.
- ✓ Un vettore $x \in R^n$ è detto **ammissibile** per P se $x \in X$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
Lineare**Programmazione
Lineare**Risoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Definizioni

- ✓ Un vettore $x \in R^n$ è una **soluzione ottima** per P se $x \in X$ e il valore di funzione obiettivo a esso corrispondente è minore o uguale al valore di funzione obiettivo corrispondente a un qualsiasi altro vettore appartenente a X se il problema è di *minimizzazione* (maggiore o uguale se il problema di *massimizzazione*).
- ✓ P è **illimitato** se per ogni $k \in R$ esiste $x \in X$ tale che $z < k$ se il problema è di *minimizzazione*, $z > k$ se il problema è di *massimizzazione* (z è il valore di funzione obiettivo corrispondente a x).



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplesso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Iperpiani e semispazi affini

Sia $\alpha \in R^n$ un vettore non nullo e β un numero reale.

L'insieme $H = \{x \in R^n: \alpha^T x = \beta\}$ si definisce *iperpiano* (un iperpiano generalizza la nozione di retta in R^2). Un iperpiano è un insieme convesso.

Un iperpiano suddivide lo spazio R^n in due insiemi convessi definiti *semispazi affini*

$$H' = \{x \in R^n: \alpha^T x \leq \beta\}$$

$$H'' = \{x \in R^n: \alpha^T x \geq \beta\}$$

(in R^2 , H' e H'' corrispondono a 2 semipiani).

Nota: l'intersezione di insiemi convessi è un insieme convesso.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
Lineare**Risoluzione
Grafica**Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Problemi di PL con 2 incognite

Quando un problema di PL contiene solamente *due variabili decisionali* ($n=2$), si può utilizzare un piano cartesiano e determinare una soluzione in maniera elementare con semplici deduzioni geometriche. Sebbene i problemi di PL siano generalmente caratterizzati da un maggior numero di variabili, la modalità di *risoluzione grafica* costituisce un valido supporto per una migliore comprensione dei metodi di soluzione dei problemi di PL per via numerica.

Nello spazio R^2 , vincoli lineari possono essere rappresentati graficamente, individuando per ciascuno di essi la retta o il semipiano in cui è soddisfatta la condizione che esprimono.



Introduzione

Problemi di PL con 2 incognite

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

In particolare, un vincolo di uguaglianza corrisponde a una *retta*, mentre un vincolo di disuguaglianza corrisponde a un *semipiano*. L'intersezione delle rette e dei semipiani associati ai vincoli individua la *regione ammissibile*.

Poiché la funzione obiettivo è anch'essa lineare, è possibile individuare un fascio di rette parallele tra loro, ciascuna delle quali rappresenta l'insieme dei punti che corrispondono a uno stesso valore di funzione obiettivo. Tali rette parallele, note come *curve di livello*, sono ortogonali alla direzione del vettore definito dai coefficienti della funzione obiettivo.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

**Risoluzione
Grafica**

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica


Metodo del
Simpleso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Rappresentazione di un vincolo

Rappresentazione del vincolo di disuguaglianza
 $S: -2x_1 + 3x_2 \leq -6$ (semipiano).





Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

**Risoluzione
Grafica**

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica


Metodo del
Simpleso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Rappresentazione delle curve di livello

Sia $c^T = [3 \ 2]$ il vettore dei coefficienti della funzione obiettivo di un problema di PL con 2 variabili decisionali. Le curve di livello sono rappresentate dalle rette $3x_1 + 2x_2 = z$ *ortogonali* alla direzione del vettore definito dai coefficienti della funzione obiettivo. Il valore di funzione obiettivo cresce nel verso di questo vettore.





Ricerca Operativa

100

Introduzione

Esempio 1

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

**Risoluzione
Grafica**

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica


Metodo del
Simplex

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

$$\begin{aligned}\text{Max } z &= 3x_1 + 5x_2 \\ x_1 &\leq 4 \\ x_2 &\leq 6 \\ 3x_1 + 2x_2 &\leq 18 \\ x_1, x_2 &\geq 0\end{aligned}$$

La regione ammissibile è di seguito rappresentata:





Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
Lineare**Risoluzione
Grafica**Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 1

Facendo variare il valore di z si ottengono delle curve di livello parallele. L'obiettivo è quello di individuare la curva di livello ottima.

Si rappresenta il vettore dei coefficienti della funzione obiettivo $c^T = [3 \ 5]$ (vettore applicato nell'origine) e si disegna una retta a esso ortogonale (si disegna cioè una qualsiasi curva di livello). Si fa “scivolare” tale retta parallelamente a se stessa nel **verso dato da c** (poiché si sta considerando un **problema di massimizzazione**).

Nota: Per problemi di **minimizzazione**, si fa “scivolare” la retta parallelamente a se stessa nel **verso opposto a quello di c** .



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

**Risoluzione
Grafica**

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 1

L'ultimo punto della regione ammissibile incontrato dalla retta rappresenta l'ottimo del problema di PL considerato.

In questo caso, l'ottimo corrisponde al punto di intersezione delle rette: $x_2=6$ e $3x_1+2x_2=18 \rightarrow x_1=2$; $x_2=6$. Il valore di funzione obiettivo associato a tale punto è: $z^*=36$.



Introduzione

Esempio 1

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare


**Risoluzione
Grafica**

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi





Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

**Risoluzione
Grafica**

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esercizio:

Rappresentare la regione ammissibile per il problema dell'esempio 1 nel caso in cui il vincolo $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ è rimpiazzato dal vincolo $3x_1 + 2x_2 = 18$.

L'ottimo del problema cambia?



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
Lineare**Risoluzione
Grafica**

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simpleso


Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 2

$$\begin{aligned} \text{Min } z &= -x_1 + x_2 \\ 3x_1 + 2x_2 &\geq 5 \\ x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

La regione ammissibile è un insieme vuoto: il problema è inammissibile!





Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
Lineare**Risoluzione
Grafica**

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 3

Risolvere graficamente i seguenti problemi di PL

$$\text{Max } z = -x_1 + x_2$$

s.v.

$$x_1 - x_2 \leq 0$$

$$x_2 \leq 1$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\text{Min } z = -x_1 + x_2$$

s.v.

$$x_1 - x_2 \leq 0$$

$$x_2 \leq 1$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
Lineare**Risoluzione
Grafica**

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica


Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 3

La regione ammissibile dei due problemi è identica, come identico è il vettore dei coefficienti della funzione obiettivo.





Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
Lineare**Risoluzione
Grafica**Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 3

Poiché $c^T = [-1 \ 1]$, la soluzione ottima del problema di massimizzazione è $x^{*T} = [0 \ 1]$ (con $z^* = 1$).

Il problema di minimizzazione, invece, ammette infinite soluzioni ottime poiché la curva di livello corrispondente a $z=0$ coincide con la retta che definisce il primo vincolo. Essa corrisponde infatti a $-x_1 + x_2 = z = 0 \rightarrow x_1 - x_2 = 0$.

Le infinite soluzioni ottime sono del tipo:

$$x^*(\lambda) = \lambda \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + (1-\lambda) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ con } \lambda \in [0,1] \text{ e } z^* = 0.$$



Introduzione

Esempio 4

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
Lineare**Risoluzione
Grafica**

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale


Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

$$\begin{aligned} \text{Min } z &= -x_1 - 0,5 x_2 \\ -x_1 + x_2 &\geq 0 \\ x_1 + x_2 &\geq 1 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$



Il problema è illimitato!



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica**Forma Standard**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Forma standard di un problema di PL

Un problema di PL può essere rappresentato in vari modi equivalenti.

Talvolta risulta utile ricondursi alla cosiddetta “forma standard”:

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{S.V.} & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i=1, \dots, m \\ & x_j \geq 0, \quad j=1, \dots, n \end{array}$$

Naturalmente, lo stesso problema può essere espresso in una forma più concisa:



Introduzione

Forma standard di un problema di PL

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

$$\text{Min } C^T x$$

S.V.

$$Ax = b$$

$$x \geq 0_n$$

dove:

$$C = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_n \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$



Introduzione

Trasformazioni

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Un problema di programmazione lineare potrebbe non essere “naturalmente” nella forma standard.

☛ Ricondurre un problema alla forma standard

- ✓ $\text{Max} \rightarrow \text{Min}$
- ✓ Vincoli di disuguaglianza \rightarrow Vincoli di uguaglianza
- ✓ Variabili non positive o non vincolate in segno \rightarrow Variabili non negative



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica**Forma Standard**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Forma standard (trasformazioni)

✓ **Massimizzazione.** Se si richiede la massimizzazione di un obiettivo lineare, ci si può ricondurre a un problema di minimizzazione semplicemente cambiando segno al vettore c dei coefficienti della funzione obiettivo. Dovendo, ad esempio, risolvere un problema di PL di massimizzazione con vincoli di uguaglianza e variabili non negative, avendo a disposizione un codice di calcolo predisposto per la minimizzazione, basterà risolvere il problema

$$\begin{aligned} & - \text{Min} \quad -c^T x \\ & \text{s.v.} \\ & Ax = b \\ & x \geq 0_n \end{aligned}$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica


Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Riferimento: Esempio 1 del metodo di risoluzione grafica

$$\text{Max } 3x_1 + 5x_2 = - \text{Min } -3x_1 - 5x_2$$



Stessa soluzione!



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica**Forma Standard**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplex

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Forma standard (trasformazioni)

Il segno “–” prima dell’operatore “Min” indica che, al termine, occorre cambiare segno al valore dell’ottimo trovato (solo al valore di funzione obiettivo corrispondente alla soluzione trovata, non alla soluzione stessa!).

✓ **Vincoli di disuguaglianza.** Un vincolo del tipo

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i,$$

può essere trasformato in un vincolo di uguaglianza introducendo una nuova variabile non negativa, coerentemente con quanto richiesto dalla forma standard:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + s_i = b_i, \quad s_i \geq 0.$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica**Forma Standard**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Forma standard (trasformazioni)

La variabile s_i è detta variabile di *slack* o di *scarto*. Se nel problema compaiono diversi vincoli di disuguaglianza del tipo “ \leq ”, si potrà operare una simile trasformazione per ciascuno di essi, ricordandosi di utilizzare, per ciascun vincolo, una diversa variabile di slack.

Se nel problema compaiono disequazioni del tipo “ \geq ”, si utilizza un procedimento analogo. In particolare una disequazione del tipo

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i,$$

può essere rimpiazzata con:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - s_i = b_i, \quad s_i \geq 0.$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica**Forma Standard**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Forma standard (trasformazioni)

In questo caso, la variabile s_j è detta variabile di *surplus* o di *eccedenza*.

- ✓ **Vincoli sul segno delle variabili.** Talvolta una variabile decisionale è vincolata ad assumere valori non positivi: $x_j \leq 0$. In questo caso, sostituendo ogni occorrenza della variabile x_j con il suo opposto $y_j = -x_j$, si può scrivere il vincolo di non negatività: $y_j \geq 0$. In altri casi, invece, la variabile decisionale è non vincolata in segno. Uno dei modi più utilizzati per trattare questo caso consiste nel sostituire la variabile *libera* con la differenza di due variabili non negative:

$$x_j = x_j^+ - x_j^-, \text{ dove } x_j^+, x_j^- \geq 0.$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Forma standard (trasformazioni)

Grazie alle trasformazioni appena viste, un problema generico di PL può sempre essere ricondotto a un ***problema equivalente*** in forma standard; in alcuni casi tale problema avrà un numero di variabili decisionali maggiore del problema originale.

Le trasformazioni viste si configurano come operazioni in grado di mantenere inalterata la struttura del problema sotto studio.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Forma standard (trasformazioni)

Esempio:

Riduzione alla forma standard del seguente problema di PL:

$$\text{Max } z = -20x_1 + 3x_2 - 4x_3 + 4x_4$$

s.v.

$$-3x_1 + 22x_2 - 5x_3 - 12x_4 \leq 4$$

$$4x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 15x_4 = 9$$

$$2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 6x_4 \geq 2$$

$$x_2, \quad x_3, \quad x_4 \geq 0$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica**Forma Standard**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Forma standard (trasformazioni)

Forma standard:

$$(-) \text{ Min } z = 20x_1^+ - 20x_1^- - 3x_2 + 4x_3 - 4x_4$$

s.v.

$$-3x_1^+ + 3x_1^- + 22x_2 - 5x_3 - 12x_4 + x_5 = 4$$

$$4x_1^+ - 4x_1^- + 7x_2 + 5x_3 + 15x_4 = 9$$

$$2x_1^+ - 2x_1^- + 2x_2 + 4x_3 - 6x_4 - x_6 = 2$$

$$x_1^+, x_1^-, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Forma standard (trasformazioni)

Esercizio:

1. Ricondurre alla forma standard il problema di PL formulato a pag. 33 (modello di miscelazione).
2. Scrivere il problema in forma standard ottenuto al punto precedente in una forma più concisa utilizzando vettori e matrici.



Introduzione

Teoria della Programmazione Lineare

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Si consideri un problema di PL in forma standard (P_s).

Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & c^T x \\ & Ax = b \\ & x \geq 0_n \end{array}$$

Si fanno le seguenti ipotesi:

- ✓ il numero di righe della matrice $A \in R^{m \times n}$ è strettamente minore del numero di colonne.
- ✓ la matrice A ha rango pari al numero di righe.

E' chiaro che esistono casi in cui queste ipotesi non sono verificate. Tuttavia è possibile ridurre l'analisi dei problemi di PL in forma standard alle sole situazioni nelle quali esse sono valide.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Teoria della Programmazione Lineare

Da un punto di vista formale, si hanno infatti i seguenti casi.

- ✓ **$m > n$** : nel sistema di equazioni $Ax=b$ compaiono più equazioni che incognite. Segue che il sistema
- è privo di soluzioni \rightarrow il problema di PL sarà non ammissibile;
 - ammette almeno una soluzione \rightarrow almeno un'equazione è ridondante e può essere eliminata (si può ripetere l'operazione, eliminando via via le equazioni ridondanti).



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Teoria della Programmazione Lineare

✓ **$m=n$** : la matrice A è quadrata.

- Se $\det(A) \neq 0$ esiste un'unica soluzione tale che $Ax=b$. Se tale soluzione ha tutte componenti non negative, essa sarà anche ottimale; se invece esiste almeno una componente negativa, il problema di PL è inammissibile.
- Se $\det(A)=0$ il sistema non ammette soluzioni oppure almeno un'equazione può essere eliminata (ci si riconduce quindi al caso $m < n$).

✓ **$m < n$** : eliminando tutte le eventuali equazioni ridondanti, si arriva a un sistema equivalente a quello iniziale caratterizzato da una matrice A con rango pari a m .



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Teoria della Programmazione Lineare

Lo stesso metodo utilizzato per la risoluzione dei problemi di PL potrà essere utilizzato anche per la verifica delle ipotesi, come si vedrà in seguito.

Se $\text{rango}(A)=m$, è sempre possibile scegliere tra le n colonne della matrice A un sottoinsieme costituito da m colonne fra loro linearmente indipendenti. In altri termini, è sempre possibile individuare un insieme di indici $B \subset \{1, \dots, n\}$ a cui corrisponde una sottomatrice $A_B \in R^{m \times m}$ invertibile (A_B è costituita da m colonne linearmente indipendenti i cui indici sono in B).



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Teoria della Programmazione Lineare

Le restanti colonne di A formano una sottomatrice $A_N \in R^{m \times (n-m)}$ (gli indici di tali colonne costituiscono l'insieme $N = \{1, \dots, n\} \setminus B$).

- ✓ B è detto *insieme degli indici di base* (indici delle colonne linearmente indipendenti).
- ✓ A_B è detta *matrice di base* o semplicemente *base*. Il nome “base” deriva dal fatto che le m colonne di A_B costituiscono una base per lo spazio m -dimensionale, cioè ogni elemento di R^m può essere espresso in modo univoco tramite una combinazione lineare delle colonne di A_B .
- ✓ N è detto *insieme degli indici non di base*.
- ✓ A_N è detta *matrice non di base*.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**
Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland
Metodo delle Due
Fasi

Teoria della Programmazione Lineare

Anche il vettore x può essere visto come formato da due sottovettori:

- ✓ x_B : sottovettore di m componenti (dette **variabili di base**); l' i -esimo elemento di x_B è la variabile decisionale associata all' i -esima colonna di A_B ($i=1, \dots, m$).
- ✓ x_N : sottovettore di $n-m$ componenti (dette **variabili non di base**); il j -esimo elemento di x_N è la variabile associata alla j -esima colonna di A_N ($j=1, \dots, n-m$).

Il sistema $Ax=b$ può essere sempre riscritto come

$$[A_B \ A_N] \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = b \rightarrow A_B x_B + A_N x_N = b.$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**

Forma Canonica

Metodo del
Simpleso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Teoria della Programmazione Lineare

Esempio:

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 \\ \text{s.v.} & \\ & 2x_1 - 4x_2 + 14x_3 = 12 \\ & x_1 + 3x_2 + 12x_3 = 26 \\ & x_1, \quad x_2, \quad x_3 \geq 0 \end{array} \quad (\tilde{P})$$

Si consideri $B = \{2, 3\}$.

$|A_B| \neq 0 \rightarrow$ la matrice A_B è non singolare \rightarrow la matrice A_B è invertibile.

$$Ax = b \rightarrow A_B x_B + A_N x_N = b \rightarrow \begin{bmatrix} -4 & 14 \\ 3 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} x_1 = \begin{bmatrix} 12 \\ 26 \end{bmatrix}.$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Soluzioni di base

$$Ax=b \rightarrow A_B x_B + A_N x_N = b \rightarrow A_B x_B = b - A_N x_N.$$

Poiché A_B è invertibile, si può moltiplicare il primo e il secondo membro dell'equazione per A_B^{-1} :

$$A_B^{-1} A_B x_B = A_B^{-1} b - A_B^{-1} A_N x_N \rightarrow x_B = A_B^{-1} b - A_B^{-1} A_N x_N.$$

Ponendo $x_N = 0_{n-m}$, si ottiene $x_B = A_B^{-1} b$.

Definizione: la soluzione $\begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_B^{-1} b \\ 0_{n-m} \end{bmatrix}$ sicuramente soddisfa il sistema di vincoli $Ax=b$. Essa è detta ***soluzione di base*** associata alla base A_B (o rispetto all'insieme degli indici di base B) per il problema P_s .



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Soluzioni di base

Si noti che una soluzione di base possiede sicuramente $n-m$ componenti uguali a zero.

Potrebbe, tuttavia, avere anche più di $n-m$ componenti nulle (il valore di qualche variabile di base è pari a zero). In questo caso si parla di ***soluzioni di base degeneri***. Per estensione, anche la base si dirà degenerare.

Definizione: una soluzione di base $\begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_B^{-1}b \\ 0_{n-m} \end{bmatrix}$ è ***ammissibile*** per il problema P_S se $x_B \geq 0_m$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Soluzioni di base

Esempio:

Con riferimento al precedente problema in forma standard (\tilde{P}) , la soluzione di base rispetto all'insieme degli indici $B=\{2,3\}$ è:

$$\begin{bmatrix} x_B \\ \dots \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_B^{-1}b \\ \dots \\ 0_{n-m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22/9 \\ 14/9 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix},$$

considerando che $A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -2/15 & 7/45 \\ 1/30 & 2/45 \end{bmatrix}$.

La soluzione $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 22/9 \\ 14/9 \end{bmatrix}$ è una soluzione di base ammissibile e non degenera.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Teorema fondamentale della PL

Con riferimento a un problema di PL in forma standard con $m < n$ e $\text{rango}(A) = m$, valgono le seguenti proposizioni:

- i. se esiste una soluzione ammissibile allora esiste una soluzione di base ammissibile;
- ii. se esiste una soluzione ottima, allora esiste una soluzione di base ottima.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Osservazioni

➤ È sufficiente esplorare le sole soluzioni di base, poiché tra di esse, se il problema ammette ottimo, si troverà la soluzione ottimale; ciò non vuol dire che non possano esistere soluzioni non di base ottimali, ma almeno una delle soluzioni ottimali deve essere di base. Le eventuali soluzioni ottimali alternative avranno, naturalmente, tutte lo stesso valore di funzione obiettivo.

Si osservi che il teorema della PL permette, in un certo senso, di passare da uno spazio delle soluzioni (da analizzare per trovare l'ottimo) “continuo” a un insieme di candidati ottimi discreto, anzi, finito.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Osservazioni

Infatti le soluzioni di base nascono dall'identificazione di una sottomatrice A_B invertibile costituita da m colonne della matrice originale A . Pertanto il numero complessivo di possibili basi non potrà superare il numero (finito) di modi in cui è possibile scegliere m colonne da un insieme di n , cioè

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$



numero massimo di soluzioni di base



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

**Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Osservazioni

Tuttavia il numero di soluzioni di base cresce al crescere di n e m a una velocità tale da rendere totalmente impraticabile la strada dell'*enumerazione esplicita* di tutte le soluzioni di base.

Il *metodo del simplexso* si è dimostrato estremamente efficiente nel determinare una soluzione di base ottimale evitando di generare esplicitamente tutte le soluzioni di base (compiendo cioè una loro *enumerazione implicita*).



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**Forma Canonica**Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Forma canonica

Si consideri un problema di PL caratterizzato solamente da vincoli di “ \leq ” e variabili vincolate in segno; si ipotizzi anche che tutti i termini noti b_i dei vincoli siano non negativi:

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & \sum_{j=1}^t c_j x_j \\ \text{s.v.} & \sum_{j=1}^t a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i=1, \dots, m \\ & x_j \geq 0, \quad j=1, \dots, t \end{array}$$

Introducendo m variabili di slack per portare il sistema in forma standard, si arriva alla forma:



Introduzione

Forma canonica

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**Forma Canonica**Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & \sum_{j=1}^t c_j x_j \\ \text{s.v.} & \sum_{j=1}^t a_{ij} x_j + x_{t+i} = b_i, \quad i=1, \dots, m \\ & x_j \geq 0, \quad j=1, \dots, t+m \end{array}$$

Il problema è in *forma canonica*.

Caratteristiche:

- ✓ esistono m variabili decisionali associate a un coefficiente di costo nullo;
- ✓ ciascuna di queste variabili compare in una sola equazione con coefficiente tecnologico pari a 1.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**Forma Canonica**Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Forma canonica

In questo caso, è semplice individuare una soluzione di base ammissibile (quella associata all'insieme $B=\{t+1,t+2,\dots,t+m\}$)

$$x = \begin{bmatrix} x_B \\ \dots \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{t+1} \\ \vdots \\ x_{t+m} \\ \dots \\ x_1 \\ \vdots \\ x_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \geq 0 \\ \vdots \\ b_m \geq 0 \\ \dots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{l} m \\ (t+m)-m=t \end{array} \right.$$

(**Nota.** La matrice $A_B = I_m$ è una particolare matrice invertibile: la matrice identità)



Introduzione

Esempio

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**Forma Canonica**Metodo del
Simplex

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

$$\text{Min} \quad 3x_1 + 2x_2 - 4x_3$$

s.v.

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 15$$

$$-x_1 + 5x_2 - x_3 \leq 12$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$



$$\text{Min} \quad 3x_1 + 2x_2 - 4x_3$$

s.v.

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 15$$

$$-x_1 + 5x_2 - x_3 + x_5 = 12$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**Forma Canonica**Metodo del
SimplexRegola di Bland
Metodo delle Due
Fasi

Esempio

$$B=\{4,5\}; N=\{1,2,3\}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad b = \begin{bmatrix} 15 \\ 12 \end{bmatrix}$$

A_N A_B

$$x = \begin{bmatrix} x_B \\ \dots \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ \dots \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_B^{-1}b = A_B b = b \\ \dots \\ 0_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 12 \\ \dots \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$x^T = [x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5] = [0 \ 0 \ 0 \ 15 \ 12]$ è una soluzione di base ammissibile.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**Forma Canonica**Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Ottimalità di una soluzione di base ammissibile

Un problema in *forma standard* P_S con $m < n$ e $\text{rango}(A) = m$ (dove $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$), individuato un insieme di indici di base B , può essere scritto come

$$\begin{aligned} \text{Min } & c_B^T x_B + c_N^T x_N \\ & A_B x_B + A_N x_N = b \\ & x_B \geq 0_m, x_N \geq 0_{n-m} \end{aligned}$$

Anche il vettore dei costi c , infatti, può essere suddiviso in due sottovettori:

- ✓ c_B : sottovettore dei coefficienti di costo associati alle variabili di base;
- ✓ c_N : sottovettore dei coefficienti di costo associati alle variabili non di base.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simpleso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Ottimalità di una soluzione di base ammissibile

$$A_B x_B + A_N x_N = b \rightarrow x_B = A_B^{-1} b - A_B^{-1} A_N x_N$$

La funzione obiettivo di P_s si può scrivere in maniera equivalente come:

$$\text{Min } c_B^T A_B^{-1} b - c_B^T A_B^{-1} A_N x_N + c_N^T x_N$$



$$\text{Min } c_B^T A_B^{-1} b + \boxed{(c_N^T - c_B^T A_B^{-1} A_N)} x_N$$

*vettore dei coefficienti di costo ridotto
associati alle variabili non di base*



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**Forma Canonica**Metodo del
SimplexsoRegola di Bland
Metodo delle Due
Fasi

Ottimalità di una soluzione di base ammissibile

Il problema P_S può essere quindi riscritto in modo equivalente come:

$$\text{Min } c_B^T A_B^{-1} b + (c_N^T - c_B^T A_B^{-1} A_N) x_N$$

$$x_B = A_B^{-1} b - A_B^{-1} A_N x_N$$

$$x_B \geq 0_m, x_N \geq 0_{n-m}$$

Una soluzione $\begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_B^{-1} b \geq 0_m \\ 0_{n-m} \end{bmatrix}$ è una soluzione di

base ammissibile per il problema. A essa è associato un valore di funzione obiettivo pari a $\bar{d} = c_B^T A_B^{-1} b$.

☛ Se $(c_N^T - c_B^T A_B^{-1} A_N) \geq 0_{n-m}^T$, questa soluzione è ottima.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**Forma Canonica**Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Ottimalità di una soluzione di base ammissibile

Avendo posto $\bar{d} = c_B^T A_B^{-1} b$ e considerando $\bar{b} = A_B^{-1} b$,
 $\bar{c}_N^T = c_N^T - c_B^T A_B^{-1} A_N$, $\bar{A}_N = A_B^{-1} A_N$, si ottiene:

$$\begin{aligned} \text{Min } & \bar{d} + \bar{c}_N^T x_N \\ & x_B + \bar{A}_N x_N = \bar{b} \\ & x_B \geq 0_m, x_N \geq 0_{n-m} \end{aligned}$$

costante reale

Se $\bar{b} \geq 0_m$ il problema è in **forma canonica** rispetto a B .



Introduzione

Forma canonica (trasformazioni)

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale**Forma Canonica**Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Ricapitolando:

- ✓ un problema di PL potrebbe già essere naturalmente in forma canonica;
- ✓ se un problema di PL ha solo vincoli " \leq " e $b \geq 0_m$, trasformando il problema in forma standard si ottiene già una forma canonica. Infatti, considerando B pari all'insieme degli indici associati alle variabili di *slack*, si ha $A_B = I_m$ e $c_B = 0_m$;
- ✓ un generico problema in forma standard, con $m < n$ e $\text{rango}(A) = m$, può essere ricondotto alla forma canonica attraverso le operazioni appena viste se si conosce un insieme di indici di base B tale che $A_B^{-1}b \geq 0_m$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Principi alla base del metodo del simplexso

Il metodo del simplexso considera forme canoniche dei problemi di PL.

Si consideri quindi un problema in forma canonica rispetto all'insieme di indici $B=\{1,2,\dots,m\}$:

$$\begin{array}{lcl} \text{Min} & & \bar{c}_{m+1} x_{m+1} + \dots + \bar{c}_k x_k + \dots + \bar{c}_n x_n + \bar{d} \\ & x_1 & + \bar{a}_{1m+1} x_{m+1} + \dots + \bar{a}_{1k} x_k + \dots + \bar{a}_{1n} x_n = \bar{b}_1 \\ & & \vdots \\ & x_i & + \bar{a}_{im+1} x_{m+1} + \dots + \bar{a}_{ik} x_k + \dots + \bar{a}_{in} x_n = \bar{b}_i \\ & & \vdots \\ & x_m & + \bar{a}_{mm+1} x_{m+1} + \dots + \bar{a}_{mk} x_k + \dots + \bar{a}_{mn} x_n = \bar{b}_m \end{array}$$
$$x_j \geq 0, j=1, \dots, n$$

$$(\bar{b} \geq 0_m)$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Principi alla base del metodo del simplexso

La soluzione $[x_B \ x_N]^T = [\bar{b} \ 0_{n-m}]^T$ è una soluzione di base ammissibile per il problema. A essa è associato un valore di funzione obiettivo pari a \bar{d} .

In rapporto a questa formulazione si possono verificare i seguenti 3 casi:

1. Se $\bar{c}_{m+1}, \dots, \bar{c}_n$ sono coefficienti non negativi, la soluzione di base è ottimale.
2. Se esiste un indice k (con $m+1 \leq k \leq n$) tale che $\bar{c}_k < 0$ e $A_k = [\bar{a}_{1k} \ \dots \ \bar{a}_{ik} \ \dots \ \bar{a}_{mk}]^T \leq 0_m$, il problema è illimitato.
3. Se esiste un indice k (con $m+1 \leq k \leq n$) tale che $\bar{c}_k < 0$ e, in corrispondenza di questo indice, almeno un elemento $\bar{a}_{rk} > 0$ (con $1 \leq r \leq m$), esiste una soluzione di base non peggiore di quella corrente.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Principi alla base del metodo del simplexso

Prova

1. Poiché deve essere $x_{m+1}, \dots, x_n \geq 0$, se $\bar{c}_{m+1}, \dots, \bar{c}_n \geq 0$ non è possibile decrementare ulteriormente il valore di funzione obiettivo.
2. Si può assumere che tutte le variabili non di base, a eccezione di x_k , restino nulle. Il valore di funzione obiettivo, essendo $\bar{c}_k < 0$, può essere decrementato. Si tratta di stabilire il massimo valore che può assumere x_k per non violare i vincoli. Occorre in altri termini verificare che: $x_i + \bar{a}_{ik} x_k = \bar{b}_i$ per ogni $i=1, \dots, m$ (con $x_i, x_k \geq 0$) $\rightarrow x_i = \bar{b}_i - \bar{a}_{ik} x_k \geq 0$.
Se $\bar{a}_{ik} \leq 0$ per ogni i , a x_k si può dare un valore positivo grande a piacere. I vincoli saranno sempre rispettati!



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Principi alla base del metodo del simplexso

Questo significa che il valore di funzione obiettivo può essere reso arbitrariamente piccolo.

3. Come prima, si può assumere che tutte le variabili non di base, a eccezione di x_k , restino nulle. Il valore di funzione obiettivo, essendo $\bar{c}_k < 0$, può essere decrementato. Occorre avere $x_i + \bar{a}_{ik} x_k = \bar{b}_i$ per ogni $i = 1, \dots, m$ (con $x_i, x_k \geq 0$) $\rightarrow x_i = \bar{b}_i - \bar{a}_{ik} x_k \geq 0$. In questo caso, per tutti gli indici r tali che $\bar{a}_{rk} > 0$, il massimo valore che si può dare a x_k per rispettare il vincolo " $x_r = \bar{b}_r - \bar{a}_{rk} x_k \geq 0$ " è \bar{b}_r / \bar{a}_{rk} . Infatti, ponendo $x_k > \bar{b}_r / \bar{a}_{rk}$, si avrebbe $x_r < 0$ (violazione di un vincolo). In particolare, ponendo:





Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Principi alla base del metodo del simplexso

$$x_k = \min_r \left\{ \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rk}}, \bar{a}_{rk} > 0 \right\} = \left\{ \frac{\bar{b}_h}{\bar{a}_{hk}} \right\}$$

si assicura il massimo incremento a x_k (e quindi il massimo decremento di funzione obiettivo) nel rispetto di tutti i vincoli.

Ponendo $x_k = \bar{b}_h / \bar{a}_{hk}$, si ha $x_h = 0$. In pratica si ha una nuova soluzione di base corrispondente a $B = \{1, \dots, h-1, k, h+1, \dots, m\} \rightarrow$ l'indice k entra in B e l'indice h esce da B .

In corrispondenza del nuovo insieme B , occorre *ripristinare la forma canonica* mediante operazioni di pivot (*pivoting*). Il **pivot** è l'elemento $\bar{a}_{hk} > 0$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simpleso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Pivot

Le operazioni di *pivot* saranno illustrate facendo riferimento direttamente alle tabelle utilizzate per applicare il metodo del simpleso.

Min

$$\begin{array}{l} \bar{c}_{m+1} x_{m+1} + \dots + \bar{c}_k x_k + \dots + \bar{c}_n x_n + \bar{d} \\ + \bar{a}_{1m+1} x_{m+1} + \dots + \bar{a}_{1k} x_k + \dots + \bar{a}_{1n} x_n = \bar{b}_1 \\ \vdots \\ + \bar{a}_{hm+1} x_{m+1} + \dots + \bar{a}_{hk} x_k + \dots + \bar{a}_{hn} x_n = \bar{b}_h \\ \vdots \\ x_m + \bar{a}_{mm+1} x_{m+1} + \dots + \bar{a}_{mk} x_k + \dots + \bar{a}_{mn} x_n = \bar{b}_m \end{array}$$
$$x_j \geq 0, j=1, \dots, n$$

$$(\bar{b} \geq 0_m)$$





Introduzione

Pivot

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Tabella corrispondente a questa forma canonica
(*tableau*)

0	0	...	0	...	0	\bar{c}_{m+1}	...	\bar{c}_k	...	\bar{c}_n	$-\bar{d}$
1	1					$\bar{a}_{1\ m+1}$...	$\bar{a}_{1\ k}$...	$\bar{a}_{1\ n}$	\bar{b}_1
		\ddots				\vdots		\vdots		\vdots	\vdots
h			1			$\bar{a}_{h\ m+1}$...	$\bar{a}_{h\ k}$...	$\bar{a}_{h\ n}$	\bar{b}_h
				\ddots		\vdots		\vdots		\vdots	\vdots
m					1	$\bar{a}_{m\ m+1}$...	$\bar{a}_{m\ k}$...	$\bar{a}_{m\ n}$	\bar{b}_m
						$m+1$		k		n	

colonne i cui indici sono di base: 1,...,m



Introduzione

Pivot

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma Canonica**Metodo del
Simplexso**Regola di Bland
Metodo delle Due
Fasi

Si dice operazione di *pivot*, con riferimento ad \bar{a}_{hk} , una trasformazione della tabella ottenuta nel seguente modo:

- ✓ si divide per l'elemento \bar{a}_{hk} ciascun elemento della riga h -esima;
- ✓ a ogni elemento della riga i -esima ($i=0,1,\dots,h-1,h+1,\dots,m$) si somma il corrispondente elemento della riga h -esima, risultante dalla trasformazione fatta al punto precedente, moltiplicato per $-\bar{a}_{ik}$ (moltiplicato per $-\bar{c}_k$ nel caso di $i=0$).

Si ottiene una nuova tabella in cui le colonne che corrispondono a vettori unitari sono: $1,\dots,h-1,k,h+1,\dots,m$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 1

Il metodo del simplexso sarà presentato a partire da esempi numerici. Sia dato il seguente problema di PL in forma canonica:

$$\text{Min } -21x_3 + 34$$

s.v.

$$x_1 \quad \quad + 9x_3 = 14$$

$$x_2 \quad + x_3 = 4$$

$$x_1, \quad x_2, \quad x_3 \geq 0$$

$m=2, n=3$. Le soluzioni di base avranno almeno $n-m=1$ variabili nulle.

Essendo il problema già in forma canonica rispetto a $B=\{1,2\}$ si può scrivere direttamente la prima tabella.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 1

$$T^{(0)} = \begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & -21 & -34 \\ 1 & 0 & 9 & 14 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \end{array}$$

La soluzione di base $x^{(0)} = [14 \ 4 \ 0]^T$ non è ottima poiché $\bar{c}_3 < 0$. Si pone $k=3$. Si esamina il segno dei coefficienti \bar{a}_{i3} , con $i=1,2$. Si calcola:

$$\min \left\{ \frac{\bar{b}_1}{\bar{a}_{13}}, \frac{\bar{b}_2}{\bar{a}_{23}} \right\} = \min \left\{ \frac{14}{9}, \frac{4}{1} \right\} = \frac{14}{9} \rightarrow h=1. \text{ Occorre}$$

eseguire l'operazione di *pivot* sull'elemento \bar{a}_{13} .

$$T^{(1)} = \begin{array}{ccc|c} 7/3 & 0 & 0 & -4/3 \\ 1/9 & 0 & 1 & 14/9 \\ -1/9 & 1 & 0 & 22/9 \end{array}$$

Annotations:

- Left: $0 + \left(21 \cdot \frac{1}{9} \right)$ with an arrow pointing to the $7/3$ pivot element.
- Right: $4 + \left(-1 \cdot \frac{14}{9} \right)$ with an arrow pointing to the $22/9$ element.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 1

Si noti il passaggio a una nuova forma canonica corrispondente all'insieme $B=\{3,2\}$: la variabile x_1 non è più di base (**variabile uscente**), mentre la variabile x_3 è diventata una variabile di base (**variabile entrante**).

La soluzione di base corrispondente alla nuova tabella è: $x^{(1)}=[0 \ 22/9 \ 14/9]^T$. Questa soluzione è ottima perché $\bar{c}_1 > 0$ (coefficiente associato all'unica variabile non di base). Il valore di funzione obiettivo si legge immediatamente nella tabella. E' sufficiente cambiare il segno al numero in alto a destra.

$T^{(1)}=$	7/3	0	0	-4/3
	1/9	0	1	14/9
	-1/9	1	0	22/9

$z^*=4/3$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 2

Sia dato il seguente generico problema di PL:

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & -2x_1 + x_2 \\ \text{s.v.} & -3x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & x_1 - x_2 \leq 3 \\ & -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

Il primo passo è quello di trasformare il problema in forma standard (ci sono vincoli di disuguaglianza).

$$\begin{array}{llllll} \text{Min} & -2x_1 + x_2 & & & & \\ \text{s.v.} & -3x_1 + 2x_2 + x_3 & & & & = 6 \\ & x_1 - x_2 & + x_4 & & & = 3 \\ & -2x_1 + x_2 & & + x_5 & & = 2 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 & \geq & 0 & & \end{array}$$

già in forma
canonica



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 2

$$T^{(0)} = \begin{array}{cc|ccccc} -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 6 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}$$

$B=\{3,4,5\}$. La soluzione di base $x^{(0)}=[0 \ 0 \ 6 \ 3 \ 2]^T$ non è ottima poiché $\bar{c}_1 < 0$. Si pone $k=1$. Si esamina il segno dei coefficienti \bar{a}_{i1} , con $i=1,2,3$. L'unico non negativo è \bar{a}_{21} . L'operazione di *pivot* è eseguita su tale elemento.

$$T^{(1)} = \begin{array}{cc|ccccc} 0 & -1 & 0 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & 3 & 0 & 15 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & 1 & 8 \end{array}$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 2

Si noti il passaggio a una nuova forma canonica corrispondente all'insieme $B=\{3,1,5\}$. In pratica, la variabile x_4 non è più di base, mentre la variabile x_1 è diventata una variabile di base.

La soluzione di base corrispondente alla nuova tabella è: $x^{(1)}=[3 \ 0 \ 15 \ 0 \ 8]^T$. Questa soluzione, a cui corrisponde un valore di funzione obiettivo pari a -6 , non è ottima perché $\bar{c}_2 < 0$.

Poiché $[\bar{a}_{12} \ \bar{a}_{22} \ \bar{a}_{32}]=[-1 \ -1 \ -1] \leq 0_3^T$ il **problema è illimitato**.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 3

Sia dato il seguente generico problema di PL:

$$\text{Max } 2x_1 + 3x_2 - 4x_3$$

s.v.

$$3x_1 + 2x_2 - 5x_3 \leq 4$$

$$2x_1 - x_2 + 4x_3 \leq 2$$

$$x_1, \quad x_3 \geq 0$$

Il primo passo è quello di trasformare il problema in forma standard.

$$(-) \text{ Min } -2x_1 - 3x_2^+ + 3x_2^- + 4x_3$$

s.v.

$$3x_1 + 2x_2^+ - 2x_2^- - 5x_3 + x_4 = 4$$

$$2x_1 - x_2^+ + x_2^- + 4x_3 + x_5 = 2$$

$$x_1, \quad x_2^+, \quad x_2^-, \quad x_3, \quad x_4, \quad x_5 \geq 0$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 3

Il problema è già in forma canonica.

$$T^{(0)} = \begin{array}{|cccccc|c} \hline -2 & -3 & 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 3 & 2 & -2 & -5 & 1 & 0 & 4 \\ \hline 2 & -1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

La soluzione di base $x^{(0)} = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 4 \ 2]^T$ non è ottima. Ci sono più coefficienti di costo ridotto associati a variabili non di base negativi. In questo caso, si pone il problema di scelta della colonna, ossia dell'indice della variabile entrante. Esistono vari criteri di scelta. E' necessario sottolineare che non esiste un criterio da preferire in assoluto rispetto agli altri.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 3

Possibili criteri sono i seguenti:

- ✓ l'indice è scelto a caso;
- ✓ si sceglie la colonna corrispondente al *primo* coefficiente di costo ridotto negativo;
- ✓ si sceglie la colonna corrispondente al *più piccolo* coefficiente di costo ridotto negativo.

L'ultima regola è quella più utilizzata. Applicando tale regola al problema in esame, si sceglie la colonna associata al coefficiente -3 . In essa c'è un solo elemento positivo. L'operazione di *pivot* è eseguita su tale elemento.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 3

$$T^{(1)} = \begin{array}{|cccccc|c} \hline 5/2 & 0 & 0 & -7/2 & 3/2 & 0 & 6 \\ \hline 3/2 & 1 & -1 & -5/2 & 1/2 & 0 & 2 \\ \hline 7/2 & 0 & 0 & 3/2 & 1/2 & 1 & 4 \\ \hline \end{array}$$

La soluzione di base $x^{(1)} = [0 \ 2 \ 0 \ 0 \ 0 \ 4]^T$ non è ottima. C'è infatti un coefficiente di costo ridotto negativo. Nella colonna a esso associata c'è un solo elemento positivo. L'operazione di *pivot* è eseguita su tale elemento.

$$T^{(2)} = \begin{array}{|cccccc|c} \hline 32/3 & 0 & 0 & 0 & 8/3 & 7/3 & 46/3 \\ \hline 22/3 & 1 & -1 & 0 & 4/3 & 5/3 & 26/3 \\ \hline 7/3 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & 2/3 & 8/3 \\ \hline \end{array}$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 3

La soluzione di base $x^{(2)} = [0 \ 26/3 \ 0 \ 8/3 \ 0 \ 0]^T$ è ottima.

Per il problema originario la soluzione ottima è:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{26}{3} - 0 \\ \frac{8}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{26}{3} \\ \frac{8}{3} \end{bmatrix}$$

A essa corrisponde un valore di funzione obiettivo pari a $\frac{46}{3}$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 4

Sia dato il seguente problema di PL in forma canonica:

$$\text{Min} \quad 3x_1 - 6x_2$$

s.v.

$$5x_1 + 7x_2 + x_3 = 35$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 2$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Dopo avere verificato che il problema ammette *infinite soluzioni ottime*, scriverne 3.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 4

$$T^{(0)} = \begin{array}{|cccc|c} 3 & -6 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 1 & 0 & 35 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 2 \end{array}$$

La soluzione di base associata a questa tabella è $x^{(0)} = [0 \ 0 \ 35 \ 2]^T$. Poiché $\bar{c}_2 < 0$, si pone $k=2$. Si esamina il segno dei coefficienti \bar{a}_{i2} , con $i=1,2$. Si calcola:

$\min\left\{\frac{35}{7}, \frac{2}{2}\right\} = \frac{2}{2} \rightarrow h=2$. Occorre eseguire l'operazione di *pivot* sull'elemento \bar{a}_{22} .

$$T^{(1)} = \begin{array}{|cccc|c} 0 & 0 & 0 & 3 & 6 \\ 17/2 & 0 & 1 & -7/2 & 28 \\ -1/2 & 1 & 0 & 1/2 & 1 \end{array}$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 4

La soluzione di base associata a questa tabella è $x^{(1)} = [0 \ 1 \ 28 \ 0]^T$. Questa soluzione è ottima. A essa è associato un valore di funzione obiettivo pari a -6 .

Si noti che c'è un **coefficiente di costo ridotto associato a una variabile non di base nullo** ($\bar{c}_1 = 0$).

Si può fare entrare in B l'indice 1. Si esamina il segno dei coefficienti \bar{a}_{i1} , con $i=1,2$. L'unico coefficiente positivo è \bar{a}_{11} . Si esegue un'operazione di pivot su questo elemento.

$$T^{(2)} = \begin{array}{|cc|cc|c|} \hline 0 & 0 & 0 & 3 & 6 \\ \hline 1 & 0 & 2/17 & -7/17 & 56/17 \\ 0 & 1 & 1/17 & 5/17 & 45/17 \\ \hline \end{array}$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 4

La soluzione di base associata a questa tabella è $x^{(2)} = [56/17 \ 45/17 \ 0 \ 0]^T$. Anche questa soluzione è ottima (il valore di funzione obiettivo resta pari a -6).

Sono state individuate 2 soluzioni di base ottime. Qualsiasi altra soluzione ottenuta come combinazione convessa di $x^{(1)}$ e $x^{(2)}$ è ottima:

$$\lambda \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 28 \\ 0 \end{bmatrix} + (1 - \lambda) \begin{bmatrix} \frac{56}{17} \\ \frac{45}{17} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad 0 < \lambda < 1.$$

Ponendo $\lambda = 1/2$, si ottiene: $x^{(3)} = [28/17 \ 31/17 \ 14 \ 0]^T$. $x^{(1)}$, $x^{(2)}$ e $x^{(3)}$ sono 3 soluzioni ottime per il problema dato ($x^{(3)}$ non è una soluzione di base).



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 5

Sia dato il seguente generico problema di PL:

$$\begin{array}{ll}\text{Max} & -x_1 + 2x_2 \\ \text{s.v.} & \\ & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & -x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

Trasformazione in forma standard:

$$\begin{array}{ll}(-) \text{ Min} & x_1 - 2x_2 \\ \text{s.v.} & \\ & x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ & -x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\ & x_2 + x_5 = 3 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0\end{array}$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 5

Il problema è già in forma canonica.

$$T^{(0)} = \begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}$$

La soluzione di base $x^{(0)} = [0 \ 0 \ 4 \ 2 \ 3]^T$ non è ottima, poiché $\bar{c}_2 < 0$. Si pone $k=2$. Si esamina il segno dei coefficienti \bar{a}_{i2} , con $i=1,2,3$. Si calcola:

$$\min \left\{ \frac{4}{1}, \frac{2}{1}, \frac{3}{1} \right\} = \frac{2}{1} \rightarrow h=2. \text{ Occorre eseguire}$$

l'operazione di *pivot* sull'elemento \bar{a}_{22} .



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 5

$$T^{(1)} = \begin{array}{ccccc|c} -1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array}$$

La soluzione di base $x^{(1)} = [0 \ 2 \ 2 \ 0 \ 1]^T$ non è ottima poiché $\bar{c}_1 < 0$. Si pone $k=1$. Si esamina il segno dei coefficienti \bar{a}_{i1} , con $i=1,2,3$. Si ha $\bar{a}_{11}, \bar{a}_{31} > 0$. Si calcola: $\min\left\{\frac{2}{2}, \frac{1}{1}\right\}$. Ci sono più rapporti che corrispondono al valore minimo! Questa situazione porta ad avere una ***soluzione di base degenera*** all'iterazione successiva. Se si seleziona la riga $h=1$, l'elemento di pivot è $\bar{a}_{11}=2$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

**Metodo del
Simplexso**

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 5

$$T^{(2)} = \begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 1/2 & 3/2 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 1/2 & -1/2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 & 1/2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \end{array}$$

La soluzione di base $x^{(2)} = [1 \ 3 \ 0 \ 0 \ 0]^T$ è ottima. Si tratta, come detto in precedenza, di una soluzione di base degenera (una variabile di base ha valore nullo). Per il problema originario la soluzione ottima è:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

A essa corrisponde un valore di funzione obiettivo pari a 5.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso**Regola di Bland**
Metodo delle Due
Fasi

Regola di Bland

Gli esempi hanno dimostrato che si può presentare un problema di scelta sia della colonna (ossia dell'indice della variabile entrante) sia della riga (ossia dell'indice della variabile uscente). Esiste una regola che disciplina la selezione sia delle variabili entranti sia delle variabili uscenti: la **regola di Bland**. In particolare, se esistono più indici candidati a entrare in B e/o più indici candidati a uscire da B , si seleziona sempre l'indice minimo, cioè:

$$✓ \quad k = \min \{ j \in N : \bar{c}_j < 0 \};$$

$$✓ \quad h = \min \left\{ i \in B : \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ik}} = \min \left\{ \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rk}}, \bar{a}_{rk} > 0 \right\} \right\}.$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)

Richiami di Algebra
Lineare

Programmazione
Lineare

Risoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Regola di Bland

Nell'esempio 5, la regola di Bland è stata applicata.

E' importante sottolineare che le soluzioni di base degeneri possono compromettere la terminazione del metodo del simplexso (presenza di *cicli*).

Tuttavia, l'applicazione della regola di Bland assicura la convergenza del metodo.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso**Regola di Bland**Metodo delle Due
Fasi

Esercizio

Sia dato il seguente problema di PL:

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & -\frac{3}{4}x_1 + 20x_2 - \frac{1}{2}x_3 + 6x_4 - 3 \\ \text{s.v.} & \\ & \frac{1}{4}x_1 - 8x_2 - x_3 + 9x_4 \leq 0 \\ & \frac{1}{2}x_1 - 12x_2 - \frac{1}{2}x_3 + 3x_4 \leq 0 \\ & \phantom{\frac{1}{2}x_1 - 12x_2 - \frac{1}{2}x_3 + 3x_4 \leq 0} x_3 \leq 1 \\ & x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad x_4 \geq 0 \end{array}$$

- ✓ Risolvere il problema applicando il metodo del simplexso e utilizzando la regola di Bland.
- ✓ Verificare l'insorgenza di un ciclo se, in presenza di più coefficienti di costo ridotto negativi, si sceglie la colonna corrispondente al coefficiente più piccolo.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Inizializzazione del metodo del simplexso

Ci sono problemi di PL che, una volta ridotti in forma standard, non sono automaticamente ridotti anche in forma canonica.

In questo caso non si dispone immediatamente di un insieme di indici di base B e, quindi, di una soluzione di base ammissibile (punto di avvio del metodo del simplexso).

Un approccio molto conosciuto utilizzato per la ricerca di una soluzione ammissibile di base è la ***tecnica delle variabili artificiali***. Essa prevede la definizione di un problema artificiale attraverso l'introduzione di variabili non negative nei vincoli del problema in forma standard.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simpleso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Inizializzazione del metodo del simpleso

Si consideri il seguente problema P_s in forma standard (con $b \geq 0_m$):

$$\text{Min } z = c^T x + d$$

S.V.

$$Ax = b$$

$$x \geq 0_n$$

Una soluzione di base ammissibile per P_s , se esiste, può essere determinata costruendo il seguente *problema artificiale* $P^{(\alpha)}$ (o *problema di prima fase*):

$$\text{Min } \rho = 1^T \alpha = \sum_{i=1}^m \alpha_i$$

S.V.

$$Ax + \alpha = b$$

$$x \geq 0_n, \alpha \geq 0_m$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simpleso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Inizializzazione del metodo del simpleso

Il vettore m -dimensionale $\alpha = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_m]^T$ è detto vettore delle *variabili artificiali*. Il vettore m -dimensionale $1^T = [1 \ 1 \ \dots \ 1]$ è un vettore in cui tutte le componenti sono pari a 1.

$P^{(\alpha)}$ non è in forma canonica ma può essere facilmente ricondotto a questa forma.

Nota: $P^{(\alpha)}$ ammette sempre una soluzione ottima (per individuare questa soluzione si può applicare il metodo del simpleso).



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Inizializzazione del metodo del simplexso

☛ P_s è ammissibile se e solo se $\rho^* = 0$ (il valore di funzione obiettivo di $P^{(\alpha)}$ all'ottimo è nullo).

Pertanto:

- ✓ Se $\rho^* = 0$, P_s è ammissibile e, a partire dalla tabella finale di $P^{(\alpha)}$, si può ottenere una tabella iniziale per P_s (inizializzazione del metodo del simplexso). Questo caso si presenta quando:
 - le variabili artificiali sono tutte non di base (nella soluzione ottima);
 - esistono variabili artificiali di base all'ottimo, ma il valore a esse associato è zero (la soluzione di base ottima per $P^{(\alpha)}$ è degenera).
- ✓ Se $\rho^* > 0$, il problema P_s è inammissibile.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 1

Il *metodo delle due fasi* (che utilizza la tecnica delle variabili artificiali) sarà presentato a partire da esempi numerici.

Si consideri il problema di PL seguente:

$$\text{Max } 3x_1 + 4x_2 - 4x_3$$

s.v.

$$2x_1 - 5x_2 + x_3 = -3 \quad (P)$$

$$3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5$$

$$x_1, \quad x_2, \quad x_3 \geq 0$$

Il primo passo è quello di trasformare il problema in forma standard.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 1

$$(-) \text{ Min } -3x_1 - 4x_2 + 4x_3$$

s.v.

$$2x_1 - 5x_2 + x_3 = -3$$

$$3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5$$

$$x_1, \quad x_2, \quad x_3 \geq 0$$

Per avere $b \geq 0$, si può riscrivere il modello in modo equivalente modificando il primo vincolo:

$$(-) \text{ Min } -3x_1 - 4x_2 + 4x_3$$

s.v.

$$-2x_1 + 5x_2 - x_3 = 3$$

$$3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5$$

$$x_1, \quad x_2, \quad x_3 \geq 0$$

 (P_s)



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 1

Il problema non è in forma canonica.

Prima fase:

Si costruisce il problema artificiale $P^{(\alpha)}$ corrispondente:

$$\begin{aligned} \text{Min } \rho &= \alpha_1 + \alpha_2 \\ \text{s.v.} \\ -2x_1 + 5x_2 - x_3 + \alpha_1 &= 3 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + \alpha_2 &= 5 \\ x_1, x_2, x_3, \alpha_1, \alpha_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Per applicare il metodo del simplexso a $P^{(\alpha)}$ si costruisce la tabella seguente





Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 1

			α_1	α_2	
0	0	0	1	1	0
-2	5	-1	1	0	3
3	2	2	0	1	5

Non si ha una forma canonica. Dalla struttura della tabella, però, si intuisce che una base da cui partire per risolvere $P^{(\alpha)}$ è quella associata alle variabili artificiali. Per fare in modo che il coefficiente di costo associato ad α_1 si annulli si può fare un'operazione di pivot sull'unico elemento diverso da zero presente nella colonna associata ad α_1 (il riferimento è alla colonna comprendente i soli coefficienti tecnologici).



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 1

			α_1	α_2	
0	0	0	1	1	0
-2	5	-1	1	0	3
3	2	2	0	1	5

 \Rightarrow

			α_1	α_2	
2	-5	1	0	1	-3
-2	5	-1	1	0	3
3	2	2	0	1	5

Allo stesso modo, per fare in modo che il coefficiente di costo associato ad α_2 si annulli si può fare un'operazione di pivot sull'unico elemento diverso da zero presente nella colonna associata ad α_2 .

			α_1	α_2	
2	-5	1	0	1	-3
-2	5	-1	1	0	3
3	2	2	0	1	5

 \Rightarrow

			α_1	α_2	
-1	-7	-1	0	0	-8
-2	5	-1	1	0	3
3	2	2	0	1	5



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 1

La tabella ottenuta costituisce la prima tabella del metodo del simplexso per $P^{(\alpha)}$

$$T_{\alpha}^{(0)} = \begin{array}{ccccc|c} & & & \alpha_1 & \alpha_2 & \\ \hline -1 & -7 & -1 & 0 & 0 & -8 \\ -2 & 5 & -1 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 0 & 1 & 5 \end{array}$$

La soluzione di base associata a questa tabella è $[x_1 \ x_2 \ x_3 \ \alpha_1 \ \alpha_2]^T = [0 \ 0 \ 0 \ 3 \ 5]^T$. Tale soluzione non è ottima per $P^{(\alpha)}$. La colonna scelta per l'operazione di pivot è quella associata a -7 ; la riga è la prima

$$\text{poiché } \min\left\{\frac{3}{5}, \frac{5}{2}\right\} = \frac{3}{5}.$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplex

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 1

$$T_{\alpha}^{(1)} = \begin{array}{ccccc|c} & & & \alpha_1 & \alpha_2 & \\ \hline -19/5 & 0 & -12/5 & 7/5 & 0 & -19/5 \\ -2/5 & 1 & -1/5 & 1/5 & 0 & 3/5 \\ 19/5 & 0 & 12/5 & -2/5 & 1 & 19/5 \end{array}$$

Occorre fare un'altra operazione di pivot. La colonna scelta è quella associata a $-19/5$; la riga è la seconda.

$$T_{\alpha}^{(2)} = \begin{array}{ccccc|c} & & & \alpha_1 & \alpha_2 & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1/19 & 3/19 & 2/19 & 1 \\ 1 & 0 & 12/19 & -2/19 & 5/19 & 1 \end{array}$$

La soluzione di base ottima di $P^{(\alpha)}$ è $[x_1^* \ x_2^* \ x_3^* \ \alpha_1^* \ \alpha_2^*]^T = [1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0]^T$, con valore di funzione obiettivo $\rho^* = 0$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 1

Poiché $\rho^*=0$, P_s è ammissibile

(*caso esaminato*: nella soluzione ottima di $P^{(\alpha)}$, le variabili artificiali sono tutte non di base).

Seconda fase:

A partire dalla tabella finale di $P^{(\alpha)}$, si può ottenere facilmente una tabella iniziale per P_s . Innanzitutto, si eliminano le colonne associate alle variabili artificiali e si rimpiazzano i coefficienti di costo ridotto nella riga 0 con i coefficienti di costo del problema P_s :

-3	-4	4	0
0	1	1/19	1
1	0	12/19	1



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 1

Non si ha una forma canonica. Tuttavia, dalla struttura della tabella, si intuisce che un insieme di indici di base iniziale per P_s è $B=\{1,2\}$. Come prima, per fare in modo che il primo coefficiente di costo si annulli, si può fare un'operazione di pivot sull'elemento "1" della prima colonna.

-3	-4	4	0		0	-4	112/19	3
0	1	1/19	1		0	1	1/19	1
1	0	12/19	1	⇒	1	0	12/19	1

Allo stesso modo, per fare in modo che il secondo coefficiente di costo si annulli, si può fare un'operazione di pivot sull'elemento "1" della seconda colonna.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simpleso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 1

0	-4	112/19	3
0	1	1/19	1
1	0	12/19	1

 \Rightarrow

0	0	116/19	7
0	1	1/19	1
1	0	12/19	1

La tabella ottenuta costituisce la prima tabella del metodo del simpleso per P_s .

$T^{(0)} =$	0	0	116/19	7
	0	1	1/19	1
	1	0	12/19	1

Non occorrono altre iterazioni perché la soluzione di base iniziale $x^{(0)} = [1 \ 1 \ 0]^T$ è ottima per P_s . Il valore ottimo di funzione obiettivo per P_s è: -7 .



Introduzione

Esempio 1

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Rispetto al problema originario P , la soluzione ottima resta:

$$\begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ x_3^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

con un valore di funzione obiettivo pari a 7.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 2

Si consideri il seguente problema di PL:

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & 3x_1 - 7x_2 + 2x_3 \\ \text{s.v.} & 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 15 \\ & x_1 + x_2 + x_3 \geq 1 \\ & -x_1 + x_2 = 5 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array} \quad (P)$$

Trasformazione del problema in forma standard:

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & 3x_1 - 7x_2 + 2x_3 \\ \text{s.v.} & 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 15 \\ & x_1 + x_2 + x_3 - x_5 = 1 \\ & -x_1 + x_2 = 5 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{array} \quad (P_s)$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplex

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 2

Prima fase:

Si costruisce il problema artificiale $P^{(\alpha)}$ corrispondente:

$$\begin{array}{ll} \text{Min } \rho = & \alpha_1 + \alpha_2 \\ \text{s.v.} & \\ & 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 15 \\ & x_1 + x_2 + x_3 - x_5 + \alpha_1 = 1 \\ & -x_1 + x_2 + \alpha_2 = 5 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, \alpha_1, \alpha_2 \geq 0 \end{array}$$

Nota: si può evitare di aggiungere variabili artificiali nei vincoli originariamente di “ \leq ”.

Il primo insieme B per $P^{(\alpha)}$ sarà formato dagli indici delle colonne associate alle variabili artificiali e alle variabili di *slack* (introdotte per trasformare i vincoli di “ \leq ” in vincoli di “ $=$ ”).



Introduzione

Esempio 2

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

					α_1	α_2	
0	0	0	0	0	1	1	0
2	3	5	1	0	0	0	15
1	1	1	0	-1	1	0	1
-1	1	0	0	0	0	1	5

Non si ha una forma canonica a causa dei coefficienti di costo non nulli associati alle variabili artificiali. Per fare in modo che il coefficiente associato ad α_1 si annulli si può fare un'operazione di pivot sull'unico elemento diverso da zero presente nella colonna associata ad α_1 (il riferimento è alla colonna comprendente i soli coefficienti tecnologici).



Introduzione

Esempio 2

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

					α_1	α_2	
0	0	0	0	0	1	1	0
2	3	5	1	0	0	0	15
1	1	1	0	-1	1	0	1
-1	1	0	0	0	0	1	5



					α_1	α_2	
-1	-1	-1	0	1	0	1	-1
2	3	5	1	0	0	0	15
1	1	1	0	-1	1	0	1
-1	1	0	0	0	0	1	5



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 2

Per annullare il coefficiente di costo associato ad α_2 si può fare un'operazione di pivot sull'unico elemento non nullo presente nella colonna associata ad α_2

							α_1	α_2	
-1	-1	-1	0	1	0	1	-1		
2	3	5	1	0	0	0	15		
1	1	1	0	-1	1	0	1		
-1	1	0	0	0	0	1	5		



0	-2	-1	0	1	0	0	-6	
2	3	5	1	0	0	0	15	
1	1	1	0	-1	1	0	1	
-1	1	0	0	0	0	1	5	



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 2

La tabella ottenuta costituisce la prima tabella del metodo del simplexso per $P^{(\alpha)}$

					α_1	α_2	
	0	-2	-1	0	1	0	-6
$T_{\alpha}^{(0)} =$	2	3	5	1	0	0	15
	1	1	1	0	-1	1	1
	-1	1	0	0	0	0	5

La soluzione di base associata a questa tabella è $[x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ \alpha_1 \ \alpha_2]^T = [0 \ 0 \ 0 \ 15 \ 0 \ 1 \ 5]^T$. Tale soluzione non è ottima per $P^{(\alpha)}$. La colonna interessata all'operazione di pivot è quella associata a -2; la riga è la seconda poiché $\min\left\{\frac{15}{3}, \frac{1}{1}, \frac{5}{1}\right\} = \frac{1}{1}$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 2

$$T_{\alpha}^{(1)} = \begin{array}{c|ccccccc|c} & & & & & \alpha_1 & \alpha_2 & \\ \hline & 2 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 0 & -4 \\ \hline & -1 & 0 & 2 & 1 & 3 & -3 & 0 & 12 \\ \hline & 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline & -2 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 4 \\ \hline \end{array}$$

Occorre fare un'altra operazione di pivot. La colonna interessata è quella associata a -1 ; la riga è la prima (per la regola di Bland).

$$T_{\alpha}^{(2)} = \begin{array}{c|ccccccc|c} & & & & & \alpha_1 & \alpha_2 & \\ \hline & 5/3 & 0 & 5/3 & 1/3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & -1/3 & 0 & 2/3 & 1/3 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ \hline & 2/3 & 1 & 5/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ \hline & -5/3 & 0 & -5/3 & -1/3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline \end{array}$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 2

La soluzione di base ottima è $[x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ \alpha_1 \ \alpha_2]^T = [0 \ 5 \ 0 \ 0 \ 4 \ 0 \ 0]^T$ con valore di funzione obiettivo $\rho^* = 0$. Tale soluzione è degenera.

Poiché $\rho^* = 0$, P_s è ammissibile
(***caso esaminato***: nella soluzione ottima di $P^{(\alpha)}$, c'è una variabile artificiale di base; tuttavia a essa è associato valore nullo).

Occorre fare un'ulteriore iterazione sulla tabella $T_{\alpha}^{(2)}$
 $\rightarrow \alpha_2$ non deve essere una variabile di base.



Introduzione

Esempio 2

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplex

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

$$T_{\alpha}^{(2)} = \begin{array}{cccccc|cc} & & & & \alpha_1 & \alpha_2 & & \\ & & & & & & & \\ 5/3 & 0 & 5/3 & 1/3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1/3 & 0 & 2/3 & 1/3 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 2/3 & 1 & 5/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ -5/3 & 0 & -5/3 & -1/3 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

Si esaminano i coefficienti sulla riga dove si trova l'elemento "1" associato ad α_2 (riga 3). Si può fare un'operazione di pivot su uno qualsiasi dei coefficienti associati a una variabile non artificiale a condizione che sia diverso da 0. In questo modo, una variabile non artificiale diventerà di base mantenendo il valore 0 (il valore ottimo $\rho^*=0$ non verrà quindi alterato).



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 2

Nota: Nel caso di più variabili artificiali di base con valore 0, occorre ripetere il procedimento appena descritto sino ad averle tutte non di base.

Eseguendo l'operazione di pivot sull'elemento

$\bar{a}_{31}^{(\alpha)} = -5/3$ si ottiene:

$$T_{\alpha}^{(3)} = \begin{array}{c|ccccccc|c} & & & & & \alpha_1 & \alpha_2 & \\ \hline & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hline & 0 & 0 & 1 & 2/5 & 1 & -1 & -1/5 & 4 \\ \hline & 0 & 1 & 1 & 1/5 & 0 & 0 & 2/5 & 5 \\ \hline & 1 & 0 & 1 & 1/5 & 0 & 0 & -3/5 & 0 \\ \hline \end{array}$$

La soluzione di base è rimasta $[x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ \alpha_1 \ \alpha_2]^T = [0 \ 5 \ 0 \ 0 \ 4 \ 0 \ 0]^T$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simpleso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 2

Seconda fase:

A partire da $T_\alpha^{(3)}$ si può ottenere facilmente una tabella iniziale per P_s . Innanzitutto, si eliminano le colonne associate alle variabili artificiali e si rimpiazzano i coefficienti di costo ridotto nella riga 0 con i coefficienti di costo del problema P_s :

3	-7	2	0	0	0
0	0	1	2/5	1	4
0	1	1	1/5	0	5
1	0	1	1/5	0	0

Non si ha ancora una forma canonica per P_s . Tuttavia si intuisce che un insieme di indici di base iniziale per P_s è $B=\{5,2,1\}$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 2

Si può fare un'operazione di pivot sull'elemento "1" della prima colonna.

3	-7	2	0	0	0
0	0	1	2/5	1	4
0	1	1	1/5	0	5
1	0	1	1/5	0	0

⇒

0	-7	-1	-3/5	0	0
0	0	1	2/5	1	4
0	1	1	1/5	0	5
1	0	1	1/5	0	0

Quindi si può fare un'operazione di pivot sull'elemento "1" della seconda colonna.

0	-7	-1	-3/5	0	0
0	0	1	2/5	1	4
0	1	1	1/5	0	5
1	0	1	1/5	0	0

⇒

0	0	6	4/5	0	35
0	0	1	2/5	1	4
0	1	1	1/5	0	5
1	0	1	1/5	0	0



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 2

La tabella ottenuta costituisce la prima tabella del metodo del simplexso per P_s .

$T^{(0)} =$

0	0	6	4/5	0	35
0	0	1	2/5	1	4
0	1	1	1/5	0	5
1	0	1	1/5	0	0

Non occorrono altre iterazioni perché la soluzione di base iniziale $x^{(0)} = [0 \ 5 \ 0 \ 0 \ 4]^T$ è ottima per P_s (i coefficienti di costo ridotto associati alle variabili non di base sono positivi). Il valore ottimo di funzione obiettivo per P_s (ma anche per P) è: -35 .

Per il problema originario P si ha: $x_1^* = x_3^* = 0$, $x_2^* = 5$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 3

Si consideri un problema di PL già risolto per via grafica (Esempio 2)

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & z = -x_1 + x_2 \\ \text{s.v.} & 3x_1 + 2x_2 \geq 5 \\ & x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

 (P)

Il primo passo è quello di trasformare il problema in forma standard.

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & z = -x_1 + x_2 \\ \text{s.v.} & 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 5 \\ & x_1 + x_2 + x_4 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array}$$

 (P_s)



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 3

Prima fase:

Si costruisce il problema artificiale $P^{(\alpha)}$ corrispondente:

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & \rho = \alpha_1 \\ \text{s.v.} & 3x_1 + 2x_2 - x_3 + \alpha_1 = 5 \\ & x_1 + x_2 + x_4 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, \alpha_1 \geq 0 \end{array}$$

Per applicare il metodo del simplexso a $P^{(\alpha)}$ si costruisce la seguente tabella:

					α_1
0	0	0	0	1	0
3	2	-1	0	1	5
1	1	0	1	0	1



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 3

Non si ha una forma canonica a causa del coefficiente di costo non nullo associato all'unica variabile artificiale presente. Per fare in modo che questo coefficiente si annulli si può fare un'operazione di pivot sull'unico elemento diverso da zero presente nella colonna associata ad α_1 (il riferimento è alla colonna comprendente i soli coefficienti tecnologici).

α_1						
0	0	0	0	1	0	
3	2	-1	0	1	5	
1	1	0	1	0	1	

⇒

α_1						
-3	-2	1	0	0	-5	
3	2	-1	0	1	5	
1	1	0	1	0	1	



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simpleso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 3

La tabella ottenuta costituisce la prima tabella del metodo del simpleso per $P^{(\alpha)}$

$$T_{\alpha}^{(0)} = \begin{array}{ccccc|c} & & & & \alpha_1 & \\ \hline -3 & -2 & 1 & 0 & 0 & -5 \\ \hline 3 & 2 & -1 & 0 & 1 & 5 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline \end{array}$$

La soluzione di base associata a questa tabella è $[x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ \alpha_1]^T = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 5]^T$. Tale soluzione non è ottima per $P^{(\alpha)}$. La colonna interessata all'operazione di pivot è quella associata a -3 ; la riga è la seconda poiché $\min\left\{\frac{5}{3}, \frac{1}{1}\right\} = \frac{1}{1}$.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 3

$$T_{\alpha}^{(1)} = \begin{array}{ccccc|c} & & & & \alpha_1 & \\ \hline 0 & 1 & 1 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline \end{array}$$

La soluzione di base associata a questa tabella è $[x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ \alpha_1]^T = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 2]^T$. Tale soluzione è ottima e il valore di funzione obiettivo a essa associato è $\rho^* = 2$.

Poiché $\rho^* \neq 0$, P_s è *inammissibile*.

Pertanto il problema originario P è inammissibile.

Nota: non c'è la seconda fase.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 4

Si consideri il seguente problema di PL (già in forma standard):

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 \\ \text{s.v.} & -8x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \\ & x_1 - x_2 + 4x_3 + x_4 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array} \quad (P_s)$$

Nota: si può evitare di aggiungere una variabile artificiale nel secondo vincolo (la variabile x_4 in esso presente non compare in altri vincoli; inoltre il coefficiente tecnologico a essa associato è 1).



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 4

Prima fase:

Si costruisce il problema artificiale $P^{(\alpha)}$ corrispondente:

$$\begin{array}{ll} \text{Min } \rho = & \alpha_1 \\ \text{s.v.} & -8x_1 + 4x_2 - x_3 + \alpha_1 = 3 \\ & x_1 - x_2 + 4x_3 + x_4 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, \alpha_1 \geq 0 \end{array}$$

La tabella associata è:

					α_1
0	0	0	0	1	0
-8	4	-1	0	1	3
1	-1	4	1	0	6



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

Metodo delle Due
Fasi

Esempio 4

Non si ha una forma canonica a causa del coefficiente di costo non nullo associato all'unica variabile artificiale presente. Si può fare un'operazione di pivot sull'unico elemento diverso da zero presente nella colonna associata ad α_1 (il riferimento è alla colonna comprendente i soli coefficienti tecnologici).

α_1						
0	0	0	0	1	0	0
-8	4	-1	0	1	3	3
1	-1	4	1	0	6	6

⇒

α_1						
8	-4	1	0	0	-3	-3
-8	4	-1	0	1	3	3
1	-1	4	1	0	6	6



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 4

La tabella ottenuta costituisce la prima tabella del metodo del simplexso per $P^{(\alpha)}$

$$T_{\alpha}^{(0)} = \begin{array}{ccccc|c} & & & & \alpha_1 & \\ \hline 8 & -4 & 1 & 0 & 0 & -3 \\ -8 & 4 & -1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 4 & 1 & 0 & 6 \end{array}$$

Occorre eseguire un'operazione di pivot. La colonna interessata è quella associata al coefficiente di costo ridotto -4 ; la riga è la prima.

$$T_{\alpha}^{(1)} = \begin{array}{ccccc|c} & & & & \alpha_1 & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -1/4 & 0 & 1/4 & 3/4 \\ -1 & 0 & 15/4 & 1 & 1/4 & 27/4 \end{array}$$



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
Grafica

Forma Standard

Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale

Forma Canonica

Metodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 4

La soluzione di base ottima di $P^{(\alpha)}$ è $[x_1^* \ x_2^* \ x_3^* \ x_4^* \ \alpha_1^*]^T = [0 \ 3/4 \ 0 \ 27/4 \ 0]^T$, con valore di funzione obiettivo $\rho^*=0$ (la variabile artificiale non è di base).

Seconda fase:

Si elimina la colonna associata alla variabile artificiale e si rimpiazzano i coefficienti di costo ridotto nella riga 0 con i coefficienti di costo del problema P_s :

3	5	-4	0	0
-2	1	-1/4	0	3/4
-1	0	15/4	1	27/4

Si esegue un'operazione di pivot sull'elemento "1" della seconda colonna.



Introduzione

Problemi Decisionali
(Formulazioni)Richiami di Algebra
LineareProgrammazione
LineareRisoluzione
GraficaForma Standard
Soluzioni di Base e
Teorema
Fondamentale
Forma CanonicaMetodo del
Simplexso

Regola di Bland

**Metodo delle Due
Fasi**

Esempio 4

Prima tabella del metodo del simplexso per P_s :

$$T^{(0)} = \begin{array}{cc|cc|c} 13 & 0 & -11/4 & 0 & -15/4 \\ -2 & 1 & -1/4 & 0 & 3/4 \\ -1 & 0 & 15/4 & 1 & 27/4 \end{array}$$

La soluzione di base associata a questa tabella non è ottima. Si esegue un'operazione di pivot su "15/4":

$$T^{(1)} = \begin{array}{cc|cc|c} 184/15 & 0 & 0 & 11/15 & 6/5 \\ -31/15 & 1 & 0 & 1/15 & 6/5 \\ -4/15 & 0 & 1 & 4/15 & 9/5 \end{array}$$

La soluzione di base associata a questa tabella è $[x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4]^T = [0 \ 6/5 \ 9/5 \ 0]^T$. Essa è ottima per P_s . Il valore ottimo di funzione obiettivo è: $-6/5$.