

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA

Appello di Analisi 1 del 12 luglio 2018

A

COGNOME e NOME:

MATRICOLA E CORSO DI LAUREA:

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Esercizio 1.

Si consideri la funzione

$$f(x) = \log \left(\frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x} \right)$$

Determinarne:

dominio

Svolgimento:

Le condizioni da imporre affinché f sia definita sono:

- $x \neq 0$
- $\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} > 0$

Osserviamo che

$$\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} = \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \cdot \frac{\sqrt{x^2+1}+1}{\sqrt{x^2+1}+1} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}+1}$$

e quindi

$$\text{Dom}(f) = (0, +\infty)$$

studiare il segno della funzione;

Svolgimento:

f è positiva se

$$\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} > 1,$$

ovvero se

$$\sqrt{x^2+1} > x+1.$$

Essendo $x > 0$, segue che anche $x+1 > 0$ e quindi $\sqrt{x^2+1}$ è strettamente maggiore di $x+1$ se

$$x^2+1 > (x+1)^2,$$

ovvero se

$$x^2 + 1 > x^2 + 2x + 1$$

e quindi se:

$$x < 0.$$

Poiché la funzione è definita solo per $x > 0$, deduciamo che f è negativa in tutto il suo dominio.

limiti agli estremi del dominio;

Svolgimento:

Ricordando che

$$f(x) = \log \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1} + 1} \right),$$

otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \log \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1} + 1} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \log \left(\frac{x}{x \left[\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + \frac{1}{x} \right]} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \log \left(\frac{1}{\left[\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + \frac{1}{x} \right]} \right) = 0$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \log \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1} + 1} \right) = -\infty.$$

intervalli di monotonia ed eventuali punti di massimo e di minimo;

Svolgimento:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1} - 1} \cdot \frac{\frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 1}} - (\sqrt{x^2 + 1} - 1)}{x^2} = \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1} - 1} \cdot \frac{x^2 - x^2 - 1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}} = \\ &= \frac{1}{x \sqrt{x^2 + 1}}, \end{aligned}$$

per cui f è strettamente crescente in tutto il suo dominio e quindi non ci sono punti di massimo e minimo relativi. Inoltre, dallo studio dei limiti visto prima deduciamo che la funzione non ammette punti di massimo e minimo assoluti.

intervalli di concavità e convessità;

Svolgimento:

Poiché $f''(x) = -\frac{2x^2 + 1}{x^2 \sqrt{(x^2 + 1)^3}} < 0 \quad \forall x \in \text{Dom}(f)$, deduciamo che f è concava in tutto il suo dominio.

tracciare il grafico qualitativo di $f(x)$;

Svolgimento:


dire, motivando la risposta, quanti sono gli zeri dell'equazione

$$f(x) = -50,$$

dove $f(x)$ rappresenta la funzione precedentemente studiata;

Svolgimento:

Essendo la funzione strettamente monotona crescente, l'equazione data ha un'unica soluzione.



Analisi Matematica 1 - 12/07/2018

A

Esercizio 2. Studiare il dominio della seguente funzione

$$f(x) = \log(\cos x) + x.$$

Svolgimento:

La funzione è definita quando $\cos x > 0$, ovvero:

$$\forall x \in D = \cup_{k \in \mathbb{Z}} \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right).$$

Determinare gli eventuali punti di massimo e minimo della funzione $f(x)$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.

Svolgimento:

Osserviamo che $D \cap [0, 2\pi] = [0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{3}{2}\pi, 2\pi]$.

Si ha:

$$f'(x) = -\tan x + 1.$$

L'equazione $f'(x) = 0$ ha due soluzioni all'interno dell'intervallo $[0, 2\pi]$: $x_1 = \frac{\pi}{4}$ e $x_2 = \frac{5}{4}\pi$. Di queste, però, solo $x_1 \in D$.

Studiando il segno di f' vicino x_1 , si ha che $f' > 0$ a sinistra di x_1 e $f' < 0$ a destra e pertanto x_1 è un punto di massimo locale.

Inoltre osserviamo che:

$$f(0) = 0, \quad f(2\pi) = 2\pi, \quad f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \log\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \frac{\pi}{4} = -\log(\sqrt{2}) + \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{4} < 2\pi$$

e

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}\pi^+} f(x) = -\infty$$

e quindi, poiché $f\left(\frac{\pi}{4}\right) < f(2\pi)$, deduciamo che x_1 è un punto di massimo relativo ma non assoluto, che il massimo assoluto di f è assunto in 2π , che 0 è un punto di minimo relativo e che f non ammette minimo assoluto.

Esercizio 3. Si consideri la funzione

$$f(x) = \sin^3(x).$$

Calcolare l'area della parte di piano compresa tra il grafico della funzione $f(x)$ e l'asse delle x , per $x \in [0, 2\pi]$.

Svolgimento:

Studiando il segno di f , si ha: $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [0, \pi]$ e $f(x) \leq 0 \quad \forall x \in [\pi, 2\pi]$.

Pertanto l'area cercata è uguale a:

$$A = \int_0^\pi f(x)dx - \int_\pi^{2\pi} f(x)dx.$$

Calcoliamo una primitiva di f . Si ha:

$$\int \sin^3(x)dx = \int (1 - \cos^2(x)) \sin(x)dx.$$

Facendo la sostituzione $t = \cos(x)$, si ottiene

$$\int (1 - \cos^2(x)) \sin(x)dx = \int (t^2 - 1)dt = \frac{t^3}{3} - t = \frac{\cos^3(x)}{3} - \cos(x) = F(x).$$

Quindi, usando il Teorema Fondamentale del Calcolo, si ottiene:

$$A = F(\pi) - F(0) - F(2\pi) + F(\pi) = 2[F(\pi) - F(0)] = 2\left[-\frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3} + 1\right] = 2 - \frac{2}{3} = \frac{8}{3}.$$

Motivando la risposta, dire se il seguente integrale improprio converge.

$$\int_1^{+\infty} \left[\sin\left(\frac{x + \sqrt{x}}{x^2 + x}\right) \right]^2 dx.$$

Svolgimento:

Per $x \rightarrow +\infty$ la funzione $\frac{x + \sqrt{x}}{x^2 + x}$ è asintoticamente equivalente alla funzione $\frac{1}{x}$ e quindi $\left[\sin\left(\frac{x + \sqrt{x}}{x^2 + x}\right) \right]^2$ è asintoticamente equivalente a $\frac{1}{x^2}$. Pertanto, usando il criterio del confronto asintotico, deduciamo che l'integrale improprio converge.

Esercizio 4. Studiare la convergenza semplice e assoluta della serie:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{n^n}{n! 3^n} \sin(n).$$

Svolgimento:

Vediamo se la serie converge assolutamente, ovvero controlliamo se converge la serie:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^n}{n! 3^n} |\sin(n)|.$$

Osservato che $|\sin(n)| \leq 1$, segue che:

$$b_n = \frac{n^n}{n! 3^n} |\sin(n)| \leq \frac{n^n}{n! 3^n}.$$

Usiamo il criterio del rapporto per studiare il carattere della serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^n}{n! 3^n}$. Si ha:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)! 3^{n+1}} \cdot \frac{n! 3^n}{n^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^n}{3n^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{e}{3} < 1.$$

Quindi la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^n}{n! 3^n}$ converge e per il Criterio del Confronto converge anche la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ converge e quindi la serie di partenza converge assolutamente e, quindi, anche semplicemente.