

Università degli Studi della Calabria

ANALISI MATEMATICA 1

Appello del 16 febbraio 2016

COGNOME:

NOME:

MATRICOLA:

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA:

IMPORTANTE

Al termine della prova è necessario riconsegnare solo il presente fascicolo. I risultati e lo svolgimento relativo vanno riportati negli appositi spazi o nel retro dei fogli del presente fascicolo: un campo vuoto o assenza di calcoli dove richiesto significano 0 punti.

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE

--	--	--	--	--

A

Esercizio 1. Si consideri la funzione

$$f(x) = \sqrt[3]{x} \left(\frac{x-2}{x+1} \right).$$

Determinarne:

dominio

Svolgimento:

$$D = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty);$$

intersezioni con gli assi

Svolgimento:

risulta

$$f(0) = 0 \text{ e } f(x) = 0 \iff x = 0 \text{ o } x = 2,$$

di conseguenza i punti d'intersezione con gli assi sono

$$(0, 0) \text{ e } (2, 0);$$

limiti agli estremi del dominio

Svolgimento:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) &= +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = -\infty; \end{aligned}$$

asintoti verticali

Svolgimento:

$$x = -1;$$

asintoti orizzontali

Svolgimento:

la funzione data non ammette asintoti orizzontali;

asintoti obliqui

Svolgimento:

poichè

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

la funzione non ammette asintoti obliqui;

derivata prima

Svolgimento:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}} \left(\frac{x-2}{x+1} \right) + x^{\frac{1}{3}} \frac{3}{(x+1)^2} \\ &= \frac{x^2 + 8x - 2}{3x^{\frac{2}{3}}(x+1)^2} \quad (x \neq 0); \end{aligned}$$

punti di non derivabilità e loro classificazione

Svolgimento:

risulta

$$f'_+(0) = f'_-(0) = -\infty,$$

dunque $x = 0$ è un punto di flesso a tangente verticale per f ;

punti stazionari e loro classificazione

Svolgimento:

si ha


$$f'(x) = \frac{x^2 + 8x - 2}{3x^{\frac{2}{3}}(x+1)^2} \geq 0,$$

$$x^2 + 8x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -4 + 3\sqrt{2} \text{ o } x \geq -4 + 3\sqrt{2},$$

quindi $x = -4 - 3\sqrt{2}$ è un punto di massimo relativo per f e $x = -4 + 3\sqrt{2}$ è un punto di minimo relativo per f ;

grafico qualitativo

Svolgimento:



Esercizio 2.

Considerata la funzione

$$f(x) = xe^{\sqrt[3]{x}} + \sqrt[3]{x-1},$$

si chiede di

stabilire se f è derivabile nel suo dominio e classificare eventuali punti di non derivabilità;

Svolgimento:

La funzione è definita e continua in $D = (-\infty, +\infty)$. Risulta

$$f'(x) = e^{\sqrt[3]{x}} + \frac{1}{3}e^{\sqrt[3]{x}}\sqrt[3]{x} + \frac{1}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}}.$$

Quindi f è derivabile nel suo dominio per $x \neq 1$. Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow 1^\pm} \left(e^{\sqrt[3]{x}} + \frac{1}{3}e^{\sqrt[3]{x}}\sqrt[3]{x} + \frac{1}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}} \right) = +\infty \Rightarrow f'_\pm(1) = +\infty,$$

Dunque f non è derivabile in $x = 1$ che è un punto di flesso a tangente verticale.

stabilire se f ammette massimo o minimo assoluti nell'intervallo $[1, 2]$ e in caso affermativo calcolarne il valore.

Svolgimento:

Evidentemente risulta ha $f'(x) > 0$ per $x > 0$. Quindi $f(x)$ è strettamente crescente nell'intervallo assegnato. Dunque

$$\min_{[1,2]} f = f(1) = e, \max_{[1,2]} f = f(2) = 2e^{\sqrt[3]{2}} + 1.$$

Esercizio 2. Calcolare l'area della regione di piano sottesa al grafico della funzione $f(x) = e^{-2x} \sin x$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.

Svolgimento:

Studiamo il segno della funzione data nell'intervallo assegnato:

$$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow \sin x \geq 0 \Leftrightarrow x \in [0, \pi].$$

Integrando due volte per parti, si ha

$$\begin{aligned} & \int e^{-2x} \sin x dx \\ &= -\frac{1}{2}e^{-2x} \sin x + \frac{1}{2} \int e^{-2x} \cos x dx \\ &= -\frac{1}{2}e^{-2x} \sin x - \frac{1}{4}e^{-2x} \cos x - \frac{1}{4} \int e^{-2x} \sin x dx, \end{aligned}$$

da cui

$$\int e^{-2x} \sin x dx = -\frac{2}{5}e^{-2x} \sin x - \frac{1}{5}e^{-2x} \cos x + c.$$

Quindi, detta A l'area richiesta, risulta

$$\begin{aligned} A &= \int_0^\pi e^{-2x} \sin x dx - \int_\pi^{2\pi} e^{-2x} \sin x dx \\ &= \left[-\frac{2}{5}e^{-2x} \sin x - \frac{1}{5}e^{-2x} \cos x \right]_0^\pi - \left[-\frac{2}{5}e^{-2x} \sin x - \frac{1}{5}e^{-2x} \cos x \right]_\pi^{2\pi} \\ &= \frac{1}{5}e^{-4\pi} + \frac{1}{5}e^{-2\pi} + \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

Esercizio 4. Studiare convergenza assoluta e convergenza semplice della seguente serie numerica:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \left(\frac{1}{e^n} \right) \right) \frac{1}{e^n}.$$

Svolgimento:

Si tratta di una serie a segni alterni. Poichè

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos \left(\frac{1}{e^n} \right)}{\frac{1}{e^{2n}}} = \frac{1}{2},$$

si ha

$$\left(1 - \cos \left(\frac{1}{e^n} \right) \right) \frac{1}{e^n} \sim \frac{1}{2e^{3n}}.$$

Per il criterio del confronto asintotico, la serie dei moduli della serie data ha lo stesso carattere della serie a termini positivi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2e^{3n}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{e^3} \right)^n,$$

che è una serie geometrica convergente. Dunque la serie data converge assolutamente e quindi converge semplicemente.

Esercizio 5. Determinare mediante calcolo diretto il polinomio di Taylor al secondo ordine della funzione $f(x) = e^2 - e^{x^2+x}$ nel punto $x_0 = 1$.

Svolgimento:

Risulta

$$\begin{aligned}f'(x) &= -(2x+1)e^{x^2+x}, \\f''(x) &= -\left(2e^{x^2+x} + e^{x^2+x}(2x+1)^2\right) \\&= -e^{x^2+x}(4x^2+4x+3),\end{aligned}$$

da cui

$$\begin{aligned}f(1) &= 0, \\f'(1) &= -3e^2, \\f''(1) &= -11e^2.\end{aligned}$$

Dunque

$$\begin{aligned}T_2^1(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2}(x-1)^2 \\&= -3e^2(x-1) - \frac{11e^2}{2}(x-1)^2.\end{aligned}$$