


I readily admit in fig 2-10 I averaged the property shown in this plot, but the property here and better of all structures are revealed when shown that no structure, based on this property, exceeds in any respect, short in property, and that no structure is adjacent property exceeds in the previous average, except in shown

Charles C. Whicker



Skriti markovski modeli v finančnih časovnih vrstah

Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani


14. april 2019

Martin Pražek

Mentor: izr. prof. dr. Damjan Škulj

Markovski model

- Markovska lastnost je lastnost slučajnega procesa v diskretnem času, da je njegova vrednost v času t odvisna le od njegove vrednosti v času $t - 1$.
- Ločimo v celoti opazovan in delno opazovan ter
- Avtonomen in kontroliran sistem.




Delitev markovskih modelov

	V celoti opazovan	Le delno opazovan
Avtonomen	Markovska veriga	Skriti markovski model
Kontroliran	Markovski proces odločanja	Delno opazovalen proces odločanja

Skriti markovski model


Skriti markovski model je statistični markovski model, kjer predpostavljamo, da je modelirani sistem markovski proces z skritimi stanji.

Gre torej za tip modela, kjer lahko razberemo rezultat, ne moremo pa ugotoviti, kakšna je bila funkcija, ki nam ga je dala.



Zahteve

- Markovska lastnost
- Enakomerno porazdeljeni slučajni signalov O_t , ki jih poda resnični svet
- Sistem ima N stanj, vsako določa slučajna spremenljivka S



Hidden States:

$$H_i = \{x, y, z, \underline{e}\}$$

Observations:

$$A = \{\underline{\text{discrete number from 1 to } U_A}\}$$

$$B = \{\underline{\text{discrete number from 1 to } U_B}\}$$

$$C = \{\underline{\text{discrete number from 1 to } U_C}\}$$

- Slučajnih spremenljivk skritih skoraj v nobenem času ne poznamo, poznamo pa slučajni proces Q , ki predstavlja signale
- Porazdelitveni zakon vsakega stanja i označimo z $b_i(x)$
- Vektor začetnih stanj je π
- Prehodna matrika A , ki je neodvisna od časa

Porazdelitveni zakon

- Gaussova mešnica
- $b_i = \sum_{j=1}^M c_{ij} N(x; \mu_j, \sigma_j^2)$
- Število porazdelitev M
- Matrika Γ , μ_{ij} predstavlja priproskovano vrednost porazdelitve j v stanju i
- Matrika Σ , kjer σ_{ij} predstavlja varianco porazdelitve j v stanju i
- Matrika C , koeficienti c_{ij} iz Gaussove mešnice

Osnovanje modela

Da bomo lahko delali z našim modelom, moramo najprej izvesti t.i. trening modela.

- Razvrščanje v skupine (k -means clustering)
- Akaikov informacijski kriterij



Izračun $P(O|\lambda)$

Z λ označimo vse ostale parametre $\lambda = (\pi, A, C, \Gamma, \Sigma)$. Za učinkovit izračun le teh si pomagamo z iterativnim postopkom, podobnim sistemu EM, *naprej – nazaj*.

$$\alpha_1(i) = \pi_i b_i(O_1) = \pi_i b_i = \sum_{k=1}^M c_{ik}$$

\Downarrow

$$P(O|\lambda) = \sum_{i=1}^N \alpha_T(i)$$


Trening modela

Da bomo lahko $P(O|\lambda)$ maksimizirali, potrebujemo zaštetne ocene parametrov. Za to ne poznamo analitičnega postopka, lahko pa lokalno maksimiziramo, z naprimer, Baum-Welchovim algoritmom. Pri tem nas ne skrbijo ocene za A ter π , kjer moramo paziti le na neništelnost le teh. Veš problemov nam povzročajo C , Σ in Γ .

C, Σ in Γ

Za dobro zaštetno oceno si lahko pomagamo z razvrščanjem v skupine. Za C to pomeni, da bo element $c_{ij} = 1/M$ za vsak par ij , kjer je M število skupin. Prišakovane vrednosti in variance nato pridobimo iz vrednosti teh skupin.

Different cluster analysis results on "mouse" data set:




Lokalno maksimiziranje

Za potrebe lokalne maksimizacije določimo dodatne funkcije:

$$\xi_t(i, j) = \frac{\alpha_t(i) a_{ij} b_j(O_t) \beta_{t+1}(j)}{P(O|\lambda)}$$

$$\gamma_t(i) = \frac{\alpha_t(i) \beta_t(i)}{P(O|\lambda)}$$

$$\gamma_t(j, k) = \gamma_t(j) \frac{c_{jk} N(x; \mu_{jk}, \sigma_{jk}^2)}{\sum_{m=1}^M c_{jm} N(x; \mu_{jm}, \sigma_{jm}^2)}$$



Lokalno maksimiziranje

Prek dodatnih funkcij definiramo iteracijske postopke za naše spremenljivke:

$$\overline{\pi}_i = \gamma_1(i)$$

$$\overline{a}_{ij} = \frac{\sum_{t=1}^{T-1} \xi_t}{\sum_{t=1}^{T-1} \gamma_t(i)}$$

$$\overline{c}_{jk} = \frac{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j, k)}{\sum_{t=1}^T \sum_{m=1}^M \gamma_t(j, m)}$$

$$\overline{\mu}_{jk} = \frac{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j, k) O_t}{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j, k)}$$



Tako definiramo večfazni iterativni proces, pri katerem popravljamo vrednosti parametrov do konvergence.

Začeto stanje in Viterbijev algoritem

Za delo s tem algoritmom moramo definirati $\delta_t(i)$, ki za vsako stanje i vrne največjo verjetnost vzdolž poti v času t . Prek $\delta_t(i)$ nato induktivno izvedemo algoritem.


Viterbijev algoritem nam vrne p^* , ki je največja verjetnost in q_{T^*} , ki nam pove stanje v času T , ki nam to verjetnost vrne.

Uporaba



I readily also in fig. 20 I changed the property shown in this plot that the property here and there of all structures are necessarily shown here. That is, structure, linked in this property, remains in my aspect, that is, property, and, I shall, structure, and point, property, remains in the present, and, property, in this.

Charles C. Whelan



V dolgi predstavitvi se bom bolj posvetil sami finančni analizi, ki sem jo tokrat zaenkrat pustil pri miru. V prihodnje bom tudi sam poizkusil določiti skriti markovski model na svojem setu podatkov.

- 1 I. MacDonald, W. Zucchini. Hidden Markov and Other Models for Discrete-valued Time Series. Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability. Taylor & Francis. (1997)
- 2 D.Roman, G. Mitra,N. Spagnolo. Hidden Markov models for financial optimization problems. IMA Journal of Management Mathematics. 21 (2010).