

TD 27 : corrigé de quelques exercices

Exercice 27.7 :

1°) En modélisant la situation à l'aide de variables aléatoires, l'indice I de l'urne choisie vérifie $I \sim \mathcal{B}(\frac{1}{2})$, et la couleur C de la boule tirée vérifie : la loi de " C sachant que $I = 1$ " est $\mathcal{B}(\frac{n_1}{n_1 + b_1})$, en convenant que la couleur noire est représentée par l'entier 1, et la loi de " C sachant que $I = 2$ " est $\mathcal{B}(\frac{n_2}{n_2 + b_2})$.

La formule des probabilités totales donne :

$$\begin{aligned} P(C = 1) &= P(C = 1 | I = 1)P(I = 1) + P(C = 1 | I = 2)P(I = 2) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{n_1}{n_1 + b_1} + \frac{n_2}{n_2 + b_2} \right). \end{aligned}$$

2°) Pour répondre à la deuxième question on applique la formule de Bayes :

$$\begin{aligned} P(I = i | C = 1) &= \frac{P(I = i)P(C = 1 | I = i)}{P(I = 1)P(C = 1 | I = 1) + P(I = 2)P(C = 1 | I = 2)} \\ &= \frac{\frac{n_i}{n_i + b_i}}{\frac{n_1}{n_1 + b_1} + \frac{n_2}{n_2 + b_2}}. \end{aligned}$$

Exercice 27.13 :

1°) Pour la k -ième personne P_k , on note $X_{n,k}$ la variable aléatoire égale au nombre de lettres qu'elle reçoit.

$X_{n,k}$ peut être considérée comme la somme de $(n-1)$ variables de Bernoulli indépendantes associées à chaque personne de la communauté (valant 1 si cette personne envoie la lettre à P_k , 0 sinon).

Par suite, $X_{n,k}$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n-1, p)$ où $p_n = \frac{1}{n-1}$

et pour $j \in \{0, \dots, n-1\}$: $p_{j,n} = P(X_{n,k} = j) = \binom{n-1}{j} \left(\frac{1}{n-1}\right)^j \left(1 - \frac{1}{n-1}\right)^{n-1-j}$.

À j fixé, quand $n \rightarrow \infty$,

$$p_{j,n} = \frac{(n-1)(n-2) \times \dots \times (n-j)}{(n-1)(n-1) \times \dots \times (n-1)} \frac{1}{j!} e^{(n-1)\ln(1-\frac{1}{n-1})} \left(1 - \frac{1}{n-1}\right)^{-j} \sim \frac{e^{-1}}{j!},$$

ce qui correspond à une loi de Poisson de paramètre 1.

Nous avons redémontré un résultat classique d'approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson, valable ici car $(n-1)p_n = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

2°) On note D_j : "au moins une personne reçoit j lettres". On a $D_j = \bigcup_{k=1}^n \{X_{n,k} = j\}$.

Pour $j > n/2$, on sait que cette union est disjointe puisque seule une personne au plus du groupe peut être dans ce cas.

$$\text{D'où } P(D_j) = nP(X_{n,k} = j) = n \binom{n-1}{j} \left(\frac{1}{n-1}\right)^j \left(1 - \frac{1}{n-1}\right)^{n-1-j}.$$

Exercice 27.16 :

1°) La probabilité étant uniforme, $P(G) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$.

Choisir un élément de Ω revient à choisir l'ensemble A de ses arêtes avec les contraintes $\text{Card}(A) = m$ et $A \subset \{(i, j) / 1 \leq i < j \leq n\}$, donc cela revient à choisir m éléments parmi $N = \binom{n}{2}$. Ainsi $P(G) = \frac{1}{\binom{N}{m}}$.

2°) $i \sim j$ est donc l'ensemble des graphes de Ω possédant l'arête (i, j) . Choisir un tel graphe revient à choisir les $m - 1$ autres arêtes parmi les $N - 1$ arêtes disponibles.

$$\text{Ainsi } P(i \sim j) = \sum_{\omega \in (i \sim j)} P(\omega) = \frac{\text{Card}(i \sim j)}{\binom{N}{m}} = \frac{\binom{N-1}{m-1}}{\binom{N}{m}}, \text{ donc } P(i \sim j) = \frac{m}{N}.$$

3°) On suppose que $m, n \geq 3$, sans quoi l'espérance est nulle.

Notons K ce nombre de triangles, qui est donc une variable aléatoire de Ω dans \mathbb{N} .

On a $K = \sum_{\substack{\{x,y,z\} \subset S \\ x,y,z \text{ distincts}}} 1_{x \sim y, y \sim z, z \sim x}$, donc par linéarité de l'espérance,

$$E(K) = \sum_{\substack{\{x,y,z\} \subset S \\ x,y,z \text{ distincts}}} E(1_{x \sim y, y \sim z, z \sim x}) = \sum_{\substack{\{x,y,z\} \subset S \\ x,y,z \text{ distincts}}} P(x \sim y, y \sim z, z \sim x).$$

Le même argument utilisé en question 2 prouve que

$$P(x \sim y, y \sim z, z \sim x) = \frac{\binom{N-3}{m-3}}{\binom{N}{m}} = \frac{m(m-1)(m-2)}{N(N-1)(N-2)},$$

$$\text{donc } E(K) = \binom{n}{3} \frac{m(m-1)(m-2)}{N(N-1)(N-2)}.$$

Exercice 27.17 :

La théorie des familles sommables de réels positifs justifie les inégalités suivantes :

Pour $h \in \{1, \dots, k-1\}$, d'après la formule de transfert,

$$\begin{aligned}
E(|X|^h) &= \sum_{x \in X(\Omega)} |x|^h P(X = x) \\
&\leq \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ |x| \geq 1}} |x|^h P(X = x) + \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ |x| \leq 1}} |x|^h P(X = x) \\
&\leq \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ |x| \geq 1}} |x|^k P(X = x) + \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ |x| \leq 1}} |P(X = x)| \\
&\leq \sum_{x \in X(\Omega)} |x|^k P(X = x) + \sum_{x \in X(\Omega)} |P(X = x)| \\
&= E(|X|^k) + 1.
\end{aligned}$$

Exercice 27.18 :

1°) Y_i est à valeurs dans $\{0, 1\}$, donc $Y_i \sim \mathcal{B}(q)$, où $q = P(Y_i = 1) = P(X_i = X_{i+1} = 1) = p^2$ car X_i et X_{i+1} sont indépendantes. En conclusion, $Y_i \sim \mathcal{B}(p^2)$.

2°) Par linéarité de l'espérance, $E(Y) = \sum_{i=1}^{n-1} E(Y_i)$, or d'après le cours, $E(Y_i) = p^2$, donc $E(Y) = (n-1)p^2$.

3°) Si $n \leq 1$, $Y = 0$ et $V(Y) = 0$.
Si $n = 2$, $Y = Y_1$ et $V(Y) = V(Y_1) = p^2(1 - p^2)$.
Pour la suite, on suppose que $n \geq 3$.

D'après le cours, $V(Y) = \sum_{i=1}^{n-1} V(Y_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} \text{Cov}(Y_i, Y_j)$.

De plus, si $i, j \in \mathbb{N}_{n-1}$ avec $i + 1 < j$, alors $Y_i = X_i X_{i+1}$ et $Y_j = X_j X_{j+1}$ sont indépendantes d'après le lemme de coalition, donc $\text{Cov}(Y_i, Y_j) = 0$.

Ainsi, $V(Y) = (n-1)p^2(1 - p^2) + 2 \sum_{i=1}^{n-2} \text{Cov}(Y_i, Y_{i+1})$.

Soit $i \in \mathbb{N}_{n-2}$. D'après la formule de Koenig-Huygens, $\text{Cov}(Y_i, Y_{i+1}) = E(Y_i Y_{i+1}) - E(Y_i)E(Y_{i+1})$, donc, en tenant compte du fait que X_{i+1} est à valeurs dans $\{0, 1\}$, donc $X_{i+1}^2 = X_{i+1}$, on a $\text{Cov}(Y_i, Y_{i+1}) = E(X_i X_{i+1} X_{i+2}) - p^4$, mais $X_i X_{i+1} X_{i+2}$ est encore à valeurs dans $\{0, 1\}$, donc $E(X_i X_{i+1} X_{i+2}) = P(X_i X_{i+1} X_{i+2} = 1) = p^3$. Ainsi, $\text{Cov}(Y_i, Y_{i+1}) = p^3 - p^4$, puis $V(Y) = (n-1)(p^2 - p^4) + 2(n-2)(p^3 - p^4) = (n-1)p^2 + 2(n-2)p^3 - (3n-5)p^4$.

Exercice 27.19 :

$$\det(M) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n X_{\sigma(j), j},$$

donc par linéarité de l'espérance puis indépendance des $X_{\sigma(j), j}$,

$$E(\det(M)) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n E(X_{\sigma(j), j}) = 0.$$

Ainsi d'après la formule de Koenig-Huygens,

$$\text{Var}(\det(M)) = E([\det(M)]^2) = E\left(\sum_{\sigma, \sigma' \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\sigma') \prod_{j=1}^n X_{\sigma(j),j} X_{\sigma'(j),j}\right).$$

Soit $\sigma, \sigma' \in \mathcal{S}_n$ telle que $\sigma \neq \sigma'$:

$$E\left(\prod_{j=1}^n X_{\sigma(j),j} X_{\sigma'(j),j}\right) = E\left(\prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ \sigma(j) = \sigma'(j)}} X_{\sigma(j),j}^2 \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ \sigma(j) \neq \sigma'(j)}} X_{\sigma(j),j} X_{\sigma'(j),j}\right).$$

Le premier produit vaut 1 et le second est un produit non vide de variables aléatoires mutuellement indépendantes,

$$\text{donc } E\left(\prod_{j=1}^n X_{\sigma(j),j} X_{\sigma'(j),j}\right) = \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ \sigma(j) \neq \sigma'(j)}} E(X_{\sigma(j),j}) E(X_{\sigma'(j),j}) = 0.$$

$$\text{Ainsi, } \text{Var}(\det(M)) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma)^2 E\left(\prod_{j=1}^n X_{\sigma(j),j}^2\right) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} E(1) = n!.$$

Exercice 27.20 :

1°) Si l'on reprend la démonstration de la loi faible des grands nombres, l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne $P(|S_n - E(S_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\varepsilon^2}$, or $E(S_n) = E(X_1) = 0$

et $\text{Var}(S_n) = \frac{1}{n} \text{Var}(X_1)$ où $\text{Var}(X_1) = E(X_1^2) = 1$, donc $P(|S_n| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{n\varepsilon^2}$.

Avec $n = 10\,000$ et $\varepsilon = 0,1$, on obtient bien $P(|S_{10\,000}| \geq 0,1) \leq \frac{1}{100}$.

2°) Soit $t \in \mathbb{R}_+$:

$P(X \geq a) \leq P(e^{tX} \geq e^{ta})$, donc d'après l'inégalité de Markov,

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(e^{tX})}{e^{ta}} = e^{-ta+H(t)}, \text{ puis en travaillant dans } \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\},$$

$\ln[P(X \geq a)] \leq -ta + H(t)$, donc par passage à la borne inférieure,

$\ln[P(X \geq a)] \leq \inf_{t \geq 0} (-ta + H(t))$, ce qui permet de conclure.

3°) Soit $t \in \mathbb{R}_+$.

$$e^{H(t)} = E(e^{tS_n}) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{t}{n} X_i}\right), \text{ donc d'après l'indépendance mutuelle des } X_i,$$

$$e^{H(t)} = \prod_{i=1}^n E(e^{\frac{t}{n} X_i}), \text{ puis d'après la formule de transfert,}$$

$$e^{H(t)} = \prod_{i=1}^n \left(e^{-\frac{t}{n}} \times \frac{1}{2} + e^{\frac{t}{n}} \times \frac{1}{2}\right) = \left(\cosh\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n, \text{ donc } H(t) = n \ln \cosh\left(\frac{t}{n}\right).$$

4°) Les questions 2 et 3 donnent : $P(S_n \geq \varepsilon) \leq e^{\inf_{t \geq 0} (n \ln \cosh(\frac{t}{n}) - t\varepsilon)}$.

Supposons que $\varepsilon \in]0, 1[$. Posons $f_n(t) = n \ln \cosh(\frac{t}{n}) - t\varepsilon$:

$$f'_n(t) = \frac{\sinh \frac{t}{n}}{\cosh \frac{t}{n}} - \varepsilon = \tanh \frac{t}{n} - \varepsilon, \text{ donc } f'_n(t) = 0 \iff t = n \operatorname{arctanh} \varepsilon = \frac{n}{2} \ln \left(\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon} \right).$$

Posons $t_0 = n \ln \sqrt{\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}}$: $f'_n(t)$ est négatif entre 0 et t_0 puis positif, donc $\inf_{t \geq 0} f_n(t) = f_n(t_0) = n \ln(\operatorname{ch}(\operatorname{argth} \varepsilon)) - \varepsilon t_0$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} = 1 - \operatorname{th}^2 x$, donc $\operatorname{ch} x = \frac{1}{\sqrt{1 - \operatorname{th}^2 x}}$.

On en déduit que $\inf_{t \geq 0} f_n(t) = -\frac{n}{2} \left(\ln(1 - \varepsilon^2) + \varepsilon \ln \left(\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon} \right) \right)$.

Avec $n = 10\,000$ et $\varepsilon = 0,1$, on calcule $f_n(t_0) = -50,0837 \pm 10^{-4}$, donc $P(S_{10\,000} \geq 0,1) \leq 1,77 \times 10^{-22}$.

De plus $-S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (-X_i)$, mais $-X_i$ suit la même loi que X_i et les $-X_i$ sont mutuellement indépendantes, donc la question 3 est encore valable pour $X = -S_n$ et on en déduit $P(-S_{10\,000} \geq 0,1) \leq 1,77 \times 10^{-22}$.

Or $(|S_n| \geq 0,1) = (S_n \geq 0,1) \cup (-S_n \geq 0,1)$,

donc $P(|S_n| \geq 0,1) \leq P(S_n \geq 0,1) + P(-S_n \geq 0,1) \leq 3,6 \times 10^{-22}$.

On obtient ainsi une majoration bien meilleure que celle de la première question.

Exercice 27.21 :

$\left[\frac{1}{b-a} \int_a^b g(t) dt \right]$ désigne la valeur moyenne de $g(t)$ lorsque t décrit $[a, b]$. Il s'agit donc de montrer que l'image par f de la moyenne des $g(t)$ est inférieure à la moyenne des images par f des $g(t)$. Mais cette propriété est connue pour la moyenne d'un nombre fini de valeurs, d'après la convexité de f . Il reste à passer des sommes finies aux intégrales. C'est possible car une intégrale peut être vue comme limite de sommes finies.]

On sait que la somme de Riemann $\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n g(a + k \frac{b-a}{n})$ tend vers $\int_a^b g(t) dt$ lorsque n tend vers $+\infty$. De même, $\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f \circ g(a + k \frac{b-a}{n})$ tend vers $\int_a^b f \circ g(t) dt$. De plus, f est convexe, donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(a + k \frac{b-a}{n}) \right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(g(a + k \frac{b-a}{n}))$. f étant continue, lorsque l'on fait tendre n vers $+\infty$, on obtient l'inégalité de Jensen.

Exercice 27.22 :

[La présence d'une racine $n^{\text{ème}}$ et d'un produit nous incite à passer aux logarithmes.]

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons $x_n = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \left(1 + \left(\frac{k}{n} \right)^2 \right)}$ et $y_n = \ln(x_n)$.

$$y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \left(\frac{k}{n} \right)^2 \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f \left(\frac{k}{n} \right), \text{ où } f : \begin{array}{ccc} [0, 1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \ln(1 + x^2) \end{array}$$

y_n est une somme de Riemann, donc $y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t) dt$.

[Pour calculer cette intégrale, on gère la présence du logarithme en intégrant par parties.]

Intégrons par parties.

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(t)dt &= [x \ln(1+x^2)]_0^1 - \int_0^1 x \times \frac{2x}{1+x^2} dx \\ &= \ln(2) + \int_0^1 2\left(\frac{1}{1+x^2} - 1\right) dx \\ &= \ln(2) - 2 + 2[\arctan(x)]_0^1 \\ &= \ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

Ainsi, $y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ln(2\sqrt{e^\pi}e^{-2})$ or $x_n = e^{y_n}$, donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{e^\pi}}{e^2}$.

Exercice 27.23 :

1°) f étant continue sur le compact $K = [\frac{k\pi}{n}, \frac{(k+1)\pi}{n}]$, elle est bornée et elle atteint ses bornes. On peut donc noter $m = f(\alpha)$ le minimum de f sur K et $M = f(\beta)$ le maximum de f sur K . Alors

$$f(\alpha) \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx \leq \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x) |\sin(nx)| dx \leq f(\beta) \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx. \text{ Or } \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx > 0, \text{ en tant qu'intégrale d'une application continue positive et}$$

non identiquement nulle, donc le quotient $\frac{\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x) |\sin(nx)| dx}{\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx}$ est compris entre

$f(\alpha)$ et $f(\beta)$, mais f est continue, donc on peut appliquer le théorème des valeurs

intermédiaires : il existe $\alpha_k \in K$ tel que $\frac{\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x) |\sin(nx)| dx}{\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx} = f(\alpha_k)$.

En adaptant cette démonstration, on peut prouver la formule de la moyenne : Soit f et g deux applications de $[a, b]$ dans \mathbb{R} (avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $a < b$) telles que f est continue et g positive. Alors il existe $\gamma \in [a, b]$ tel que $\int_a^b f(t)g(t) dt = f(\gamma) \int_a^b g(t) dt$.

$$2^\circ) \int_0^\pi f(x) |\sin nx| dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x) |\sin(nx)| dx = \sum_{k=0}^{n-1} f(\alpha_k) \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx.$$

Soit $k \in \{0, \dots, n-1\}$. L'application $x \mapsto \sin(nx)$ étant de signe constant sur l'intervalle $[\frac{k\pi}{n}, \frac{(k+1)\pi}{n}]$, $\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx = \left| \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} \sin(nx) dx \right| = \left| \left[\frac{\sin(nx)}{n} \right]_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} \right| = \frac{2}{n},$

donc $\int_0^\pi f(x) |\sin nx| dx = \sum_{k=0}^{n-1} f(\alpha_k) \frac{2}{n} = \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\pi}{n} f(\alpha_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx$, d'après le cours sur les sommes de Riemann.