A vírusfertőzés után 5-9 nappal a korai ellenanyag, az IgM, a fertőzés után 10-12 nappal a késői ellenanyag, az IgG van jelen a vérben. Ezek szintje mutatható ki a teszttel, ujjbegyből vett vérből.

A szűrővizsgálat lépései:

- 1. Koronavírus laborteszt vizsgálatra az online felületen tud bejelentkezni, melyről visszaigazoló email-t fog kapni. A bejelentkezést követően megjelenő kérdőívet töltse ki és lehetőség szerint kinyomtatva hozza magával.
- 2. Kolléganőnk telefonon egyeztet Önnel egy időpontot..
- 3. Kérjük a vizsgálatra szájmaszkban érkezzen. Foglaljon helyet a váróban, ha a váróban van jelen más személy, legalább 1,5 m-es távolságot tartsanak egymás között.
- 4. A vizsgálóhelységbe való belépés előtt fertőtlenítse le a kezét, valamint ellenőrizzük a testhőmérsékletét. Csak szájmaszkban, normál hőmérséklet esetén léphet be.
- 5. A személyes adatait egyeztetjük, a korábban kitöltött és lehetőség szerint Ön által kinyomtatott kérdőívet és a beleegyező nyilatkozatot aláírja.
- 6. A vizsgálat árát lehetőleg banki átutalással vagy helyben bankkártyás fizetési módon térítheti meg. A számlát emailben vagy a vizsgálat végén kapja meg.
- 7. Alkoholos fertőtlenítés után az egyik ujjbegyét megszúrjuk. Az ujjbegyből vett vért a vizsgáló eszközbe cseppentjük. A szúrás helyét kötszerrel fedjük, majd a vizsgálóhelyiségből távozhat. A vizsgálat kb. 10 perc lesz.
- 8. Az eredményt 12 órán belül email címére kiküldjük. Írásban tájékoztatjuk Önt az aktuálisan hatályos eljárásrend szerint teendőkről.
- 9. Pozitív eredmény esetén a tényt, hogy a teszt pozitív eredményt igazolt az Ön személyes adataival együtt be kell jelentenünk a területileg illetékes járványügyi hatóság részére.

A LABORDIAGNOSZTIKA KECSKEMÉT a COVID-19 - koronavírus teszt elvégzése mellett, esetleges fertőzöttség esetén egyéb labordiagnosztikai tesztek elvégzésére is lehetőséget biztosít.

A CRP, prokalcitonin, ferritin, D-dimer laborparaméterek segítenek a klinikai progresszió értékelésében, súlyos és kritikus tendenciákra hívják fel a figyelmet alapot biztosítva a megfelelő kezelési tervhez.