



Autoantikörper gegen Caspr2

eine immunhistologische Analyse ihrer Auswirkungen im
zentralen Nervensystem

Seminarfacharbeit in den Spezialklassen mit
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Richtung der gymnasialen
Oberstufe

Autor/ -innen:	Johanna Hoppe Helene Becker Kushagr Sinha
Schule:	Carl-Zeiss-Gymnasium Jena
Abgabetermin:	07. Oktober 2026
Fachbetreuerinnen:	Frau Dr. Josefine Sell Frau Dr. Anja Strauß
Fachlehrerin:	Frau Sybille Weiß
Betreuerin:	Frau Dr. Annett Fiedler

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation und Zielsetzung	1
2	Grundlagen	3
2.1	Neurobiologische Grundlagen	3
2.2	Immunologische Grundlagen	8
2.2.1	Prinzipien der Immunabwehr	8
2.2.2	Mechanismen fehlgeleiteter Immunabwehr	10
3	Die Wirkung von Caspr2 am Axon und der Synapse	12
4	Autoimmune Enzephalitis und Caspr2	16
4.1	Definition und Krankheitsbild	16
4.2	Wirkungsweise der anti-Caspr2-Autoantikörper	21
5	Methodisches Vorgehen	23
5.1	Indirekte Immunfluoreszenz	23
5.2	Mikroskopieverfahren	25
6	Durchführung der praktischen Untersuchungen	29
6.1	Untersuchung zur Lokalisation von Caspr2 an Synapsen	30
6.2	Untersuchung zum Einfluss von humanen anti-Caspr2-Autoantikörpern auf die Proteininteraktion mit Contactin-2	33
6.3	Mikroskopieren und Bildanalyse	36
7	Ergebnisse und Auswertung	39
7.1	Kolokalisation von Caspr2 mit VGat und VGlut	39
7.2	Kolokalisation von Caspr2 und Contactin-2 nach der Behandlung mit pathogenen Antikörpern	44
8	Diskussion	47
9	Fazit und Ausblick	54

10 Literaturverzeichnis	56
11 Bildquellenverzeichnis	61

1 Motivation und Zielsetzung

Johanna Hoppe

Entzündungen des Gehirns (Enzephalitis) werden meist durch Bakterien oder Viren ausgelöst. Seltener ist eine Fehlreaktion des Immunsystems der Grund. Die Autoimmune Enzephalitis ist eine neurologische Erkrankung, die durch Autoantikörper (aAK) gegen neuronale Oberflächenproteine ausgelöst wird. Diese fehlgeleitete Immunreaktion des Körpers führt zu einer beeinträchtigten Signalweiterleitung am Axon und einer gestörten synaptischen Übertragung. Dies äußert sich durch Symptome wie Gedächtnisstörungen, psychiatrische Auffälligkeiten, oder Wesensveränderungen. Betroffene leiden außerdem häufig an epileptischen Anfällen, Halluzinationen, Schlafstörungen oder kognitiven Defiziten.¹

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der autoimmunen Caspr2-Enzephalitis, bei der aAK gegen das neuronale Protein Contactin-associated protein 2 (Caspr2) gebildet werden. Caspr2 bildet über die Bindung mit weiteren Proteinen im Nervensystem, unter anderem Contactin-2, Komplexe mit Kaliumionenkanälen, welche unter anderem für die Lokalisation der Kaliumionenkanäle in der Membran relevant sind. Bekannt ist bereits, dass Caspr2 für die funktionierende Signalweiterleitung durch das Axon von Bedeutung ist. Studien konnten Caspr2 2008 ebenfalls an Synapsen, den Verbindungsstellen zwischen zwei Nervenzellen, nachweisen.² Der Fokus dieser Arbeit liegt daher auf der Untersuchung von Caspr2 und der Wirkung von aAK gegen dieses Protein an den Synapsen des zentralen Nervensystems. In Zusammenarbeit mit Dr. Josefine Sell vom Universitätsklinikum Jena werden zwei Teiluntersuchungen durchgeführt.

Zum einen soll herausgefunden werden, ob Caspr2 eher an erregenden oder hemmenden Synapsen lokalisiert ist. Dazu werden an Hippocampuszellkulturen von Mäusen Doppelfärbungen kommerzieller Caspr2-Antikörper (AK) mit je einem der synaptischen Marker VGlut1 (für erregende Synapsen) und VGat (für hemmende Synap-

¹van Sonderen et al. 2017.

²Bakkaloglu et al. 2008.

sen) durchgeführt. Diese werden mithilfe hochauflösender Fluoreszenzmikroskopie analysiert und ausgewertet.

Im zweiten Teil wird untersucht, ob AK gegen Caspr2 die Interaktion zwischen Caspr2 und seinem Bindungspartner Contactin-2 stören. Dafür werden lebende neuronale Zellkulturen mit aus Patienten gewonnenen Caspr2-AK behandelt. Anschließend erfolgt eine Doppelfärbung von Caspr2 und Contactin-2, um mögliche Veränderungen in der Kolo-kalisation der beiden Proteine festzustellen.

Ziel dieser Seminarfacharbeit ist es, durch die Untersuchungen dazu beizutragen, ein besseres Verständnis für die Caspr2-assoziierte Enzephalitis zu entwickeln. Denn nur wenn die zugrundeliegenden Vorgänge im Gehirn genau verstanden werden, kann die Diagnostik und Behandlung der Erkrankung weiter optimiert werden.

2 Grundlagen

2.1 Neurobiologische Grundlagen

Johanna Hoppe

Um die Rolle bestimmter Proteine für die Signalweiterleitung in einer Nervenzelle zu verstehen, sollen der Aufbau einer Nervenzelle sowie der Prozess der Signalweiterleitung genauer betrachtet werden.

Die grundlegende Funktionseinheit des Nervensystems ist die Nervenzelle, auch Neuron genannt.




Abbildung 2.1: Aufbau einer Nervenzelle (Kaus 2026)

Ein Neuron besteht aus einem Zellkörper (Soma), welcher das Zellplasma, den Zellkern sowie weitere typische Zellorganellen enthält. Zwischen dem Zellinneren und dem äußeren Milieu gibt es unterschiedliche Ionenzusammensetzungen, die zum Teil von der Zelle aktiv aufrecht erhalten werden. Durch die unterschiedlichen positiven

und negativen Ladungen und den chemischen Gradienten entsteht an der Membran ein elektrisches Potential, das Membranpotential. Das Zellinnere ist dabei im Vergleich zum Zelläußeren negativ geladen, das Zelläußere positiv. Vom Zellkörper gehen Dendriten, verzweigte Fortsätze des Neurons, aus, die der Aufnahme eingehender Signale anderer Neuronen dienen. Sie leiten Signale elektrisch zum Zellkörper weiter. Am Übergang zum Axon, dem Axonhügel, werden alle eingehenden Signale summiert und Aktionspotentiale generiert. Diese werden über das Axon bis zu den synaptischen Endigungen weitergeleitet. Dort wird das ankommende elektrische Signal in ein chemisches Signal umgewandelt, indem Neurotransmitter in den synaptischen Spalt ausgeschüttet werden. Auf diese Weise wird die Information auf eine nachgeschaltete Nerven-, Muskel- oder Drüsenzelle übertragen.³

Ein Aktionspotential (siehe Abbildung 2.2) ist eine ein bis zwei Millisekunden anhaltende, markante Änderung des Membranpotentials der Zellmembran.⁴ Das Membranpotential ist die elektrische Spannung, die zwischen der Außen- und Innenseite der Zellmembran, aufgrund von Ladungsunterschieden, besteht.⁵ Alle Zellen bilden ein solches Membranpotential aus, jedoch können Neuronen ihr Membranpotential aktiv verändern. Man bezeichnet sie daher auch als erregbare Zellen. Im Ruhezustand weist die Membran der Nervenzelle ein negatives Ruhepotential auf, das ca. -70 Millivolt (mV) beträgt. Wird am Axonhügel der Zelle durch das Summieren der eingehenden Signale ein bestimmter Schwellenwert überschritten, welcher in der Regel bei -55 mV liegt, kommt es zur Öffnung spannungsgesteuerter Natriumionenkanäle. Der darauffolgende Einstrom von positiv geladenen Natriumionen in das Zellinnere führt zu einer Depolarisation, also einer Verschiebung des Membranpotentials in den positiven Bereich. Diese Depolarisation bewirkt die Öffnung weiterer Natriumionenkanäle, wodurch das Innere der Zelle rasant positiver wird. Dieser Vorgang folgt dem Prinzip der positiven Rückkopplung. Während sich die spannungsgesteuerten Natriumionenkanäle bei einer Depolarisation sehr schnell öffnen, gibt es eine zeitliche Verzögerung bis zur Öffnung der spannungsgesteuerten Kaliumionenkanäle. Infolgedessen strömen Kaliumionen aus dem Zellinneren in den extrazellulären Raum. Da die Natriumionenkanäle bereits wieder geschlossen sind, führt der Ausstrom der Kaliumionen zur Repolarisation der Membran. Durch ein verzögertes Schließen der Kaliumionenkanäle strömen eine kurze Zeit nach dem

³Campbell 1997, S. 1082–1083.

⁴Hircin et al. 2025.

⁵Antwerpes et al. 2025.

Erreichen eines Membranpotentials von -70 mV weitere Kaliumionen nach außen, was eine Hyperpolarisation bewirkt. Während der Hyperpolarisation kann die Zelle nicht erregt werden. Diese Zeit nennt man auch Refraktärzeit. Die Natrium-Kalium-Pumpe stellt anschließend das ursprüngliche, negative Ruhepotential wieder her.⁶




Abbildung 2.2: Verlauf eines Aktionspotentials (Winter 2014)

Das Aktionspotential breitet sich anschließend entlang des Axons aus. Das Axon ist häufig von einer Myelinscheide umgeben, die von spezialisierten Gliazellen gebildet wird. Die Myelinscheide dient als elektrische Isolierung und ist in regelmäßigen Abständen durch Ranvier-Schnürringe unterbrochen (siehe Abbildung 2.3). Die spannungsgesteuerten Natrium- und Kaliumionenkanäle sind dabei überwiegend an den Ranvier-Schnürringen konzentriert. Eine Depolarisation, die durch ein Aktionspotential an einem Ranvier-Schnürring ausgelöst wurde, breitet sich im Zellplasma aus und führt auch am nächsten Ranvier-Schnürring zur Öffnung spannungsgesteuerter Natriumionenkanäle. Dort wird nach dem zuvor beschriebenen Prinzip erneut ein Aktionspotential ausgelöst. Das Aktionspotential wird also durch die spannungsgesteuerten Ionenkanäle sequenziell nur an den Ranvier-Schnürringen neu generiert

⁶Campbell 1997, S. 1087–1089.

und so entlang des Axons bis zu den synaptischen Endigungen weitergeleitet, wobei die spannungsgesteuerten Kaliumionenkanäle für die Repolarisation verantwortlich sind. Dies bezeichnet man als saltatorische Erregungsleitung.⁷




Abbildung 2.3: Saltatorische Erregungsleitung (Campbell 1997)

Trifft ein Aktionspotential an der präsynaptischen Endigung ein, kommt es zur Depolarisation der Membran, was zur Öffnung spannungsgesteuerter Calciumionenkanäle führt. Der folgende Einstrom von Calciumionen führt zur Fusion der synaptischen Vesikel mit der präsynaptischen Membran und zur Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt. (siehe Abbildung 2.4)

⁷Campbell 1997, S. 1090–1091.




Abbildung 2.4: Aufbau und Funktionsweise einer chemischen Synapse (Nolte 2022)

Spannungsabhängige Kaliumionenkanäle des Typs Kv1 spielen eine wichtige Rolle bei der Repolarisation der Membran. Sie begrenzen die Dauer des Aktionspotentials und dadurch den Calciumioneneinstrom. So beeinflussen sie indirekt die Menge an freigesetzten Neurotransmittern. Je nach Art der freigesetzten Neurotransmitter unterscheidet man erregende (exzitatorische) und hemmende (inhibitorische) Synapsen. Zum Beispiel ist Glutamat ein wichtiger exzitatorischer Transmitter. Für den Transport von Glutamat in die synaptischen Vesikel ist das Vesikelprotein VGlut1 (Vesikulärer Glutamat-Transporter 1) verantwortlich. Daher dient VGlut1 als Marker für exzitatorische Synapsen. Das Protein VGat (Vesikulärer GABA/Glyzin-Transporter) hingegen transportiert inhibitorische Neurotransmitter wie Gammaaminobuttersäure (GABA) in die Vesikel und ist somit ein Marker für inhibitorische Synapsen.⁸

⁸Campbell 1997, S. 1092.

2.2 Immunologische Grundlagen

Kushagr Sinha

Bei den autoimmunen Enzephalitiden handelt es sich um entzündliche Erkrankungen des Gehirns, bei denen das Immunsystem fehlgeleitet ist und dadurch körpereigene Stoffe angreift (= autoimmun). Um diese autoimmune Krankheit und ihre Entstehung zu verstehen, wird in diesem Kapitel zunächst auf die wichtigsten Grundlagen des gesunden und des fehlgeleiteten Immunsystems eingegangen.

2.2.1 Prinzipien der Immunabwehr

Das Immunsystem des menschlichen Körpers ist ebenso wie das Nervensystem äußerst komplex. Seine Hauptaufgabe besteht darin, den Körper vor Viren, Bakterien und anderen körperfremden Stoffen zu schützen.⁹

Außerdem wird das Immunsystem in zwei Systeme unterteilt:

- das angeborene (unspezifische) Immunsystem
- das adaptive (spezifische) Immunsystem

Das angeborene Immunsystem wirkt im Falle eines Krankheitserregers als Erstes, am schnellsten und unspezifisch, also ohne Erkennung spezifischer Antigene, indem es auf allgemein charakteristische Strukturen der Erreger reagiert.¹⁰

Das adaptive Immunsystem hingegen reagiert langsamer als das angeborene, wirkt aber spezifisch gegen die Antigene der Erreger. Außerdem bildet es ein immunologisches Gedächtnis, um beim Wiederauftreten des Pathogens dieses schneller und besser bekämpfen zu können. Die zwei wichtigsten Zellen dabei sind die T-Lymphozyten und die B-Lymphozyten.¹¹

⁹Smith und Germolec 1999.

¹⁰Delves 2026.

¹¹Delves 2026.

T-Lymphozyten übernehmen vorwiegend regulatorische und zellvermittelte Funktionen. T-Helferzellen koordinieren die Immunantwort, indem sie durch die Ausschüttung von Zytokinen die Aktivierung anderer Immunzellen steuern. Zytotoxische T-Zellen sind hingegen in der Lage, virusinfizierte oder entartete Körperzellen gezielt zu zerstören. Die präzise Zusammenarbeit dieser verschiedenen Zelltypen ermöglicht eine effektive und kontrollierte Immunabwehr.

B-Lymphozyten differenzieren sich nach Aktivierung durch Antigenkontakt und Unterstützung durch T-Helferzellen zu Plasmazellen, welche große Mengen spezifischer AK produzieren. AK sind Proteine, die meist der Klasse der Immunglobuline G (IgG) angehören und eine charakteristische Y-förmige Struktur besitzen (siehe Abbildung 2.5). Die variablen Regionen an den Enden der AK ermöglichen eine hochspezifische Bindung an Antigene. Durch diese Bindung können Krankheitserreger neutralisiert oder für andere Immunzellen markiert werden.¹² (Antigen-AK-Reaktion)




Abbildung 2.5: Darstellung eines IgG-Antikörpers mit Beschriftung der strukturellen Regionen. (Reh 2024)

Damit beide Systeme miteinander kommunizieren können, gibt es dendritische Zellen. Diese gelten als Vermittler zwischen dem angeborenen und dem adaptiven Immunsystem. Sie erfüllen diese Aufgabe, indem sie Antigeninformationen von

¹²Antwerpes et al. 2024b; Hircin et al. 2024.

Erregern aufnehmen und diese dann an ihrer Oberfläche präsentieren. Dadurch werden Lymphozyten aktiviert, was wiederum zu einer spezifischen Immunantwort führt.¹³

Die IgG-Klasse umfasst vier Subklassen (IgG1 bis IgG4), die sich in ihrer Funktion unterscheiden. Während IgG1 und IgG3 oft Entzündungen durch das sogenannte Komplementsystem verstärken, nimmt IgG4 eine Sonderrolle ein: Es ist weniger entzündlich, neigt aber dazu, Bindungen zwischen Proteinen direkt zu blockieren.¹⁴

2.2.2 Mechanismen fehlgeleiteter Immunabwehr

Ein zentrales Merkmal eines funktionierenden Immunsystems ist die Fähigkeit zur Selbsttoleranz. Das bedeutet, dass körpereigene Strukturen unter normalen Bedingungen nicht als Ziel einer Immunreaktion erkannt werden. Diese Eigenschaft ist entscheidend, um autoimmune Prozesse zu verhindern.¹⁵

Kommt es zu einem Fehler bei der immunologischen Selbsttoleranz, greift das Immunsystem fälschlicherweise körpereigene Strukturen an. Dieser Vorgang wird als Autoimmunität bezeichnet. Erst wenn eine solche Reaktion zu messbaren Schäden an Organen oder Geweben führt und klinische Symptome aufweist, spricht man von einer Autoimmunerkrankung.¹⁶

T- und B-Zellen reifen aus Vorläuferzellen im Thymus (daher auch T-Zelle) beziehungsweise im Knochenmark (B für engl. Bone Marrow). Während ihrer Reifung werden sie durch Mechanismen der zentralen Toleranz auf ihre Reaktion gegenüber körpereigenen Antigenen kontrolliert. Reagieren die unreifen Zellen auf körpereigene Antigene, werden sie in der Regel eliminiert. Dieser Kontrollmechanismus minimiert das Auftreten von Autoimmunität, auch wenn einzelne autoreaktive Lymphozyten dieser Selektion entgehen können.¹⁷

Zusätzlich gibt es noch einen Selektionsprozess, die periphere Toleranz. Hierbei werden die T-Zellen gegen weitere Antigene getestet, die z. B. im Blut oder in

¹³Universitätsklinikum Heidelberg 2026b.

¹⁴Hircin et al. 2024; Antwerpes et al. 2024a.

¹⁵Smith und Germolec 1999.

¹⁶Fernandez 2025.

¹⁷Antwerpes und Hüting 2024; Antwerpes et al. 2024b.

Lymphknoten vorkommen. Dabei unterdrücken regulatorische T-Zellen mithilfe von hemmenden Botenstoffen die Aktivierung schädlicher Zellen oder lösen ihren Zelltod aus. Darüber hinaus kann die Zelle, wenn keine Entzündung vorliegt und sie somit keine kostimulatorischen Signale erhält, in einen Zustand der Inaktivität versetzt werden und somit keine Reaktion auslösen.¹⁸

Die beschriebenen Mechanismen der immunologischen Selbsttoleranz sind auch für das Verständnis der Caspr2-Enzephalitis relevant. Bei dieser Erkrankung richtet sich die Immunantwort gegen körpereigene Strukturen des Nervensystems, insbesondere gegen das Protein Caspr2.

¹⁸Macián et al. 2004; Antwerpes und Hüting 2024.

3 Die Wirkung von Caspr2 am Axon und der Synapse

Johanna Hoppe

Bei der beschriebenen Form der Erregungsleitung entlang des Axons spielen neben den spannungsgesteuerten Ionenkanälen (siehe Kapitel 2.1) auch weitere Proteine eine entscheidende Rolle.


Bereits 1999 wurde das Protein Caspr2 in den angrenzenden Bereichen der axonalen Schnürringe, den juxtaparanodalen Bereichen, beschrieben¹⁹ und seitdem weiter erforscht. Caspr2 ist ein Typ-I-Transmembranprotein, also ein integrales Protein, welches die Zellmembran nur einmal durchquert, und gehört zur Neurexin-Superfamilie. Diese ist eine Gruppe von Transmembranmolekülen, die Zell-Zell-Kontakte vermitteln und spezialisierte membranöse Domänen erzeugen. Caspr2 weist eine charakteristische Domänenstruktur auf, die in Abbildung 3.2 Teil B dargestellt ist. Dazu gehören unter anderem die Discoidin-Domäne (F58C) und die Laminin-Domänen (L1-L4), welche in Kapitel 6 der Arbeit erneut aufgegriffen werden.²⁰

Caspr2 ist am myelinisierten Axon unter anderem mit Contactin-2 Bestandteil eines Proteinkomplexes, dem voltage-gated potassium channels (VGKC)-Komplex, welcher in Abbildung 3.1 dargestellt ist. Dieser lokalisiert und verankert spannungsgesteuerte Kaliumionenkanäle des Typs Kv1 in der Axonmembran. Dabei interagiert Caspr2 extrazellulär mit Contactin-2, welches wie Caspr2 als Zelladhäsionsprotein wirkt. Dadurch trägt der Komplex entscheidend zur räumlichen Organisation der myelinisierten Axonmembran und zur Aufrechterhaltung einer effizienten saltatorischen Erregungsleitung bei. (siehe Kapitel 2.1) Eine Störung dieser Interaktion kann die korrekte Clusterbildung (gesteuerte Zusammenlagerung von Proteinmolekülen zu größeren Strukturen) und somit die Funktion der Kv1-Kanäle beeinträchtigen und zu neurologischen Symptomen, wie in Kapitel 4.1 beschrieben wird, führen.²¹

¹⁹Poliak et al. 1999.

²⁰Haklai-Topper et al. 2011; Cell Signaling Technology 2026.

²¹van Sonderen et al. 2017.



Nature Reviews | Neurology

Abbildung 3.1: Caspr2 am myelinisierten Axon (van Sonderen et al. 2017)

Zudem ist bekannt, dass Caspr2 während der Embryonalentwicklung bedeutsam ist und dort für die korrekte Verzweigung der Dendriten, die Ausbildung dendritischer Spines und das Axonwachstum mitverantwortlich ist. Fehlt Caspr2 durch eine genetische Veränderung, kann die Entwicklung der Nervenzellen beeinträchtigt sein. Eine Caspr2-Mutation wird beispielsweise mit Erkrankungen wie der Autismus-Spektrum-Störung oder Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) in Verbindung gebracht.²²

Neuere Studien zeigen, dass Caspr2 nicht nur am Axon lokalisiert ist, sondern auch an Synapsen vorkommt, was bisher jedoch deutlich weniger erforscht ist. Kv1-Kanäle sind bereits sicher an den präsynaptischen Membranen bekannt und sind dort an der Freisetzung von Neurotransmittern beteiligt (siehe Kapitel 2.1). Bereits 2008 konnten die Proteine Caspr2 und Contactin-2 biochemisch an synaptischen Membranen nachgewiesen werden.²³ In einer weiteren Studie aus dem Jahr 2015 wurde mithilfe von Immunfärbungen eine Überlappung von Caspr2 mit synaptischen Markern ex-

²²Canali und Goutebroze 2018.

²³Bakkaloglu et al. 2008.

zitatorischer und inhibitorischer Synapsen gezeigt. Dabei wurden die Marker VGlut für exzitatorische und GAD65 für inhibitorische Synapsen verwendet. Diese gelten als spezifische Markerproteine für den jeweiligen Synapsentyp. Unter anderem durch solche Ergebnisse wird davon ausgegangen, dass Caspr2 auch an präsynaptischen Membranen vorliegt.²⁴

Die Funktion von Caspr2 an der Synapse ist bislang nicht vollständig geklärt, ähnelt jedoch vermutlich der am Axon. Caspr2 bildet auch hier einen Proteinkomplex mit weiteren Molekülen wie Contactin-2. Wie dieser genau aufgebaut ist, ist noch unklar. Angenommen wird, dass dieser Komplex analog zum myelinisierten Axon die Kv1-Kanäle stabilisiert und lokalisiert. Darüber hinaus könnte der Caspr2-Contactin-2-Komplex an der Organisation synaptischer Strukturen beteiligt sein, indem er die Verbindung von Prä- und Postsynapse stabilisiert. Die Anordnung des Proteinkomplexes sowie die Organisation der einzelnen Domänen von Caspr2 sind wahrscheinlich andere als am Axon, da es sich hier um verschiedene Zellbereiche handelt. Weiterhin ist zu beachten, dass der synaptische Spalt kleiner ist als der extrazelluläre Raum zwischen Axon und Gliazelle. Entsprechend existieren unterschiedliche Hypothesen zur Organisation und Funktion von Caspr2 an der Synapse.²⁵ Teil C der Abbildung 3.2 veranschaulicht zwei mögliche Anordnungen des Proteins an der Synapse: zum einen eine vertikale Orientierung, die das Protein annehmen könnte, sowie eine mögliche horizontale Orientierung der Domänen. Je nachdem, wie das Protein ausgerichtet ist, wird seine Funktion unterschiedlich beeinflusst, da beispielsweise andere Interaktionen mit weiteren Proteinen möglich sind.²⁶

²⁴Pinatel et al. 2015.

²⁵Canali und Goutebroze 2018.

²⁶Canali und Goutebroze 2018.




Abbildung 3.2: Domänenorganisation von Caspr2. Verändert nach: (Canali und Goutebroze 2018)

4 Autoimmune Enzephalitis und Caspr2

Helene Becker

4.1 Definition und Krankheitsbild

Als Enzephalitis wird eine Entzündung des Gehirns bezeichnet. Je nach Ursache und Ausprägung der Symptome werden verschiedene Arten von Enzephalitiden unterschieden.

Enzephalitiden werden meist ausgelöst, indem ein Virus das Hirn direkt infiziert oder ein Virus, ein Impfstoff oder etwas anderes eine Entzündung auslöst. Als Folge einer Viruserkrankung kann so beispielsweise eine epidemische oder eine sporadische Enzephalitis entstehen. Ebenfalls kann (aus einer Virusinfektion oder aus der Reaktion von T-Zellen auf einen Tumor) eine autoimmune Enzephalitis (AE) entstehen.²⁷ Bei der AE handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der es zur fehlgeleiteten Immunabwehr gegen körpereigene neuronale Strukturen kommt.²⁸ Dabei werden AK gegen Antigene körpereigener Gewebe durch das Immunsystem hergestellt, jene werden dann als sogenannte aAK bezeichnet. Eine solche Autoimmunreaktion kann zu neuronalen Entzündungen und Gewebeschäden führen.²⁹

Der Begriff AE beschreibt eine Gruppe von Erkrankungen, die sich in verschiedenen Bereichen des zentralen und peripheren Nervensystem ausbilden. Jede Einzelne wird anhand der auslösenden aAK, die sich gegen bestimmte neuronale Strukturen bzw. Antigene richten, charakterisiert. Durch die vielfältigen Antigene gibt es ein breites Spektrum klinischer Symptome der AE, die von Wesensänderungen und kognitiven

²⁷Klein 2025.

²⁸Klein 2025; Fernandez 2025.

²⁹Fernandez 2025.

Störungen über epileptische Anfälle und Bewegungsstörungen bis hin zu vegetativen Funktionsstörungen und Bewusstseinsstörungen reichen können.³⁰

Sporadische AE werden in zwei Hauptformen unterschieden. Paraneoplastische Enzephalitiden werden durch aAK, sogenannte onkoneurale AK, gegen intrazelluläre Zielstrukturen (siehe Abbildung 4.1 A) ausgelöst und sind Tumor-assoziiert. aAK gegen neuronale Oberflächenantigene (siehe Abbildung 4.1 B) lösen eine sogenannte nicht-paraneoplastische Enzephalitis aus und sind eher selten mit Tumoren assoziiert. Eines dieser neuronalen Oberflächenantigene ist Caspr2.³¹




Abbildung 4.1: A: onkoneurale aAK richten sich gegen intrazelluläre Proteine. B: aAK gegen neuronale Oberflächenantigene. (Dalmau et al. 2017)

Generell verlaufen AE in der Regel zunächst subakut bis chronisch. Über den Langzeitverlauf von AE wurden bisher nur wenige Daten erhoben. Je nach Zeitpunkt der Diagnosestellung und des Therapiebeginns kommt es bei nicht-paraneoplastischen AE allerdings meist zur vollständigen oder teilweisen Erholung.³² Kurz nach der Akutphase sind die Genesungschancen für Patienten zwar am höchsten, dennoch lassen sich noch nach mehreren Jahren Verbesserungen der kognitiven Fähigkeiten

³⁰Heine et al. 2023, S. 525.

³¹Heine et al. 2023, S. 526–528.

³²Heine et al. 2023, S. 533.

verzeichnen.³³ Die durch T-Zellen vermittelte Immunreaktion (siehe Abbildung 4.1 A), welche paraneoplastische Enzephalitiden auslöst, richtet sich gegen intrazelluläre Zielproteine. Zellen im Gehirn werden zerstört und es entstehen irreversible Schäden.³⁴

Da sich diese Arbeit mit der Caspr2-AE befasst, werden im Folgenden zunächst die nicht-paraneoplastischen Enzephalitiden betrachtet.

Zur Diagnostik einer AE hilft die Zuordnung erhobener Befunde in Kategorien. Diese Befunde stammen unter anderem aus der klinischen Analyse der Symptome und möglicher Syndrome, Magnetresonanztomographie (MRT), Liquoranalyse, Elektroenzephalogramm (EEG) und AK–diagnostik. In Graus et al. (2016) findet sich ein klinischer Diagnosealgorithmus, der ausgehend vom Verdacht auf eine autoimmune Enzephalitis verschiedene klinisch charakterisierbare Syndrome, sowie AK–assoziierte und AK–negative Erkrankungen berücksichtigt.³⁵

Wie in Abbildung 4.2 zu erkennen ist, sollte bei Verdacht einer AE eine Diagnostik auf zugrundeliegende aAK initiiert werden. Dies sollte in Abhängigkeit von klinischen Syndromen und Zusatzbefunden (siehe oben) geschehen. Zwar kann die Diagnose einer AE ohne Nachweis von AK bei AE-typischen Veränderungen im Liquor, MRT und EEG sowie dem zusätzlichen Ausschluss wichtiger Differentialdiagnosen gestellt werden, allerdings führt erst der Nachweis von aAK zu einer sicheren Diagnose.³⁶

³³Heine et al. 2023, S. 534.

³⁴Universitätsklinikum Heidelberg 2026a.

³⁵Graus et al. 2016, S. 394.

³⁶Graus et al. 2016, S. 394; German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) 2026.




Abbildung 4.2: Vereinfachter schematischer Ablauf der Diagnose und Differentialdiagnose autoimmuner Enzephalitiden. (German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) 2026)

Die Therapie von AE sollte auch ohne bestätigten Antikörpernachweis frühestmöglich beginnen, um die fortschreitende Entzündung des Gehirns durch das Immunsystem zu verhindern. Dabei ist die Therapie in zwei Bereiche mit verschiedenen Therapiemöglichkeiten unterteilt. Die Erstlinientherapie, bspw. mit hochdosierten Steroiden, dient zunächst der Abschwächung der Immunreaktion. Um die Erkrankung langfristig unter Kontrolle zu bekommen, ist eine weitere Therapie mit Medikamenten, die gezielt AK-produzierende B-Zellen beseitigen, sinnvoll. Zusätzlich zu einer Immuntherapie erfolgt meist eine symptomatische Behandlung. Im Falle von Tumoren müssen diese zunächst entfernt oder behandelt werden. Es werden ebenfalls nichtmedikamentöse Maßnahmen, wie Physiotherapie oder neurologische Rehabilitation, zur Förderung der funktionalen Fähigkeiten, die zuvor durch die AE gemindert wurden, angeraten.³⁷ Einerseits, weil sich bei einzelnen AE auch nach mehreren Jahren Verbesserungen von kognitiven Funktionen erkennen lassen³⁸, andererseits weil selbst nach einer Verbesserung der Symptomatik ein Rückfall nicht auszuschließen ist.³⁹

AE werden nach den auslösenden aAK charakterisiert und benannt. Die Caspr2-Enzephalitis wird durch die anti-Caspr2-aAK ausgelöst. Sie geht häufig einher mit bestimmten Symptomen und Syndromen, die jedoch von Patient zu Patient variieren.⁴⁰

Dazu zählen:

- Übererregbarkeit des peripheren Nervensystems:
 - Neuromyotonie (Dies ist die Überaktivität der Nerven, welche die Muskelfasern anregen. Es entwickelt sich eine fortschreitende Versteifung der Muskeln, ein anhaltendes Muskelzittern sowie Zuckungen und Krämpfe.)⁴¹
 - neuropathische Schmerzen, sowie Gelenk-, Muskel- und Brustschmerzen
- limbische Enzephalitis

³⁷Heine et al. 2023, S. 533.

³⁸Heine et al. 2023, S. 534.

³⁹Lancaster 2016, S. 11.

⁴⁰van Sonderen et al. 2016, S. 525–526.

⁴¹Rubin 2024.

- Morvan-Syndrom (Kombination aus neuropsychiatrischen Symptomen [Schlafstörung, kognitive Defizite], autonomer Funktionsstörung [Störung von unwillkürlichen Körperprozessen, wie Herzschlag] und Neuromyotonie)
- Gewichtsverlust⁴²

Die meisten nicht-paraneoplastischen AE, so auch die Caspr2-Enzephalitis, gehen deutlich seltener mit Tumoren einher als paraneoplastische AE. Ist dies dennoch der Fall, dann handelt es sich meist um Tumore der Thymusdrüse.⁴³

Es lässt sich feststellen, dass überwiegend ältere Männer von der Caspr2-Enzephalitis betroffen sind, wobei das durchschnittliche Alter zum Zeitpunkt des Auftretens der Symptome 66 Jahre betrug.⁴⁴

4.2 Wirkungsweise der anti-Caspr2-Autoantikörper

Die anti-Caspr2-aAK binden an die extrazellulären Domänen von Caspr2, insbesondere an die Discoidin- und Laminin-1-Domänen.⁴⁵

Die AK der Klasse IgG4 lösen kaum Entzündungsreaktionen aus, sondern blockieren die Funktionen der Zielstrukturen, sodass beispielsweise die Bindung von Antigenen an andere Antigene verhindert wird.⁴⁶ Die IgG1-AK sind mit verstärkten Entzündungsreaktionen und Komplementaktivierung assoziiert.⁴⁷ Der Test auf IgG4 ist in der Studie von van Sonderen et al. (2016) in 100 % der Fälle, in denen die Caspr2-Enzephalitis auftrat, positiv ausgefallen. 63 % der Testergebnisse lieferten ein positives Ergebnis bei der IgG-Klasse IgG1. Dabei wurden 19 Patientinnen und Patienten bezüglich der IgG-Klasse der AK getestet.⁴⁸

⁴²van Sonderen et al. 2016, S. 523, 526; Heine et al. 2023, S. 527, 530.

⁴³Heine et al. 2023, S. 527, 530.

⁴⁴van Sonderen et al. 2016, S. 522–523, 526.

⁴⁵Olsen et al. 2015, S. 6.

⁴⁶Antwerpes et al. 2024a.

⁴⁷Mitrevski et al. 2026.

⁴⁸van Sonderen et al. 2016, S. 524.

Die Rückfallquote scheint ebenfalls hoch zu sein. In der klinischen Forschung von van Sonderen et al. (2016) liegt sie bei 25 %, wobei die Rückfälle bis zu sieben Jahren nach Auftreten der Erkrankung eingetreten sind.⁴⁹

Eine mögliche Hypothese ist, dass anti-Caspr2-aAK Caspr2 funktionell blockieren. Die Kaliumionenkanäle (Kv1.1/1.2), die normalerweise durch den VGKC-Komplex in den juxtaparanodalen Bereichen der Axone verankert sind, würden ihre räumliche Organisation verlieren.⁵⁰ Dieser Komplex ist bereits in Kapitel 3 Abbildung 3.1 dargestellt. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, sind Kaliumionenkanäle für die Repolarisation nach einem Aktionspotential essenziell. Bei gestörter Verankerung kommt es zu axonaler Hyperexzitabilität, die Neuronen werden also zu lange erregt.⁵¹ Dies könnte die Symptome Neuromyotonie, Übererregbarkeit und neuropathische Schmerzen aus Kapitel 4.1 erklären. Die Wirkung von anti-Caspr2-aAK an Synapsen ist noch wenig charakterisiert.

⁴⁹van Sonderen et al. 2016, S. 524.

⁵⁰Mitreviski et al. 2026; Patterson et al. 2018, S. 6–8.

⁵¹van Sonderen et al. 2016, S. 525–526.

5 Methodisches Vorgehen

Johanna Hoppe

5.1 Indirekte Immunfluoreszenz

Ein zentrales Verfahren dieser Arbeit ist die Immunhistochemie. Dies ist eine histologische Methode, mit der spezifische Zellstrukturen, beispielsweise Proteine, sichtbar gemacht werden. Diese Markierung basiert auf der Bindung von AK an ihre Zielstruktur und somit auf der Antigen-AK-Reaktion (siehe Kapitel 2.2). Eine spezielle Form der Immunhistochemie ist die Immunfluoreszenz mit indirekten Färbungen, welche in den folgenden Untersuchungen verwendet wird.⁵²

Im ersten Schritt der immunhistologischen Färbung wird ein Primär-AK auf die Zellstrukturen gegeben. Dieser bindet spezifisch an das Zielantigen (siehe Abbildung 5.1). Dabei unterscheidet man zwischen polyklonalen und monoklonalen AK. Polyklonale AK binden an verschiedene Epitope (Bindungsstellen) des Antigens, da sie eine Mischung mehrerer AK darstellen, während monoklonale AK spezifisch an ein einzelnes Epitop binden. Sie werden von nur einer Zelllinie produziert, die auf einen einzigen B-Lymphozyten zurückgeht.⁵³

Im nächsten Schritt bindet der Sekundär-AK spezifisch an den verwendeten Primär-AK. Zudem ist der Sekundär-AK mit einem Farbstoff gekoppelt, welcher unter dem Fluoreszenzmikroskop farbig sichtbar ist. Daher spricht man von einem fluoreszenzbasierten Detektionssystem. Durch den Nachweis des fluoreszierenden AK können somit die untersuchten Proteine dargestellt und beispielsweise ihre Lokalisation untersucht werden (siehe Abbildung 5.1).⁵⁴

⁵²Anderson et al. 2026.

⁵³Ostendorf et al. 2025; Nicolay et al. 2024.

⁵⁴Nicolay et al. 2024.




Abbildung 5.1: Prinzip der indirekten Immunfluoreszenz. Verändert nach: (Hoff 2022)

Für optimale Färbungsergebnisse ist darauf zu achten, die Fixierung der Zellen optimal sicherzustellen, geeignete Antikörper sorgfältig auszuwählen und unspezifische Hintergrundfärbungen zu minimieren. Letzteres wird unter anderem durch gründliche Waschschrte und geeignete Blockierungsschrte erreicht. Zudem müssen Negativkontrollen durchgeführt werden, um unspezifische Bindungen der AK auszuschließen. Auf diese Weise können die Auswertungen aussagekräftig und präzise durchgeführt werden.⁵⁵

Um eine Kolokalisation zweier Proteine bei der mikroskopischen Auswertung beurteilen zu können, müssen diese in einer Probe durch eine Doppelfärbung sichtbar gemacht werden. Dazu werden zwei verschiedene, jeweils proteinspezifische Primär-AK eingesetzt. Dabei ist zu beachten, dass diese aus zwei unterschiedlichen Spezies stammen. Für wissenschaftliche Zwecke werden die AK in Tieren generiert, indem sie das Antigen gespritzt bekommen, was eine gezielte Immunreaktion auslöst (siehe Kapitel 2.2). Dadurch werden spezifische Antikörper produziert. Die Sekundär-AK sind jeweils spezifisch gegen die Spezies des Primär-AK gerichtet, weshalb die Wahl von zwei unterschiedlichen Spezies die eindeutige Zuordnung der Signale ermöglicht und Kreuzreaktionen vermeidet. Zudem muss bei einer Doppelfärbung beachtet werden, dass sich die an die Sekundär-AK gekoppelten Fluoreszenzfarbstoffe ausreichend unterscheiden, damit es zu keiner Überlagerung der Signale kommt. Dies bedeutet, dass die Spektren, in denen die Farbstoffe fluoreszieren, nicht stark

⁵⁵Anderson et al. 2026.

überlappen dürfen. Diese Spektren ergeben sich aus der jeweiligen Anregungs- und Emissionswellenlänge.⁵⁶

Die Methode der indirekten Immunfluoreszenz wurde gewählt, da sie eine Untersuchung der räumlichen Verteilung spezifischer Proteine innerhalb von Nervenzellen ermöglicht. Dies ist für die vorliegenden Untersuchungen von Bedeutung, da die Lokalisation von Proteinen an den synaptischen Strukturen untersucht werden soll. Durch die Doppelfärbung von Caspr2 und den synaptischen Markern VGlut und VGat (siehe Kapitel 6.1) beziehungsweise Contacin-2 (siehe Kapitel 6.2) lässt sich feststellen, inwiefern sich deren Signale räumlich überlagern. Auf diese Weise kann untersucht werden, ob Caspr2 sowohl an exzitatorischen als auch an inhibitorischen Synapsen lokalisiert ist und ob AK gegen Caspr2 die Kolokalisation von Caspr2 und Contacin-2 beeinflussen.

5.2 Mikroskopieverfahren

Zur mikroskopischen Auswertung der Proben wurden die Methoden Widefield Fluorescence Microscopy (WF) und Structured Illumination Microscopy (SIM) angewendet. Die WF Mikroskopie ist ein fluoreszenzmikroskopisches Verfahren, bei dem das gesamte betrachtete Sichtfeld gleichzeitig mit Anregungslicht beleuchtet wird. Dabei werden Fluorophore in der Probe durch Licht einer geeigneten Wellenlänge angeregt. Nach der Anregung emittieren sie Licht mit einer längeren Wellenlänge. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der aufgenommenen Energie in Form von Schwingung oder Wärme an die Umgebung abgegeben wird. Dadurch steht für die Lichtemission weniger Energie zur Verfügung, wodurch das emittierte Licht eine geringere Wellenlänge als das Anregungslicht aufweist. Eine zentrale Komponente der WF Mikroskopie ist der dichroitische Spiegel (oder Strahlteiler). Dieser befindet sich zwischen Lichtquelle und Mikroskopobjektiv und erfüllt eine wichtige Trennfunktion (siehe Abbildung 5.2). Das Anregungslicht wird vom Strahlteiler in Richtung Probe reflektiert, während das von den Fluorophoren emittierte Licht den Strahlteiler passieren kann. Die Eigenschaften des Strahlteilers müssen daher auf die verwendeten Fluorophore abgestimmt sein, damit das Anregungslicht möglichst

⁵⁶Hackenberg 2005.

effizient zur Probe gelangt und gleichzeitig das Fluoreszenzlicht zur Detektion weitergeleitet wird. Der Emissionsfilter isoliert Fluoreszenzemissionen und blockiert unerwünschte Wellenlängen. Das Mikroskopobjektiv wirkt zunächst als Kondensator und fokussiert das Licht auf die Probe. Zudem sammelt es das von den Fluorophoren ausgesendete Fluoreszenzlicht und bildet dieses auf einer Kamera ab.⁵⁷




Abbildung 5.2: Widefield Fluorescence Microscopy (Kiderlen 2026)

Die SIM ist eine Methode der Fluoreszenzmikroskopie, mit der die Auflösung eines Lichtmikroskops verbessert werden kann. Im Gegensatz zur WF Mikroskopie wird die Probe nicht gleichmäßig, sondern mit einem definierten, regelmäßigen Streifen-

⁵⁷Kiderlen 2026.

muster beleuchtet. Dieses Muster entsteht durch die Interferenz von Laserstrahlen, die mithilfe eines Beugungsgitters erzeugt werden (siehe Abbildung 5.3).




Abbildung 5.3: Structured Illumination Microscopy (Oxford Instruments 2025)

Sehr kleine Strukturen weisen hohe räumliche Frequenzen auf. Diese liegen teilweise außerhalb des Frequenzbereichs, den das Mikroskop aufgrund seiner begrenzten Auflösung übertragen kann. Durch die Überlagerung der hochfrequenten Strukturen der Probe mit dem bekannten Beleuchtungsmuster entstehen jedoch zusätzliche Frequenzanteile. Dabei wird ein Teil der ursprünglich nicht direkt erfassbaren hochfrequenten Information in einen niedrigeren Frequenzbereich verschoben, der vom Mikroskop detektiert werden kann. Im aufgenommenen Bild erscheint diese Wechselwirkung zwischen dem bekannten Beleuchtungsmuster und den Strukturen der Probe als sogenanntes Moiré-Muster. Um möglichst viele Informationen über die Probe zu erhalten, wird das Beleuchtungsmuster in verschiedene Richtungen gedreht und verschoben (siehe Abbildung 5.3). Bei der 2D-SIM werden dafür typischerweise neun Einzelaufnahmen aufgenommen. Anschließend werden die Einzelaufnahmen

mithilfe von Computersoftware zu einem Bild verarbeitet.⁵⁸

Neben der WF Mikroskopie wurde die SIM eingesetzt, da die höhere räumliche Auflösung der SIM für die Fragestellungen der Arbeit von Bedeutung ist. Die Wide Field Mikroskopie ermöglicht zwar eine Darstellung der fluoreszenzmarkierten Proteine, weshalb sie sich grundsätzlich zur Untersuchung der Proben eignet. Jedoch kommt es bei sehr kleinen oder dicht beieinander liegenden Strukturen dazu, dass sich ihre Fluoreszenzsignale nicht eindeutig voneinander unterscheiden lassen, da die Ränder verschwommen erscheinen können. Dies ist bei der Untersuchung der Kollokalisierung zu beachten, da eine scheinbare Überlagerung von Signalen nicht zwangsläufig einer tatsächlichen räumlichen Übereinstimmung der untersuchten Strukturen entspricht. Durch den Einsatz der SIM können die fluoreszenzmarkierten Strukturen detaillierter dargestellt und die Kollokalisationsflächen dadurch genauer untersucht werden. Die zusätzliche Verwendung der WF Mikroskopie ermöglicht einen größeren Überblick über die Zellproben mit schneller Aufnahmegeschwindigkeit. Bei beiden Methoden ist jedoch zu beachten, dass in dreidimensionalen Strukturen auch Zellteile tieferer Ebenen fluoreszieren können.⁵⁹

⁵⁸Oxford Instruments 2025.

⁵⁹Oxford Instruments 2025.

6 Durchführung der praktischen Untersuchungen

Kushagr Sinha

Der experimentelle Teil lässt sich in zwei Versuche gliedern:

1. **Lokalisation von Caspr2 an Synapsen:** Das Ziel war es, die Caspr2-Proteine sowohl an erregenden als auch an hemmenden Synapsen zu lokalisieren.
2. **Einfluss von Caspr2-Antikörpern auf die Protein-Interaktion:** Spezifisch wurde untersucht, ob die Interaktion zwischen Caspr2 und dem Protein Contactin-2 durch Caspr2-AK, die gegen die Discoidin- beziehungsweise Laminin-G1-Domäne gerichtet sind, gestört wird.

Um die Experimente beginnen zu können, wurden zunächst Gehirnzellkulturen, spezifisch Hippocampus-Neuronenkulturen, benötigt. Hierfür wurden aus einer trächtigen Maus die Embryonen entnommen, dekapitiert und die Zellen aus der Hippocampus-Region des Gehirns isoliert.

Um die Zellen aus dem dichten Gewebe voneinander zu trennen und zu vereinzeln, wurden sie zuerst mit dem Enzym Trypsin behandelt. Trypsin spaltet die Peptidverbindungen zwischen den Zellen und lockert somit das Gewebe auf, damit die Zellen beim anschließenden Triturieren (dem mechanischen Vereinzeln durch Auf- und Abpipettieren der Gewebestücke) nicht beschädigt werden. Nach ca. fünf Minuten wurde das Gewebe mit einem Medium (HBSS) gewaschen. Dazu wurde die Lösung hinzugegeben, kurz einwirken gelassen und anschließend wieder abpipettiert. Dadurch wurde das Enzym entfernt und die Enzymaktivität beendet.

Durch diesen Vorgang entstand eine Zellsuspension, wobei die Zellen einzeln im Medium schwebten (= Suspension). Mithilfe einer Zählkammer und entsprechender Berechnungen wurde diese mit einem Medium verdünnt, um die gewünschte

Zelldichte von ca. 20.000 Zellen/cm² zu erreichen. Im Anschluss wurden die Zellen auf zuvor mit Poly-D-Lysin, welches eine haftende Oberfläche für die Zellen schafft, beschichtete Deckgläschen verteilt. Damit die Zellen dann ein neuronales Netzwerk ausbildeten, wurden diese mit einem Neurobasal-Medium (NB), das unter anderem Nährstoffe und Wachstumsfaktoren enthält, versetzt und für 14 Tage im Brutschrank bei 37 °C inkubiert.

6.1 Untersuchung zur Lokalisation von Caspr2 an Synapsen

Der gesamte Prozess zur Immunfärbung der Zellkulturen erstreckte sich über drei Tage. Insgesamt wurden elf Deckgläschen verwendet (siehe Tabelle 6.1), welche in verschiedene Versuchsgruppen unterteilt wurden.

Am ersten Tag wurden die Zellen vor Beginn der Färbungen 20 Minuten lang mit einer 4 %igen PFA-Lösung behandelt und dadurch fixiert. Fixieren bedeutet, die Proteine chemisch zu stabilisieren und den aktuellen Zustand der Zelle zu konservieren; allerdings stirbt die Zelle dabei. Daraufgehend wurden sie drei Mal mit PBS (phosphatgepufferte Salzlösung) gewaschen (siehe Abbildung 6.1). PBS wurde hierbei als Waschlösung verwendet, da es eine isotonische, nicht-toxische Lösung ist, die den pH-Wert stabilisiert und die Zellen schont.

Nachdem die Zellen gewaschen worden waren, wurde der Puffer B1 aufgetragen, welcher aus 10 %iger BSA-Lösung (Rinderserumalbumin) und 10 %iger NDS-Lösung (normales Eselserum) bestand und als Blockierungslösung diente. Durch die Blockierung wurden unspezifische Bindungsstellen auf den Deckgläschen und den Zellen besetzt. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass die später hinzugefügten AK nur an ihre spezifischen Zielproteine binden und keine störende Hintergrundfluoreszenz verursachen.

Nach einer Stunde Einwirkzeit wurde der Puffer B1 abpipettiert und die ersten Primär-AK (Caspr2 bzw. der Kontrollantikörper) hinzugefügt. Die Präparate wurden anschließend über Nacht bei 4 °C inkubiert.

Tabelle 6.1: Übersicht der elf Proben des ersten Versuches.

Nr. Färbung	Nr. Färbung	Nr. Färbung
(1) Caspr2 + VGlut1	(5) Caspr2 + VGat	(9) Kontrolle + VGlut1
(2) Caspr2 + VGlut1	(6) Caspr2 + VGat	(10) Kontrolle + VGat
(3) Caspr2 + VGlut1	(7) Caspr2 + VGat	(11) Negativkontrolle (nur SEK1+2)
(4) Caspr2 + VGlut1	(8) Caspr2 + VGat	



Abbildung 6.1: Vorgang des Fixierens und Waschens (Eigene Aufnahme 2026)

Am zweiten Tag wurden die Deckgläschen in eine Feuchtekammer transferiert. Dies war notwendig, damit die geringen Mengen an AK-Lösung während der Einwirkzeit nicht verdunsteten und somit die Zellen nicht austrockneten. Die Kammer bestand aus einer Plastikbox mit angefeuchteten Papiertüchern als Untergrund (siehe Abbildung 6.2).



Abbildung 6.2: Feuchtekammer (Eigene Aufnahme 2026)

Nach sechsmaligem Waschen mit PBS wurden die ersten Sekundär-AK, AF647@sheep, hinzugegeben. Die Bezeichnung „AF647“ gibt an, dass der Fluoreszenzfarbstoff sein Anregungsmaximum bei einer Wellenlänge von 647 nm hat. Das Emissionsmaximum liegt im fernroten Bereich bei ca. 665–672 nm. „Sheep“ bezeichnet hingegen die Spezies, gegen die der Sekundär-AK gerichtet ist. Da der erste Primär-AK gegen Caspr2 gerichtet ist und aus dem Schaf stammt, bindet der gegen Schaf gerichtete Sekundär-AK an diesen Primär-AK. Nach einer Inkubationszeit von zwei Stunden wurden die Deckgläschen erneut sechsmal mit PBS gewaschen.

Wichtige Proteine von Synapsen sind VGlut und VGat. Da sich diese allerdings nicht auf der Membranoberfläche, sondern im Inneren der Zelle befinden, musste erst ein Zugang durch die fixierte Zellmembran geschaffen werden, damit die AK daran binden konnten.

Hierfür wurde die Pufferlösung B2 hergestellt. Diese bestand aus der B1-Lösung und zusätzlich dem Detergenz Triton. Triton wirkt ähnlich wie Seife und kann Fette lösen. Da die Zellmembran aus einer Lipiddoppelschicht besteht, interagiert Triton mit den Lipiden (Fette) und löst diese teilweise. Dadurch wird die Struktur der Zellmembran gestört und ihre Permeabilität erhöht. Vereinfacht gesagt „wäscht“ Triton dabei kleine Öffnungen in die Membran. So konnten die VGlut- und VGat-

AK, die in Meerschweinchen gezüchtet wurden, in das Zellinnere gelangen und an ihre Zielstrukturen binden. Die Zugabe der VGlut- und VGat-AK erfolgte nach der Puffer-Behandlung mit anschließender Inkubation über Nacht bei 4 °C.

Am dritten Tag wurden die Präparate wieder sechsmal mit PBS abgewaschen, und es folgte die Zugabe der zweiten Sekundär-AK, CF488@gp. Dieser AK war gegen Meerschweinchen-AK (also in diesem Fall gegen VGlut- und VGat-AK) gerichtet und mit dem Fluoreszenzfarbstoff CF488 markiert, wodurch die entsprechende Färbung im grünen Fluoreszenzbereich sichtbar wurde. Nach einer Inkubationszeit von zwei Stunden wurden die Präparate erneut sechsmal mit PBS gewaschen.

Anschließend wurde DAPI hinzugefügt, eine Lösung, die den Zellkern anfärbt, indem sie mit der darin vorhandenen DNA interagiert. Damit wurde erzielt, dass die Zellen während der mikroskopischen Untersuchungen leichter zu identifizieren waren.

Nach drei weiteren Waschschritten wurden die Präparate für zehn Minuten mit einer 4%igen PFA-Lösung fixiert, damit sie über Monate hinweg mikroskopiert werden konnten. Nach einem letzten Waschschriff waren die Präparate fertig für die Eindeckung.

6.2 Untersuchung zum Einfluss von humanen anti-Caspr2-Autoantikörpern auf die Proteininteraktion mit Contactin-2

Im zweiten Versuchsteil wurde untersucht, ob die Bindung humaner Caspr2-AK die Interaktion zwischen Caspr2 und dem Bindungspartner Contactin-2 beeinträchtigt oder blockiert. Der Ablauf gliederte sich erneut in drei Tage.

Zu Beginn des ersten Tages des Versuches wurde zur Vorbereitung NB auf 37 °C erwärmt. Damit konnten die verschiedenen Ansätze mit humanen monoklonalen Caspr2-AK gegen die Discoidin- bzw. Laminin-1-Domäne hergestellt werden. Zusätzlich wurde ein Kontrollantikörper (mgo53) verwendet.

Nachdem diese Primär-AK mit dem Neurobasal-Medium auf die benötigte Konzentration verdünnt worden waren, wurden jeweils 500 µl in jedes Well pipettiert.

Die behandelten Neuronenkulturen wurden anschließend für 24 Stunden bei 37 °C inkubiert. Insgesamt entstanden zwölf Proben, die in Tabelle 6.2 dargestellt sind.

Tabelle 6.2: Versuch 2: Effekt auf Contactin-2 Bindung (monoklonal Caspr2: Discoidin (PRIM1.1) / Laminin1).

Nr.	Färbung	Nr.	Färbung	Nr.	Färbung
(1)	Discoidin + Contactin-2	(5)	Laminin1 + Contactin-2	(9)	Control + Contactin-2
(2)	Discoidin + Contactin-2	(6)	Laminin1 + Contactin-2	(10)	Control + Contactin-2
(3)	Discoidin + Contactin-2	(7)	Laminin1 + Contactin-2	(11)	negative control (nur SEK1+2)
(4)	Discoidin + Contactin-2	(8)	Laminin1 + Contactin-2	(12)	negative control (nur SEK1+2)

Am zweiten Tag der Färbung wurden die Neuronen auf den Deckgläschen zunächst dreimal kurz mit auf 37 °C erwärmtem NB gewaschen. Anschließend wurden die Zellen für 20 Minuten bei Raumtemperatur mit einer 4 %igen PFA-Lösung behandelt. Nach der Fixierung folgte ein dreimaliger Waschschriff mit PBS für jeweils 5 Minuten, um Reste des Fixiermittels zu entfernen.

Zur Vermeidung unspezifischer AK-Bindungen wurden die Präparate für eine Stunde bei Raumtemperatur mit dem Puffer B1 inkubiert. Dieser bestand aus einer Mischung aus 10 %iger BSA-Lösung und 10 %igem NGS (normales Ziegenserum) in PBS. Das NGS diente dabei, analog zum NDS im ersten Versuch, der Blockierung unspezifischer Bindungsstellen.

Da die Zellen bereits mit humanen Caspr2-AK behandelt worden waren, folgte im nächsten Schritt direkt die Zugabe des ersten Sekundär-AK. Hierfür wurde der Puffer SEK1, bestehend aus 1 %iger BSA-Lösung, 1 %iger NGS-Lösung und dem AK CF640R@hu, aufgetragen und für zwei Stunden bei Raumtemperatur inkubiert. Der AK CF640R@hu ist spezifisch gegen humane AK gerichtet und trägt den Fluoreszenzfarbstoff CF640R (Anregungswellenlänge bei 640 nm, Emission ebenfalls im fernroten Bereich). Hiermit konnten die gebundenen humanen Caspr2-AK fluoreszenzmikroskopisch sichtbar gemacht werden.

Nach der Inkubation wurden die Deckgläschen sechsmal mit PBS gewaschen, jeweils für fünf Minuten. Daraufhin wurde der Puffer PRIM2 aufgebracht. Dieser enthielt

den gegen Contactin-2 gerichteten Primär-AK, der in Kaninchen gezüchtet wurde, sowie 1 %ige BSA-Lösung und 1 %ige NGS-Lösung. Die Inkubation erfolgte dann über Nacht bei 4 °C in der Feuchtekammer.

Am darauffolgenden Tag wurden die Proben erneut sechsmal für jeweils 5 Minuten mit PBS gewaschen, um ungebundene Contactin-2-AK zu entfernen. Im Anschluss wurde der zweite Sekundär-AK über den Puffer SEK2 (1 %ige BSA-Lösung, 1 %ige NGS-Lösung und CF568@rb) hinzugegeben. Dieser AK bindet an Kaninchen-AK und fluoresziert durch den Farbstoff CF568 in roter Farbe. Die Inkubationszeit betrug zwei Stunden bei Raumtemperatur.

Nach einem erneuten sechsmaligen Waschschrift mit PBS wurde DAPI für fünf Minuten hinzugegeben. DAPI diente erneut als Orientierungshilfe bei der Mikroskopie. Nach drei kurzen Waschschriften mit PBS wurden die Präparate nochmals für 10 Minuten bei Raumtemperatur mit einer 4 %igen PFA-Lösung nachfixiert, um die gebildeten AK-Protein-Komplexe dauerhaft zu stabilisieren.

Nach drei finalen kurzen Waschschriften mit PBS wurden die Deckgläschen aus dem ersten sowie dem zweiten Versuch schließlich mit dem Eindeckmedium Fluoromount auf Objektträgern eingedeckt (siehe Abbildung 6.3). Fluoromount schützt die Präparate vor dem Austrocknen und verhindert das Ausbleichen der Fluoreszenzfarbstoffe. Nach dem Härten über Nacht konnte mit der Mikroskopie begonnen werden.



Abbildung 6.3: Eindecken der Präparate (Eigene Aufnahme 2026)

6.3 Mikroskopieren und Bildanalyse

Um die hergestellten Proben zu mikroskopieren und optisch zu erfassen, wurde ein SIM-Mikroskop des Typs Elyra 7 (Carl Zeiss Microscopy GmbH) verwendet. Das Mikroskop besitzt zwei sCMOS-Kameras (scientific complementary metal-oxide-semiconductor), mit denen die Fluoreszenzaufnahmen erfasst wurden.

Für die Aufnahmen wurden zwei verschiedene Objektive genutzt. Zuerst wurden mit einem 20x-Plan-Apochromat-Objektiv bei Luftimmersion, wobei sich nur Luft zwischen der Linse und dem Deckglas befand, Übersichtsaufnahmen gemacht. Für die detaillierte Darstellung der Dendriten und Synapsen wurden ein 63x-Ölimmersionsobjektiv sowie die Aufnahmeverfahren von SIM und WF verwendet. Ölimmersion bedeutet, dass ein Tropfen Immersionsöl zwischen die Linse und das Deckglas gegeben wird. Da das Öl einen nahezu identischen Brechungsindex wie das Deckglas besitzt, werden störende Lichtbrechungen an den Übergangsflächen und Lichtstreuung reduziert. Dadurch werden optische Abbildungsfehler minimiert und eine möglichst hohe Auflösung erreicht.

Die Steuerung des Mikroskops sowie die Berechnung der Aufnahmen erfolgten mit der Software ZEN (Zeiss). Tabelle 6.3 zeigt die Laser, deren Leistung und Bestrahlungsdauer, die zur Anregung der verwendeten Fluoreszenzfarbstoffe eingesetzt wurden.

Tabelle 6.3: Übersicht der verwendeten Laser-Einstellungen, Fluoreszenzfarbstoffe und Zielstrukturen.

Anregungs- wellenlänge	Fluoreszenz- farbstoff / AK	Zielstruktur / Protein	Leistung	Belichtung
405 nm	DAPI (blau)	Zellkerne	1,0 %	15 ms
488 nm	CF488 Sekundär- AK (grün)	VGlut1 / VGat	2,6 %	50 ms
561 nm	CF568 Sekundär- AK (rot)	Contactin-2	1,0 %	50 ms
640 nm	Alexa-Fluor 647 / CF640R Sekundär-AK (fernrot)	Caspr2	1,0 %	50 ms

Die Laserleistungen sowie Bestrahlungszeiten wurden absichtlich auf einem Minimum gehalten, um Photobleaching (das Ausbleichen bzw. die Zerstörung der Fluorophore bei zu langer oder starker Bestrahlung) zu verhindern und somit eine erneute Verwendung der Präparate zu ermöglichen.

Für die quantitative Auswertung wurden ausschließlich die SIM-Datensätze genutzt. Die Auswertung erfolgte über die Bildanalysesoftware Imaris. Zur Kollisionsanalyse wurde für jeden Fluoreszenzkanal ein Helligkeitsgrenzwert festgelegt, damit nur echte Signale und kein Hintergrundrauschen berücksichtigt wurden. Anschließend wurden in den Bildern nur die Bereiche definiert, in denen sich die Zellfortsätze befanden, um Bereiche ohne Zellsignale auszuschließen.⁶⁰

Die Software prüfte dann Pixel für Pixel, an welchen Stellen beide Proteine gleichzeitig nachweisbar waren, und berechnete daraus Werte wie den prozentualen Überlappungsanteil und die gemeinsame Signalfäche. Die Nutzung von Imaris ist in Abbildung 6.4 zu sehen, wobei die weißen Flächen die Überlappungsflächen zeigen.⁶¹

⁶⁰Dunn et al. 2011.

⁶¹Dunn et al. 2011.




Abbildung 6.4: Imaris Software mit Beispiel (Eigene Aufnahme 2026)

Die daraus gewonnenen Messwerte der Kolokalisationsflächen dienen der Erstellung der Graphen und der statistischen Auswertung.

7 Ergebnisse und Auswertung

Helene Becker

7.1 Kolokalisation von Caspr2 mit VGat und VGlut

Zur Untersuchung der synaptischen Lokalisation von Caspr2 wurden Caspr2 und die synaptischen Marker VGat und VGlut angefärbt. Ein Beispiel für die Doppelfärbung ist in Abbildung 7.1 A und B bzw. C und D zu finden. Hier ist ebenfalls der Vergleich zwischen WF- (siehe Abbildung 7.1 A, C) und SIM-Aufnahmen (siehe Abbildung 7.1 B, D) dargestellt. Es kann bereits anhand dieser Bilder die verschiedene Auflösung der Verfahren erkannt werden. Die Proteine VGat und VGlut liegen im Vergleich zu Caspr2 in sehr großer Dichte innerhalb der Synapsen vor. Sie sind auf den Aufnahmen als größere ovale Strukturen zu erkennen. Caspr2 bildet deutlich kleinere, punktförmige Strukturen, die sowohl inner- als auch außerhalb der Bereiche liegen, die durch VGat bzw. VGlut markiert sind (siehe Abbildung 7.1). Die Färbung von Caspr2 ist nicht besonders stark zu erkennen, was dazu führt, dass Imaris bei der Bildanalyse, v.a. der der SIM-Aufnahmen, kaum Kolokalisationsflächen detektieren konnte. So findet sich in der VGlut-Färbung lediglich ein Wert im SIM-Datensatz, was die statistische Auswertung auf die WF-Daten begrenzt. Dies ist auch auf den Unterschied der Verfahren bzgl. ihrer Auflösung zurückzuführen (siehe Kapitel 5.2).

In der Kontrollprobe wurde ein Kontroll-AK (mgo53) alternativ zum anti-Caspr2-aAK genutzt, um die Spezifität des anti-Caspr2-aAK und der Färbung zu belegen. Vom mgo53-AK ist bekannt, dass er normalerweise nicht an Nervenzellen bindet, da dort kein Zielprotein für diese AK vorhanden ist. Dass dennoch eine Magentafärbung in Abbildung 7.2 A und B erkennbar ist, spricht für eine unspezifische Reaktivität vom mgo53- oder Sekundär-AK mit den Nervenzellen.

Die Kolokalisationsflächen wurden in μm^2 bestimmt und anschließend mittels Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung geprüft. Die Normalverteilung ist die symmetrische Verteilung der Werte in Glockenform. Diese Normalverteilung lag nicht vor, weshalb anschließend der nichtparametrische Mann-Whitney U-Test verwendet wurde. Also ein Test, der nicht an eine bestimmte Verteilung von Daten, wie zum Beispiel die Normalverteilung, gebunden ist.

Die SIM-Daten in Abbildung 7.3 zeigen bei beiden Markern eine geringe Anzahl und Größe der Kolokalisationsflächen. Der Medianwert bei VGat und VGlut liegt jeweils bei etwa $1\mu\text{m}^2$. Die mittleren 50 % der VGat-Werte liegen im Bereich von ca. $0,5\text{--}2\mu\text{m}^2$, die VGlut-Analyse ergab lediglich einen Wert. Die Streuung der SIM-Daten ist gering.

Die WF-Daten weisen eine größere Streuung auf. Hier liegt der Median der VGat-Daten bei rund $1,81\mu\text{m}^2$ und der der VGlut-Daten bei rund $1,32\mu\text{m}^2$. Zudem treten zahlreiche Extrema auf. Sie erreichen Werte von über $10\mu\text{m}^2$, teils liegen sie im Bereich von ca. $40\text{--}95\mu\text{m}^2$.

In beiden Gruppen liegen die meisten Werte im niedrigen Bereich. Der statistische Vergleich mittels Mann-Whitney U-Test zeigt im SIM-Datensatz keinen signifikanten Unterschied zwischen VGat und VGlut ($p = 0,257$, n. s.). Mittels Mann-Whitney U-Test konnte kein Nachweis für ein bevorzugtes Vorhandensein von Caspr2 an einem der untersuchten Synapsentypen erbracht werden. Ein möglicher Unterschied ist jedoch nicht auszuschließen.




Abbildung 7.1: Aufnahme einer Nervenzelle mittels Wide-Field (WF) (A, C) und Structured-Illumination-Microscopy (SIM) (B, D) in 63x-Vergrößerung. Die fluoreszierenden Strukturen zeigen Caspr2 (magenta) und Zellkern (blau). Außerdem in grün: VGat (A, B) und VGlut (C, D) (Eigene Aufnahme 2026)




Abbildung 7.2: Aufnahme einer Nervenzelle der Kontrollprobe mit VGat (A) und VGlut (B) mittels Structured-Illumination-Microscopy (SIM) in 63x-Vergrößerung. Die fluoreszierenden Strukturen zeigen mgo53 (magenta), VGat/VGlut (grün) und Zellkern (blau). (Eigene Aufnahme 2026)




Abbildung 7.3: Colokalisationsfläche von Caspr2 mit synaptischen Markern VGlut und VGat (Eigene Aufnahme 2026)

7.2 Kolokalisation von Caspr2 und Contactin-2 nach der Behandlung mit pathogenen Antikörpern

Zur Untersuchung des Effekts der anti-Caspr2-aAK auf die Interaktion zwischen Caspr2 und Contactin-2 wurde Caspr2 mit entweder Discoidin- oder die Laminin-AK und Contactin-2 angefärbt. Die Kolokalisationsflächen wurden in μm^2 bestimmt. Zusätzlich wurde eine Kontrollprobe angefertigt um die Auswirkungen der aAK zu untersuchen.

Die SIM-Aufnahmen einer Discoidin- und Laminin-Probe (siehe Abbildung 7.4 A, B) zeigen den qualitativ sichtbaren Unterschied der Färbungen. In der Discoidin-Probe ist die Färbung von Caspr2 und Contactin2 noch schwächer zu sehen als in der Laminin-Probe. Auch wirkt die Färbung in A unspezifisch im Vergleich zu B. Die Kontrollprobe ist fehlgeschlagen und kann daher nicht als Vergleich herangezogen werden.

Bei der Überprüfung der mit Imaris gesammelten Werte mittels Shapiro-Wilk-Tests lag keine Normalverteilung vor, daher erfolgte erneut ein Vergleich zwischen den Gruppen mittels Mann-Whitney U-Test. Hier konnten aufgrund des zahlreicheren Auftretens von Werten in den SIM-Proben diese zur statistischen Auswertung genutzt werden. Die Kolokalisationsflächen in Abbildung 7.5 weisen in beiden Gruppen ähnliche Wertebereiche auf. Bei den AK, die an die Discoidin-Domäne binden, liegt der Median bei ca. $1,8 \mu\text{m}^2$, die mittleren 50 % der Werte liegen in etwa zwischen $1,4\text{--}2,5 \mu\text{m}^2$ und es liegt ein Wert außerhalb des Hauptbereichs bei rund $5 \mu\text{m}^2$. Die Laminin-Werte sind zahlreicher und deutlich stärker gestreut. Der Median der Laminin-Werte liegt bei $1,6 \mu\text{m}^2$. Die mittleren 50 % der Werte liegen im Vergleich zu den Discoidin-Werten in einem geringeren Bereich. Der Bereich reicht von etwa $1,2\text{--}2,2 \mu\text{m}^2$. Der Mann-Whitney U-Test zeigt keinen signifikanten Unterschied zwischen den Werten von AK, die an die Discoidin- oder Laminin-Domäne binden ($p = 0,386$, n. s.). Dies legt nahe, dass die beiden AK-Gruppen, die gleichen Effekte auf die Kolokalisation mit Contactin-2 ausüben. Aufgrund der mangelnden Kontrollprobe lässt sich allerdings kein fundierter Vergleich zum Normalzustand anstellen.




Abbildung 7.4: Aufnahme der Discoidin-Färbung (A) und der Laminin-Färbung (B) mittels Structured-Illumination-Microscopy (SIM) in 63x-Vergrößerung. Die fluoreszierenden Strukturen zeigen Caspr2 (magenta), Contactin2 (orange) und Zellkern (blau). (Eigene Aufnahme 2026)




Abbildung 7.5: Einfluss von Anti-Caspr2-aAK gegen die Discoidin- bzw. Laminin-Domäne von Caspr2 auf die Kokalisation mit Contactin-2 (Eigene Aufnahme 2026)

8 Diskussion

Helene Becker

Bei der Koloalisation von Caspr2 mit VGat und VGlut wurde kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt. Dieses Ergebnis könnte darauf hindeuten, dass Caspr2 nicht bevorzugt an einem bestimmten Synapsentyp vorliegt. Jedoch ist durch die Ergebnisse keine eindeutige Beantwortung der Forschungsfrage möglich.

Wegen der geringen Datenmenge der SIM-Daten, wurden die WF-Daten statistisch analysiert. Die WF-Daten können als weniger genau angesehen werden. Durch die geringere Auflösung dieser Mikroskopiemethode können kleine Strukturen, wie Synapsen, mikroskopisch und bei der Analyse mit Imaris nicht voneinander getrennt werden. Es entstehen aus mehreren kleinen Flächen eine Große. Deshalb müssen alle WF-Messwerte, die größer sind als $10 \mu\text{m}^2$, als nicht biologisch realistisch angesehen werden. Daher lässt sich keine abschließende Aussage über das vermehrte Vorhandensein von Caspr2 an exzitatorischen oder inhibitorischen Synapsen tätigen.

Zusätzlich funktionierte zwar die Immunfärbung mit VGat und VGlut spezifisch und sauber, doch haben die Primär-AK, die an Caspr2 binden sollten, nicht spezifisch an dieses gebunden. Daher ist keine spezifische Anfärbung von Caspr2 zu Stande gekommen. Mögliche Ursachen dafür sind das Alter (in 2024 bestellt), eine zwischenzeitlich inkorrekte Lagerung oder zu häufiges Einfrieren und Auftauen der Primär-AK. Ersteres ist am wahrscheinlichsten. In weiteren Testfärbungen unserer Fachbetreuerin Dr. Josefine Sell am Universitätsklinikum Jena, wurde etwas später die gleiche Färbung mit neu bestellten anti-Caspr2-AK wiederholt. Ausgetauscht wurden lediglich die Primär-AK für Caspr2. Sie stammen von der gleichen Firma, sind aus der gleichen Spezies gewonnen und lagen in gleicher Konzentration vor. Die Färbung war klarer und die Zellstrukturen in den Dendriten sind deutlich zu erkennen (siehe Abbildung 8.1). Daher ist davon auszugehen, dass die Färbung auf Grund veralteter anti-Caspr2-aAK kaum funktioniert hat.




Abbildung 8.1: Testfärbung von Dr. Josefine Sell mit neuen Primärantikörpern in 40x-Vergrößerung mittels WF. Die fluoreszierenden Strukturen zeigen Caspr2 (rot) und Zellkerne (blau). (Eigene Aufnahme 2026)

Der aktuelle Forschungsstand zu dieser Frage ist noch gering, dennoch gibt es bereits Ergebnisse, die Hinweise auf die Beantwortung liefern. So konnte in der Studie von Varea et al. aus 2015 das Vorhandensein von Caspr2 an Dendriten, im Soma und an exzitatorischen und inhibitorischen Synapsen festgestellt werden.⁶² Des Weiteren wurde eine teilweise Kolokalisation von Caspr2 mit AMPA-Rezeptor-Untereinheiten GluA1 beobachtet. Diese befindet sich auf der postsynaptischen Seite einer exzitatorischen Synapse. Die Kolokalisation mit dem inhibitorischen Marker Gephyrin sei dagegen nicht so hoch gewesen. Daher wird von den Forschenden vermutet, dass

⁶²Varea et al. 2015, S. 6177.

Caspr2 bezogen auf den Synapsentyp vorrangig an und um exzitatorische Synapsen vorkommt. Weiterhin wären sich unterscheidende Regulationsmechanismen je nach Synapsentyp denkbar.⁶³

In einer weiteren Studie aus 2015 von Pinatel et al. wurde mittels Immunmarkierung festgestellt, dass 51–68% der Caspr2-positiven Neuronen auch GAD65-positiv sind. GAD65 kommt ausschließlich an GABAergen Neuronen, also inhibitorischen Neuronen vor. Lediglich 4-8% der Neuronen waren GAD65-negativ, also exzitatorisch. Die Forschenden kamen zu dem Schluss, dass Caspr2 hauptsächlich an inhibitorischen Neuronen vorliegt.⁶⁴ Bei der Untersuchung der Lokalisation von Caspr2 an verschiedenen Synapsentypen stellten die Forschenden eine Kolo-kalisation von Caspr2 sowohl mit glutamatergen (exzitatorischen) als auch mit GABAergen (inhibitorischen) präsynaptischen Kontakten fest. Die Kolo-kalisation von Caspr2 mit inhibitorischen Zellen ist im Vergleich zu der mit exzitatorischen höher.⁶⁵ Bisherige Studien zeigen unterschiedliche Ergebnisse zu der Fragestellung, an welchem Synapsentyp Caspr2 vorrangig vorliegt.

Zwar konnten beim zweiten Teilversuch einige Ergebnisse aufgenommen werden, allerdings dienen sie nicht der Beantwortung der Forschungsfrage, inwiefern Caspr2-aAK die Kolo-kalisation zwischen Caspr2 und Contactin-2 beeinflusst. Dies ist auf eine misslungene Kontrollprobe zurückzuführen. Diese sollte ursprünglich dem Vergleich zwischen den mit Caspr2-aAK behandelten Neuronen und solchen, die nicht mit den AK behandelt wurden, ermöglichen. Zurückzuführen ist dies auf einen Protokollfehler. Für eine korrekte Kontrollprobe hätte sich nach der 24h-Inkubation mit den humanen aAK eine komplette Caspr2-Färbung mit den kommerziellen Caspr2-Primär-AK und dem anti-sheep Sekundär-AK (wie im ersten Versuch) anschließen müssen. Stattdessen wurde fälschlicherweise direkt ein anti-human Sekundär-AK gegen die mgo53 Primär-AK eingesetzt, um vermeintlich Caspr2 sichtbar zu machen. Da der mgo53 Primär-AK nicht spezifisch an neuronale Strukturen bindet, wurde es mit PBS gewegewaschen, wodurch keine Bindung des Sekundär-AK möglich war. Die Forschungsfrage kann aufgrund der fehlerhaften Immunfärbung nicht beantwortet werden. Nun wäre lediglich der Vergleich zwischen den AK-Gruppen (also AK gegen die Laminin- bzw. Discoidin-Domäne) möglich. Die unterschiedliche

⁶³Varea et al. 2015, S. 6177 f.

⁶⁴Pinatel et al. 2015, S. 4.

⁶⁵Pinatel et al. 2015, S. 4-6.

Verteilung der Kolokalisationsflächen in Abbildung 7.4 entsteht dadurch, dass bei der Discoidin-Färbung zwei und bei der Laminin-Färbung fünf verschiedene Positionen aufgenommen und ausgewertet wurden. Bei der Discoidin-Färbung war ein sehr großer Teil der Zellen bereits vor dem Färben tot, weshalb wenig sinnvolle Positionen aufgenommen werden konnten. In der Laminin-Färbung war dagegen die Zellqualität deutlich besser und die Färbung schien ebenfalls spezifischer zu sein. Dennoch finden sich auch hier tote Zellen (siehe Abbildung 8.2). Bei der Laminin-Färbung konnten mehr Positionen aufgenommen werden.




Abbildung 8.2: Übersichtsaufnahme der Laminin-Färbung mittels WF in 20x-Vergrößerung. Die fluoreszierenden Strukturen zeigen Contactin2 (orange), Caspr2 (magenta) und Zellkerne (blau). 1: Zellkern einer lebenden Zelle; 2: Zellkern einer toten Zelle. (Eigene Aufnahme 2026)

Im Gegensatz zur ersten Untersuchung scheinen zur Beantwortung der Frage, welchen Einfluss die aAK auf die Proteininteraktion zwischen Caspr2 und Contactin-2 haben, bereits mehr Studien vorzuliegen. Diese kommen jedoch teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen, was verschiedene Hypothesen zulässt. So wurde 2018 von Patterson et al. gezeigt, dass durch die Bindung von Caspr2-aAK an Caspr2 die Interaktion zwischen Caspr2 und Contactin-2 gehemmt wird. Patterson et al. konnten also eine gestörte Interaktion von Caspr2 und Contactin-2 zeigen.⁶⁶ Eine andere

⁶⁶Patterson et al. 2018, S. 6, 8.

Studie von Saint-Martin et al. aus 2019 zeigt, dass anti-Caspr2-aAK zwar keine Auswirkung auf die Internalisierung (zelluläre Aufnahme) von Caspr2 haben, aber die Oberflächenverteilung, sowie die Interaktion von Caspr2 mit TAG1 (= Contactin2) beeinflussen. Die aAK führen der Studie nach zu einer erhöhten Oberflächenexpression und Clusterbildung von Caspr2.⁶⁷ Die Beeinträchtigung der Bindung von Caspr2 zu Contactin-2 ist nicht so stark ausgefallen wie in der Studie von Patterson et al.. Solche Unterschiede sind auf die verschiedenen Methoden zurückzuführen. So nutzten Patterson et al. ein zellfreies Bindungsassay, während Saint-Martin et al. ein zelluläres Modell nutzten. Im zellfreien Bindungsassay werden die Proteine direkt miteinander inkubiert, während in einem zellulären Modell zusätzliche Faktoren, wie bspw. die räumliche Anordnung der Proteine oder ihre Oberflächenexpression, die Messungen beeinflussen und die Bindung abschwächen können.⁶⁸ In einer anderen Studie wird ebenfalls von einer Beeinträchtigung der Interaktion von Caspr2 mit Contactin-2 gesprochen.⁶⁹

In weiterführenden Studien konnte ebenfalls gezeigt werden, dass anti-Caspr2-aAK einen Einfluss auf die räumliche Organisation des VGKC-Komplexes haben.⁷⁰ Dieser Komplex ist bereits in Kapitel 3 Abbildung 3.1. Bei Patientinnen und Patienten, die symptomatische Schmerzen aufwiesen, führte eine Bindung von anti-Caspr2-aAK zu einem signifikanten Anstieg des Abstandes zwischen dem Kv1.2-Kanal und Caspr2. Dies deutet darauf hin, dass der Proteinkomplex (das schließt auch Contactin-2 ein) seine strukturelle Widerstandsfähigkeit aufgrund der AK-Bindung verliert. Zudem zeigten die Serumproben dieser Patienten bei der Untersuchung der neuronalen Erregbarkeit eine verstärkte Aktivität, sowie eine geminderte Aktivität der Kaliumionenkanäle. Daher könne es sein, dass die Veränderung der neuronalen Aktivität direkt mit der Bindung der Caspr2-aAK zusammenhängt und somit auch die Funktionalität des VGKC-Komplexes beeinträchtigt.⁷¹ Ein Unterschied zwischen den AK-Gruppen, die an die Laminin- oder Discoidin-Domäne binden, wurde nicht untersucht. Allerdings scheint die IgG-Subklasse eine Rolle bei der Ausbildung von Symptomen, wie neuropathischen Schmerz, der untersuchten Patientinnen und Patienten zu spielen.⁷² Obwohl die Discoidin-Domäne für die Bindung der anti-Caspr2-

⁶⁷Saint-Martin et al. 2019, S. 8.

⁶⁸BellBrook Labs 2026.

⁶⁹van Hoof et al. 2024, S. 11, 15 f.

⁷⁰Habib et al. 2025, S. 10.

⁷¹Habib et al. 2025, S. 10.

⁷²Habib et al. 2025, S. 10 f.

aAK von Bedeutung ist,⁷³ scheint sie für die Caspr2–Contactin-2-Interaktion selbst nicht erforderlich zu sein. Die Untersuchungen von Saint-Martin et al. weisen eher darauf hin, dass insbesondere die Laminin-G1-Domäne von Caspr2 für die Interaktion von Caspr2 mit Contactin-2 wesentlich ist. So wird vermutet, dass anti-Caspr2-aAK die Interaktion hauptsächlich durch die Laminin-G1-Domäne stören.⁷⁴ In der Studie von Oliveira et al. aus 2026 konnte auch an menschlichen neuronalen Organoiden (organähnliche 3D-Strukturen, die im Labor aus Stammzellen gezüchtet werden, ahmen Struktur sowie Funktion echter Organe nach) beobachtet werden, dass nach einer Behandlung dieser mit anti-Caspr2-aAK die Feuerrate der Aktionspotentiale signifikant höher ist als ohne diese Behandlung mit anti-Caspr2-aAK. Somit konnte gezeigt werden, dass anti-Caspr2-aAK sowohl die neuronale Funktionalität, als auch die neuronale Entwicklung beeinflussen können.⁷⁵ Ein Unterschied der Methode von Oliveira et al. zu der von Saint-Martin et al. ist besonders relevant. Oliveira et al. untersuchte die Embryonalentwicklung und nicht die Autoimmunreaktion in Patientinnen und Patienten. Die Studie zeigt die funktionellen Folgen einer anti-Caspr2-aAK-Bindung, bezieht sich allerdings nicht direkt auf die Interaktion zwischen Caspr2 und Contactin-2. Des Weiteren sei angemerkt, dass die Fragestellung sowie die Durchführung unserer Untersuchung der Veröffentlichung dieser Studie voraus ging.

⁷³van Hoof et al. 2024, S. 11.

⁷⁴Saint-Martin et al. 2019, S. 9.

⁷⁵Oliveira et al. 2026, S. 8 f.

9 Fazit und Ausblick

Johanna Hoppe

Ziel dieser Arbeit war es, die synaptische Lokalisation von Caspr2 sowie den Einfluss von aAK gegen Caspr2 auf dessen Interaktion mit Contactin-2 zu untersuchen. Dabei standen zwei Fragestellungen im Mittelpunkt. Zum einen sollte herausgefunden werden, ob Caspr2 bevorzugt an exzitatorischen oder inhibitorischen Synapsen lokalisiert ist. Zum anderen wurde untersucht, ob AK gegen die Discoidin- bzw. Laminin-G1-Domäne von Caspr2 dessen Kolokalisation mit Contactin-2 beeinflussen.

Zur Untersuchung der synaptischen Lokalisation wurde die Kolokalisation von Caspr2 mit den synaptischen Markern VGat und VGlut betrachtet. Dabei konnte kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den beiden Markern festgestellt werden. Eine eindeutige Aussage über eine bevorzugte Lokalisation von Caspr2 an exzitatorischen oder inhibitorischen Synapsen ist anhand der vorliegenden Ergebnisse nicht möglich. Insbesondere die fehlende spezifische Bindung der verwendeten Caspr2-Primär-AK sowie die begrenzte Anzahl auswertbarer Messwerte schränken die Aussagekraft der Untersuchung ein.

Auch bei der Untersuchung des Einflusses der AK gegen die Discoidin- und Laminin-G1-Domäne konnte kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen nachgewiesen werden. Da aufgrund einer fehlgeschlagenen Kontrollfärbung keine unbehandelte Vergleichsgruppe vorlag, lässt sich nicht beurteilen, ob die AK-Behandlung die Kolokalisation von Caspr2 und Contactin-2 tatsächlich verändert.

Zusammenfassend konnten die durchgeführten Experimente keine abschließenden Antworten auf die beiden Fragestellungen liefern. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Aussagekraft der Untersuchungen maßgeblich von der Spezifität der verwendeten AK, der Qualität der Färbungen und einer ausreichenden Datengrundlage abhängt.

Um die Fragestellungen beantworten zu können, sollten zunächst die verwendeten AK auf ihre Spezifität überprüft werden. Dies ist durch erneute Färbungen von

Caspr2 mit anti-Caspr2-aAK durch Dr. Josefine Sell bereits erfolgt (siehe Kapitel 8 Abbildung 8.1). Zur vollständigen Auswertung des zweiten Experiments muss die misslungene Kontrollprobe aufgrund des Fehlers im Protokoll angepasst wiederholt werden. Es muss also, wie in Kapitel 8 beschrieben, eine zusätzliche Gegenfärbung von Caspr2 durchgeführt werden, um eine veränderte Kolokalisation zu Contactin-2 untersuchen zu können. Mit einer größeren Anzahl an Messungen könnten zudem belastbarere Aussagen zu den Fragestellungen getroffen werden.

10 Literaturverzeichnis

- Anderson, James; Rolls, Geoffrey und Westra, Steven (2026). *Immunohistochemistry: An Overview + Steps to Better IHC Staining*. URL: <https://www.leicabiosystems.com/de-de/knowledge-pathway/immunohistochemistry-an-overview-steps-to-better-ihc-staining/> (Abrufdatum: 23.03.2026).
- Antwerpes, Frank et al. (2024a). *Immunglobulin G4*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/IgG4-Antik%C3%B6rper> (Abrufdatum: 20.03.2026).
- Antwerpes, Frank et al. (2024b). *Lymphozyt*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Lymphozyt> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Antwerpes, Frank und Hüting, Moritz P. (2024). *Immuntoleranz*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Immuntoleranz> (Abrufdatum: 29.08.2026).
- Antwerpes, Frank et al. (2025). *Membranpotential*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Membranpotential> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Bakkaloglu, Betul et al. (2008). „Molecular Cytogenetic Analysis and Resequencing of Contactin Associated Protein-Like 2 in Autism Spectrum Disorders“. In: *The American Journal of Human Genetics* 82.1, S. 165–173. DOI: 10.1016/j.ajhg.2007.09.017. (Abrufdatum: 14.01.2026).
- BellBrook Labs (2026). *What’s the Difference Between Biochemical and Cell-Based HTS Assays?* URL: <https://bellbrooklabs.com/whats-the-difference-between-biochemical-and-cell-based-hts-assays/?srsltid=AU7gw4XnmJ2ipeB4hLLKmY0C9YPvSdKwxngY10w1blH9GKq0zAw10Y70> (Abrufdatum: 29.09.2026).
- Campbell, Neil A. (1997). *Biologie*. Deutsche Übersetzung herausgegeben von Jürgen Markl. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Canali, Giorgia und Goutebroze, Laurence (2018). „CNTNAP2 Heterozygous Missense Variants: Risk Factors for Autism Spectrum Disorder and/or Other Pathologies?“ In: *Journal of Experimental Neuroscience* 12, S. 1179069518809666. DOI: 10.1177/1179069518809666. (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Cell Signaling Technology (2026). *Caspr2 Antibody (#3731)*. URL: <https://www.cellsignal.com/products/primary-antibodies/caspr2-antibody/3731> (Abrufdatum: 10.01.2026).

- Delves, Peter J. (2026). *Überblick über das Immunsystem*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/profi/immunologie-allergien/biologie-des-immunsystems/%C3%BCberblick-%C3%BCber-das-immunsystem> (Abrufdatum: 14.06.2026).
- Dunn, Kenneth W.; Kamocka, Malgorzata M. und McDonald, John H. (2011). „A Practical Guide to Evaluating Colocalization in Biological Microscopy“. In: *American Journal of Physiology* 300.4, S. C723–C742. DOI: 10.1152/ajpcell.00462.2010. (Abrufdatum: 21.09.2026).
- Fernandez, James (2025). *Autoimmunerkrankungen*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/heim/immunst%C3%B6rungen/allergische-reaktionen-und-andere-hypersensitivit%C3%A4tsst%C3%B6rungen/autoimmunerkrankungen> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) (2026). *Wie werden autoimmune Enzephalitiden diagnostiziert?* URL: <https://generate-net.de/wie-werden-die-verschiedenen-krankheitsbilder-diagnostiziert.html> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Graus, Francesc et al. (2016). „A Clinical Approach to Diagnosis of Autoimmune Encephalitis“. In: *The Lancet Neurology* 15.4, S. 391–404. DOI: 10.1016/S1474-4422(15)00401-9. (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Habib, Margarita et al. (2025). „Neuropathic Pain and Distinct CASPR2 Autoantibody IgG Subclasses Drive Neuronal Hyperexcitability“. In: *Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation* 12.4, e200423. DOI: 10.1212/NXI.00000000000000423. (Abrufdatum: 27.09.2026).
- Hackenberg, Stephan (2005). „Immunhistologische Charakterisierung des nickel-induzierten Kontaktekzems anhand von T-Zellinfiltrat, Adhäsionsmolekülen und Proliferations-/ Apoptosephänomenen“. Diss. München: Ludwig-Maximilians-Universität München. URL: https://edoc.ub.uni-muenchen.de/3850/1/Stephan_Hackenberg.pdf (Abrufdatum: 23.03.2026).
- Haklai-Topper, Liat et al. (2011). „The Neurexin Superfamily of *Caenorhabditis elegans*“. In: *Gene Expression Patterns* 11.1, S. 144–150. DOI: 10.1016/j.gep.2010.10.008. (Abrufdatum: 12.01.2026).
- Heine, Josephine et al. (2023). „Autoimmunenzephalitis – ein Update“. In: *Der Nervenarzt* 94.6, S. 525–537. DOI: 10.1007/s00115-022-01411-1. (Abrufdatum: 15.12.2025).

- Hircin, Emrah et al. (2024). *Immunglobulin G*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Immunglobulin_G (Abrufdatum: 01.04.2026).
- Hircin, Emrah et al. (2025). *Aktionspotential*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Aktionspotential> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Kiderlen, Stefanie (2026). *Widefield Fluorescence Microscopy: Principle, Applications, and When to Use It*. URL: <https://ibidi.com/content/215-widefield-fluorescence> (Abrufdatum: 29.08.2026).
- Klein, Robyn S. (2025). *Gehirnentzündung (Enzephalitis)*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/heim/st%C3%B6rungen-der-hirn-r%C3%BCckenmarks-und-nervenfunktion/infektionen-des-gehirns/gehirnentz%C3%BCndung-enzephalitis> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Lancaster, Eric (2016). „The Diagnosis and Treatment of Autoimmune Encephalitis“. In: *Journal of Clinical Neurology* 12.1, S. 1–13. DOI: 10.3988/jcn.2016.12.1.1. (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Macián, Fernando et al. (2004). „T Cell Anergy“. In: *Current Opinion in Immunology* 16.2, S. 209–216. DOI: 10.1016/j.coi.2004.01.013. (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Mitrevski, Vasil et al. (2026). *CASPR2-Antikörper-Enzephalitis*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/CASPR2-Antik%C3%B6rper-Enzephalitis> (Abrufdatum: 20.07.2026).
- Nicolay, Nils et al. (2024). *Immunhistochemie*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Immunhistochemie> (Abrufdatum: 22.03.2026).
- Oliveira, Ana Rafaela et al. (2026). „CASPR2 Autoimmune Antibodies Induce Neuronal Hyperactivity in Human Brain Organoids“. In: *Journal of Neurochemistry* 170.2, e70388. DOI: 10.1111/jnc.70388. (Abrufdatum: 27.09.2026).
- Olsen, Abby L. et al. (2015). „Caspr2 Autoantibodies Target Multiple Epitopes“. In: *Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation* 2.4, e127. DOI: 10.1212/NXI.0000000000000127. (Abrufdatum: 20.03.2026).
- Ostendorf, Norbert et al. (2025). *Monoklonaler Antikörper*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Monoklonaler_Antik%C3%B6rper (Abrufdatum: 23.03.2026).
- Oxford Instruments (2025). *Structured Illumination Microscopy and 3D SIM Imaging*. URL: <https://www.oxinst.com/learning/view/article/super-resolution-imaging-structured-illumination-microscopy> (Abrufdatum: 29.08.2026).

- Patterson, Kristina R.; Dalmau, Josep und Lancaster, Eric (2018). „Mechanisms of Caspr2 Antibodies in Autoimmune Encephalitis and Neuromyotonia“. In: *Annals of Neurology* 83.1, S. 40–51. DOI: 10.1002/ana.25120. (Abrufdatum: 21.03.2026).
- Pinatel, Delphine et al. (2015). „Inhibitory Axons Are Targeted in Hippocampal Cell Culture by Anti-Caspr2 Autoantibodies Associated with Limbic Encephalitis“. In: *Frontiers in Cellular Neuroscience* 9, S. 265. DOI: 10.3389/fncel.2015.00265. (Abrufdatum: 20.03.2026).
- Poliak, Shraga et al. (1999). „Caspr2, a New Member of the Neurexin Superfamily, Is Localized at the Juxtaparanodes of Myelinated Axons and Associates with K⁺ Channels“. In: *Neuron* 24.4, S. 1037–1047. DOI: 10.1016/s0896-6273(00)81049-1. (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Rubin, Michael (2024). *Neuromyotonie*. URL: <https://www.msdmanuals.com/de/heim/st%C3%B6rungen-der-hirn-r%C3%BCckenmarks-und-nervenfunktion/erkrankungen-der-peripheren-nerven-und-verwandte-erkrankungen/neuromyotonie> (Abrufdatum: 29.08.2026).
- Saint-Martin, Margaux et al. (2019). „Impact of Anti-CASPR2 Autoantibodies from Patients with Autoimmune Encephalitis on CASPR2/TAG-1 Interaction and Kv1 Expression“. In: *Journal of Autoimmunity* 103, S. 102284. DOI: 10.1016/j.jaut.2019.05.012. (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Smith, D. A. und Germolec, D. R. (1999). „Introduction to Immunology and Autoimmunity“. In: *Environmental Health Perspectives* 107.Suppl 5, S. 661–665. DOI: 10.1289/ehp.99107s5661. (Abrufdatum: 29.03.2026).
- Universitätsklinikum Heidelberg (2026a). *Autoimmunenzephalitis*. URL: <https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/erkrankungen/autoimmunenzephalitis-202062> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Universitätsklinikum Heidelberg (2026b). *Sektion Molekulare Immunologie – Übersicht*. URL: <https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/immunologie/forschung/sektion-molekulare-immunologie/uebersicht> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- van Hoof, Scott et al. (2024). „Human Cerebrospinal Fluid Monoclonal CASPR2 Autoantibodies Induce Changes in Electrophysiology, Functional MRI, and Behavior in Rodent Models“. In: *Brain, Behavior, and Immunity* 122, S. 266–278. DOI: 10.1016/j.bbi.2024.08.027. (Abrufdatum: 27.09.2026).

- van Sonderen, Agnes et al. (2016). „The Clinical Spectrum of Caspr2 Antibody-Associated Disease“. In: *Neurology* 87.5, S. 521–528. DOI: 10.1212/WNL.0000000000002917. (Abrufdatum: 10.01.2026).
- van Sonderen, Agnes et al. (2017). „The Value of LGI1, Caspr2 and Voltage-Gated Potassium Channel Antibodies in Encephalitis“. In: *Nature Reviews Neurology* 13.5, S. 290–301. DOI: 10.1038/nrneuro1.2017.43. (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Varea, Olga et al. (2015). „Synaptic Abnormalities and Cytoplasmic Glutamate Receptor Aggregates in Contactin Associated Protein-Like 2/Caspr2 Knockout Neurons“. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 112.19, S. 6176–6181. DOI: 10.1073/pnas.1423205112. (Abrufdatum: 27.09.2026).

11 Bildquellenverzeichnis

- (Abbildung 2.1): Kaus, Robert (2026). *Neuron: Aufbau und Funktion*. URL: <https://www.medi-karriere.de/wiki/neuron/> (Abrufdatum: 26.08.2026).
- (Abbildung 2.2): Winter, Jannik (2014). *Grafik zum ablauf eines Aktionspotentials*. URL: <https://www.doccheck.com/de/detail/photos/20984-aktionspotential> (Abrufdatum: 26.09.2026).
- (Abbildung 2.3): Campbell, Neil A. (1997). *Biologie*. Deutsche Übersetzung herausgegeben von Jürgen Markl. S. 1091. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- (Abbildung 2.4): Nolte, Janica (2022). *Synapse adaptiert von "Chemical Synapse: Steps of Synaptic Transmission", von BioRender.com (2022)*. URL: <https://www.doccheck.com/de/detail/photos/41888-chemische-synapse> (Abrufdatum: 13.09.2026).
- (Abbildung 2.5): Reh, Fabienne (2024). *Antikörper adaptiert von "The Variable Region of an Antibody Binds to the Antigen"; by BioRender.com (2024)*. URL: <https://www.doccheck.com/de/detail/photos/43457-antikoerper> (Abrufdatum: 30.08.2026).
- (Abbildung 3.1): van Sonderen, Agnes et al. (2017). „The Value of LGI1, Caspr2 and Voltage-Gated Potassium Channel Antibodies in Encephalitis“. In: *Nature Reviews Neurology* 13.5, S. 290–301. DOI: 10.1038/nrneuro.2017.43. (Abrufdatum: 10.01.2026).
- (Abbildung 3.2): Canali, Giorgia und Goutebroze, Laurence (2018). „CNTNAP2 Heterozygous Missense Variants: Risk Factors for Autism Spectrum Disorder and/or Other Pathologies?“ In: *Journal of Experimental Neuroscience* 12, S. 1179069518809666. DOI: 10.1177/1179069518809666. (Abrufdatum: 14.01.2026).
- (Abbildung 4.1): Dalmau, Josep; Geis, Christian und Graus, Francesc (2017). „Autoantibodies to Synaptic Receptors and Neuronal Cell Surface Proteins in Autoimmune Diseases of the Central Nervous System“. In: *Physiological Reviews* 97.2, S. 839–887. DOI: 10.1152/physrev.00010.2016. (Abrufdatum: 29.08.2026).

- (Abbildung 4.2): German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) (2026). *Wie werden autoimmune Enzephalitiden diagnostiziert?* URL: <https://generate-net.de/wie-werden-die-verschiedenen-krankheitsbilder-diagnostiziert.html> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- (Abbildung 5.1): Hoff, Florian (2022). *How to Prepare Your Specimen for Immunofluorescence Microscopy*. URL: <https://www.leica-microsystems.com/science-lab/life-science/how-to-prepare-specimen-for-immunofluorescence-microscopy/> (Abrufdatum: 23.03.2026).
- (Abbildung 5.2): Kiderlen, Stefanie (2026). *Widefield Fluorescence Microscopy: Principle, Applications, and When to Use It*. URL: <https://ibidi.com/content/215-widefield-fluorescence> (Abrufdatum: 29.08.2026).
- (Abbildung 5.3): Oxford Instruments (2025). *Structured Illumination Microscopy and 3D SIM Imaging*. URL: <https://www.oxinst.com/learning/view/article/super-resolution-imaging-structured-illumination-microscopy> (Abrufdatum: 29.08.2026).
- (Abbildung 6.1): Eigene Aufnahme (2026).
- (Abbildung 6.2): Eigene Aufnahme (2026).
- (Abbildung 6.3): Eigene Aufnahme (2026).
- (Abbildung 6.4): Eigene Aufnahme (2026).
- (Abbildung 7.1): Eigene Aufnahme (2026).
- (Abbildung 7.2): Eigene Aufnahme (2026).
- (Abbildung 7.3): Eigene Aufnahme (2026).
- (Abbildung 7.4): Eigene Aufnahme (2026).
- (Abbildung 7.5): Eigene Aufnahme (2026).
- (Abbildung 8.1): Eigene Aufnahme (2026).
- (Abbildung 8.2): Eigene Aufnahme (2026).

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei all denen bedanken, die auf unterschiedliche Art und Weise zum Gelingen dieser Seminarfacharbeit beigetragen haben.

Ein großer Dank gilt unserer Seminarfachlehrerin Frau Dr. Annett Fiedler und unserer Fachbetreuerin Frau Sybille Weiß, die uns während des gesamten Betreuungszeitraums mit hilfreichen Anmerkungen und konstruktiver Kritik unterstützten.

Ein weiterer Dank gebührt unserer Außenbetreuerin Frau Dr. Josefine Sell, die uns durch ihre fachliche Expertise, die Beantwortung aufkommender Fragen sowie ihre Unterstützung bei der statistischen Auswertung wertvolle Hilfestellungen gab und damit wesentlich zum Gelingen dieser Seminarfacharbeit beitrug.

Selbstständigkeitserklärung

Wir erklären, dass wir die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Autoantikörper gegen Caspr2 - eine immunhistologische Analyse ihrer Auswirkungen im zentralen Nervensystem“ selbstständig, ohne unzulässige fremde Hilfe angefertigt und nur unter Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel verfasst haben. Sämtliche Stellen, die wörtlich oder inhaltlich anderen Werken entnommen sind, wurden unter Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht. Dies trifft besonders auch auf Quellen aus dem Internet zu. Gleichzeitig geben wir das Einverständnis, unsere Arbeit mittels einer Plagiatsoftware durch die Schule überprüfen zu lassen.

.....
Jena, den 4. Oktober 2026

.....
Namen & Unterschriften aller Gruppenmitglieder