PHIẾU TỰ LUYỆN — BÀI 16. PHÉP NHÂN SỐ NGUYÊN

Toán 6

Phần A. Cơ bản – Củng cố

Câu 1. Tính:

a) $13 \cdot (-6)$; **b)** $(-24) \cdot 5$; **c)** $40 \cdot (-25)$.

Câu 2. Tính:

a) $(-7) \cdot (-9)$; **b)** $(-15) \cdot (-12)$; **c)** $(-50) \cdot (-8)$.

Câu 3. Tính:

a) $(-1999) \cdot 0$; **b)** $0 \cdot (-56) \cdot (-3)$.

Câu 4. Không tính giá trị, cho biết mỗi tích sau là số âm, số dương hay bằng 0:

a) $(-17) \cdot 23$; **b)** $(-8) \cdot (-11)$; **c)** $45 \cdot (-1) \cdot 0$.

Câu 5. Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng:

a) $(-9) \cdot (-4) = -36$; **b)** $11 \cdot (-5) = 55$.

Câu 6. Điền số thích hợp vào ô trống:

a) $(-6) \cdot 11 = 11 \cdot \square$;

b) $[(-3) \cdot 5] \cdot (-2) = (-3) \cdot [5 \cdot \square]$;

c) $(-4) \cdot (9 + 6) = (-4) \cdot 9 + (-4) \cdot \square$.

Câu 7. Cho $a = -5$, $b = 12$, $c = -7$. Tính $a(b + c)$ và $ab + ac$ rồi so sánh hai kết quả.

Phần B. Thông hiểu – Vận dụng

Câu 1. Tính:

a) $5 \cdot (-2) \cdot (-7)$; **b)** $(-2) \cdot (-3) \cdot (-5) \cdot (-1)$.

Câu 2. Cho $Q = (-2) \cdot 3 \cdot (-4) \cdot (-5)$.

a) Tính Q.

b) Nếu đổi dấu tất cả các thừa số của Q thì được tích mới bằng bao nhiêu?

Câu 3. Tính một cách hợp lí: $(-25) \cdot (-13) \cdot 4$.

Câu 4. Tính một cách hợp lí:

a) $(-8) \cdot 56 + (-8) \cdot 44$; **b)** $23 \cdot (-17) + 23 \cdot (-83)$.

Câu 5. Tính một cách hợp lí:

a) $9 \cdot (-36) - 9 \cdot (-16)$; **b)** $(-11) \cdot 105 - (-11) \cdot 5$.

Câu 6. Tính nhanh: $4 \cdot (-7) \cdot 25 \cdot (-3)$.

Câu 7. Một cửa hàng trong một tháng có 3 tuần, mỗi tuần lỗ 250 nghìn đồng, và 1 tuần lãi 400 nghìn đồng. Hỏi sau tháng đó cửa hàng lãi hay lỗ bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 8. Một thợ lặn mỗi phút lặn xuống thêm 4 m (biểu thị bằng -4 m). Bắt đầu từ mặt nước (độ cao 0 m), sau 6 phút thợ lặn ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt nước?

Câu 9. Bia có bốn vòng: 10 điểm, 6 điểm, -2 điểm, -5 điểm. Số lần trúng mỗi vòng của Hà và Tú cho ở bảng dưới. Ai được nhiều điểm hơn?

Vòng	10 điểm	6 điểm	-2 điểm	-5 điểm
Hà	1	2	2	1
Tú	2	0	3	2

Phần C. Nâng cao

Câu 1. Tháp tích (hình bên): hàng dưới cùng có 4 ô ghi -2, 1, -1, 3. Số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tích hai số trong hai ô kề với nó ở hàng dưới. Điền các ô còn lại và tìm số ở ô trên cùng.



Câu 2. Tính một cách hợp lí: $(-15)\cdot 37+15\cdot(-63)$.

Câu 3. Cho $A=(-4)\cdot(-5)\cdot(-25)\cdot(-2)\cdot(-1)$.

a) Không tính giá trị, cho biết A là số dương hay số âm. Giải thích.

b) Tính A một cách hợp lí.

Câu 4. Tính một cách hợp lí: $(-37)\cdot 101-(-37)$.

Phần D. Dành cho học sinh giỏi

Câu 1. Tính một cách hợp lí: $(-125)\cdot(-37)\cdot(-8)\cdot 25\cdot(-4)$.

Câu 2. Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn $a\cdot b=15$ và $a\cdot c=-7$. Tính:

a) $(-a)\cdot b$; **b)** $a\cdot(b+c)$; **c)** $(-a)\cdot(c-b)$.

Câu 3. Tính một cách hợp lí: $A=(-17)\cdot 85+17\cdot(-15)-17\cdot(-100)$.

HẾT