آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

اصول اپیدمیولوژی

۱- **در یک جامعه تعداد مبتلایان به بیماری HMPVویروس متاپنومونی انسانی از ۱۰۰ نفر به ۲۸۰۰ نفر طی ۱۷ روز افزایش یافته است. کدام نتیجه گیری صحیح است؟**

همه گیری رخ داده است

طغیان رخ داده است

✓ اطلاعات برای نتیجه گیری کافی نیست

در حال حاضر در حد خوشه است

۲- **به دنبال توقف ارزیابی پاپ اسمیر در شبکه بهداشت، گزارش دهی موارد ابتلاء به سرطان دهانه رحم به یک دوم کاهش یافته است. کدام نتیجه در مورد شاخص های مرتبط با سرطان دهانه رحم در جامعه صحیح است؟**

شیوع بیماری کاهش خواهد یافت

بروز بیماری کاهش خواهد یافت

شیوع بیماری افزایش خواهد یافت

✓ بروز بیماری تغییری نخواهد کرد

۳- **در یک بررسی ۹۷ درصد از بیمارانی که یک دمنوش خاص را دریافت کرده اند، بهبودی کامل یافته حال آنکه در گروهی که این دمنوش را مصرف نکرده اند، میزان بهبودی تنها ۳ درصد بوده است. کدام نتیجه گیری صحیح است؟**

دمنوش بسیار مؤثر است و باید حتماً برای عموم جامعه توصیه شود

دمنوش بسیار مؤثر است و باید حتماً برای تمام بیماران توصیه شود

✓ حداقل اطلاع از شدت بیماری در هر دو گروه ارائه شده باشد

بدون تخصیصی تصادفی هرگونه نتیجه گیری اشتباه است

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۴- در یک بررسی مشخص شده است که ۹۰ درصد از افرادی که دارای عامل خطر بیماری مفروض می باشند، به این بیماری مبتلا نیستند. کدام نتیجه گیری صحیح است؟

- این عامل به اشتباه عامل خطر بیماری معرفی شده است و باید تجدید نظر شود
- این مطالعه قطعاً دارای خطای اندازه گیری اما بدون خطای مخدوش کنندگی است
- این مطالعه حتماً دارای تورش انتخاب و خطای مخدوش کنندگی است
- ✓ نتایج این مطالعه و عامل خطر بودن آن خصوصیت هر دو می تواند کاملاً صحیح باشد

۵- یک بیمار پس از ابتلای فرزند خود به بیماری کووید ۱۹ آزمایش PCR انجام داده و متوجه شده است که به بیماری مفروض مبتلا است، حال آنکه هیچ علامتی از بیماری نداشته است. بیماری وی کدام شکل می تواند باشد؟

- ✓ Inapparent
- Abortive
- Residual Disability
- Chronic

۶- در یک مطالعه بر روی ۷۰۰ نفر مشخص شده است که فراوانی بیماری ۲۰ درصد می باشد. اگر پس از دو سال تعداد بیماران در همین نمونه ۱۰۵ نفر باشد. اگر میزان بروز بیماری صفر در نظر گرفته شود. میزان بهبودی دوساله در بیماران چند درصد بوده است؟

- ۱۲.۵
- ✓ ۲۵
- ۳۷.۵
- ۵۰

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۷- در یک مطالعه بر روی ۷۰۰ نفر مشخص شده است که فراوانی بیماری ۲۰ درصد می باشد. اگر پس از دو سال تعداد بیماران در همین نمونه ۲۱۰ نفر باشد. اگر میزان بهبودی دوساله در بیماران صفر درصد بوده باشد. میزان بروز دوساله بیماری چند درصد بوده است؟

- ۱۲.۵ ✓
- ۲۵
- ۳۷.۵
- ۵۰

۸- در یک جامعه فراوانی مصرف سیگار در مردان ۲۰ درصد و در زنان ۵ درصد گزارش شده است. نمونه ای ۵۰۰۰ نفره از این جامعه مطالعه شده است که در آن تعداد مردان ۱۰۰۰ نفر بوده است. فراوانی مصرف سیگار در این نمونه چند درصد است؟

- ۱۲
- ۱۰
- ۸ ✓
- ۶

۹- در یک جامعه فراوانی مصرف سیگار در مردان ۲۰ درصد و در زنان ۵ درصد گزارش شده است. نمونه ای ۵۰۰۰ نفره از این جامعه مطالعه شده است که در آن فراوانی مصرف سیگار ۱۱.۷۵ درصد بوده است. تعداد مردان در این نمونه چند نفر است؟

- ۱۵۰۰
- ۱۷۵۰
- ۲۰۰۰
- ۲۲۵۰ ✓

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۱۰- در یک مطالعه بر روی یک نمونه ۱۰۰۰۰ نفره در ابتدای امسال مشخص شده است تعداد بیماران دو برابر تعداد بیماران در همان نمونه در ابتدای سال گذشته است. کدام رخداد نمی تواند توجیه کننده این وضعیت باشد؟

- ✓ افزایش بروز بیماری به دو برابر
- افزایش دوره بیماری به دو برابر
- کاهش مرگ و میر بیماری به نصف
- کاهش میزان بهبودی به نصف

۱۱- میزان فراوانی یک بیماری در مردان ۵ در ده هزار و در زنان ۳ در ده هزار در جامعه ای با فراوانی زنان در حد ۶۰ درصد گزارش شده است. میزان فراوانی این بیماری در جامعه دیگری با فراوانی زنان در حد ۴۰ درصد، در کل ۴ در ده هزار نفر گزارش شده است. وضعیت این بیماری در جامعه دوم نسبت به جامعه اول چگونه است؟

- بهتر است زیرا SMR از یک بزرگتر است
- بدتر است زیرا SMR از یک بزرگتر است
- ✓ بهتر است زیرا SMR از یک کوچکتر است
- بدتر است زیرا SMR از یک کوچکتر است

۱۲- میزان فراوانی یک بیماری در مردان ۵ در ده هزار و در زنان ۳ در ده هزار در جامعه ای با فراوانی زنان در حد ۶۰ درصد گزارش شده است. میزان فراوانی این بیماری در جامعه دیگری با فراوانی زنان در حد ۴۰ درصد، در کل ۴ در ده هزار نفر گزارش شده است. میزان فراوانی این بیماری در جامعه اول چند در صد هزار نفر است؟

- ۲۶
- ۲۸
- ۳۲
- ✓ ۳۶

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۱۳- در یک بررسی بر روی ۱۰۰۰ نفر سیگاری و ۵۰۰۰ نفر غیر سیگاری در طی دو سال موارد بروز بیماری مفروض در گروه اول ۲۰۰ و در گروه دوم ۱۰۰ نفر بوده است. اگر شیوع مصرف سیگار در این جامعه ۲۵ درصد باشد. میزان خطر نسبی مصرف سیگار چقدر است؟

- ۲.۵
- ۵
- ۷.۵
- ✓ ۱۰

۱۴- در یک بررسی بر روی ۱۰۰۰ نفر سیگاری و ۵۰۰۰ نفر غیر سیگاری در طی دو سال موارد بروز بیماری مفروض در گروه اول ۲۰۰ و در گروه دوم ۱۰۰ نفر بوده است. اگر شیوع مصرف سیگار در این جامعه ۲۵ درصد باشد. میزان خطر منتسب به مصرف سیگار چند درصد است؟

- ۲۲
- ۲۰
- ✓ ۱۸
- ۱۶

۱۵- در یک بررسی بر روی ۱۰۰۰ نفر سیگاری و ۵۰۰۰ نفر غیر سیگاری در طی دو سال موارد بروز بیماری مفروض در گروه اول ۲۰۰ و در گروه دوم ۱۰۰ نفر بوده است. اگر شیوع مصرف سیگار در این جامعه ۲۵ درصد باشد. میزان جزء منتسب خطر به مصرف سیگار چند درصد است؟

- ✓ ۹۰
- ۸۵
- ۸۰
- ۷۵

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۱۶- در یک بررسی بر روی ۱۰۰۰ نفر سیگاری و ۵۰۰۰ نفر غیر سیگاری در طی دو سال موارد بروز بیماری مفروض در گروه اول ۲۰۰ و در گروه دوم ۱۰۰ نفر بوده است. اگر شیوع مصرف سیگار در این جامعه ۲۵ درصد باشد. میزان خطر منتسب به مصرف سیگار در جامعه چند درصد است؟

- ۶
- ۵.۵
- ۵
- ۴.۵ ✓

۱۷- در یک بررسی بر روی ۱۰۰۰ نفر سیگاری و ۵۰۰۰ نفر غیر سیگاری در طی دو سال موارد بروز بیماری مفروض در گروه اول ۲۰۰ و در گروه دوم ۱۰۰ نفر بوده است. اگر شیوع مصرف سیگار در این جامعه ۲۵ درصد باشد. چند درصد از افراد جامعه به دلیل سیگار کشیدن به این بیماری مبتلا می شوند؟

- ۹۰
- ۶۹
- ۱۸
- ۴.۵ ✓

۱۸- در یک بررسی بر روی ۱۰۰۰ نفر سیگاری و ۵۰۰۰ نفر غیر سیگاری در طی دو سال موارد بروز بیماری مفروض در گروه اول ۲۰۰ و در گروه دوم ۱۰۰ نفر بوده است. اگر شیوع مصرف سیگار در این جامعه ۲۵ درصد باشد. جزء خطر منتسب به مصرف سیگار در جامعه چند درصد است؟

- ۶۹ ✓
- ۵۹
- ۴۹
- ۳۹

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۱۹- در یک بررسی بر روی ۱۰۰۰ نفر سیگاری و ۵۰۰۰ نفر غیر سیگاری در طی دو سال موارد بروز بیماری مفروض در گروه اول ۲۰۰ و در گروه دوم ۱۰۰ نفر بوده است. اگر شیوع مصرف سیگار در این جامعه ۲۵ درصد باشد. چند درصد از موارد بیماری در جامعه به علت سیگار کشیدن رخ می دهد؟

- ۹۰
- ✓ ۶۹
- ۱۸
- ۴.۵

۲۰- در یک بررسی بر روی ۱۰۰۰ نفر سیگاری و ۵۰۰۰ نفر غیر سیگاری در طی دو سال موارد بروز بیماری مفروض در گروه اول ۲۰۰ و در گروه دوم ۱۰۰ نفر بوده است. اگر شیوع مصرف سیگار در این جامعه ۲۵ درصد باشد. نسبت شانس ابتلا به سلامت در افراد سیگاری به غیر سیگاری چند برابر خطر نسبی سیگار کشیدن برای ابتلای به بیماری است؟

- ۱.۷۲۵
- ۱.۵۲۵
- ✓ ۱.۲۲۵
- ۱.۰۲۵

۲۱- در اثبات رابطه علیتی یک گزارش مجموعه موارد هیچ اعتباری ندارد. کدام نکته علت اصلی در این محدودیت است؟

- ✓ فقدان گروه شاهد
- فقدان تخصیص تصادفی
- وجود تورش اندازه گیری و انتخاب
- وجود مخدوش کنندگی

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۲۲- در اثبات رابطه علیتی یک مطالعه مقطعی نمی تواند نقشی داشته باشد. کدام نکته علت اصلی در این محدودیت است؟

وجود تورش های اندازه گیری و انتخاب

✓ فقدان اثبات تقدم علت به معلول

عدم تساوی تعداد گروه مبتلا و غیر مبتلا

وجود مخدوش کنندگی

۲۳- در اثبات رابطه علیتی کدام مطالعه می تواند رابطه دوز-پاسخ را در اثبات رابطه علیتی بررسی کند؟

مطالعات مقطعی، مورد شاهدی، همگروهی و کارآزمائی بالینی

تنها مطالعات همگروهی

✓ تنها مطالعات همگروهی و کارآزمائی بالینی

تنها مطالعات مورد شاهدی، همگروهی و کارآزمائی بالینی

۲۴- در اثبات رابطه علیتی مهمترین محدودیت در مورد مطالعات کارآزمائی بالینی با تخصیص تصادفی کدام مورد می تواند باشد؟

فقدان گروه شاهد

فقدان تخصیص تصادفی

✓ وجود تورش اندازه گیری و انتخاب

وجود مخدوش کنندگی

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۲۵- در یک بررسی مشخص شده است که آزمون غربالگری توانسته از ۱۰۰ نفر بررسی شده، در مورد ۷۰ نفر نتیجه مثبت داشته باشد. کدام نتیجه گیری صحیح است؟

- حداکثر میزان مورد انتظار از حساسیت این آزمون ۷۰ درصد است
- حداکثر میزان مورد انتظار از ویژگی این آزمون ۷۰ درصد است
- حداکثر میزان مورد انتظار از ارزش اخباری مثبت آزمون ۷۰ درصد است
- ✓ هیچ نتیجه گیری قابل استنتاج نیست

۲۶- در یک بررسی مشخص شده است که آزمون غربالگری توانسته از ۱۰۰ نفر بررسی شده، در مورد ۷۰ نفر نتیجه مثبت داشته باشد. اگر میزان حساسیت بیماری ۹۰ درصد باشد و شیوع بیماری در افراد مورد مطالعه ۵۰ درصد بوده باشد. ویژگی آزمون چند درصد است؟

- ✓ ۵۰
- ۶۰
- ۷۰
- ۸۰

۲۷- در یک بررسی بر روی ۲۰۰ بیمار و ۴۰۰ فرد سالم حساسیت و ویژگی آزمون غربالگری ۹۵ و ۶۵ درصد محاسبه شده است. استفاده از این آزمون در کدام جمعیت زیر بالاترین ارزش اخباری مثبت را به همراه خواهد داشت؟

- ✓ جامعه با شیوع ۷۰ درصد
- جامعه با شیوع ۶۰ درصد
- جامعه با شیوع ۵۰ درصد
- در هر جامعه ارزش اخباری نتیجه یکسانی خواهد داشت

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۲۸- ارزش اخباری نتیجه مثبت آزمون...

احتمال مثبت شدن نتیجه آزمون به شرط بیمار بودن است

احتمال مثبت شدن نتیجه ازمون به شرط سالم بودن است

✓ احتمال بیمار بودن به شرط مثبت شدن نتیجه آزمون است

احتمال بیمار بودن به شرط منفی شدن نتیجه آزمون است

۲۹- در یک بررسی مشخص شده است که یک پروتئین خاص در بیماران مبتلا به بیماری لوپوس در محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر و در گروه شاهد سالم در محدود ۷۰ تا ۹۰ نانوگرم بر دسی لیتر است. این آزمون در غربالگری بیماران مشکوک به لوپوس...

می تواند با حساسیت ۱۰۰ درصد و ویژگی ۱۰۰ درصد استفاده شود

می تواند با حساسیت ۱۰۰ درصد اما ویژگی قابل قبول استفاده شود

می تواند با حساسیت قابل قبول اما ویژگی ۱۰۰ درصد استفاده شود

✓ ممکن است در غربالگری بیماران مشکوک به بیماری لوپوس اساساً آزمون مناسبی نباشد

۳۰- در یک بررسی مشخص شده است که یک پروتئین خاص در بیماران مبتلا به بیماری لوپوس در محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر و در گروه شاهد سالم اما مشکوک به بیماری در محدود ۹۰ تا ۳۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر است. با توجه به اینکه این بیماری یک بیماری خود ایمنی با عوارض متعدد و قابل کنترل با داروهای سرکوبگر ایمنی است، بهترین نقطه برش به منظور تشخیص بیماران کدام مقدار خواهد بود؟

۹۰ نانوگرم بر دسی لیتر

✓ ۱۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر

۲۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر

۳۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۳۱- اگر شیوع بیماری در یک مطالعه به منظور برآورد حساسیت و ویژگی آزمون غربالگری دو برابر شود...

ارزش اخباری نتیجه مثبت آزمون در هر شرایطی بیشتر می شود

حساسیت آزمون بیشتر می شود

✓ ارزش اخباری نتیجه مثبت آزمون در همان مطالعه بیشتر می شود

ویژگی آزمون بیشتر می شود

۳۲- در یک مطالعه ۲۰۰ نمونه توسط دو دستگاه ارزیابی شده است. نتیجه در مورد دستگاه اول در ۹۰ درصد موارد بالاتر از ۱۰۰ و در مورد دستگاه دوم در ۹۵ درصد موارد بالاتر از ۱۰۰ گزارش شده است. میزان توافق شانسی بین نتیجه این دو دستگاه چند درصد است؟

۶۶

۷۶

✓ ۸۶

۹۶

۳۳- در یک مطالعه ۲۰۰ نمونه توسط دو دستگاه ارزیابی شده است. نتیجه در مورد دستگاه اول در ۹۰ درصد موارد بالاتر از ۱۰۰ و در مورد دستگاه دوم در ۹۵ درصد موارد بالاتر از ۱۰۰ گزارش شده است. اگر این دو دستگاه در ۸۰ درصد از موارد نتیجه مشابه بالاتر از ۱۰۰ داشته باشند، میزان درصد توافق بین نتیجه این دو دستگاه چند درصد است؟

✓ غیر ممکن است

۸۵

۹۵

۹۷.۵

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۳۴- در غربالگری یک بیماری بسیار کشنده که قابل درمان در هنگام تشخیص زودهنگام است، دو آزمون یکی با حساسیت ۸۲ و ویژگی ۷۵ درصد و دیگری با حساسیت ۸۶ و ویژگی ۷۶ درصد. ویژگی رویکردی که برای غربالگری این بیماری با استفاده از این دو آزمون ممکن است، چند درصد خواهد بود؟

قابل محاسبه نیست

✓ ۵۷

۶۷

۷۷

۳۵- آماره کاپا...

میزان توافق بین دو روش یا دو فرد بر اساس مقادیر مشاهده شده است

میزان توافق بیش از شانس بین دو روش یا دو فرد بر اساس مقادیر مشاهده شده است

سهم توافق بیش از شانس مشاهده شده از کل توافق ممکن است

✓ سهم توافق بیش از شانس مشاهده شده از کل توافق غیر شانسی ممکن است

۳۶- در استفاده از آزمون های متوالی یا موازی در غربالگری یک بیماری با شیوع حدود ۵ در ده هزار نفر، کدام آزمون باید ابتدا انجام شود و چرا؟

آزمون دارای حساسیت بالاتر با توجه به هزینه

آزمون دارای حساسیت بالاتر با توجه به اهمیت تشخیص بیماری

✓ آزمون دارای ویژگی بالاتر با توجه به اهمیت عدم انجام آزمون غیر ضروری

آزمون دارای ویژگی بالاتر با توجه به هزینه

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۳۷- با توجه به امکان شروع همه گیری بیماری HMPVویروس متاپنومونی انسانی در کشور، انجام کدام مطالعات در این مورد اولویت اول است؟

- [x] گزارش مورد یا مجموعه موارد
- [ ] مقطعی
- [ ] مورد شاهدی
- [ ] همگروهی

۳۸- با توجه به امکان شروع همه گیری بیماری HMPVویروس متاپنومونی انسانی در کشور و ضرورت ارزیابی اثر واکسن های احتمالی علیه این بیماری، انجام کدام مطالعات در این مورد اولویت اول است؟

- [x] کارآزمائی بالینی با تخصیص تصادفی
- [ ] همگروهی
- [ ] مورد شاهدی
- [ ] مقطعی

۳۹- با توجه به مشاهده موارد بیماری تنفسی در خوابگاه در حدود ۷۰ درصد از دانشجویان و ضرورت بررسی وجود بیماری HMPV ویروس متاپنومونی انسانی، انجام کدام مطالعه در این مورد اولویت دارد؟

- [ ] کارآزمائی بالینی با تخصیص تصادفی
- [ ] همگروهی
- [ ] مورد شاهدی
- [x] مقطعی

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۴۰- در یک مطالعه هر زمان که یکی از دانشجویان در خوابگاه به بیماری HMPVویروس متاپنومونی انسانی مبتلا شده است، سه تا چهار نفر از هم اتاقی های وی که مبتلا نبوده اند، انتخاب شده و در نهایت ۷۵ مورد از بیماری HMPVویروس متاپنومونی انسانی و ۱۸۵ نفر غیر مبتلا از نظر عوامل مختلف بررسی شده اند. نوع مطالعه کدام مورد بوده است؟

مورد همگروهی

مورد شاهدی کلاسیک

✓ مورد شاهدی لانه گزینی شده

مورد شاهدی متقاطع

۴۱- در یک مطالعه دانشجویان ساکن خوابگاه با تعداد مساوی از دانشجویان غیر ساکن خوابگاه مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه ابتلای به بیماری HMPVویروس متاپنومونی انسانی در طی سه ماه اخیر در ایشان مورد مقایسه قرار گرفته است. نوع مطالعه احتمالاً کدام است؟

همگروهی کلاسیک

✓ همگروهی تاریخی

مورد همگروهی

مورد شاهدی لانه گزینی شده

۴۲- در یک مطالعه ۲۵ دانشجوی مشکوک به ابتلا به بیماری HMPVویروس متاپنومونی انسانی ساکن خوابگاه از نظر استفاده از غذای طبخ و توزیع شده در خوابگاه و یا هر نوع غذای دیگری، مورد بررسی قرار گرفته اند و مشخص شده است که ۲۲ نفر منحصراً از غذای طبخ و توزیع شده در خوابگاه استفاده کرده اند. اقدام مناسب کدام است؟

توقف فوری طبخ و توزیع غذا در خوابگاه

بازنگری نحوه طبخ و توزیع غذا در خوابگاه

بررسی آشپز و همکاران آشپزخانه از نظر بیماری HMPV

✓ عدم توجه جدی به این نتیجه و توصیه به انجام مطالعات تکمیلی

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۴۳- پس از آغاز همه گیری جهانی بیماری HMPVویروس متاپنومونی انسانی، واکسن های مختلفی برای این بیماری عرضه شده اند. کدام مطالعات در مورد این واکسن باید به بررسی عوارض احتمالی واکسن ها بپردازند؟

فقط کارآزمائی های بالینی با هدف تعیین کارآئی واکسن

فقط کارآزمائی های بالینی و مطالعات همگروهی با هدف تعیین کارآئی و یا اثربخشی واکسن

مطالعات کارآزمائی، همگروهی و مورد شاهدی با هدف تعیین کارآئی و یا اثربخشی واکسن

✓ هر مطالعه ای که با هر هدفی در مورد کارآئی و یا اثربخشی واکسن انجام می شود

۴۴- با توجه به نوع عامل بیماری HMPVویروس متاپنومونی انسانی که یک ویروس با RNA تک رشته ای است، احتمالاً موثرترین واکسن ها در مورد پیشگیری و کنترل این بیماری از کدام نوع خواهند بود؟

DNA Vaccines

RNA Encapsulated Vaccines

RNA viral Vector Vaccines

✓ mRNA Vaccines

۴۵- در ارزیابی اثر یک واکسن ابداع شده در مورد پیشگیری از ابتلاء به بیماری HMPVویروس متاپنومونی انسانی، یک کارآزمائی بالینی با تخصیص تصادفی در نظر گرفته شده است. کدام نکته در طراحی این مطالعه از موارد دیگر اهمیت بیشتری دارد؟

✓ بررسی پاسخ ایمنی به بیماری در افراد مورد مطالعه

اطمینان از نحوه تخصیص تصادفی افراد به گروه واکسن و دارونما

اطمینان از ارزیابی بروز بیماری در افراد واکسینه و دارونما

اطمینان از میزان مواجهه در دو گروه واکسینه و دارونما

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۴۶- مطالعات نشان داده است که میزان انتقال پایه در مورد بیماری HMPVویروس متاپنومونی انسانی در حدود عدد ۸ است. اگر یک واکسن با اثربخشی ۸۷.۵ درصد در دسترس باشد، چند درصد افراد جامعه باید واکسینه شوند تا بتوان این بیماری را کنترل کرد؟

با این واکسن بیماری قابل کنترل نیست

✓ ۱۰۰

۹۵

۹۰

۴۷- پس از تجویز واکسن HMPVویروس متاپنومونی انسانی در یک جامعه مشاهده شده است که بروز بیماری در ۲۲۲۵ فرد واکسینه شده ۷۵ مورد و در ۴۰۵۰ نفر که واکسن را دریافت نکرده بودند ۶۷۵ مورد در طی سه ماه بوده است. میزان اثربخشی واکسن مورد استفاده چند درصد بوده است؟

۹۵

۹۰

۸۵

✓ ۸۰

۴۸- در یک بررسی نشان داده شده است که میزان بقای ناشی از سرطان پستان در زنان غربالگری شده با ماموگرافی ۸۵ درصد در طی ۵ سال و در زنانی که در این غربالگری شرکت نکرده اند، ۷۵ درصد در طی ۵ سال بوده است. در گروهی که در غربالگری ماموگرافی شرکت نداشته اند، میزان بقای ۵ ساله در افرادیکه در هیچ برنامه غربالگری دیگری نیز شرکت نکرده بودند، ۷۰ درصد و در زنانیکه در برنامه های غربالگری دیگری مانند دیابت شیرین و یا سرطان دهانه رحم شرکت کرده بودند، ۸۰ درصد گزارش شده است. اثر رفتار سلامت و بیماری بر مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در زنان در چه حد قابل تخمین است؟

۵ درصد از مرگ و میر

✓ ۱۰ درصد از مرگ و میر

۱۵ درصد از مرگ و میر

قابل تعیین نیست

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۴۹- در یک بررسی نشان داده شده است که میزان بقای ناشی از سرطان پستان در زنان غربالگری شده با ماموگرافی ۸۵ درصد در طی ۵ سال و در زنانی که در این غربالگری شرکت نکرده اند، ۷۵ درصد در طی ۵ سال بوده است. در گروهی که در غربالگری ماموگرافی شرکت نداشته اند، میزان بقای ۵ ساله در افرادیکه در هیچ برنامه غربالگری دیگری نیز شرکت نکرده بودند، ۷۰ درصد و در زنانیکه در برنامه های غربالگری دیگری مانند دیابت شیرین و یا سرطان دهانه رحم شرکت کرده بودند، ۸۰ درصد گزارش شده است. اثر غربالگری بیماری با ماموگرافی بر مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در زنان در چه حد قابل تخمین است؟

- ✓ ۵ درصد از مرگ و میر
- ۱۰ درصد از مرگ و میر
- ۱۵ درصد از مرگ و میر
- قابل تعیین نیست

۵۰- در مورد غربالگری سندروم داون در مادران باردار و دیگر ناهنجاری های ژنتیک، برخی افراد که خود را صاحبنظر معرفی می کنند، اینکه موارد بیماری قابل درمان نیست را به عنوان فقدان یکی از معیارهای بسیار مهم در انجام غربالگری تلقی کرده و انجام غربالگری در مورد این بیماری را غیر اخلاقی و غیر مجاز تعبیر می نمایند. پاسخ مناسب در مورد این نظر کدام است؟

- این ادعا صحیح است و نباید غربالگری انجام شود
- ✓ درمان در این معبار به عنوان اقدام جهت کاهش بار بیماری یا رخداد باید در نظر گرفته شود
- بسیاری از بیماری های دیگر که برای آنها غربالگری انجام می شود، اساساً درمان ندارند
- با وجودیکه درمان برای این بیماری وجود ندارد اما شیوع آن بسیار زیاد و نیازمند مداخله است

۵۱- در مدیریت ناخوشی های اطفال، رویکرد مورد استفاده کدام است؟

- مبتنی بر شواهد نیست اما با توجه به توصیه سازمان جهانی بهداشت قابل قبول است
- رسیدن به تشخصی نهائی اهمیت ویژه ای دارد و دستورالعمل همین موضوع را دنبال می کند
- هدف درمان تمامی موارد بیماری و تمامی مشکلات سلامتی کودکان زیر ۵ سال در مرکز است
- ✓ طبقه بندی بر اساس میزان خطر و تصمیم گیری بر اساس نوع مراقبت مورد نیاز مد نظر است

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۵۲- کودک ۳ ساله با شکایت تب و سرفه و اسهال مراجعه کرده است. تصمیم گیری او بر اساس دستورالعمل مانا...

ممکن نیست و بیمار باید به متخصص کودکان ارجاع شود

با توجه به شکایت های متعدد و پیچیدگی، ارجاع به بیمارستان باید انجام شود

✓ ممکن است این کودک قابل پیگیری در منزل باشد

وضعیت کودک حداقل زرد خواهد بود و سبز نیست

۵۳- کودک ۲.۵ ساله با مشکل تنفس و کاهش وزن مراجعه کرده است. در بررسی عضلات شانه و سرین تحلیل رفته و کودک قدری بی حال است. صدای تنفسی مشکلی ندارد. تو رفتگی قفسه سینه مشهود نیست. بیمار تب ندارد اگرچه مادر اظهار داشته که شبها دمای بدن او بالا می رود. اسهال و دانه های پوستی مشاهده نشد. تصمیم گیری صحیح برای این کودک طبق دستورالعمل مانا کدام است؟

✓ ارجاع فوری

درمان و بررسی در مرکز

توصیه های غذائی و پیگیری در منزل

انجام آزمایشات اولیه و تصمیم گیری بر اساس آن

۵۴- کودک سه ماهه فرزند یکی از همکاران پزشک به مرکز بهداشت مراجعه داشته و پرستار کودک عنوان می دارد که در حال عبور از این حوالی جهت بررسی بدون سکایت خاص کودک را به مرکز آورده است. در بررسی ظاهری کودک مشکل خاصی ندارد اما در تخت معاینه متوجه تحرک کاهش یافته کودک می شوید. در سمع ریه متوجه نکته خاصی نمی شوید جز آنکه بدون آنکه کودک گریه کند، اندکی بخش پایینی قفسه سینه تو رفتگی پیدا کرده و سپس به حالت طبیعی باز می گردد. کودک به دلیل شیف کاری مادر از شیر خشک استفاده می کند و از نظر وزن گیری طبیعی به نظر می رسد. طبق دستورالعمل مانا اقدام مناسب برای این کودک کدام است؟

صحبت در زمان مقتضی با مادر کودک جهت تکمیل شرح حال

تجویز آزمایشات اولیه و بررسی دقیق تر

اطمینان دادن به پرستار و ارجاع به منزل

✓ ارجاع فوری به مرکز درمانی مجهز (بیمارستان)

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۵۵- در مراجعه به یک رستوران کودکی را در مشاهده می کنید که موهای کم پشت داشته و به شما اصرار برای خرید جوراب دارد. دست او را که نگاه می کنید متوجه کم رنگ بودن کف دست او می شود. از او می خواهید کف دست خود را به شما نشان دهد و متوجه می شود که رنگ پریده بوده و خطوط کف دست او نیز روشن است. اقدام شما طبق دستورالعمل مانا چیست؟

طبق دستورالعمل این مورد اقدامی ندارد

✓ ارجاع فوری به مرکز درمانی مجهز مثلاً بیمارستان مرکز طبی کودکان دانشگاه

توصیه به مراجعه توسط والدین به مرکز بهداشت و یا پزشک در اولین زمان ممکن

تهیه شربت سولفات آهن و دستور استفاده به وی و توصیه به مراجعه به همان رستوران دو هفته دیگر

۵۶- کدام بیماری غیرواگیر در کشور باید مبنای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر قرار گیرد و چرا؟

اختلالات سلامت روان به دلیل بار و شیوع بسیار بالا و ایجاد زمینه برای آسیب به خود

سرطان ها با توجه به بار و کشندگی بسیار بالا و عوامل خطر محیطی رو به فزونی در کشور

✓ بیماری های قلبی عروقی با توجه به بار و مرگ و میر بالا و اشتراک عوامل خطر با دیگر بیماری ها

سوانح و حوادث جاده ای با توجه به قابل پیشگیری بودن با اصلاح خودروها و جاده ها و عوامل انسانی

۵۷- در پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر...

باید امکانات و تجهیزات گسترده مانند مراکز جامع سرطان، مراکز کنترل دیابت، بیمارستان های فوق تخصصی قلب و عروق در سرار کشور راه اندازی و فراهم کرد

باید اقدامات گسترده در جهت درمان اختلالات سلامت روان من جمله تأسیس بیمارستان های تخصصی روان پزشکی و شبکه های مشاوره تحصصی انجام داد

✓ باید برای ارزیابی و مدیریت خطر از جداول بسیار ساده و بدون هزینه و نیاز به آزمایشات تخصصی در جامعه استفاده کرد و افراد پر خطر را شناسائی و مدیریت کرد

باید نظام پزشکی خانواده و ارجاع را با توجه به راه اندازی تخصص پزشکی خانواده و استفاده از متخصصین این رشته در هر مرکز بهداشتی درمان در اولویت قرار داد

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۵۸- کدام رویکرد در پیشگیری و کنترل سرطان پستان در زنان به عنوان پیشگیری اولیه قابل استفاده است؟

بررسی وجود ژن BRCA

بررسی سابقه فامیلی

✓ پیشگیری و کنترل چاقی و اضافه وزن

غربالگری با ماموگرافی

۵۹- کشنده ترین سرطان در کشور چگونه قابل پیشگیری و کنترل می باشد؟

توصیه های ویژه به تهیه غذای سالم و عدم استفاده از فست فودها و دیگر غذاهای افزایش دهنده خطر

غربالگری از نظر H pylori و درمان همگانی با استفاده از چهار داروی ریشه کن کننده این عامل

✓ توجه به عادات غذائی، اصلاح آنها، تأمین غذای سالم و حفظ امنیت غذائی به عنوان حق عمومی

تأمین امکانات جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی برای بیماران همراه با فراهم آوری انواع آندوسکوپی

۶۰- مهمترین عامل در بروز سوانح و حوادث جاده ای در کشورکدام مورد است؟

عدم استفاده از تجهیزات ایمنی مانند کلاه ایمنی و کمربندی ایمنی

✓ استفاده از داروها و موارد روانگردان و الکل

عدم توجه به قوانین و مقررات رانندگی

عوامل محیطی شامل خودرو و جاده

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۶۱- مرد ۴۲ ساله مراجعه کرده است. وزن او ۹۵ کیلوگرم و قد او ۱۸۵ سانتی متر است. دور کمر ۱۰۷ سانتی متر، قند خون ناشتا ۱۱۷ میلی گرم بر دسی لیتر، تری گلیسیرید ۱۲۷ میلی گرم بر دسی لیتر، HDL ۵۵ میلی گرم بر دسی لیتر، فشار خون ۱۲۷ بر روی ۸۰ میلی متر جیوه می باشد. کدام تشخیص برای وی مطرح است؟

سندروم متابولیک بر اساس معیار IDF، دیابت شیرین، چاقی مرکزی

✓ IFG، چاقی مرکزی، اضافه وزن

سندروم متابولیک بر اساس معیار IDF، IGF، چاقی

دیابت شیرین، چاقی مرکزی، چاقی

۶۲- مهمترین محدودیت در مورد مطالعاتی که روند تغییرات بیماری های قلبی عروقی را در کشور ارزیابی کرده اند، کدام است؟

ارزیابی های متفاوت در طول زمان در دوره های مختلف انجام مطالعات STEPs

✓ عدم ارزیابی دقیق پیامد اصلی یعنی بروز بیماری قلبی عروقی در جمعیت هدف

وجود خطا در ابزار و نمونه گیری در مطالعات مختلف و همچنین کم بودن تعداد نمونه

استفاده نادرست از آزمون های آماری و مقایسه های غیر دقیق آماری در تعیین معنی داری

۶۳- در خصوص مراقبت از اختلالات سلامت روان در کشور طبق آخرین مطالعه منتشر شده وضعیت ارائه خدمات چگونه است؟

✓ توصیه شده است که اقدامات باید در سطح شبکه بهداشت و برای تمامی افراد جامعه با توجه به رفع تبعیض انجام شود

توصیه شده است که باید تعداد تخت های بیمارستانی مرتبط با اختلالات سلامت روان افزایش یابد و متخصصین این رسته فعال تر عمل کنند

از روند مشاوره و نظام ارجاع که در نظام سلامت در مورد اختلالات سلامت روان به خوبی طراحی و اجرا شده است تقدیر شده است

بیش از ۱۷ درصد از DALY و بیش از ۲۹ درصد از YLD منتسب به اختلالت سلامت روان در این مطالعه شناخته شده است

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۶۴- در خصوص خطاهای فکری و شناختی کدام نکته صحیح است؟

- ✓ بیماری هائی مانند افسردگی حاد، اختلال وسواس جبری و اختلالات اضطرابی در حقیقت نوعی از همین خطاها هستند
- در این خطاها افراد امور بسیار مهم و خطیر، مانند شرایط پر مخاطره و حادثه خیز را معمولی و عادی تلقی می کنند
- معمولاً این خطاها به دلیل خوشبینی بیش از حد و در نظر گرفتن نتیجه خوب و مثبت برای تمامی رخداد های غیر معمول رخ می دهد
- پیشگوئی و پیشبینی کردن رخدادها در این مورد نقش مثبتی داشته و بر این اساس مناسب است که انسان از مواجهه و حضور اجتماعی اجتناب کند

۶۵- مهمترین نکته به منظور حفظ و ارتقای سلامت روان کدام است؟

- تفاوت روانپزشک، روانشناس و روان درمانگر را به درستی شناخت و تنها از تخصص مناسب در صورت نیاز مشاوره دریافت کرد
- ✓ توجه داشت که هر وضعیتی که منجر به اختلال در عملکرد روزانه، فعالیت های تحصیلی و شغلی و زندگی طبیعی شده باشد، نیازمند مراجعه فوری است
- این نکته بسیار اهمیت دارد که شرایط روحی و روانی ما به دلیل گفته ها، اندیشه ها و رفتارهای دیگران است و با اجتناب از افراد می توان شرایط بهتری داشت
- بسیاری از موارد به دلیل شرایط استرس زای محیط در دانشگاه و فشردگی دروس و آزمون ها بوده و هیچ اقدامی از سوی دانشجویان در این خصوص نیز ممکن نیست

۶۶- کدام مطالعه جهانی یا برنامه مربوط به نظام مراقبت بیماریهای غیر واگیردار است؟

- ✓ STEPS
- DOTS
- GAVI
- EPI

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۶۷- اولین بخش در قاعده هرم سورویلانس مربوط به یک بیماری گوارشی کدام است؟

- ✓ مواجهه با پاتوژن
- تست آزمایشگاهی
- جمع آوری نمونه مدفوع
- تشخیص پاتوژن

۶۸- کودکی به دنبال تزریق واکسن دچار عارضه ناشایعی می شود، برای جمع آوری اطلاعات اولویت با کدام است؟

- Registries
- ✓ Notifications
- Surveys
- Environmental monitoring

۶۹- کدامیک از خصوصیات داده های سورویلانس مبتنی بر indicator(IBS) است؟


- Not organized
- All hazards
- Informal
- ✓ Reliable

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۷۰- Sentinel surveillanceو registries به ترتیب زیر مجموعه کدام سورویلانس است؟

- ✓ IBS ،IBS
- EBS ،IBS
- EBS ،EBS
- IBS ،EBS

۷۱- با در نظر گرفتن الگوهای مختلف اپیدمی شماره یک و دو به ترتیب به چه مواردی اشاره دارند؟



- اپیدمیک، اندمیک
- ✓ هایپراندمیک، اندمیک
- پاندمیک، اپیدمیک
- اپیدمیک، تک گیری

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۷۲- کدامیک از موارد ذیل، معمولا در پاسخ به اپیدمی به عنوان objectiveدر نظر گرفته می شود؟

شکستن چرخه انتقال

درمان مناسب بیماران

پیشگیری از اپیدمی های آینده

✓ تعیین منبع احتمالی

۷۳- در مرحله اثبات طغیان در اپیدمی ها کدامیک ضروری تر است؟

اثبات همه بیماران

طرح فرضیه

✓ بررسی artefact ها

اثبات فرضیه

۷۴- منحنی اپیدمیک نشاندهنده کدامیک از موارد ذیل نمی باشد؟

الگوی انتشار


شدت بیماری

روند زمانی

✓ محل ابتلا

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۷۵- منحنی اپیدمیک ذیل، بیانگر کدام الگوی انتشار اپیدمی است؟



- Propagated ✓
- Point source
- Intermittent
- Continuous source

۷۶- کدام گروه از بیماریهای communicable در سال ۲۰۱۹ جزو ده علت اول مرگ در کشورهای با در آمد متوسط به بالا و با در آمد بالا بوده است؟

- Diarrhoeal disease
- Lower respiratory infections ✓
- AIDS
- Tuberculosis

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۷۷- شرایط پری ناتال ، مادری و کمبودهای تغذیه ای در کدام دسته بندی بیماری ها (براساس طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی) قرار می گیرند؟

- [x] واگیردار
- [ ] غیرواگیردار
- [ ] آسیب ها
- [ ] هیچکدام

۷۸- کدامیک به عنوان بیماری reemerging diseases در نظر گرفته می شود؟

- [ ] تب هموراژیک ویروسی
- [ ] SARS
- [ ] واریانت جدید کروتزفلد جاکوب
- [x] تب زرد

۷۹- بازپدیدی بیماریهایی مانند سرخک و سیاه سرفه در برخی کشورها، بیشتر تحت تاثیر کدامیک از عوامل ذیل است؟

- [x] کاهش کمپلیانس
- [ ] افزایش تماس با حیوانات
- [ ] مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک
- [ ] مسافرتهای بین المللی

آزمون:اصول اپیدمیولوژی مدت آزمون:70بر اساس دفترچه کاربر

۸۰- کدام راه انتقال بیماری با بقیه از لحاظ دسته بندی متفاوت است؟

آب آلوده

غذای آلوده

حشرات

✓ انتقال خون