Gendya金岱

EGFR基因突变检测报告

患者姓名：**吴秀英**

患者年龄：**66**

报告编号：**21N0389**

21N0389

目 录

1 患者信息 1

2 检测项目 1

3 检测结果概述 1

4 检测结果汇总 2

5 附录 4

1.患者信息

个人信息

样本编号：21N0389	性　　别：女
年　　龄：66	家族病史：NA
疾病描述：肺癌	
治疗史　：NA	
其他信息：NA	
样本种类：血浆	样本状态：正常
送检时间：2021-08-25	报告时间： 2021-08-30

2.检测项目

检测内容	EGFR基因突变检测
检测方法	ARMS-PCR法
检测仪器	ABI step one plus
核酸抽提方法	QIAamp DNA FFPE Tissue Kit\QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit
检测范围	EGFR基因29个突变位点（详见4. 检测结果汇总列表）

3.检测结果概述

检测结果

本次检测未发现EGFR基因18、19、20、21号外显子存在Egfr-TKI敏感的或有临床意义的基因突变，建议进行其他基因检测以了解有无其他肺癌驱动基因变异以及相关的分子靶向治疗药物敏感性。

最终治疗方式需结合患者整体情况确定，以上信息仅供参考。

4.检测结果汇总

外显子	突变位点	包含位点		检测结果
18	p.G719X	c.2156G>C	p.G719A	阴性
		c.2155G>A	p.G719S	
		c.2155G>T	p.G719C	
19	Exon 19del	c.2235_2249del15	p.E746_A750del	阴性
		c.2236_2250del15	p.E746_A750de	
		c.2240_2257del18	p.L747_P753>S	
		c.2235_2252>AAT(complex)	p.E746_T751>I	
		c.2236_2253del18	p.E746_T751del	
		c.2237_2251del15	p.E746_T751>A	
		c.2237_2254del18	p.E746_S752>A	
		c.2237_2255>T(complex)	p.E746_S752>V	
		c.2238_2255del18	p.E746_S752>D	
		c.2238_2248>GC(complex)	p.L747_A750>P	
		c.2238_2252>GCA(complex)	p.L747_T751>Q	
		c.2239_2247del9	p.L747_E749del	
		c.2239_2253del15	p.L747_T751del	
		c.2239_2256del18	p.L747_S752del	
		c.2239_2248TTAAGAGAAG>C(complex)	p.L747_A750>P	
		c.2239_2258>CA(complex)	p.L747_P753>Q	
		c.2240_2251del12	p.L747_T751>S	
		c.2240_2254del15	p.L747_T751del	
		c.2239_2251>C(complex)	p.L747_T751>P	
20	p.T790M	c.2369C>T	p.T790M	阴性
20	p.S768I	c.2303G>T	p.S768I	阴性
20	Exon 20ins	c.2319_2320insCAC	p.H773_V774insH	阴性
		c.2310_2311insGGT	p.D770_N771insG	
		c.2307_2308insgccagcgtg	p.V769_D770insASV	
21	p.L858R	c.2573T>G	p.L858R	阴性
21	p.L861Q	c.2582T>A	p.L861Q	阴性

注：
1）本方法检测灵敏度为5%，低于5%的突变可能无法检出；
2）本检测无法检出检测范围外的EGFR基因突变。

附图：



A	B	C	D	E	F	G	H
19-Del	L858R	T790M	20-Ins	G719X	S768I	L861Q	外控

5.附录

5.1 什么是EGFR?

EGFR（Epidermal growth factor receptor family）：人类表皮生长因子受体家族属于酪氨酸激酶受体家族，也被称作HER家族或ERBB家族。EGFR诱导癌症至少通过3种机制：EGFR配体的过表达、EGFR的扩增或EGFR的突变活化。其中以EGFR的突变活化为主要机制。

5.2 为什么进行EGFR检测？

EGFR基因突变是患者对易瑞沙和特罗凯等靶向药物有效的必要前提，其与这些TKI药物反应性相关的突变主要集中在18-21外显子，其中外显子19缺失突变和外显子21上L858R点突变比例最高。外显子19上747-750位氨基酸的不同缺失约占45%，其中delE746-A750（2235-2249del和2236-2250del）最为常见；外显子21上858位氨基酸替代突变约占40-45%；外显子18点突变（G719S或G719C）约占5%；外显子20上插入突变约占1%左右，可能使得肿瘤细胞对TKI不敏感，部分突变还与TKI抗性有关，外显子20上T790M突变导致约50%患者TKI耐药。

临床研究表明，EGFR突变分布于临床上EGFR-TKI治疗的人群相一致，主要见于女性、腺癌、非吸烟者及亚裔患者。美国国家癌症综合网络（NCCN）临床治疗指南中明确指出：EGFR突变，尤其是外显子19缺失突变与肿瘤对TKIs如吉非替尼的敏感度有重要关系。

检测报告使用须知

1.本次检测结果仅对本次送检样本负责；

2.本次送检剩余样本保留时间为15个工作日，如对本次结果存有异议，请在10个工作日内与本公司联系；

3.有关科学研究报道，肿瘤是处于动态变化的疾病，患者一次检测结果只可作为获得样本后一段时间实施治疗的参考。一段时期后患者疾病可能会发生改变（包括疾病转好、稳定、进展等），因此，本次检测结果不可作为一段时间后才实 施的治疗的参考。若一段时间（如三个月）后患者还需接受其他治疗，建议患者再次咨询主治医生接受有关检测，供其他治疗参考；

4.本次检测结果仅供参考，最终治疗方案请遵医嘱。

声明

对有限数量的细胞进行基因检测不能揭示所有可能存在的有意义的基因突变，也不能排除肿瘤进展过程中发生变化的可能性。基因突变可能由于检测技术的限制、样本中肿瘤细胞比例、样本采集或运输意外以及其他无法预知的因素等而未被发现。本报告仅对此次检测样本和检测报告的一致性负责。本检测报告为科学研究报告，仅供临床医生参考。具体治疗方案须由临床医生根据患者的情况、患者与家属意愿及其它综合因素进行选择。

检测人:薛梦娇　　复核人:吴阳　　审核人:

Gendya金岱

北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层

010-67888090

www.gendya.com

请扫描二维码了
解更多内容