

# ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА

## что делать прямо сейчас

**SOS-инструкция: открыть во время приступа, переслать человеку рядом или распечатать.**

Здесь не будет всех существующих вариантов работы с паническими атаками.

**Здесь будет то, что нужно человеку, которого накрыло прямо сейчас.**

Написано человеком, который не один год страдал от жестоких панических атак, пока не разобрался, как и почему они возникают и что с этим делать. После этого они исчезли и не возвращаются даже во время массовых обстрелов.

**Если тебя накрыло прямо сейчас - начни со следующей страницы.**

Скачать эту памятку в виде pdf файла можно [здесь](#)



# СНАЧАЛА ПРОВЕРЬ

Наша задача не поставить тебе диагноз. Наша задача понять, можно ли с высокой вероятностью переключиться с поиска смертельной опасности на понятный протокол панической атаки.

**С тобой такое уже было?**

ДА



**Тогда это закончилось и ты вернулся в норму?**

ДА



**Ты обращался к врачам из-за таких приступов или обследовался, и опасной причины не обнаружили?**

ДА



**Сейчас происходит примерно то же самое?**

ДА



**С ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ТЕБЯ СНОВА НАКРЫЛА ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА.**

**Хорошая новость- паническая атака тебя не убьет.**

Если на любом шаге ответ «НЕТ» - не делай преждевременный вывод «со мной точно что-то страшное». Перейди к разделу «Красные флаги», чтобы исключить реально опасные для жизни ситуации и возвращайся к чтению памятки если там нет совпадений..

## КРАСНЫЕ ФЛАГИ

Эта памятка не предназначена для диагностики инфаркта, инсульта или последствий травмы.

**Но попытайся получить медицинскую помощь, если:**

- этот приступ существенно отличается от всех предыдущих;
- появилась новая сильная давящая или сжимающая боль в груди, особенно если она отдаёт в руку, спину, шею или челюсть;
- появилась необычная выраженная одышка, холодный липкий пот, резкая слабость;
- перекосило лицо, внезапно ослабла или онемела одна сторона тела, нарушилась речь;
- человек действительно потерял сознание, становится спутанным или перестаёт нормально отвечать;
- симптомы появились непосредственно после близкого взрыва, удара, падения или травмы и есть потеря сознания, повторная рвота, нарушение речи, координации, судороги или другие новые неврологические симптомы.

**В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ЭТО УЖЕ НЕ ЗАДАЧА ДЛЯ ПАМЯТКИ О ПАНИЧЕСКОЙ АТАКЕ И СКОРЕЕ ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ.**

---

**ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ !**

# **ТЫ НЕ УМИРАЕШЬ**

Даже если паническая атака очень сильная.

Даже если сердце колотит так, что, кажется, сейчас выскочит из груди.

Даже когда тебе не хватает воздуха и кажется, что ты не можешь дышать.

Даже когда тебя трясёт.

Даже когда кружится голова.

Даже когда внутри есть абсолютная уверенность:  
«Всё. На этот раз я реально умираю».

## **Нет!**

**Если это паническая атака, ты не умираешь.**

Организм в этой ситуации прекрасно умеет не допустить критического состояния. Хотя и может быть чудовищно страшно.

# ЧТО ПРОИСХОДИТ

Паническая атака в значительной степени держится на очень простой адреналиновой петле.

Что-то произошло: кольнуло в груди, закружилась голова, был взрыв, несколько ночей почти не спал - или сердце просто вдруг забилося быстрее, потому что ты о чем то подумал.

## После этого ТЫ ИСПУГАЛСЯ

Для организма страх означает: ОПАСНОСТЬ.

Надпочечники выбрасывают адреналин. Организм переходит в режим «Дерись или беги».

Сердце работает быстрее. Дыхание учащается. Напрягаются мышцы. Может появиться дрожь, жар или холод.

Ты пугаешься уже этих ощущений: «Наверное, я сейчас умру».

**Организм слышит: ОПАСНОСТЬ ЕЩЁ НЕ ПРОШЛА.**

**И добавляет новую порцию адреналина.**

**Симптомы усиливаются. Ты пугаешься еще сильнее.**

**ТОЧКА РАЗРЫВА ПЕТЛИ ИСПУГА:**

«Я знаю, что происходит. Это адреналин. Не запускаю следующий круг».

# ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

## Адреналин не вечный.

Он очень быстро разрушается организмом. Его количество уменьшается вдвое каждые 3–5 минут.

Возьмем для примера норму 1 единица адреналина. Ты так себя напугал, что сейчас адреналина 8 единиц. Но через 5 минут естественным образом он снизится до 4 единиц. За следующие 5 минут от 4 единиц останется всего половина, т.е. 2 единицы. Через еще 5 минут от 2 останется всего 1. Что является нормой.

Это очень упрощённое объяснение, но сейчас тебе не нужна лекция по биохимии.

**8 → 4 → 2 → 1**

**КАЖДЫЕ НЕСКОЛЬКО МИНУТ БЕЗ НОВОГО ВИТКА ПАНИКИ  
КОЛИЧЕСТВО АДРЕНАЛИНА СНИЖАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.**

**И снижаются пугающие тебя симптомы.**

**Паническая атака не может бесконечно нарастать. Она достигнет пика. А потом закончится. САМА.**

Обычно основная волна укладывается примерно в 20–30 минут.

После этого может ещё трясти, остаться или появиться слабость, ватные ноги, усталость.

Это не означает, что атака продолжается или усиливается. Организму нужно время после такой жесткой мобилизации.

# ЧТО ДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

**ВАЖНО - ТЫ НЕ УМИРАЕШЬ.**

- ЭТО АДРЕНАЛИН.
- ОН УЖЕ РАСПАДАЕТСЯ.
- НЕ ПОДБРАСЫВАЙ СЛЕДУЮЩУЮ ПОРЦИЮ НОВЫМ ИСПУГОМ.

Теперь займём тело и мозг на то время, которое им нужно для возвращения в норму.

**1**

## **МОЖЕШЬ ХОДИТЬ**

Иди ровным обычным шагом. Желательно около 30 минут. Во время обстрела не выходи ради прогулки из безопасного места.

**2**

## **ХОДИТЬ НЕГДЕ, НО НАГРУЗКА НЕ ПРОТИВОПОКАЗАНА**

Сделай обычную зарядку. Или приседай.

**3**

## **ДВИГАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ**

Дышим: вдох 5 счетов, выдох 5 счетов. После каждого цикла загибай один палец. 30 циклов вдох/выдох ≈ 5 минут.

**На следующей странице более подробно описаны эти действия**

# 1. ЕСЛИ МОЖЕШЬ ХОДИТЬ

## ИДИ.

Не мечись из угла в угол. Не бегай в поисках спасения. Выбери безопасный маршрут и иди ровным обычным шагом. Желательно около 30 минут.

Твоё тело только что подготовилось двигаться, бежать, прыгать. Так дай ему движение.

**Не спрашивай себя «Как сердце? А сейчас? А теперь? А вдруг всё-таки?..»**

**Просто иди.** Мозг отвлечется на то, куда ставить ноги, что происходит вокруг, какие звуки окружают и меньше будет обращать внимание на происходящее в теле.

**ВО ВРЕМЯ ОБСТРЕЛА НЕ ВЫХОДИ РАДИ ПРОГУЛКИ ИЗ БЕЗОПАСНОГО МЕСТА.**

# 2. ЕСЛИ ХОДИТЬ НЕГДЕ

Если ты знаешь, что физическая нагрузка тебе не противопоказана - сделай обычную зарядку. Или приседай до усталости.

**«Какие, приседания? У меня сердце сейчас из груди вылетит!»**

## Вот именно.

Тебе может казаться, что это глупо. Но адреналин вбрасывался ради того чтобы ты бежал или дрался. Мы даем телу движение. Работают ноги. Работает тело. Мозг занят этими действиями.

### 3. ЕСЛИ ДВИГАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Ты в убежище, спрятался в ванную с ребенком, или тебе противопоказаны физические упражнения.

## Тогда дышим.

Не «дыши глубже». Не «попробуй успокоиться». У тебя есть конкретная работа на пять минут.

**ВДОХ на 5 счетов: 1 • 2 • 3 • 4 • 5**

**ВЫДОХ на 5 счетов: 1 • 2 • 3 • 4 • 5**



**После каждого полного вдоха и выдоха загни ОДИН палец.**



10 пальцев = 10 циклов вдох/выдох. Сбросил. Начал снова.  
Сделай так три раза.

## 30 ЦИКЛОВ ≈ 5 МИНУТ

Тебе даже не нужны часы. Считай. Дыши. Загибай пальцы.

Через пять минут первоначального адреналина уже значительно меньше, если ты не подбрасывал новый страх. Всё ещё потряхивает? Это нормально.

# А МОЖЕТ ТАБЛЕТКУ?

Вот здесь есть ловушка, в которую когда-то попал и я. И в которую попадает огромное количество людей.

Началась паническая атака.

Ты что-то выпил.

Через 20–30 минут стало легче.

**Мозг сделал вывод: «МЕНЯ СПАСЛА ТАБЛЕТКА».**

Однажды таблетки рядом нет.

**Появляется новый страх: «Чем теперь себя спасу?»**

**ТО, ЧТО ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА ЗАКОНЧИЛАСЬ ПОСЛЕ ТАБЛЕТКИ, ЕЩЁ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОНА ЗАКОНЧИЛАСЬ ИЗ-ЗА ТАБЛЕТКИ.**

Ты выпил таблетку. Через 20-30 минут тебя отпустило. Таблетка могла успеть дать успокаивающий эффект. А могла ещё не успеть существенно подействовать. Но сама паническая атака за это время тоже естественным образом идёт на спад. Поэтому нам не нужно чтобы мозг делал вывод: «таблетка спасла меня, без неё я бы не справился».

**Таблетка не должна становиться волшебным предметом, без которого ты считаешь себя беззащитным. Паническая атака пройдет самостоятельно.**

# ЕСЛИ ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА У ЧЕЛОВЕКА РЯДОМ

## НЕ ПАНИКУЙ ВМЕСТЕ С НИМ.

Человек сейчас абсолютно уверен, что умирает. Если ты тоже начнёшь суесться и строить страшное лицо, его мозг получит подтверждение: «Значит происходит что-то ужасное, я действительно умираю».

### НЕ НАДО

- каждые полминуты спрашивать про сердце, голову и дыхание
- рассказывать страшные медицинские истории
- гуглить симптомы вместе
- суесться и зеркалить панику

### ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ

- **быстро проверить знакомость приступа и красные флаги**
- после этого перестать заниматься диагностикой
- если безопасно - идти вместе обычным шагом
- спокойно объяснять, что происходит

**«ПОШЛИ. Я ТЕБЕ СЕЙЧАС ОБЪЯСНЮ, ЧТО ПРОИСХОДИТ».**

**Или открой эту памятку и читай её человеку вслух.**

**СПОКОЙНО • МЕДЛЕННО • С ПАУЗАМИ**

Пока ты читаешь, проходит время. Человек слушает тебя вместо того, чтобы слушать каждое сокращение собственного сердца.

А организм тем временем делает своё дело.

---

# И ПОСЛЕДНЕЕ

Самая большая победа над панической атакой не в том, чтобы научиться идеально её останавливать.

## А В ТОМ, ЧТОБЫ ПЕРЕСТАТЬ ЕЁ БОЯТЬСЯ.

«Я УМИРАЮ!»



«А. Адреналин. Я это уже знаю. Надо переждать и не пугаться».



«О, опять эта хрень, пофиг».

Я через это прошёл. И видел много раз, как через это проходили другие. Когда ты понимаешь что происходит и перестаешь их бояться, панические атаки становятся реже, слабее или совсем уходят..

**ТЫ НЕ УМИРАЕШЬ.  
ЭТО АДРЕНАЛИН ИЗ ЗА ТВОЕГО ИСПУГА СИМТОМОВ.  
ОН СНИЖАЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ.  
НЕ ЗАПУСКАЙ СЛЕДУЮЩИЙ КРУГ ИСПУГА.**

А теперь иди. Или приседай. Или сделай свои 30 дыханий.

Остальное организм сделает сам.

Желаю тебе здоровья.