

ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА

что делать прямо сейчас

SOS-инструкция: открыть во время приступа, переслать человеку рядом или распечатать.

Здесь не будет всех существующих вариантов работы с паническими атаками.

Здесь будет то, что нужно человеку, которого накрыло прямо сейчас.

Написано человеком, который не один год страдал от жестоких панических атак, пока не разобрался, как и почему они возникают и что с этим делать. После этого они исчезли и не возвращаются даже во время массовых обстрелов.

Если тебя накрыло прямо сейчас - начни со следующей страницы.

Скачать эту памятку в виде pdf файла можно [здесь](#)



СНАЧАЛА ПРОВЕРЬ

Наша задача не поставить тебе диагноз. Наша задача понять, можно ли с высокой вероятностью переключиться с поиска смертельной опасности на понятный протокол панической атаки.

С тобой такое уже было?

ДА



Тогда это закончилось и ты вернулся в норму?

ДА



Ты обращался к врачам из-за таких приступов или обследовался, и опасной причины не обнаружили?

ДА



Сейчас происходит примерно то же самое?

ДА



**С ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ТЕБЯ СНОВА
НАКРЫЛА ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА.**

**Хорошая новость- паническая атака тебя не
убьет.**

Если на любом шаге ответ «НЕТ» - не делай преждевременный вывод «со мной точно что-то страшное». Перейди к разделу «Красные флаги», чтобы исключить реально опасные для жизни ситуации и возвращайся к чтению памятки если там нет совпадений..

КРАСНЫЕ ФЛАГИ

Эта памятка не предназначена для диагностики инфаркта, инсульта или последствий травмы.

Но попытайся получить медицинскую помощь, если:

- этот приступ существенно отличается от всех предыдущих;
- появилась новая сильная давящая или сжимающая боль в груди, особенно если она отдаёт в руку, спину, шею или челюсть;
- появилась необычная выраженная одышка, холодный липкий пот, резкая слабость;
- перекосило лицо, внезапно ослабла или онемела одна сторона тела, нарушилась речь;
- человек действительно потерял сознание, становится спутанным или перестаёт нормально отвечать;
- симптомы появились непосредственно после близкого взрыва, удара, падения или травмы и есть потеря сознания, повторная рвота, нарушение речи, координации, судороги или другие новые неврологические симптомы.

В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ЭТО УЖЕ НЕ ЗАДАЧА ДЛЯ ПАМЯТКИ О ПАНИЧЕСКОЙ АТАКЕ И СКОРЕЕ ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ.

ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ !

ТЫ НЕ УМИРАЕШЬ

Даже если паническая атака очень сильная.

Даже если сердце колотит так, что, кажется, сейчас выскочит из груди.

Даже когда тебе не хватает воздуха и кажется, что ты не можешь дышать.

Даже когда тебя трясёт.

Даже когда кружится голова.

Даже когда внутри есть абсолютная уверенность:
«Всё. На этот раз я реально умираю».

Нет!

Если это паническая атака, ты не умираешь.

Организм в этой ситуации прекрасно умеет не допустить критического состояния. Хотя и может быть чудовищно страшно.

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Паническая атака в значительной степени держится на очень простой адреналиновой петле.

Что-то произошло: кольнуло в груди, закружилась голова, был взрыв, несколько ночей почти не спал - или сердце просто вдруг забилося быстрее, потому что ты о чем то подумал.

После этого ТЫ ИСПУГАЛСЯ

Для организма страх означает: ОПАСНОСТЬ.

Надпочечники выбрасывают адреналин. Организм переходит в режим «Дерись или беги».

Сердце работает быстрее. Дыхание учащается. Напрягаются мышцы. Может появиться дрожь, жар или холод.

Ты пугаешься уже этих ощущений: «Наверное, я сейчас умру».

Организм слышит: ОПАСНОСТЬ ЕЩЁ НЕ ПРОШЛА.

И добавляет новую порцию адреналина.

Симптомы усиливаются. Ты пугаешься еще сильнее.

ТОЧКА РАЗРЫВА ПЕТЛИ ИСПУГА:

«Я знаю, что происходит. Это адреналин. Не запускаю следующий круг».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Адреналин не вечный.

Он очень быстро разрушается организмом. Его количество уменьшается вдвое каждые 3–5 минут.

Возьмем для примера норму 1 единица адреналина. Ты так себя напугал, что сейчас адреналина 8 единиц. Но через 5 минут естественным образом он снизится до 4 единиц. За следующие 5 минут от 4 единиц останется всего половина, т.е. 2 единицы. Через еще 5 минут от 2 останется всего 1. Что является нормой.

Это очень упрощённое объяснение, но сейчас тебе не нужна лекция по биохимии.

8 → 4 → 2 → 1

**КАЖДЫЕ НЕСКОЛЬКО МИНУТ БЕЗ НОВОГО ВИТКА ПАНИКИ
КОЛИЧЕСТВО АДРЕНАЛИНА СНИЖАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.**

И снижаются пугающие тебя симптомы.

Паническая атака не может бесконечно нарастать. Она достигнет пика. А потом закончится. САМА.

Обычно основная волна укладывается примерно в 20–30 минут.

После этого может ещё трясти, остаться или появиться слабость, ватные ноги, усталость.

Это не означает, что атака продолжается или усиливается. Организму нужно время после такой жесткой мобилизации.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

ВАЖНО - ТЫ НЕ УМИРАЕШЬ.

- ЭТО АДРЕНАЛИН.
- ОН УЖЕ РАСПАДАЕТСЯ.
- НЕ ПОДБРАСЫВАЙ СЛЕДУЮЩУЮ ПОРЦИЮ НОВЫМ ИСПУГОМ.

Теперь займём тело и мозг на то время, которое им нужно для возвращения в норму.

1

МОЖЕШЬ ХОДИТЬ

Иди ровным обычным шагом. Желательно около 30 минут. Во время обстрела не выходи ради прогулки из безопасного места.

2

ХОДИТЬ НЕГДЕ, НО НАГРУЗКА НЕ ПРОТИВОПОКАЗАНА

Сделай обычную зарядку. Или приседай.

3

ДВИГАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Дышим: вдох 5 счетов, выдох 5 счетов. После каждого цикла загибай один палец. 30 циклов вдох/выдох ≈ 5 минут.

На следующей странице более подробно описаны эти действия

1. ЕСЛИ МОЖЕШЬ ХОДИТЬ

ИДИ.

Не мечись из угла в угол. Не бегай в поисках спасения. Выбери безопасный маршрут и иди ровным обычным шагом. Желательно около 30 минут.

Твоё тело только что подготовилось двигаться, бежать, прыгать. Так дай ему движение.

Не спрашивай себя «Как сердце? А сейчас? А теперь? А вдруг всё-таки?..»

Просто иди. Мозг отвлечется на то, куда ставить ноги, что происходит вокруг, какие звуки окружают и меньше будет обращать внимание на происходящее в теле.

ВО ВРЕМЯ ОБСТРЕЛА НЕ ВЫХОДИ РАДИ ПРОГУЛКИ ИЗ БЕЗОПАСНОГО МЕСТА.

2. ЕСЛИ ХОДИТЬ НЕГДЕ

Если ты знаешь, что физическая нагрузка тебе не противопоказана - сделай обычную зарядку. Или приседай до усталости.

«Какие, приседания? У меня сердце сейчас из груди вылетит!»

Вот именно.

Тебе может казаться, что это глупо. Но адреналин вбрасывался ради того чтобы ты бежал или дрался. Мы даем телу движение. Работают ноги. Работает тело. Мозг занят этими действиями.

3. ЕСЛИ ДВИГАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Ты в убежище, спрятался в ванную с ребенком, или тебе противопоказаны физические упражнения.

Тогда дышим.


Не «дыши глубже». Не «попробуй успокоиться». У тебя есть конкретная работа на пять минут.

ВДОХ на 5 счетов: 1 • 2 • 3 • 4 • 5

ВЫДОХ на 5 счетов: 1 • 2 • 3 • 4 • 5



После каждого полного вдоха и выдоха загни ОДИН палец.



10 пальцев = 10 циклов вдох/выдох. Сбросил. Начал снова.
Сделай так три раза.

30 ЦИКЛОВ ≈ 5 МИНУТ

Тебе даже не нужны часы. Считай. Дыши. Загибай пальцы.

Через пять минут первоначального адреналина уже значительно меньше, если ты не подбрасывал новый страх. Всё ещё потряхивает? Это нормально.

А МОЖЕТ ТАБЛЕТКУ?

Вот здесь есть ловушка, в которую когда-то попал и я. И в которую попадает огромное количество людей.

Началась паническая атака.

Ты что-то выпил.

Через 20–30 минут стало легче.

Мозг сделал вывод: «МЕНЯ СПАСЛА ТАБЛЕТКА».

Однажды таблетки рядом нет.

Появляется новый страх: «Чем теперь себя спасу?»

ТО, ЧТО ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА ЗАКОНЧИЛАСЬ ПОСЛЕ ТАБЛЕТКИ, ЕЩЁ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОНА ЗАКОНЧИЛАСЬ ИЗ-ЗА ТАБЛЕТКИ.

Ты выпил таблетку. Через 20-30 минут тебя отпустило. Таблетка могла успеть дать успокаивающий эффект. А могла ещё не успеть существенно подействовать. Но сама паническая атака за это время тоже естественным образом идёт на спад. Поэтому нам не нужно чтобы мозг делал вывод: «таблетка спасла меня, без неё я бы не справился».

Таблетка не должна становиться волшебным предметом, без которого ты считаешь себя беззащитным. Паническая атака пройдет самостоятельно.

ЕСЛИ ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА У ЧЕЛОВЕКА РЯДОМ

НЕ ПАНИКУЙ ВМЕСТЕ С НИМ.

Человек сейчас абсолютно уверен, что умирает. Если ты тоже начнёшь суесться и строить страшное лицо, его мозг получит подтверждение: «Значит происходит что-то ужасное, я действительно умираю».

НЕ НАДО

- каждые полминуты спрашивать про сердце, голову и дыхание
- рассказывать страшные медицинские истории
- гуглить симптомы вместе
- суесться и зеркалить панику

ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ

- **быстро проверить знакомость приступа и красные флаги**
- после этого перестать заниматься диагностикой
- если безопасно - идти вместе обычным шагом
- спокойно объяснять, что происходит

«ПОШЛИ. Я ТЕБЕ СЕЙЧАС ОБЪЯСНЮ, ЧТО ПРОИСХОДИТ».

Или открой эту памятку и читай её человеку вслух.

СПОКОЙНО • МЕДЛЕННО • С ПАУЗАМИ

Пока ты читаешь, проходит время. Человек слушает тебя вместо того, чтобы слушать каждое сокращение собственного сердца.

А организм тем временем делает своё дело.

И ПОСЛЕДНЕЕ

Самая большая победа над панической атакой не в том, чтобы научиться идеально её останавливать.

А В ТОМ, ЧТОБЫ ПЕРЕСТАТЬ ЕЁ БОЯТЬСЯ.

«Я УМИРАЮ!»



«А. Адреналин. Я это уже знаю. Надо переждать и не пугаться».



«О, опять эта хрень, пофиг».

Я через это прошёл. И видел много раз, как через это проходили другие. Когда ты понимаешь что происходит и перестаешь их бояться, панические атаки становятся реже, слабее или совсем уходят..

**ТЫ НЕ УМИРАЕШЬ.
ЭТО АДРЕНАЛИН ИЗ ЗА ТВОЕГО ИСПУГА СИМТОМОВ.
ОН СНИЖАЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ.
НЕ ЗАПУСКАЙ СЛЕДУЮЩИЙ КРУГ ИСПУГА.**

А теперь иди. Или присядай. Или сделай свои 30 дыханий.

Остальное организм сделает сам.

Желаю тебе здоровья.