
ПАНІЧНА АТАКА

що робити прямо зараз

SOS-інструкція: відкрити під час нападу, переслати людині поруч або роздрукувати.

Тут не буде всіх існуючих варіантів роботи з панічними атаками.

Тут буде те, що потрібно людині, яку накрило прямо зараз.

Написано людиною, яка не один рік страждала від жорстких панічних атак, доки не розібралася, як і чому вони виникають і що з цим робити. Після цього вони зникли й не повертаються навіть під час масованих обстрілів.

Якщо тебе накрило прямо зараз - почни з наступної сторінки.

Завантажити цю памятку у вигляді pdf файлу можна тут



СПОЧАТКУ ПЕРЕВІР

Наше завдання не поставити тобі діагноз. Наше завдання зрозуміти, чи можна з високою ймовірністю переключитися з пошуку смертельної небезпеки на зрозумілий протокол панічної атаки.

З тобою таке вже було?

ТАК



Тоді це закінчилося і ти повернувся до нормального стану?

ТАК



Ти звертався до лікарів через такі напади або обстежувався, і небезпечної причини не виявили?

ТАК



Зараз відбувається приблизно те саме?

ТАК



**З ДУЖЕ ВЕЛИКОЮ ЙМОВІРНІСТЮ ТЕБЕ ЗНОВУ
НАКРИЛА ПАНІЧНА АТАКА.**

Хороша новина - панічна атака тебе не вб'є.

Якщо на будь-якому кроці відповідь «НІ» - не роби передчасний висновок «зі мною точно щось страшне». Перейди до розділу «Червоні прапорці», щоб виключити реально небезпечні для життя ситуації, і повертайся до читання пам'ятки, якщо там немає збігів.

ЧЕРВОНІ ПРАПОРЦІ

Ця пам'ятка не призначена для діагностики інфаркту, інсульту або наслідків травми.

Але спробуй отримати медичну допомогу, якщо:

- цей напад суттєво відрізняється від усіх попередніх;
- з'явився новий сильний тиснучий або стискаючий біль у грудях, особливо якщо він віддає в руку, спину, шию або щелепу;
- з'явилася незвична виражена задишка, холодний липкий піт, різка слабкість;
- перекосило обличчя, раптово ослабла або оніміла одна сторона тіла, порушилася мова;
- людина справді втратила свідомість, стає сплутаною або перестає нормально відповідати;
- симптоми з'явилися безпосередньо після близького вибуху, удару, падіння або травми і є втрата свідомості, повторне блювання, порушення мови, координації, судоми або інші нові неврологічні симптоми.

**У ЦИХ ВИПАДКАХ ЦЕ ВЖЕ НЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПАМ'ЯТКИ
ПРО ПАНІЧНУ АТАКУ І, НАЙІМОВІРНІШЕ, ПОТРІБНА
ТЕРМІНОВА МЕДИЧНА ДОПОМОГА.**

ТЕПЕР НАЙГОЛОВНІШЕ!

ТИ НЕ ПОМИРАЄШ

Навіть якщо панічна атака дуже сильна.

Навіть якщо серце калатає так, що здається, зараз вискочить із грудей.

Навіть коли тобі бракує повітря і здається, що ти не можеш дихати.

Навіть коли тебе трясє.

Навіть коли паморочиться голова.

Навіть коли всередині є абсолютна впевненість: «Все. Цього разу я реально помираю».

Ні!

Якщо це панічна атака, ти не помираєш.

Організм у цій ситуації чудово вміє не допустити критичного стану. Хоча може бути жахливо страшно.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ

Панічна атака значною мірою тримається на дуже простій адреналіновій петлі.

Щось сталося: кольнуло в грудях, запаморочилася голова, був вибух, кілька ночей майже не спав - або серце просто раптом забилося швидше, тому що ти про щось подумав.

Після цього ТИ ЗЛЯКАВСЯ

Для організму страх означає: НЕБЕЗПЕКА.

Наднирники викидають адреналін. Організм переходить у режим «Бийся або тікай».

Серце працює швидше. Дихання частішає. Напружуються м'язи. Може з'явитися тремтіння, жар або холод.

Ти лякаєшся вже цих відчуттів: «Напевно, я зараз помру».

Організм чує: НЕБЕЗПЕКА ЩЕ НЕ МИНУЛА.

І додає нову порцію адреналіну.

Симптоми посилюються. Ти лякаєшся ще сильніше.

ТОЧКА РОЗРИВУ ПЕТЛІ ПЕРЕЛЯКУ:

«Я знаю, що відбувається. Це адреналін. Не запускаю наступне коло».

ХОРОША НОВИНА

Адреналін не вічний.

Він дуже швидко руйнується організмом. Його кількість зменшується вдвічі кожні 3-5 хвилин.

Візьмемо для прикладу норму 1 одиниця адреналіну. Ти так себе налякав, що зараз адреналіну 8 одиниць. Але через 5 хвилин природним чином він знизиться до 4 одиниць. За наступні 5 хвилин від 4 одиниць залишиться лише половина, тобто 2 одиниці. Ще через 5 хвилин від 2 залишиться лише 1. Що і є нормою.

Це дуже спрощене пояснення, але зараз тобі не потрібна лекція з біохімії.

8 → 4 → 2 → 1

КОЖНІ КІЛЬКА ХВИЛИН БЕЗ НОВОГО ВИТКА ПАНІКИ КІЛЬКІСТЬ АДРЕНАЛІНУ ЗНИЖУЄТЬСЯ АВТОМАТИЧНО.

І зменшуються симптоми, які тебе лякають.

Панічна атака не може нескінченно наростати. Вона досягне піку. А потім закінчиться. САМА.

Зазвичай основна хвиля вкладається приблизно у 20-30 хвилин.

Після цього може ще трясти, залишитися або з'явитися слабкість, ватяні ноги, втома. Це не означає, що атака триває або посилюється. Організму потрібен час після такої жорсткої мобілізації.

ЩО РОБИТИ ПРЯМО ЗАРАЗ

ВАЖЛИВО - ТИ НЕ ПОМИРАЄШ.

• **ЦЕ АДРЕНАЛІН.**

• **ВІН УЖЕ РОЗПАДАЄТЬСЯ.**

• **НЕ ПІДКИДАЙ НАСТУПНУ ПОРЦІЮ НОВИМ ПЕРЕЛЯКОМ.**

Тепер займемо тіло й мозок на той час, який їм потрібен для повернення до норми.

1

МОЖЕШ ХОДИТИ

Іди рівним звичайним кроком. Бажано близько 30 хвилин. Під час обстрілу не виходь заради прогулянки з безпечного місця.

2

ХОДИТИ НЕМАЄ ДЕ, АЛЕ НАВАНТАЖЕННЯ НЕ ПРОТИПОКАЗАНЕ

Зроби звичайну зарядку. Або присідай.

3

РУХАТИСЯ НЕ МОЖНА

Дихаємо: вдих на 5 рахунків, видих на 5 рахунків. Після кожного циклу загинай один палець. 30 циклів вдих/видих $\approx$ 5 хвилин.

На наступній сторінці ці дії описані детальніше

1. ЯКЩО МОЖЕШ ХОДИТИ ІДИ.

Не метушися з кутка в куток. Не бігай у пошуках порятунку. Обери безпечний маршрут і йди рівним звичайним кроком. Бажано близько 30 хвилин.

Твоє тіло щойно підготувалося рухатися, бігти, стрибати. Тож дай йому рух.

Не запитуй себе: «Як серце? А зараз? А тепер? А раптом таки-все?..»

Просто йди. Мозок відволікатиметься на те, куди ставити ноги, що відбувається навколо, які звуки оточують, і менше звертатиме увагу на те, що відбувається в тілі.

ПІД ЧАС ОБСТРІЛУ НЕ ВИХОДЬ ЗАРАДИ ПРОГУЛЯНКИ З БЕЗПЕЧНОГО МІСЦЯ.

2. ЯКЩО ХОДИТИ НЕМАЄ ДЕ

Якщо ти знаєш, що фізичне навантаження тобі не протипоказане - зроби звичайну зарядку. Або присідай до втоми.

«Які присідання? У мене серце зараз із грудей вискочить!»

Саме так.

Тобі може здаватися, що це дурня. Але адреналін викидався для того, щоб ти біг або бився. Ми даємо тілу рух. Працюють ноги. Працює тіло. Мозок зайнятий цими діями.

3. ЯКЩО РУХАТИСЯ НЕ МОЖНА

Ти в укритті, сховався у ванній з дитиною, або тобі протипоказані фізичні вправи.

Тоді дихаємо.


Не «дихай глибше». Не «спробуй заспокоїтися». У тебе є конкретна робота на п'ять хвилин.

ВДИХ на 5 рахунків: 1 • 2 • 3 • 4 • 5

ВИДИХ на 5 рахунків: 1 • 2 • 3 • 4 • 5



Після кожного повного вдиху й видиху загни ОДИН палець.



10 пальців = 10 циклів вдих/видих. Скинув рахунок. Почав знову. Зроби так тричі.

30 ЦИКЛІВ ≈ 5 ХВИЛИН

Тобі навіть не потрібен годинник. Рахуй. Дихай. Загинай пальці.

Через п'ять хвилин початкового адреналіну вже значно менше, якщо ти не підкидав новий страх. Усе ще трусить? Це нормально.

А МОЖЕ ТАБЛЕТКУ?

Ось тут є пастка, у яку колись потрапив і я. І в яку потрапляє величезна кількість людей.

Почалася панічна атака.

Ти щось випив.

Через 20-30 хвилин стало легше.

Мозок зробив висновок: «МЕНЕ ВРЯТУВАЛА ТАБЛЕТКА».

Одного разу таблетки поруч немає.

З'являється новий страх: «Чим тепер себе врятую?»

ТЕ, ЩО ПАНІЧНА АТАКА ЗАКІНЧИЛАСЯ ПІСЛЯ ТАБЛЕТКИ, ЩЕ НЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ВОНА ЗАКІНЧИЛАСЯ ЧЕРЕЗ ТАБЛЕТКУ.

Ти випив таблетку. Через 20-30 хвилин тебе відпустило. Таблетка могла встигнути дати заспокійливий ефект. А могла ще не встигнути суттєво подіяти. Але сама панічна атака за цей час теж природним чином іде на спад. Тому нам не потрібно, щоб мозок робив висновок: «таблетка врятувала мене, без неї я б не впорався».

Таблетка не повинна ставати чарівним предметом, без якого ти вважаєш себе беззахисним. Панічна атака мине самотійно.

ЯКЩО ПАНІЧНА АТАКА У ЛЮДИНИ ПОРУЧ

НЕ ПАНІКУЙ РАЗОМ ІЗ НЕЮ.

Людина зараз абсолютно впевнена, що помирає. Якщо ти теж почнеш метушитися і робити страшне обличчя, її мозок отримає підтвердження: «Значить, відбувається щось жахливе, я справді помираю».

НЕ ТРЕБА

- кожні пів хвилини питати про серце, голову й дихання
- розповідати страшні медичні історії
- гуглити симптоми разом
- метушитися й дзеркалити паніку

КРАЩЕ ЗРОБИТИ

- швидко перевірити, чи знайомий напад, і червоні прапорці
- після цього перестати займатися діагностикою
- якщо безпечно - йти разом звичайним кроком
- спокійно пояснювати, що відбувається

«ХОДИМО. Я ТОБІ ЗАРАЗ ПОЯСНЮ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ».

Або відкрий цю пам'ятку і читай її людині вголос.

СПОКІЙНО • ПОВІЛЬНО • З ПАУЗАМИ

Поки ти читаєш, минає час. Людина слухає тебе замість того, щоб слухати кожне скорочення власного серця.

А організм тим часом робить свою справу.

І НАОСТАНОК

Найбільша перемога над панічною атакою не в тому, щоб навчитися ідеально її зупиняти.

А В ТОМУ, ЩОБ ПЕРЕСТАТИ ЇЇ БОЯТИСЯ.

«Я ПОМИРАЮ!»



«А. Адреналін. Я це вже знаю. Треба перечекаати й не лякатися».



«О, знову ця хрінь, пофіг».

Я через це пройшов. І багато разів бачив, як через це проходили інші. Коли ти розумієш, що відбувається, і перестаєш їх боятися, панічні атаки стають рідшими, слабшими або зовсім зникають.

ТИ НЕ ПОМИРАЄШ.

ЦЕ АДРЕНАЛІН ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО ТИ ЗЛЯКАВСЯ СИМПТОМІВ.

ВІН ЗНИЖУЄТЬСЯ ПРИРОДНИМ ЧИНОМ.

НЕ ЗАПУСКАЙ НАСТУПНЕ КОЛО ПЕРЕЛЯКУ.

А тепер іди. Або присідай. Або зроби свої 30 дихань.
Решту організм зробить сам.

Бажаю тобі здоров'я.