

Exercícios: Programação Linear

Questão 1 (Programas lineares)

Prove ou mostre um contra-exemplo.

O problema $\max\{c^t x \mid Ax \leq b\}$ possui uma solução viável sse $\min\{x_0 \mid Ax - ex_0 \leq b\}$ possui uma solução viável com $x_0 = 0$. Observação: e é um vetor com todos compentes igual 1 da mesma dimensão que b .

Questão 2 (Produtos caninos)

A companhia de produtos caninos oferece duas comidas para cachorro: Frisky Pup e Husky Hound, que são feitas de uma mistura de cereais e carne. Um pacote de Frisky Pup requer 1 quilo de cereal e 1.5 quilo de carne, e é vendido por \$7. Um pacote de Husky Hound usa 2 quilos de cereal e 1 quilo de carne, e é vendido por \$6. O cereal bruto custa \$1 por quilo e a carne bruta, \$2 por quilo. Há também o custo de \$1.40 para empacotar o Frisky Pup e \$0.60 para o Husky Hound. Um total de 240000 quilos de cereal e 180000 quilos de carne estão disponíveis a cada mês. O único gargalo de produção está no fato de a fábrica poder empacotar apenas 110000 pacotes de Frisky Pup por mês. Desnecessário dizer, a gerência gostaria de maximizar o lucro.

Formule o problema como um programa linear em duas variáveis.

Questão 3 (Soluções)

Dado

$$\begin{array}{ll} \text{maximiza} & 4x_1 + 5x_2 - 3x_3 \\ \text{sujeito a} & 3x_1 - x_2 + 7x_3 \leq 10, \\ & 3x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 15, \\ & 4x_1 + 6x_2 + 10x_3 = 11, \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{B}, \end{array}$$

decide se há uma solução viável sem resolver o problema. Justifique.

Questão 4 (Formulação Matemática)

Um produtor de fertilizante usa três recursos naturais para produzir dois tipos de fertilizante: um tipo possui uma alta percentagem de fosfato (A) outro baixa (B). A seguinte tabela mostra os recursos naturais necessárias para produzir uma unidade de A ou B , os toneladas disponíveis de cada recurso natural por mês e o lucro na venda de cada unidade de A e B . Formula um programa linear que maximiza o lucro.

Recurso natural	Recurso por unidade fertilizante [t]		Recurso disponível por mês [t]
	A	B	
R1	2	1	1500
R2	1	1	1200
R3	1	0	500
Lucro por unidade [R\$]	15	10	

Questão 5 (Método Simplex)

Prove ou mostre um contra-exemplo.

Se x é a variável sainte em um pivô, x não pode ser variável entrante no pivô seguinte.

Questão 6 (Mineração)

Uma empresa mineradora possui duas jazidas que produzem minérios de três classes: superior, médio e inferior. Durante um dia de operação, a primeira jazida produz 6 toneladas de minério de classe superior, 2 de classe média e 4 de classe inferior. Enquanto a segunda jazida produz diariamente 2 toneladas de minério de classe superior, 2 de classe média e 12 de classe inferior. O custo de diário de operação das jazidas é de UM 900,00 para a primeira e UM 720,00 para a segunda. A empresa de mineração possui uma fábrica de beneficiamento com capacidade para 12 toneladas da classe superior, 8 da média e 24 da inferior por semana. Quantos dias por semana deve operar cada jazida para preencher, da maneira mais econômica, a capacidade total da fábrica de beneficiamento? (As jazidas podem operar parte de um dia).

Questão 7 (Resolução gráfica)


Resolver graficamente.

$$\begin{aligned}
 &\text{maximiza} && 10x_1 + 20x_2 \\
 &\text{sujeito a} && -x_1 + 2x_2 \leq 15, \\
 &&& x_1 + x_2 \leq 12, \\
 &&& 5x_1 + 3x_2 \leq 45, \\
 &&& x_1, x_2 \geq 0.
 \end{aligned}$$

Questão 8 (Solução de sistemas lineares)

Resolve graficamente.

$$\begin{aligned}
 &\text{maximiza} && x_1 + x_2 \\
 &\text{sujeito a} && x_1 + 2x_2 \leq 12, \\
 &&& x_1 \leq 6, \\
 &&& x_1, x_2 \geq 0.
 \end{aligned}$$



- (a) Identifique todas restrições e ao menos um conjunto de nível no gráfico.
- (b) A região das soluções viáveis é limitada ou ilimitada? Quantas soluções possui o sistema? Quantas soluções básicas possui o sistema? Quantas soluções ótimas?
- (c) Caso existe uma solução ótima, qual é e qual é o seu valor?

Questão 9 (Método Simplex)

Resolva

$$\begin{array}{ll}\text{minimiza} & x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} & -x_1 + x_2 \leq 3/2, \\ & x_1 + x_2 \geq 3/2, \\ & -1/2x_1 + 2x_2 \geq 2, \\ & x_1, x_2 \geq 0,\end{array}$$

usando o método Simplex com a regra de Dantzig. (Não execute mais que 3 pivôs no total.)

- a) Qual o sistema em forma normal?

- b) Precisa-se aplicar a fase I? Por quê? Caso sim, qual a solução ótima do sistema auxiliar e seu valor? Caso não, o que podemos concluir?
- c) Precisa-se aplicar a fase II? Por quê? Caso sim, qual a solução ótima do sistema original e seu valor? Caso não, o que podemos concluir?

Questão 10 (Método Simplex)

Considere o programa linear

$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & -5x_1 - 3x_2 \\ \text{sujeito a} & x_1 + x_2 \geq 15, \\ & x_1 + 12x_2 \leq 60, \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{array}$$

- (a) Qual o sistema dual correspondente?
- (b) Resolva o sistema usando o método Simplex (escolhe uma variante adequada e documenta a escolha).
- (c) Qual a solução ótima do sistema primal? Qual o valor correspondente da função objetivo?
- (d) Qual a solução ótima do sistema dual? Qual o valor correspondente da função objetivo?

Questão 11 (Solução de sistemas lineares)

Resolva usando o método Simplex.

$$\begin{array}{ll}\text{minimiza} & 3x_1 + 2x_2 \\ \text{sujeito a} & 2x_1 + x_2 \geq 10, \\ & -3x_1 + 2x_2 \leq 6, \\ & x_1 + x_2 \geq 6, \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{array}$$

- a) Qual o sistema em forma normal?
- b) Precisa-se aplicar a fase I? Por quê? Caso sim, qual a solução ótima do sistema auxiliar e seu valor? Caso não, o que podemos concluir?
- c) Precisa-se aplicar a fase II? Por quê? Caso sim, qual a solução ótima do sistema original e seu valor? Caso não, o que podemos concluir?

Questão 12 (Solução de sistemas lineares)

Resolve usando o método Simplex *usando a regra de Dantzig*.

$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & 2x_1 + 13x_2 - 3x_3 \\ \text{sujeito a} & 2x_1 + x_2 \leq 20, \\ & -x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10, \\ & -3x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 2, \\ & 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 = -8, \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0.\end{array}$$

- (a) Qual o sistema em forma normal?
- (b) Precisa-se aplicar a fase I? Por quê? Caso sim, qual a solução ótima do sistema auxiliar e seu valor? Caso não, o que podemos concluir?
- (c) Precisa-se aplicar a fase II? Por quê? Caso sim, qual a solução ótima do sistema original e seu valor? Caso não, o que podemos concluir?

Questão 13 (Método Simplex)

Resolve usando o método Simplex *usando o método lexicográfico*. Usa perturbação ϵ_i na restrição i e supõe que $0 \ll \epsilon_1 \ll \epsilon_2 \ll \dots \ll$ constantes.

$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ \text{sujeito a} & x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 0, \\ & 3x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 0, \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}_+.\end{array}$$

- a) Explique brevemente o método lexicográfico.
- b) Qual o sistema em forma normal?
- c) Precisa-se aplicar a fase I? Por quê? Caso sim, qual a solução ótima do sistema auxiliar e seu valor? Caso não, o que podemos concluir?
- d) Precisa-se aplicar a fase II? Por quê? Caso sim, qual a solução ótima do sistema original e seu valor? Caso não, o que podemos concluir?

Questão 14 (Método Simplex)

Considere o sistema

$$\begin{array}{ll} \text{maximiza} & -x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} & x_1 + x_2 \geq 2, \\ & 3x_1 + x_2 \leq -2, \\ & -2x_1 + x_2 \leq 0, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{array}$$

Resolva o sistema acima usando o algoritmo simplex. Explique brevemente suas conclusões. Caso houver solução ótima, indique claramente o valor da função objetivo e das variáveis da solução ótima.

(Observe que nenhuma regra de pivotamento é especificada. Você pode escolher qualquer uma. Não faça mais de 3 pivôs.)

Questão 15 (Método Simplex)

Para o dicionário abaixo

- informa todos pivôs válidos possíveis,
- indique qual deles seria escolhido pela regra de Dantzig,
- qual deles seria escolhido pela regra de Bland, e
- qual deles seria escolhido pela combinação da regra de Dantzig com o método lexicográfico.

Nos itens a), b) e c) ignore os valores ϵ . Para regra de Bland, supõe que as variáveis são ordenadas pelo índice (x_1, x_2, \dots, x_n) , para o método lexicográfico supõe que $0 \ll \epsilon_1 \ll \epsilon_2 \ll \dots \ll \text{constantes}$.

$z =$	10				$+x_1$	$+2x_4$	$+3x_6$
$x_2 =$	3	$+2\epsilon_1$	$+7\epsilon_2$	$+3\epsilon_3$	$-15x_1$	$-4x_4$	$-x_6$
$x_5 =$	1	$+4\epsilon_1$	$+\epsilon_2$	$+2\epsilon_3$	$-5x_1$	$-9x_4$	$-1/3x_6$
$x_3 =$	6	$+5\epsilon_1$	$+8\epsilon_2$	$+2\epsilon_3$	$-30x_1$	$-3x_4$	$-x_6$

Questão 16 (Sistema linear parameterizado)

Considere o programa linear

$$\begin{array}{ll} \text{maximiza} & x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} & tx_1 + x_2 \leq 1, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{array}$$

com parametro $t \in \mathbb{R}$. Determine para qual valores de t o sistema

- a) possui exatamente uma solução ótima,
- b) possui um número infinito de soluções ótimas,
- c) é ilimitado, ou
- d) não possui solução.

Justifique a resposta.