

Révision de cinématique

Mouvement d'une particule dans un plan

Cette fiche reprend les notions à maîtriser pour le quiz : position en une et deux dimensions, vecteur position, équations horaires, trajectoire et vecteur déplacement. Revoir les exemples, puis résoudre les exercices sur une feuille séparée en détaillant les calculs.

Dans toute la fiche, le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ est orthonormé. Les coordonnées sont exprimées en mètres et le temps en secondes. Les valeurs numériques des équations horaires sont données dans ces unités.

1 Position en une et deux dimensions

En une dimension, une seule coordonnée repère le mobile sur un axe. En deux dimensions, deux coordonnées repèrent le point M dans le plan.

$$\text{En 1D : } x = x(t) \qquad \text{En 2D : } M(x(t), y(t))$$

Une coordonnée peut être positive, négative ou nulle. Elle dépend de l'origine et de l'orientation de l'axe choisi.

2 Vecteur position et module

Le vecteur position relie l'origine O au point M. Ses composantes sont les coordonnées du mobile.

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} \qquad \|\vec{OM}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Le module du vecteur position est la distance OM. Il est toujours positif ou nul. En une dimension : $OM = |x|$.

Exemple

Pour $M(-3 ; 4)$, on obtient :

$$\vec{OM} = -3\vec{i} + 4\vec{j} \text{ (m)} \qquad OM = \sqrt{9 + 16} = 5 \text{ m}$$

3 Équations paramétriques ou horaires

Les équations horaires donnent les coordonnées en fonction du temps. Pour trouver une position à un instant donné, remplacer t dans chacune des deux équations.

$$x(t) = 2t + 1 \qquad y(t) = 4t - 3$$

À $t = 2 \text{ s}$: $x = 5 \text{ m}$ et $y = 5 \text{ m}$. Ainsi, $M(5 ; 5)$, $\vec{OM} = 5\vec{i} + 5\vec{j} \text{ (m)}$ et $OM = 5\sqrt{2} \text{ m}$.

4 Équation et forme de la trajectoire

La trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par le mobile. Pour obtenir une relation entre x et y indépendante du temps, éliminer le paramètre t entre les équations horaires.

Trajectoire rectiligne

$$x = 2t + 1 \quad y = 6t - 4$$

Isoler t dans la première équation, puis le remplacer dans la seconde :

$$t = (x - 1)/2 \quad y = 3(x - 1) - 4 = 3x - 7$$

L'équation obtenue est celle d'une droite : la trajectoire est rectiligne.

Trajectoire parabolique

$$x = 2t \quad y = 8 - t^2$$

$$t = x/2 \quad y = 8 - x^2/4$$

L'équation obtenue est celle d'une parabole : la trajectoire est parabolique.

Trajectoire circulaire

On considère $x = 3 \cos(\omega t)$ et $y = 3 \sin(\omega t)$, avec $\omega = 1 \text{ rad/s}$. Utiliser l'identité $\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) = 1$.

$$x^2 + y^2 = 9 \cos^2(\omega t) + 9 \sin^2(\omega t) = 9$$

La trajectoire est un cercle de centre O et de rayon 3 m.

Reconnaître les formes étudiées

Équation cartésienne	Forme
$y = ax + b$	Droite
$x = \text{constante}$	Droite verticale
$y = \text{constante}$	Droite horizontale
$y = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$	Parabole
$x^2 + y^2 = R^2$	Cercle de centre O et de rayon R
$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$	Cercle de centre (a ; b) et de rayon R

Tenir compte de l'intervalle de temps donné : le mobile peut ne parcourir qu'une partie de la droite, de la parabole ou du cercle. Par exemple, si $x = 2t$ et $t \geq 0$, alors $x \geq 0$.

5 Vecteur déplacement

Entre les instants t_1 et t_2 , le mobile passe de $M_1(x_1 ; y_1)$ à $M_2(x_2 ; y_2)$. Le vecteur déplacement relie la position initiale à la position finale.

$$\overrightarrow{M_1 M_2} = \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1}$$

$$\overrightarrow{M_1 M_2} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}$$

$$\|\overrightarrow{M_1 M_2}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Exemple

Pour $M_1(2 ; -1)$ et $M_2(7 ; 3)$:

$$\overrightarrow{M_1 M_2} = 5\vec{i} + 4\vec{j} \text{ (m)} \qquad \|\overrightarrow{M_1 M_2}\| = \sqrt{41} \text{ m}$$

Le vecteur position part de O ; le vecteur déplacement part de M_1 . Le module du déplacement est la distance directe entre M_1 et M_2 , qui peut différer de la distance parcourue sur la trajectoire.

6 Exercices de révision

Exercice A Position et vecteur position

À $t = 2 \text{ s}$, un mobile se trouve en $M(-3 ; 4)$.

1. Donner ses coordonnées et préciser leurs unités.
2. Écrire le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ et calculer son module.

Exercice B Équations horaires

$$x = 3t - 2 \qquad y = 2t + 1 \qquad t \geq 0$$

1. Déterminer les coordonnées à $t = 0 \text{ s}$, $t = 2 \text{ s}$ et $t = 4 \text{ s}$.
2. Écrire le vecteur position à chacun de ces instants.

Exercice C Trajectoire rectiligne

$$x = 2t + 1 \qquad y = 6t - 4 \qquad t \geq 0$$

1. Exprimer t en fonction de x , puis éliminer t .
2. Donner l'équation cartésienne et la forme de la trajectoire.
3. Préciser les valeurs de x correspondant à $t \geq 0$.

6 Exercices de révision suite

Exercice D Trajectoire parabolique

$$x = 2t \quad y = 8 - t^2 \quad t \geq 0$$

1. Exprimer t en fonction de x .
2. Établir l'équation cartésienne et identifier la forme de la trajectoire.
3. Déterminer les coordonnées du mobile à $t = 2$ s.

Exercice E Trajectoire circulaire

On donne $x = 5 \cos(\omega t)$ et $y = 5 \sin(\omega t)$, avec $\omega = 1$ rad/s et $t \geq 0$.

1. Montrer que $x^2 + y^2 = 25$.
2. Donner le centre et le rayon de la trajectoire.
3. Déterminer la position initiale et le module du vecteur position.

Exercice E bis Centre et rayon d'un cercle

Pour chaque équation ci-dessous, identifier les coordonnées du centre $C(a ; b)$, puis déduire le rayon R . Les coordonnées et le rayon sont exprimés en mètres. Compléter le tableau en donnant la valeur exacte de R .

Comparer avec $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Attention aux signes : $x + 3 = x - (-3)$. Le nombre à droite de l'égalité représente R^2 .

Cas	Équation de la trajectoire	Centre $C(a ; b)$	Rayon R
1	$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$		
2	$(x + 4)^2 + (y + 1)^2 = 9$		
3	$(x - 5)^2 + (y + 2)^2 = 16$		
4	$(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 36$		
5	$x^2 + (y + 5)^2 = 4$		
6	$(x - 6)^2 + y^2 = 49$		
7	$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 7$		
8	$x^2 + y^2 = 12$		

Exercice F Déplacement

À t_1 , le mobile se trouve en $M_1(-2 ; 3)$. À $t_2 > t_1$, il se trouve en $M_2(4 ; -5)$.

1. Déterminer $\vec{OM_1}$ et $\vec{OM_2}$.
2. Calculer M_1M_2 , puis son module.
3. Déterminer M_2M_1 et le comparer à M_1M_2 .

7 Exercice de synthèse

$$x = 2t - 1 \qquad y = t^2 - 4t + 5 \qquad t \geq 0$$

1. Déterminer les coordonnées de M à $t = 0$ s.
2. Écrire $\vec{OM}$ en fonction du temps.
3. Calculer le module du vecteur position à $t = 0$ s.
4. Déterminer les coordonnées de M à $t = 3$ s.
5. Calculer le vecteur déplacement entre $t = 0$ s et $t = 3$ s, puis son module.
6. Éliminer t et établir l'équation cartésienne de la trajectoire.
7. Identifier la forme de la trajectoire.

Avant de terminer

Vérifier les unités, les signes et l'ordre « final – initial » dans le déplacement. L'équation cartésienne ne doit plus contenir t . Distinguer un vecteur de son module.