

Laplace transform and applications to ODEs

Nguyen Thu Huong



School of Applied Mathematics and Informatics
Hanoi University of Science and Technology

January 6, 2021

Content

- Shifting on t -domain

Heaviside function

Let $a, b \in \mathbb{R}_+$.

① We define $u(t - a) = \begin{cases} 0 & \text{if } 0 \leq t < a, \\ 1 & \text{if } t \geq a. \end{cases}$

Heaviside function

Let $a, b \in \mathbb{R}_+$.

- ① We define $u(t - a) = \begin{cases} 0 & \text{if } 0 \leq t < a, \\ 1 & \text{if } t \geq a. \end{cases}$

In particular, $u(t) = 1, \forall t \geq 0$.

Heaviside function

Let $a, b \in \mathbb{R}_+$.

- ① We define $u(t - a) = \begin{cases} 0 & \text{if } 0 \leq t < a, \\ 1 & \text{if } t \geq a. \end{cases}$

In particular, $u(t) = 1, \forall t \geq 0$.

$u(t - a)$ is discontinuous at a .

Heaviside function

Let $a, b \in \mathbb{R}_+$.

- ① We define $u(t - a) = \begin{cases} 0 & \text{if } 0 \leq t < a, \\ 1 & \text{if } t \geq a. \end{cases}$

In particular, $u(t) = 1, \forall t \geq 0$.

$u(t - a)$ is discontinuous at a .

- ② $g(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } 0 \leq t < a \text{ or } t \geq b, \\ 1 & \text{if } a \leq t < b. \end{cases}$

$$g(t) = u(t - b) - u(t - a)$$

Example

Express the following functions in terms of $u(t - a)$:

$$\textcircled{1} \quad f(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } 0 \leq t < \pi, \\ \cos t & \text{if } t \geq \pi. \end{cases}$$

Example

Express the following functions in terms of $u(t - a)$:

$$\textcircled{1} \quad f(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } 0 \leq t < \pi, \\ \cos t & \text{if } t \geq \pi. \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad g(t) = \begin{cases} t^2 & \text{if } 0 \leq t < 2, \\ \sin \pi t & \text{if } t \geq 2. \end{cases}$$

Example

Express the following functions in terms of $u(t - a)$:

$$\textcircled{1} \quad f(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } 0 \leq t < \pi, \\ \cos t & \text{if } t \geq \pi. \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad g(t) = \begin{cases} t^2 & \text{if } 0 \leq t < 2, \\ \sin \pi t & \text{if } t \geq 2. \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \quad h(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } 0 \leq t < \pi, \\ \cos t & \text{if } \pi \leq t < 2\pi, \\ t^2 & \text{if } t \geq 2\pi. \end{cases}$$

Shifting on t -domain

Recall: $\mathcal{L}\{u(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s}, s > 0.$

Shifting on t -domain

Recall: $\mathcal{L}\{u(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s}, s > 0.$

Theorem

$$\mathcal{L}\{u(t-a)f(t)\}(s) = e^{-as}\mathcal{L}(f(t+a))(s).$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\}(t) = u(t-a)f(t-a).$$

Example

Find the Laplace transforms of the following functions

$$\textcircled{1} \quad f(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } 0 \leq t < \pi, \\ \cos t & \text{if } t \geq \pi. \end{cases}$$

Example

Find the Laplace transforms of the following functions

$$\textcircled{1} \quad f(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } 0 \leq t < \pi, \\ \cos t & \text{if } t \geq \pi. \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad g(t) = \begin{cases} t^2 & \text{if } 0 \leq t < 2, \\ \sin \pi t & \text{if } t \geq 2. \end{cases}$$

Applications to ODEs

Example

Solve the following ODEs:

- ① $y'' + 3y' + 2y = u(t - 2), y(0) = 0, y'(0) = 1.$
- ② $y'' + y = \sin t + u(t - \pi) \sin(t - \pi), y(0) = y'(0) = 0.$
- ③ $y'' + 4y = f(t), y(0) = y'(0) = 0,$ where
$$f(t) = \begin{cases} \sin t & \text{if } 0 < t < \pi, \\ 0 & \text{if } t \geq \pi. \end{cases}$$