ANOVA a Misure Ripetute

Effetti Entro i Sggetti

	Correzione della Sfericità	Somma dei Quadrati	gdl	Media Quadratica	F	p	η^2	η^2_p
Training	Nessuna	21.1488	1	21.1488	18.3384	.002	0.182	0.671
	Greenhouse-Geisser	21.1488	1.00	21.1488	18.3384	.002	0.182	0.671
Residuo	Nessuna	10.3793	9	1.1533				
	Greenhouse-Geisser	10.3793	9.00	1.1533				
Blocco	Nessuna	18.0557	2	9.0278	12.0269	<.001	0.155	0.572
	Greenhouse-Geisser	18.0557	1.21	14.9156	12.0269	.004	0.155	0.572
Residuo	Nessuna	13.5115	18	0.7506				
	Greenhouse-Geisser	13.5115	10.89	1.2402				
Training ✻ Blocco	Nessuna	0.0843	2	0.0422	0.0916	.913	0.001	0.010
	Greenhouse-Geisser	0.0843	1.73	0.0488	0.0916	.888	0.001	0.010
Residuo	Nessuna	8.2881	18	0.4605				
	Greenhouse-Geisser	8.2881	15.55	0.5331				

Nota. Somma dei quadrati Tipo 3

Effetti Tra Soggetti

	Somma dei Quadrati	gdl	Media Quadratica	F	p	η^2	η^2_p
Residuo	44.9	9	4.99				

Nota. Somma dei quadrati Tipo 3

Ipotesi

Test di Sfericità

	W di Mauchly	p	Greenhouse-Geisser ε	Huynh-Feldt ε
Training[aaa]	1.000	NaN	1.000	1.000
Blocco	0.348	.015	0.605	0.649
Training ✻ Blocco	0.842	.503	0.864	1.000

[a] Le misure ripetute hanno solo due livelli. L'assunzione di sfericità è sempre soddisfatta quando le misure ripetute hanno solo due livelli.

Test Post Hoc

Confronti Post Hoc - Training

Confronto											
Training		Training	Differenza Media	SE	gdl	t	p	p_{tukey}	$p_{scheffe}$	$p_{bonferroni}$	p_{holm}
T1	-	T2	1.19	0.277	9.00	4.28	.002	.002	.002	.002	.002

Confronti Post Hoc - Blocco

Confronto											
Blocco		Blocco	Differenza Media	SE	gdl	t	p	p_{tukey}	$p_{scheffe}$	$p_{bonferroni}$	p_{holm}
B1	-	B2	0.886	0.261	9.00	3.39	.008	.020	.025	.024	.016
	-	B3	1.318	0.361	9.00	3.65	.005	.013	.017	.016	.016
B2	-	B3	0.432	0.162	9.00	2.66	.026	.061	.073	.078	.026