ANOVA a Misure Ripetute

Effetti Entro i Sggetti

	Correzione della Sfericità	Somma dei Quadrati	gdl	Media Quadratica	F	p	η^2	η^2_p
Training	Nessuna	1082	1	1081.8	16.11	.003	0.188	0.642
	Greenhouse-Geisser	1082	1.00	1081.8	16.11	.003	0.188	0.642
Residuo	Nessuna	604	9	67.1				
	Greenhouse-Geisser	604	9.00	67.1				
Blocco	Nessuna	944	2	471.8	13.53	<.001	0.164	0.601
	Greenhouse-Geisser	944	1.33	710.8	13.53	.002	0.164	0.601
Residuo	Nessuna	628	18	34.9				
	Greenhouse-Geisser	628	11.95	52.5				
Training ✻ Blocco	Nessuna	184	2	92.1	2.31	.128	0.032	0.204
	Greenhouse-Geisser	184	1.46	126.3	2.31	.147	0.032	0.204
Residuo	Nessuna	719	18	39.9				
	Greenhouse-Geisser	719	13.13	54.7				

Nota. Somma dei quadrati Tipo 3

Effetti Tra Soggetti

	Somma dei Quadrati	gdl	Media Quadratica	F	p	η^2	η^2_p
Residuo	1603	9	178				

Nota. Somma dei quadrati Tipo 3

Ipotesi

Test di Sfericità

	W di Mauchly	p	Greenhouse-Geisser ε	Huynh-Feldt ε
Training[aaa]	1.000	NaN	1.000	1.000
Blocco	0.493	.059	0.664	0.735
Training ✻ Blocco	0.629	.156	0.729	0.834

[a] Le misure ripetute hanno solo due livelli. L'assunzione di sfericità è sempre soddisfatta quando le misure ripetute hanno solo due livelli.

Test Post Hoc

Confronti Post Hoc - Training

Confronto			Differenza Media	SE	gdl	t	p	p_{tukey}	$p_{scheffe}$	$p_{bonferroni}$	p_{holm}
Training		Training									
T1	-	T2	8.49	2.12	9.00	4.01	.003	.003	.003	.003	.003

Confronti Post Hoc - Blocco

Confronto			Differenza Media	SE	gdl	t	p	p_{tukey}	$p_{scheffe}$	$p_{bonferroni}$	p_{holm}
Blocco		Blocco									
B1	-	B2	7.09	1.67	9.00	4.25	.002	.005	.007	.006	.006
	-	B3	9.30	2.43	9.00	3.83	.004	.010	.013	.012	.008
B2	-	B3	2.21	1.33	9.00	1.66	.132	.273	.302	.395	.132