ANOVA a Misure Ripetute

Effetti Entro i Sggetti

	Correzione della Sfericità	Somma dei Quadrati	gdl	Media Quadratica	F	p	η^2	η^2_p
Training	Nessuna	4.274	1	4.274	2.014	.190	0.013	0.183
	Greenhouse-Geisser	4.274	1.00	4.274	2.014	.190	0.013	0.183
Residuo	Nessuna	19.099	9	2.122				
	Greenhouse-Geisser	19.099	9.00	2.122				
Blocco	Nessuna	8.548	2	4.274	3.953	.038	0.026	0.305
	Greenhouse-Geisser	8.548	1.34	6.381	3.953	.061	0.026	0.305
Residuo	Nessuna	19.464	18	1.081				
	Greenhouse-Geisser	19.464	12.06	1.614				
Training ✻ Blocco	Nessuna	0.621	2	0.310	0.393	.681	0.002	0.042
	Greenhouse-Geisser	0.621	1.54	0.403	0.393	.630	0.002	0.042
Residuo	Nessuna	14.231	18	0.791				
	Greenhouse-Geisser	14.231	13.87	1.026				

Nota. Somma dei quadrati Tipo 3

Effetti Tra Soggetti

	Somma dei Quadrati	gdl	Media Quadratica	F	p	η^2	η^2_p
Residuo	265	9	29.4				

Nota. Somma dei quadrati Tipo 3

Ipotesi

Test di Sfericità

	W di Mauchly	p	Greenhouse-Geisser ε	Huynh-Feldt ε
Training[a]	1.000	NaN	1.000	1.000
Blocco	0.507	.066	0.670	0.744
Training ✻ Blocco	0.702	.243	0.770	0.899

[a] Le misure ripetute hanno solo due livelli. L'assunzione di sfericità è sempre soddisfatta quando le misure ripetute hanno solo due livelli.