ANOVA a Misure Ripetute

Effetti Entro i Sggetti

	Correzione della Sfericità	Somma dei Quadrati	gdl	Media Quadratica	F	p	η^2	η^2_p
Test	Nessuna	0.426	1	0.4256	20.3	.001	0.260	0.693
	Greenhouse-Geisser	0.426	1.00	0.4256	20.3	.001	0.260	0.693
Residuo	Nessuna	0.189	9	0.0210				
	Greenhouse-Geisser	0.189	9.00	0.0210				

Nota. Somma dei quadrati Tipo 3

Effetti Tra Soggetti

	Somma dei Quadrati	gdl	Media Quadratica	F	p	η^2	η^2_p
Residuo	1.02	9	0.113				

Nota. Somma dei quadrati Tipo 3

Ipotesi

Test di Sfericità

	W di Mauchly	p	Greenhouse-Geisser ε	Huynh-Feldt ε
Test[aa]	1.00	NaN	1.00	1.00

[a] Le misure ripetute hanno solo due livelli. L'assunzione di sfericità è sempre soddisfatta quando le misure ripetute hanno solo due livelli.

Test Post Hoc

Confronti Post Hoc - Test

Confronto											
Test		Test	Differenza Media	SE	gdl	t	p	p_{tukey}	$p_{scheffe}$	$p_{bonferroni}$	p_{holm}
T1	-	T2	0.292	0.0648	9.00	4.50	.001	.001	.001	.001	.001