ANOVA a Misure Ripetute

Effetti Entro i Sggetti

	Correzione della Sfericità	Somma dei Quadrati	gdl	Media Quadratica	F	p	η^2	η^2_p
Test	Nessuna	0.2189	1	0.2189	20.9	.001	0.153	0.699
	Greenhouse-Geisser	0.2189	1.00	0.2189	20.9	.001	0.153	0.699
Residuo	Nessuna	0.0942	9	0.0105				
	Greenhouse-Geisser	0.0942	9.00	0.0105				

Nota. Somma dei quadrati Tipo 3

Effetti Tra Soggetti

	Somma dei Quadrati	gdl	Media Quadratica	F	p	η^2	η^2_p
Residuo	1.12	9	0.124				

Nota. Somma dei quadrati Tipo 3

Ipotesi

Test di Sfericità

	W di Mauchly	p	Greenhouse-Geisser ε	Huynh-Feldt ε
Test[a]	1.00	NaN	1.00	1.00

[a] Le misure ripetute hanno solo due livelli. L'assunzione di sfericità è sempre soddisfatta quando le misure ripetute hanno solo due livelli.

Test Post Hoc

Confronti Post Hoc - Test

Confronto											
Test		Test	Differenza Media	SE	gdl	t	p	p_{tukey}	$p_{scheffe}$	$p_{bonferroni}$	p_{holm}
T1	-	T2	0.209	0.0458	9.00	4.57	.001	.001	.001	.001	.001