# ANOVA a Misure Ripetute

Effetti Entro i Sggetti

| | Correzione della Sfericità | Somma dei Quadrati | gdl | Media Quadratica | F | p | $\eta^2$ | $\eta^2_p$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | Nessuna | 1786 | 1 | 1786 | 3.98 | .077 | 0.069 | 0.307 |
| | Greenhouse-Geisser | 1786 | 1.00 | 1786 | 3.98 | .077 | 0.069 | 0.307 |
| Residuo | Nessuna | 4038 | 9 | 449 | | | | |
| | Greenhouse-Geisser | 4038 | 9.00 | 449 | | | | |

Nota. Somma dei quadrati Tipo 3

Effetti Tra Soggetti

| | Somma dei Quadrati | gdl | Media Quadratica | F | p | $\eta^2$ | $\eta^2_p$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residuo | 20048 | 9 | 2228 | | | | |

Nota. Somma dei quadrati Tipo 3

## Ipotesi

Test di Sfericità

| | W di Mauchly | p | Greenhouse-Geisser ε | Huynh-Feldt ε |
|---|---|---|---|---|
| Test[a] | 1.00 | NaN | 1.00 | 1.00 |

[a] Le misure ripetute hanno solo due livelli. L'assunzione di sfericità è sempre soddisfatta quando le misure ripetute hanno solo due livelli.