## 全国肾脏基金会



## 限制水分/液体的摄取

健康的肾脏将调节人体内的水分平衡,将体内多余的水分和毒素排出。当您的肾 脏衰竭时, 洗肾将无法像健康的肾脏般有效的将多余的水分和毒素排出。过多水 分的摄取将导致洗肾期间体重的增加。

过多的水分累积体内将危害您的健康,导致

- 脚部,脚踝,手腕和脸部水肿
- 肺积水而呼吸困难
- 高血压
- 心脏问题,例:心跳加快、心脏衰弱、心肌肿大
- 洗肾后,肌肉抽痉和血压降低,而导致恶心、晕眩和虚弱

任何在室温内呈现液体形态的食物、饮料都含有水分。例如: 饮用水、茶、咖 啡、果汁、汤、汽水、酒精饮料、粥、酱汁、燕菜、冰、冷冻甜品和冰淇淋。

您可使用以下的容器来估计水分含量。

容器	水量(ml)
1 汤匙	15
1个华人汤匙	30
1个冰块	20
1口水	30
1 碗粥	100
1个茶杯	150
1杯	250
1 瓶矿泉水 (500ml)	500

## 有效控制水分摄取的方法!!

- ▶ 把您一天可饮用的水份装在水壶里。适当的分配您一天的水量,包 括吃药所需的饮用水。
- ▶ 使用较小的容器喝水。
- ▶ 含着冰块、酸糖果或柠檬片可刺激口水分泌。
- ▶ 用水漱口,但不要吞下去。
- ▶ 少吃咸的食物将减少口渴的感觉。
- ▶ 控制您的血糖。

您一天可以饮用 毫升的水分 (= 杯)。

如果您有任何疑问,请向您的营养师咨询详情。







