

# Восстановление параметров с периодическим начальным приближением

20 сентября 2017 г.

## 1 Процесс восстановления параметров модели Курамото

Напомним процесс восстановления параметров, который мы используем.

Для начала напомним некоторые базовые вещи: общую частоту маятников  $\Omega$  положим  $\Omega = 2\pi$  (тогда их период есть  $T = \frac{2\pi}{\Omega} = 1$ ). Симметричную разность их частот будем в рамках данной работы считать постоянной и обозначим  $\Delta w$ .

Общее время наблюдения  $L = nT$ , где  $n \in \mathbb{N}$  — число периодов наблюдения.

Динамика фазовой разницы  $\theta(t)$  описывается следующим дифференциальным уравнением:

$$\dot{\theta} = 2\Delta w - k(t) \sin \theta \quad (1)$$

с некоторым начальным условием  $\theta(0) = \text{init}$ . Значение начального условия обсудим позднее.

Параметр-функция  $k(t)$  («каплинг») и является центром нашего исследования; ее мы и будем восстанавливать.

Для этого введем некоторое начальное приближение  $k_0(t)$  (опять же, его вид и выбор мы обсудим чуть ниже); решая уравнение (1) для  $k(t) = k_0(t)$  получим некую функцию  $\theta_0(t)$ . Заведем два виртуальных маятника:

$$\begin{cases} x_0(t) = \sin(\Omega t) \\ y_0(t) = \sin(\Omega t + \theta_0(t)) \end{cases},$$

для которых пересчитаем скользящую корреляцию  $C_0(t)$  по следующей формуле:

$$C_0(t) = \frac{\int_{t-T/2}^{t+T/2} \sin(\Omega \tau) \sin(\Omega \tau + \theta_0(\tau)) d\tau}{\sqrt{\int_{t-T/2}^{t+T/2} \sin^2(\Omega \tau) d\tau \cdot \int_{t-T/2}^{t+T/2} \sin^2(\Omega \tau + \theta_0(\tau)) d\tau}}$$

Теперь воспользуемся *гипотезой о квазистационарности*: если  $\theta_0(t) \approx \text{const}$ , то  $C_0 \approx \text{const} = \cos \theta_0$ . Поэтому наведем новую переменную:

$$\phi_0(t) = \arccos C_0(t)$$

Таким образом одним из замеров качества восстановления можно считать пару  $\theta_0$  и  $\phi_0$ . Саму же восстановленную параметр-функцию  $\hat{k}(t)$  можно найти из расчета  $\phi \approx 0$  (из квазистационарности), откуда

$$\hat{k}(t) = \frac{2\Delta w}{\sin \phi_0(t)}$$

Корректность процесса восстановления обеспечивается выполнением основного Курамото-неравенства:

$$\left| \frac{2\Delta w}{k_0(t)} \right| \leq 1 \quad (2)$$

Теперь разрешим первый из оставшихся вопросов: начальное условие выберем таким, чтобы изначально процедура восстановления была верной, т.е.

$$init = \arcsin \frac{2\Delta w}{k_0(0)}$$

## 2 Начальное приближение параметр-функции

Теперь обратимся ко второму оставленному вопросу: а именно к выбору  $k_0(t)$ .

Было предложено исследовать семейство начальных приближений вида:

$$k_0(t) = A \cos(Bt + \delta) + C$$

где  $A$  — амплитуда,  $B$  его частота,  $C$  вертикальный сдвиг. Переменная  $\delta$  здесь служит для сдвига начальной фазы параметр-функции относительно фазы основных маятников. Отсюда можно получить несколько разовых ограничения:

- $k_0(t) \geq 0$ , а значит  $-A + C \geq 0$ ;
- основное Курамото неравенство выполняется, если

$$2\Delta w \leq A \cos(Bt + \delta) + C \Rightarrow 2\Delta w \leq A + C;$$

- в начальный момент времени основное Курамото-неравенство не должно нарушаться:

$$2\Delta w \leq A \cos \delta + C;$$

- предполагается, что качественное восстановление возможно только лишь при  $B \ll \Omega$ . Для удобства далее мы везде будем мерить  $B$  в долях  $\Omega$ .

Приведем вид графиков при разных параметрах (попадание  $k_0(t)$  ниже красной линии  $2\Delta w$  означает нарушение основного неравенства):




Рис. 1: Начальное приближение  $k_0(t)$  при  $n = 100$ ,  $\Delta w = 0.1$ ,  $A = 0.05$ ,  $B = \frac{1}{100}\Omega$ ,  $\delta = \pi - 0.9$ ,  $C = 0.24$




Рис. 2: Начальное приближение  $k_0(t)$  (случай касания) при  $n = 100$ ,  $\Delta w = 0.1$ ,  $A = 0.05$ ,  $B = \frac{1}{100}\Omega$ ,  $\delta = \pi - 0.9$ ,  $C = 0.25$




Рис. 3: Начальное приближение  $k_0(t)$  (случай полного попадания) при  $n = 100$ ,  $\Delta w = 0.1$ ,  $A = 0.01$ ,  $B = \frac{1}{10}\Omega$ ,  $\delta = \pi - 0.9$ ,  $C = 0.25$

**Качество.** Теперь прежде чем заговорить о результатах восстановления, введем относительное качество восстановления для  $\mathbb{L}_2$  метрики:


$$q = \frac{\int_0^L (\hat{k} - k_0)^2 dt}{\int_0^L (k_0 - \bar{k}_0)^2 dt}$$

### 3 Примеры восстановления


Прежде чем начать немного поясним: для каждого набора входных данных приводится три картинки, параметр-функция, для  $\phi_0$  и  $\theta_0$  и для  $\hat{k}(t)$  и  $k_0(t)$ ; для последней пары посчитан  $q$ .

Из всего дальнейшего следует три основных вывода:


- восстановление по фазовой разности выглядит довольно корректно;
- восстановление итогового параметра  $\hat{k}$ , видимо, требует иного пересчет из  $\phi_0$ ;
- вероятно, стоит пересмотреть метод подсчета качества (хотя она может быть и удовлетворительной при исправленном методе восстановления).



(a)  $k_0(t)$




(b)  $\phi_0$  и  $\theta_0$




(c)  $\hat{k}(t)$  и  $k_0(t)$

Рис. 4: Процесс восстановления для  $n = 100$ ,  $\Delta w = 0.1$ ,  $A = 0.01$ ,  $B = \frac{1}{100}\Omega$ ,  $\delta = \pi - 0.9$ ,  $C = 0.25$ . Результат:  $q = 0.13$




(a)  $k_0(t)$

Comparison between solution  $\theta(t)$  and reconstructed  $\varphi_0(t)$




(b)  $\phi_0$  и  $\theta_0$

Comparison between zero approximation  $k_0(t)$  and reconstructed  $\hat{k}(t)$




(c)  $\hat{k}(t)$  и  $k_0(t)$


Рис. 5: Процесс восстановления для  $n = 100$ ,  $\Delta w = 0.1$ ,  $A = 0.01$ ,  $B = \frac{1}{10}\Omega$ ,  $\delta = \pi - 0.9$ ,  $C = 0.25$ . Результат:  $q = 0.95$



(a)  $k_0(t)$



(b)  $\phi_0$  и  $\theta_0$



(c)  $\hat{k}(t)$  и  $k_0(t)$

Рис. 6: Процесс восстановления для  $n = 100$ ,  $\Delta w = 0.1$ ,  $A = 0.05$ ,  $B = \frac{1}{100}\Omega$ ,  $\delta = \pi - 0.9$ ,  $C = 0.24$ . Результат:  $q = 0.225$






Рис. 7: Процесс восстановления для  $n = 10$ ,  $\Delta w = 0.1$ ,  $A = 0.05$ ,  $B = \frac{1}{40}\Omega$ ,  $\delta = \pi - 0.9$ ,  $C = 0.249$ . Результат:  $q = 7.117$