

BUKU PANDUAN PENGGUNAAN OBAT-OBATAN

Panduan Praktis Klinis & Referensi Peningkatan Kualitas Medis Roleplay

PENGANTAR & TUJUAN:

Tidak ada kewajiban untuk menghafal nama obat secara spesifik dalam panduan ini. Daftar dan klasifikasi ini disusun secara sistematis murni bertujuan untuk membantu memahami kelas obat, mekanisme dasar, serta memberikan referensi penggunaan obat yang valid guna meningkatkan kualitas dan realisme dalam skenario simulasi/roleplay medis.

1. Analgesics (Pain Killers / Obat Pereda Nyeri)

Analgesik adalah golongan obat yang digunakan untuk meredakan nyeri (pain relief) dan menurunkan demam (antipiretik). Secara klinis, pengelolaan nyeri dibagi berdasarkan tingkat keparahannya menggunakan skala nyeri (Pain Scale 1–10) serta dibagi menjadi dua kategori utama:

Klasifikasi Utama Analgesik:

- **Non-narcotic analgesics:** Digunakan untuk menangani manifestasi nyeri ringan hingga sedang. Tidak menimbulkan ketergantungan.
- **Narcotic analgesics (Opioid):** Bekerja pada sistem saraf pusat untuk nyeri berat. Memiliki potensi adiksi tinggi.

Nama Obat (Merek)	Klasifikasi & Skala	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
Acetaminophen / Paracetamol Tylenol	Non-Narcotic (Non-NSAID) Skala 1–3 (Ringan)	Bekerja langsung di pusat saraf untuk menurunkan demam dan meredakan nyeri ringan seperti sakit kepala atau nyeri otot. Tidak mengurangi peradangan/inflamasi. Sangat aman jika digunakan sesuai dosis.
Ibuprofen Motrin	Non-Narcotic (NSAID) Skala 1–3 (Ringan)	Obat anti-inflamasi non-steroid yang bekerja menghambat enzim penyebab peradangan. Sangat efektif untuk nyeri yang disertai pembengkakan, seperti cedera sendi, sakit gigi, atau kram otot.
Naproxen Aleve	Non-Narcotic (NSAID) Skala 1–3 (Ringan)	Memiliki mekanisme serupa dengan Ibuprofen namun dengan durasi kerja yang lebih panjang di dalam tubuh. Sering digunakan untuk nyeri kronis atau peradangan sendi jangka panjang.
Tramadol Ultram	Opioid Ringan Skala 4–6 (Sedang)	Obat analgesik sentral yang memengaruhi cara otak merespons nyeri. Digunakan untuk meredakan nyeri sedang pasca-operasi ringan atau nyeri trauma tingkat menengah.
Acetaminophen + Codeine Tylenol-3 / Vopac	Kombinasi Opioid Skala 4–6 (Sedang)	Kombinasi paracetamol dengan narkotik ringan (kodein). Efek sinergisnya menghasilkan peredaman nyeri yang jauh lebih kuat dibanding paracetamol tunggal untuk cedera atau luka robek signifikan.
Oxycodone + Acetaminophen Percocet	Kombinasi Opioid Skala 4–6 (Sedang)	Kombinasi analgesik narkotik kuat dengan paracetamol. Diindikasikan untuk manajemen nyeri akut setelah tindakan bedah atau trauma jaringan lunak yang parah.
Hydrocodone + Acetaminophen Vicodin	Kombinasi Opioid Skala 4–6 (Sedang)	Digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga cukup berat. Sangat sering diresepkan pada fase pemulihan cedera fraktur atau pasca-ortopedi sebelum pasien diturunkan ke analgesik ringan.
Morphine Morphine	Narcotic / Opioid Skala 7–10 (Berat)	Standar utama untuk penanganan nyeri yang sangat hebat, seperti pada pasien luka tembak, fraktur terbuka (patah tulang parah), amputasi, atau serangan jantung. Diberikan secara hati-hati via IV.
		Analgesik opioid derivat morfin yang memiliki potensi jauh lebih kuat daripada morfin biasa. Cadangan

Nama Obat (Merek)	Klasifikasi & Skala	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
Hydromorphone Dilaudid	Narcotic / Opioid Skala 7–10 (Berat)	utama jika pasien menunjukkan toleransi tinggi terhadap morfin atau mengalami nyeri ekstrem mendadak.

Peringatan Klinis (Catatan Roleplay): Gunakan penilaian klinis objektif saat menentukan tingkat nyeri pasien. Berhati-hatilah dan lakukan pemeriksaan menyeluruh jika pasien datang dan langsung meminta/mendesak obat golongan opioid (indikasi kecanduan/drug seeking behavior).

2. Anesthetics (Obat Bius)

Anestesi merupakan agen yang digunakan untuk menghilangkan sensasi fisik secara sementara (termasuk rasa nyeri) agar tindakan medis invasif atau operasi dapat dilaksanakan tanpa hambatan.

Nama Obat	Jenis Anestesi	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
Propofol Intravenous / IV	General Anesthetics (Umum)	Menginduksi sedasi penuh (pasien tertidur total dan kehilangan kesadaran). Digunakan sebagai agen utama dalam memulai dan mempertahankan anestesi umum selama prosedur operasi besar di ruang operasi.
Ketamine Intravenous / IV	General Anesthetics (Umum)	Menginduksi sedasi parsial atau anestesi disosiatif (pasien tampak terjaga namun tidak merespons nyeri dan lingkungan). Sangat berguna di medan darurat/lapangan untuk reposisi tulang atau penanganan trauma berat karena tidak menekan sistem pernapasan sekuat propofol.
Lidocaine Topikal / Injeksi Lokal	Local Anesthetics (Lokal)	Memblokir sinyal nyeri di area tubuh tertentu yang sangat spesifik tanpa memengaruhi kesadaran pasien. Digunakan untuk tindakan minor seperti penjahitan luka robek (hecting), pencabutan gigi, atau biopsi kulit.

3. Anti-Infectives (Obat Anti Infeksi)

Golongan obat ini dirancang khusus untuk membasmi, menghambat, atau menetralkan mikroorganisme patogen yang menyerang tubuh inang, dibagi secara ketat berdasarkan jenis mikroorganisme penyebabnya.

A. Antibiotics (Infeksi Bakteri)

Hanya efektif terhadap bakteri. Digunakan pada kasus infeksi berat seperti meningitis, apendisitis (radang usus buntu), atau UTI (Infeksi Saluran Kemih).

Nama Obat (Merek)	Kategori	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
Amoxicillin Amoxil	Berbasis Penisilin	Antibiotik spektrum luas yang bekerja merusak dinding sel bakteri. Pilihan pertama untuk infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga, atau profilaksis luka bersih.
Vancomycin Vancocin	Non-Penisilin	Antibiotik dosis kuat yang dicadangkan untuk infeksi bakteri gram-positif yang sudah kebal (resisten) terhadap antibiotik biasa, seperti infeksi MRSA atau infeksi jaringan dalam yang parah.
Sulfamethoxazole-Trimethoprim Bactrim	Alternatif Alergi	Obat kombinasi sulfonamida. Menjadi pilihan utama untuk mengatasi infeksi saluran kemih (UTI) atau infeksi saluran pencernaan, khususnya bagi pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap golongan penisilin.

B. Antivirals (Infeksi Virus)

Digunakan untuk memperlambat replikasi virus di dalam tubuh pada kasus seperti influenza, bronkitis akut akibat virus, atau infeksi sistemik lainnya.

Nama Obat (Merek)	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
Acyclovir Zovirax	Secara spesifik menghentikan replikasi DNA virus. Sangat efektif untuk mengatasi infeksi virus herpes (herpes zoster/simplex) dan cacar air guna mempercepat penyembuhan lesi kulit.
Amantadine Symmetrel	Dahulu digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi virus Influenza tipe A dengan menghambat penetrasi virus ke dalam sel inang. Juga memiliki efek neurologis sekunder.
Ritonavir Norvir	Merupakan antiretroviral golongan protease inhibitor. Bekerja menghambat pematangan virus baru, umumnya digunakan dalam terapi kombinasi untuk infeksi virus kronis/berat (seperti HIV).

C. Antifungals (Infeksi Jamur)

Digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh jamur patogen, seperti athlete's foot (kutu air) atau ringworm (kadas/kurap).

Nama Obat (Merek)	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
Voriconazole Vfend	Antijamur generasi baru golongan triazol untuk infeksi jamur sistemik tingkat berat dan invasif yang menyerang organ dalam tubuh, biasanya pada pasien dengan imun lemah.
Clotrimazole Lotrimin	Antijamur topikal (salep/krim) yang bekerja merusak membran sel jamur secara lokal. Sangat efektif untuk infeksi jamur permukaan kulit, lipatan paha, dan kutu air.
Terbinafine Lamisil	Bekerja menghentikan pertumbuhan jamur dengan menghambat sintesis sterol jamur. Banyak dipilih untuk pengobatan infeksi jamur membandel pada kuku tangan/kaki atau kurap yang meluas.

4. Cardiovascular (Jantung & Pembuluh Darah)

Obat-obatan yang bekerja secara spesifik pada sistem sirkulasi, otot jantung, dan tonus pembuluh darah untuk menjaga stabilitas hemodinamik pasien.

Kondisi Klinis	Nama Obat (Merek)	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
Hypertension (Tekanan Darah Tinggi)	Nitroglycerin	Vasodilator kuat yang melebarkan pembuluh darah secara instan. Menurunkan beban kerja jantung dan tekanan darah dengan cepat. Sering diberikan di bawah lidah (sublingual) pada kasus nyeri dada akibat angin duduk (angina).
Hypotension (Tekanan Darah Rendah)	Fludrocortisone Florinef	Kortikosteroid yang memicu ginjal untuk menahan natrium dan cairan di dalam tubuh, sehingga volume darah meningkat dan secara bertahap menaikkan tekanan darah yang drop.
Cardiac Arrest (Henti Jantung)	Epinephrine Adrenaline	Obat emergensi utama dalam resusitasi jantung paru (RJP). Merangsang reseptor jantung untuk berdenyut kembali dan menyempitkan pembuluh darah perifer demi menjaga aliran darah ke otak.
Tachycardia (>100 bpm)	Diltiazem Cardizem	Golongan calcium channel blocker yang bekerja memperlambat konduksi listrik di jantung dan merelaksasi otot jantung, secara efektif menurunkan denyut nadi yang terlalu cepat dan tidak teratur.
Bradycardia (<60 bpm)	Epinephrine Adrenaline	Dalam dosis titrasi rendah (atau alternatif atropin), digunakan jika denyut jantung terlalu lambat secara simptomatik dan mengancam jiwa, guna memacu ritme nodus pemacu jantung.
Coagulant (Pembeku Darah)	Tranexamic Acid (TXA)	Antifibrinolitik yang menghentikan penghancuran alami bekuan darah tubuh. Digunakan untuk menghentikan perdarahan masif akibat trauma berat, kecelakaan, atau perdarahan pasca-operasi. Risiko: Kelebihan dosis memicu Trombosis yang fatal.
Anticoagulant (Pengencer Darah)	Warfarin	Mencegah pembentukan gumpalan darah baru yang berbahaya di pembuluh darah. Penggunaannya wajib dipantau rutin lewat cek laboratorium darah (nilai INR) karena rentan overdosis.
	Rivaroxaban Xarelto	Antikoagulan modern yang bekerja memblokir Faktor Xa secara langsung. Jauh lebih praktis karena memiliki dosis yang stabil dan tidak

Kondisi Klinis	Nama Obat (Merek)	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
		memerlukan kontrol laboratorium rutin seperti Warfarin.
	Heparin	Pengencer darah kerja cepat yang disuntikkan secara IV atau subkutan. Digunakan langsung di rumah sakit untuk penanganan cepat serangan jantung atau pencegahan stroke sumbatan.

Catatan Keamanan Pasien: Pasien yang sedang mengonsumsi obat Antikoagulan (Pengencer Darah) berada dalam risiko tinggi mengalami perdarahan hebat yang sulit berhenti jika mereka terkena benturan atau luka robek sekecil apa pun saat investigasi medis dilakukan.

5. Diuretics (Obat Peluruh Cairan)

Sering disebut sebagai “*water pills*”. Obat ini bekerja dengan cara merangsang organ ginjal untuk membuang kelebihan cairan tubuh dan natrium (garam) melalui ekskresi urin, secara langsung mengurangi volume cairan di pembuluh darah dan jaringan pembengkakan.

Nama Obat (Merek)	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
Furosemide Lasix	Loop diuretic dosis kuat dan bekerja sangat cepat. Diindikasikan untuk mengeluarkan timbunan cairan di paru-paru (edema paru) pada pasien gagal jantung congestif atau pembengkakan ekstremitas masif.
Mannitol Resectisol	Diuretik osmotik yang diberikan via infus. Berfungsi menarik cairan keluar dari jaringan otak atau kompartemen mata. Digunakan khusus pada kasus cedera kepala berat untuk menurunkan tekanan tinggi dalam otak (Intracranial Pressure / ICP).
Metolazone Zaroxolyn	Diuretik mirip-tiazid kuat yang sering dikombinasikan dengan Furosemide apabila pasien mengalami resistensi diuretik pada gangguan fungsi ginjal kronis.
Spirolactone Aldactone	Diuretik hemat kalium. Berbeda dengan Furosemide, obat ini mengeluarkan cairan tanpa membuang kalium tubuh, sering dipakai pada pasien dengan sirosis hati atau gagal jantung jangka panjang.
Acetazolamide Diamox	Bekerja menghambat enzim karbonat anhidrase. Selain menurunkan tekanan bola mata pada glaukoma, obat ini juga digunakan untuk mencegah dan meringankan gejala penyakit ketinggian (altitude sickness).
Hydrochlorothiazide Microzide	Diuretik tiazid yang bekerja moderat. Umumnya diresepkan sebagai terapi lini pertama jangka panjang untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi esensial kronis.

6. Gastrointestinal & Neurological (Pencernaan & Saraf)

Mencakup regulasi refleks saluran cerna serta pengendalian sinyal kelistrikan dan vaskularisasi pada kompartemen sistem saraf pusat.

A. Gastrointestinal (Antiemetics / Anti-Mual)

Nama Obat (Merek)	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
Lorazepam Ativan	Dalam konteks pencernaan, obat ini digunakan di rumah sakit sebagai lini lanjutan untuk meredakan mual/muntah hebat yang dipicu antisipasi kecemasan berat atau pasca-kemoterapi. Perhatian: Termasuk golongan Benzodiazepine yang berpotensi adiktif tinggi.

B. Neurological: Anticonvulsants (Obat Anti Kejang)

Digunakan untuk menstabilkan aktivitas listrik abnormal di otak demi mencegah atau menghentikan kejang yang dipicu oleh cedera kepala berat (Traumatic Brain Injury / TBI), stroke, maupun epilepsi. Dapat juga dipakai untuk meredakan nyeri saraf kronis.

Nama Obat (Merek)	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
Gabapentin Neurontin / Gralise	Bekerja memengaruhi neurotransmitter saraf. Selain mencegah kejang parsial, sangat efektif dan sering dipakai untuk mengobati nyeri saraf (neuropati) kronis akibat trauma atau diabetes.
Carbamazepine Tegretol	Menstabilkan saluran natrium yang sensitif terhadap tegangan di sel saraf otak. Digunakan untuk mengontrol kejang tonik-klonik umum serta gangguan mood berat seperti fase manik bipolar.
Phenytoin Dilantin	Salah satu obat anti-kejang lini pertama di instalasi gawat darurat. Sangat efektif untuk menekan dan mencegah aktivitas kejang berulang pasca-trauma kepala akut (TBI) tanpa menyebabkan penurunan kesadaran total.
Primidone Mysoline	Di dalam tubuh akan diubah menjadi fenobarbital. Digunakan untuk mengendalikan kejang grand mal dan kejang fokal, serta membantu mengurangi tremor esensial.

C. Migraine & Cluster Headache Medications

Nama Obat (Merek)	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
Sumatriptan Imitrex	Golongan triptan yang bekerja menyempitkan pembuluh darah di sekitar otak yang melebar dan meredakan peradangan saraf. Sangat spesifik dan efektif meredakan migrain atau sakit kepala cluster parah jika langsung dikonsumsi sejak awal gejala muncul.

7. Poison Control (Penanganan Keracunan)

Protokol penanganan darurat medikamentosa yang ditujukan untuk membalikkan efek toksik zat asing berbahaya atau mencegah penyerapannya di saluran cerna.

Kategori Kasus	Nama Obat (Merek)	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
Opioid Overdose (Overdosis Narkotik)	Naloxone Narcan	Antagonis opioid murni. Bekerja mendepak dan memblokir molekul opioid dari reseptor otak secara instan. Menyelamatkan nyawa pasien yang mengalami henti napas akibat overdosis morfin/heroin dalam hitungan detik.
Poisoning (Keracunan Umum)	Activated Charcoal Arang Aktif	Arang khusus yang memiliki daya serap (adsorpsi) sangat tinggi. Diminumkan ke pasien untuk mengikat zat racun atau obat overdosis yang masih ada di lambung agar tidak terserap tubuh, lalu dibuang lewat BAB.

8. Psychological / Mental Health (Kesehatan Mental)

Psikofarmaka yang bekerja memengaruhi neurotransmitter di otak untuk memodifikasi, menstabilkan, atau mengoreksi gangguan persepsi, suasana hati (mood), dan kecemasan psikologis berat.

Kelas / Golongan	Contoh Obat / Sub-kelas	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
Antidepressants (Obat Antidepresan)	SSRI (e.g. Fluoxetine)	Digunakan untuk mengatasi gangguan depresi mayor, gangguan kecemasan kronis, dan trauma (PTSD) dengan cara menyeimbangkan kadar zat kimia otak (seperti serotonin & norepinefrin) yang bertanggung jawab atas regulasi emosi dan suasana hati pasien.
	SNRI (e.g. Venlafaxine)	
	TCA (e.g. Amitriptyline)	
Antipsychotics (Obat Antipsikotik)	<i>Atypical:</i> Olanzapine	Diindikasikan untuk menangani gangguan psikotik berat (seperti Skizofrenia atau episode manik akut). Bekerja meredam distorsi kognitif, menghentikan halusinasi (mendengar/melihat hal gaib/palsu), serta meredakan delusi/waham dengan menstabilkan dopamin otak.
	<i>Atypical:</i> Quetiapine	
	<i>Atypical:</i> Risperidone	
	<i>Typical:</i> (e.g. Haloperidol)	
Anxiolytics (Obat Anti-Cemas)	Lorazepam Ativan	Obat penenang yang bekerja cepat menekan aktivitas sistem saraf pusat yang overaktif. Digunakan untuk meredakan serangan panik akut (panic attack), kecemasan ekstrem, atau memenangkan pasien histeris yang mengamuk.
	Diazepam	
	Benzodiazepines (Golongan)	
Mood Stabilizers (Penstabil Mood)	Lithium	Obat garis depan untuk mengendalikan ayunan emosi ekstrem yang tidak stabil, khususnya pada penderita Gangguan Bipolar, mencegah pasien terperosok terlalu dalam ke fase depresi atau melonjak terlalu tinggi ke fase manik yang destruktif.
	Valproate	
	Lamotrigine	

9. Respiratory (Sistem Pernapasan)

Agen farmakologis yang difokuskan pada pemulihan fungsi ventilasi paru-paru, mengatasi penyempitan bronkus, serta meredakan reaksi hipersensitivitas pada saluran napas.

Nama Obat (Merek)	Kelas Kerja	Pengertian & Kejelasan Penggunaan
Diphenhydramine Benadryl	Antihistamines	Memblokir zat histamin yang diproduksi tubuh saat reaksi alergi terjadi. Digunakan untuk mengatasi gatal-gatal, biduran, bersin, atau sebagai pertolongan awal pada syok anafilaktik akibat alergi obat/makanan. Menyebabkan kantuk.
Albuterol / Salbutamol Ventolin HFA	Bronchodilators	Obat pelega (rescue inhaler) yang bekerja instan melemaskan otot-otot di sekitar saluran napas yang menyempit. Digunakan langsung saat pasien mengalami serangan sesak napas akut akibat Asma atau PPOK.
Fluticasone Flovent HFA	Inhaled Corticosteroids	Kortikosteroid hirup yang berfungsi sebagai obat pengontrol (maintenance). Bekerja mengurangi peradangan kronis dan pembengkakan di dalam paru-paru, digunakan setiap hari untuk mencegah kekambuhan serangan asma.