

Checklist preoperatorio – Implante de LVAD

Hospital Universitario Ramón y Cajal – Unidad de Críticos Cardiovasculares

1. Cuidados generales)

- ☐ Ingreso 2-4 días antes del implante (U.Intermedios- cama 8)- depende de la situación clínica.
- ☐ Peso y talla
- ☐ ECG de 12 derivaciones
- ☐ Radiografía de tórax (tras colocación de vía central y catéter de AP).
- ☐ Grabar ecocardiograma transtorácico completo
- ☐ Analítica completa al ingreso y el día de la cirugía (incluyendo LDH y haptoglobina).
- ☐ Pruebas cruzadas y reserva de 10 CH, 4 pool plaquetas y 2000 cc PFC.
- ☐ Revisión dental y bucal si infección activa.
- ☐ Rasurado con maquinilla eléctrica (tórax, cuello, axilas, abdomen, pubis y piernas hasta rodillas) la mañana del implante.
- ☐ Ducha con clorhexidina la tarde previa y la mañana del implante.
- ☐ Enjuague bucal con clorhexidina 0,1 % el mismo día del implante.
- ☐ Recorte de uñas y retirada de esmaltes.
- ☐ Dieta absoluta desde 12 horas antes de la cirugía.
- ☐ Enema de limpieza la noche anterior (21:00 h).
- ☐ Reprogramar DAI/marcapasos/TRC en la antesala de quirófano.

2. Medicación y profilaxis (día previo y días anteriores)

- ☐ Profilaxis nasal con mupirocina 2 % cada 8 h desde 5 días antes (o al menos desde la tarde previa).
- ☐ Suspende clopidogrel/prasugrel $\geq 7-10$ días antes.
- ☐ Suspende AAS $\geq 5-7$ días antes.
- ☐ Suspende ticagrelor $\geq 3-5$ días antes.
- ☐ Suspende apixabán/rivaroxabán/edoxabán ≥ 2 días antes.
- ☐ Suspende dabigatrán ≥ 2 días antes (≥ 4 días si TFG < 80 ml/min).
- ☐ Suspende dicumarínicos ≥ 4 días antes y mantener HBPM ajustada a TFG.
- ☐ No administrar HBPM la noche previa.
- ☐ Si INR $> 1,5 \rightarrow$ vitamina K (2 ampollas VO) + complejo protrombínico (2-3 ampollas según peso) 30 min antes de cirugía.
- ☐ Profilaxis antibiótica 30 min antes de la incisión: cefotaxima 1 g + vancomicina 500 mg + fluconazol 200 mg (ajustar según infecciones).

3. Objetivos hemodinámicos – Swan-Ganz (día previo)

- ☐ PVC < 15 mmHg.
- ☐ PCP < 20 mmHg.
- ☐ Resistencias vasculares pulmonares < 3 UW.
- ☐ Presión pulmonar media < 40 mmHg (considerar sildenafil si > 40 mmHg y RVP > 3 UW).
- ☐ Cálculo PAPI, CPO