Краткое описание препарата
Алгис Дезлоратадин

Торговое название:Алгис
Международное непатентованное название:Дезлоратадин
Лекарственная форма:Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, раствор для приема внутрь 60мл
Состав:Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит
активного вещества - дезлоратадина 5 мг,раствор 0.5 мг/мл дезлоратадина
Фармакотерапевтическая группа:
Антигистаминные препараты системного действия.
Фармакологические свойства
Фармакокинетика
Всасывание:После приема препарата внутрь дезлоратадин хорошо абсорбируется из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), при этом определяемые концентрации дезлоратадина в плазме крови достигаются в течение 30 мин, а максимальная концентрация в плазме (C max) - приблизительно через 3 ч. Прием пищи или алкоголя практически не изменяет фармакологические свойства препарата.*Распределение*: Связывание дезлоратадина с белками плазмы составляет 83-87%. При применении в дозе от 5 мг до 20 мг 1 раз в сутки в течение 14 дней признаков клинически значимой кумуляции дезлоратадина не выявлено). Не проникает через гематоэнцефаличес-кий барьер (ГЭБ).*Выведение*:Выводится из организма в виде глюкуронидного соединения и в небольшом количестве в неизмененном виде, небольшая часть выводится почками (2%) и с каловыми массами (7%). П-д полувыведения (T1/2) составляет в среднем 27 ч (20-30 ч).
Фармакодинамика:
Алгис оказывает антигистаминное, противоаллергическое и противовоспалительное действие, не вызывает сонливости. При приеме внутрь дезлоратадин селективно блокирует периферические гистаминовые H1-рецепторы. Подавляет каскад цитостатических реакций: выделение провоспалительных цитокинов, в т.ч. интерлейкина-4 (ИЛ-4), интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-8 (ИЛ-8), интерлейкина-13 (ИЛ-13), провоспалительных хемокинов типа RANTES, продукцию супероксидных анионов активированными полиморфно-ядерными нейтрофилами, адгезию и хемо-таксис эозинофилов, экспрессию молекул адгезии, в т.ч. P-селектина, IgE-опосредованное выделение гистамина, простагландина D2 и лейкотриена C4.
Показания к применению:
- сезонный поллиноз и аллергический ринит (устранение или облегчение чихания, выделения слизи из носа, зуда и заложенности носа, зуда и покраснения глаз, слезотечения, зуда неба);
- крапивница и другие кожные заболевания (уменьшение или устранение кожного зуда и сыпи).
-в комплексном лечении аллергического бронхита, респираторных заболеваний
Способ применения и дозы:
Алгис принимают внутрь, независимо от приема пищи, запивая небольшим количеством воды.
Взрослым: по 1 таблетки (5 мг) 1 раз в сутки.
Курс лечения и продолжительность приема определяется характером заболевания. При лечении сезонного поллиноза прием препарата прекращают после исчезновения симптомов. При лечении круглогодичного аллергического ринита препарат применяют непрерывно, в течение всего периода контакта пациента с аллергеном.
Применение у детей раствора:

Детям в возрасте от 2 до 5 лет назначают по 2,5 мл раствора (1,25 мг) 1 раз в сутки.
Детям в возрасте от 6 до 11 лет - по 5 мл раствора (2,5 мг) 1 раз в сутки.
Курс лечения и продолжительность приема определяется характером заболевания. При лечении сезонного поллиноза прием препарата прекращают после исчезновения симптомов. При лечении круглогодичного аллергического ринита препарат применяют непрерывно, в течение всего периода контакта пациента с аллергеном.

Лекарственные взаимодействия

Дезлоратадин не усиливает действие *алкоголя* на центральную нервную систему.

Особые указания

С осторожностью применять у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.

Особенности влияния на способность управлять транспортным средством и работы с потенциально опасными механизмами:

Алгис не влияет на способность управлять автомобилем и выполнять работы, требующие высокой скорости психомоторных реакций. Однако пациентов следует проинформировать, что в очень редких случаях возможно появление сонливости.

Производитель

SPECIFAR S.A.
1, 28 Octovriou str., 12351 Ag.Varvara, Афины, Греция
Владелец регистрационного удостоверения
Welfar United LTD. Co.
Suite 2, 23-24 Great James Street, Лондон WC1N 3ES, Великобритания