Краткое описание препарата : Картан® Левокарнитин

Производитель: DEMO S.A. Pharmaceutical Industry
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Levocarnitine
Международное непатентованное название -Левокарнитин
Лекарственная форма: Раствор для инъекции, 1г/5мл
Состав:1 мл раствора содержит
активное вещество - левокарнитин 200 мг,
вспомогательные вещества: кислота хлороводородная, вода для инъекций.
Описание: Прозрачный бесцветный или светло-желтого цвета раствор
Фармакотерапевтическая группа:
Аминокислоты и их производные, средства улучшающие метаболизм
Код АТС А16АА01
Фармакологические свойства:
Фармакокинетика:
При парентеральном введении хорошо проникает во все ткани, высокие концентрации создаются в скелетных мышцах и миокарде. Экскретируется почками преимущественно в виде ацильных эфиров, свободный же карнитин реабсорбируется.
Фармакодинамика:
L-карнитин- природное вещество, родственное витаминам группы В. Участвует в процессах обмена веществ в качестве переносчика жирных кислот через клеточные мембраны из цитоплазмы в митохондрии, где эти кислоты подвергаются процессу бета-окисления с образованием большого количества метаболической энергии (в форме АТФ).Обеспечивает энергоснабжение всех тканей организма, в особенности энергозатратных органов (сердечная и скелетные мышцы). Картан - нормализует белковый и жировой обмен, восстанавливает щелочной резерв крови, угнетает образование кетокислот и анаэробный гликолиз, уменьшает степень лактатацидоза, а также увеличивает двигательную активность и повышает переносимость физических нагрузок, при этом способствует экономному расходованию гликогена и увеличение его запасов в печени. Картан оказывает дезинтоксикационное действие , уменьшая количество кетоновых тел и устраняя лактоацидоз.
Картан - оказывает анаболическое действие, нормализует повышенный основной обмен при гипертиреозе, являясь частичным антагонистом тироксина, стимулирует секрецию желудочного сока, замедляет распад белковых и углеводных молекул. Снижает избыточную массу тела и уменьшает содержание жира в мускулатуре, так же препятствует накоплению жировых отложений в печени и сердечной мышце. Оказывает нейротрофическое действие,учавствуя в синтезе фосфолипидов , сфингомиелина и цереброзидов. Тормозит развитие апоптоза, ограничивает зону поражения и восстанавливает структуру нервной ткани,нормализует передачу нервных импульсов, тем самым оказывая нейропротекторное действие. Картан предотвращая ПОЛ, оказывает антиоксидантное действие , снижает гиперлипидемию, оказывает антиатеросклеротическое действие.
Показания к применению:
Первичный или вторичный дефицит карнитина у взрослых, детей, в т.ч. новорожденных

- вторичный дефицит карнитина у гемодиализных больных с терминальной стадией почечной недостаточности (т. к. при этом происходит удаление из организма свободного карнитина, обычно реабсорбируемого в почках, и накопление ацильных эфиров, выделяемых здоровыми почками)

- недостаточность карнитина у недоношенных детей, находящихся на полном парентеральном питании. Введение питательных веществ в вену исключает первоначальное их прохождение через стенку кишечника и печень. В результате в плазме крови возникает избыток липидов, что угнетает скорость всех биохимических реакций (в частности, нарушается утилизация метильных групп метионина).
- недостаток карнитина в организме у пациентов с резко повышенным его расходованием (например, при гипоксии, дифтерии, приеме препаратов вальпроевой кислоты и т.п.)
- анорексия, медленная прибавка массы тела и задержка роста у детей
- нарушения метаболизма миокарда на фоне ИБС (стабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз)
- хроническая сердечная недостаточность
- острое и хроническое нарушение мозгового кровообращения (инсульт, энцефалопатия различного генеза)
- кардиомиопатии (в миокарде утилизация жирных кислот в качестве источника энергии происходит очень интенсивно, поэтому есть особенная потребность в карнитине. После его введения отмечают увеличение силы сокращений, предотвращение дальнейшей дегенерации мышц, нормализацию ЭКГ)
- слабость скелетных мышц и/или миопатии
- дистресс-синдром у недоношенных новорожденных
- органическая ацидемия. Эта патология является следствием врожденных или генетических нарушений нормального обмена органических кислот. У таких больных ацильные метаболиты КоА, например, пропионил-КоА, накапливаются в клетках, превращаются в ацильные эфиры карнитина и вместе с ним выводятся из клеток, приводя к его внутриклеточному дефициту. Остаток пропионовой кислоты в печени угнетает окислительное фосфорилирование, нарушая этим её функцию.
- заболевания, при которых показано применение анаболических средств (в комплексной терапии)
- отставание в физическом и умственном развитии
- рахит, анемия, ЭКД, ЧБД
- сахарный диабет, тиреотоксикоз, ожирение, дисметаболический синдром
- хронические гепатиты, холециститы, панкреатиты, колиты
- физическое истощение, продолжительные интенсивные спортивные тренировки
- мужское и женское бесплодие

Способ применения и дозы:

Вводится внутримышечно, внутривенно, медленно (2-3 минуты) или путем инфузий.

Дети до 12 лет:

- Первичный или вторичный дефицит карнитина. В случае острой декомпенсации, назначают от 50 до 100 мг/кг/день в 3-4 приема.

Взрослые и дети старше 12 лет:

Обычно суточную дозу назначают от 1г до 3г в 3-4 приема. Лечение начинают с дозы 1г в день. После обследования пациента врачом в зависимости от состояния больного дозу можно увеличить до 3г в день.

Продолжительность внутривенного лечения не должна превышать трех месяцев и период, необходимый для восстановления нормального уровня содержания L-карнитина в мышцах.

Необходимость повторного курса лечения определяется содержанием L - карнитина в плазме крови, осуществляемые с регулярной периодичностью при контроле состояния пациента.

Побочные действия:

- легкие миастенические расстройства у урологических пациентов
- боли в подложечной области

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата

Лекарственные взаимодействия:

Перед приемом препарата следует проинформировать врача о приеме других препаратов.

Глюкокортикоиды увеличивают уровень карнитина во многих тканях (кроме печени). Чрезмерные дозы холина тормозят синтез и активность карнитина. Карнитин можно сочетать с различными анаболическими средствами; с препаратами, обладающими антиоксидантной или/и антигипоксантной активностью.

Особые указания:

Беременность и период лактации:

Назначается во время беременности или кормления грудью только в случае крайней необходимости, если польза для матери превышает потенциальный риск для пола или ребенка.

Передозировка

Отсутствуют данные о токсичности в случае передозировки L-карнитина. Переносимость препарата контролируется в течение первой недели приема и после каждого повышения принимаемой дозы.

Симптомы: высокие дозы препарата вызывают диарею.

Лечение: уменьшение дозы приема препарата и заместительная терапия.

Форма выпуска и упаковка

Раствор для инъекций: По 5 мл препарата разливают в ампулы темного стекла с меткой для разлома по 5 ампул, помещают в термопластиковую контурную ячейковую упаковку.

Раствор для приема внутрь: 10 шт по 10 мл препарата в ампулах полипропиленовых.По 5 ампул помещают в термопластиковые контурную ячейковую упаковку, заклеенные фольгой алюминиевой.

Условия отпуска из аптек: По рецепту

Производитель

Компания ***DEMO S.A. Pharmaceutical Industry***

21 Km National Road Athens-Lamia

14568 Афины, Греция

тел.: + 30 210 8161802

факс:+ 30 210 8161802

Владелец регистрационного удостоверения

DEMO S.A. Pharmaceutical Industry,

21 Km National Road Athens-Lamia,

14568 Афины. Греция,