

MEDIXS : 薬歴

レクチャー用操作マニュアル

★調剤から投薬までの流れの中で MEDIXSを活用するポイント★

処方箋受付	☆ 患者情報を把握する	P4～
調剤・監査	I. 過去処方との比較や今回処方についての疑問点等の情報確認	P5～
投薬・指導	II. 患者様に有効な情報を提供し、手早く充実した指導内容を残す	P10～
疑義照会	III. 疑義照会の登録方法	P17～
患者情報の登録	IV. 最新の患者様情報を登録	P18～
情報提供書	V. 情報提供書の作成 / 印刷	P23～
電話対応	VI. 電話での問合せ内容の登録	P24～
画像・資材	VII. 画像保存方法、資材の提供、薬剤師カラーの設定	P25～
定型文作成	VIII. 定型文作成方法	P27～

☆MEDIXS 起動・終了手順について

■ 各PCの起動順番

①レセコン



②メディクス親機 (getsips常駐)



③メディクス子機



■ メディクスの開始

①「getsips」が【監視中】になっていることを確認してください(自動)



②メディクスのアイコンをダブルクリック



③ID、パスワードを入力
→ログイン

Form for login with fields for ID and Password, and a Login button.

ID: 1文字以上


PW: 英数字8文字以上

ログイン


パスワードの有効期限を設定できます

■ メディクスの終了

①薬歴を保存し、右上のプルダウン「▼」から「ログアウト」をクリック



②「×」で終了



■ 患者検索画面

[未入力(本日)]選択時のみ、レセコンから新規 SIPSが取り込まれた場合に自動的に最新の患者一覧を取得します
その他の項目を選択している場合は[**F5キー**]をクリックし、**画面を更新**してください

薬局管理 グループ管理 指導文管理 ログイン者名

患者検索
小児科 DD子 - 服薬指導

0 101 2 2
ヘルプページ

来局者

全患者
訪問

簡易検索

未入力(本日)

後で

保留

指導済

自分のみ

本日分

詳細検索

期間 本日

▼

期間 (自由入力)

例) s26/7/4 または 1951/7/4

R03/05/31

～

R03/05/31

患者検索項目

☐ 過去分
 ☐ 記載不要

☐ 患者氏名

受付番号 ※完全一致

患者氏名 ※部分一致

医薬品名 (フリー入力)

医薬品名 (選択)

☐ AND検索

モーラステープ L 40mg

ロキソニン錠 60mg

医薬品検索

調剤日

患者氏名

生年月

医療機関/タイトル

状況	調剤日	受付番号	患者氏名	生年月	医療機関/タイトル	指導者
未入力	R3/05/31		フクスウ キカンイタ		複数 機関EE太	か デモシステム管理者
未入力	R3/05/31		ドウィツカ センセイベツホカテンボ		同一科 先生別他店舗	か デモシステム管理者
未入力	R3/05/31 (9時間経過)	7	ニンブ デチョウコ	S62/05/05 34歳	浜谷病院	か デモシステム管理者
未入力	R3/05/31 (9時間経過)		ドウィツカ センセイベツホカテンボ	H24/04/04 9歳	浜谷病院	か デモシステム管理者
未入力	R3/05/31 (9時間経過)		ドウィツカ センセイベツホカテンボ	T14/03/03 96歳	あいうえおクリニック	か デモシステム管理者
未入力	R3/05/31 (9時間経過)	4	チョウフク ハイリス	7/09/09 78歳	テストB病院	か デモシステム管理者
未入力	R3/05/31 (10時間経過)	3	シンカン エイエイクユニューキチ	S55/01/01 41歳	アクシスクリニック	か デモシステム管理者
未入力	R3/05/31	2	キンキ ホウモンナカムラ	S36/03/03 60歳	浜谷病院	か デモシステム管理者

クリア

検索

1~9 件/全9件

注 患者情報ポップアップあり
メモ メモあり
写真 写真あり
かかりつけ薬剤師

◎服用している医薬品名で患者を検索

↳ **医薬品名(フリー入力)**: アムロジピン錠 2.5mg「トーフ」⇒『あむ 2.5 と』間にスペース入力
AND検索: アムロジピン錠トーフとロキソニン⇒『あむ と&ろき &』を入力

↳ **医薬品名(選択)**: 医薬品検索タブから特定の医薬品を選択、**添付文書閲覧**
AND検索: チェック有
OR検索: チェック無

☆MEDIXS 基本画面

患者一覧
(F1)

※保留で保存して来局者一覧に戻ります。
※操作薬剤師名で担当薬剤師が更新されます

確認事項
(F2)

併用薬
(F3)

指導支援
(F4)

更新
(F5)

服薬指導の要点入力欄
カーソル1番上(F10)

保存
(F12)

患者検索 禁忌 訪問中村 - 服薬指導

服薬指導 患者基本 頭書き 写真 検査値 薬歴 処方比較 残薬 疑義照会 確認事項 指導支援 検査値 処方監査 訪問 情報提供書 保存

キンキ ホウモンナカムラ
禁忌 訪問中村 様

S36/03/03(61歳4ヶ月) 家族あり

メモ 患者情報 処方歴 他店舗 2次元コード

足が悪いため、席まで行って服薬指導

患者情報

一酸化 後発 健

施設名: ○○○施設

初回来局日: R4/06/05 前回来局日: R4/07/01 (9日ぶり)

頭書き

処方監査項目

疾病: 認知症、緑内障、脳出血、痛風、小麦によるアレルギー、抗生物質アレルギー、アトピー性白内障、アトピー性神経皮膚炎

●他科受診/併用薬

●副作用歴/発現

●体質/アレルギー

●既往歴/疾病

●飲食物/嗜好品

●患者生活像

●後発品希望

●調剤情報

貧血 (R4/07/10)

糖尿病 (R4/07/10)

運動不足 (R4/07/10)

後発品希望 (R4/07/10)

一酸化(理由:身体が不自由で服用困難のため) (R4/07/10)

写真

写真追加

R4/06/19 渋谷病院 内科

医師 薬師 太郎01

調剤日 R4/06/19 [1]

指導日 R4/06/19 12:22

指導者 本人

指導対象者 本人

1 Do メトグルコ錠 2.5 0mg 2錠 1回 1回朝食後服用 5日分

2 Do ギザル錠 5mg 1錠 1回 1回夕食後服用 7日分

3 前除 サンコバ点眼液 0.02% 5mL 1瓶 1日2回 左目に点眼

4 Do ブルゼニド錠 12mg 1錠 10回分

服薬指導の要点

体調変化 咳はおさまった。痰は目覚めから出てしまった。

確認 [ギザル錠 5mg] なかったこと確認。

指導 [サンコバ点眼液] 左目に点眼。

指導 [ブルゼニド錠 12mg] 主な副作用として、気持ちが悪くなる等の症状があるため、気になる症状があれば相談するよう指導。

確認事項

残薬記録

メトグルコ錠 2.5 0mg 1日分

ギザル錠 5mg 1日分

患者体質 (アレルギー) 変化なし

既往歴含む合併症 変化なし

相談事項 なし

●手帳活用の有無 持参

●副作用歴/発現 変化なし

●飲食物/嗜好品 なし

残薬の状況 残薬の状況

副作用疑われる症状 なし

良好→残薬量と、来局間隔より

●他科受診/併用薬 変化なし

●体質/アレルギー 変化なし

●後発品希望 しない

検査値

検査日: R5/01/06

検査種別名	検査項目名	検査値 単位
身体	体重	75 Kg
糖尿病	空腹時血糖 (BS)	135 mg/dl
糖尿病	グリコヘモグロビン (HbA1C)	6.6 %
肝機能	AST(GOT)	20 IU/l

R4/07/10 渋谷病院 内科

医師 薬師 太郎01

調剤日 R4/07/10 [2]

指導日 R4/07/10

指導者 メディクス管理者

指導対象者 本人

1 新規 ワー 1錠 1回 1回朝食後服用 5日分

2 Do ギザル錠 5mg 1錠 1回 1回夕食後服用 7日分

疑義照会

服薬指導の要点

体調変化

確認

指導

留意点

確認事項

●服薬状況/残薬状況

●他科受診/併用薬

●体質/アレルギー

●飲食物/嗜好品

●相談事項

●調剤情報

●手帳活用の有無

●副作用歴/発現

●既往歴/疾病

●患者生活像

●後発品希望

●特記事項

検査値

訪問報告

患者の服薬状況等に係る情報提供書

ハイリスク薬の注意事項

写真

I. 過去処方との比較や今回処方についての疑問点等の情報確認

■ 処方の変化を確認する

[基本画面]...今回と表示されている過去処方での比較(絞り込み可能)

アイコンに色が付く=処方に变化がある!

「新規(白抜き)」「以前」をクリックすると、過去処方欄が自動で切り替わります

処方変更の内容を指導文に転記できます

医薬品差分

■ 比較処方日の変更・絞り込み

全体

医療機関+診療科+医師

今回処方を基準に同一の「医療機関+診療科+医師」で絞り込みができます

- 新規**
 - 初めて処方された薬品(※メディックスのデータ上)
 - ※同一規格でも含有量が変わる場合、新規処方になる
- 新規**
 - 過去処方に同一規格の医薬品が処方されたことがある(先発A⇒GEへ変更した場合など) YJ9桁一致(クリック)
- 削除**
 - 今回処方から削除
- 削除**
 - 今回処方から削除
 - 過去処方に同一規格の医薬品が処方されたことがある
- 以前**
 - 前回以前に処方されたことがある(クリック)
- 変更**
 - 用量/用法の変更
- Do**
 - 前回とDo処方
- 日数**
 - 日数のみ変更
- 効**
 - 同効薬かつ同系統の薬剤が1つ以上ある(クリック)
- 効**
 - 同系統の薬剤はないが同効薬の薬剤が1つ以上ある(クリック)
- 選**
 - 選定療養の対象薬剤かつ選定療養で調剤した
- 選**
 - 選定療養の対象薬剤かつ保険調剤した
- 特薬3**
 - 供給不足により同じ銘柄を用意できずに変更する
- 包**
 - 一包化した医薬品
- 混**
 - 混合指定した医薬品
- 般**
 - 一般名が同じで医薬品が異なる場合
- 同日に複数の受付がある(**点減**)

点減

クリックすると別医療機関の薬歴画面が別タブで開きます

※処方2つの場合は別窓で1つ、処方が3つの場合は別窓で2つ開きます

処方あり/なしのイベントを除外して表示することができます

I. 過去処方との比較や今回処方についての疑問点等の情報確認

■ 3回分の処方と指導文を確認する

[処方比較]



服薬指導 患者基本 頭書き 写真 検査値 薬歴 **処方比較** 残薬 疑義照会 確認事項 指導支援 検査値 処方監査 訪問 情報提供書 保存

2個前

調剤日 R4/06/05 [1]

指導日 R4/06/05 12:22

R4/06/05 渋谷病院 (内科) 医師

1 メトグルコ錠 250mg
1日1回朝食後服用 5日分

2 ザイザル錠 5mg
1日1回夕食後服用 7日分

3 ムコダイン錠 500mg
1日3回食後服用 5日分

4 プルゼニド錠 12mg 1錠

1個前

調剤日 R4/06/19 [1]

指導日 R4/06/19 12:22

R4/06/19 渋谷病院 (内科) 医師

1 Do メトグルコ錠 250mg
1日1回朝食後服用 5日分

2 Do ザイザル錠 5mg
1日1回夕食後服用 7日分

3 Do サンコバ点眼液 0.02% 5mL 1瓶

今回

調剤日 R4/07/10 [2]

指導日

R4/07/10 渋谷病院 (内科) 医師 テスト太郎

1 Do フーフェリン錠 4mg 1錠

2 Do メトグルコ錠 250mg 5日分

3 Do

1日1回夕食後服用 7日分

今回処方と比較をしたい処方をクリック

カーソルをあてると
前回処方日が表示されます

クリックすると添付文書
が開きます

R3/02/09

過去処方と指導文を確認できる

- 特定の薬品がいつ処方されたのか調べたい
- 薬品変更された日の指導文を見たい
- 長いスパン(5年間)で処方歴を確認したい

[処方歴]

キンキ ホウモンナカムラ
禁忌 訪問中村 様

S36/03/03(61歳4ヶ月) 家族あり

メモ ✓ 患者情報 **処方歴** 他店舗 2次元コード



複数 機関EE太 様の処方歴

● 調剤日降順 ○ 医薬品名昇順 ※直近5年分の処方歴が対象です

医療機関	診療科	調剤日降順	用法	初回処方日	調剤内容	処方内容・指導文
あいうえおクリニック	内科	ツムラ麦門冬湯 大顆粒 (医療用)	1日3回食前服用	R6/04/24	処方内容 調剤日 R4/07/10 [2] 指導日 R4/07/10 10:07 R4/07/10 渋谷病院 (内科) サンプル 医師 1 アレロック錠 5mg 2錠 2 トランサミンカプセル 250mg 3錠 3 フスコデ 1日3回 4 イソラシ 処方内容の表示	処方内容・指導文
〇〇病院	整形外科	ロキソニン錠 60mg	1日3回食後服用			
〇〇病院	整形外科	スミルスチック 3%	1日1回 塗布			
〇〇病院	呼吸器科	アレロック錠 5	1日2回朝夕食後服用			
〇〇病院	整形外科	ロキソプロフェン錠 60mg 「EMEC」	1日3回食後服用			
〇〇病院	整形外科	ロキソプロフェンNa錠 60mg 「サワイ」	1日3回食後服用			

I. 過去処方との比較や今回処方についての疑問点等の情報確認

■ 残薬のチェックを行いたい

[今回処方]...理論残薬がアイコンで表示されます
カーソルをあてると服用最終日が表示されます

R4/07/10 ○○病院 呼吸器科 の処方 (未入力)

1	2回朝夕食後服用	14日分	
2	以前 トランサミンカプセル 250mg	3カプセル	残3
	新規 フスコデ配合錠	残薬を含む服用最終日: R4/07/26	疾病
	1日3回食後服用	14日分	
3	以前 シムピコートタービュヘイラー 60吸入	服用最終日: R4/07/23	残-10
	1日2回 朝・夕1吸入		

■ 残薬を薬歴に記録したい

[残薬記録]...薬歴簿(2号用紙)に印字されます

確認事項 残薬記録 併用薬 F3 確認事項

残薬記録入力項目 ※半角数字で入力してください

薬名	単位	数量	単位	単位
アレロック錠5	錠	10	日分	
トランサミンカプセル 250mg	錠	7	錠	
シムピコートタービュヘイラー 60吸入	キット			
イソジンガーグル液 7%	mL			
ロコイド軟膏 0.1%	g			

薬品名コピー

コメント

フリーコメント記入欄

入力

■ カレンダーで残薬を確認したい

[残薬]...理論残薬がカレンダーで表示されます



服薬指導 患者基本 読書き 写真 検査値 薬歴 処方比較 残薬 疑義照会 確認事項

複数 機関EE太 様のカレンダー

ON-OFF 残薬あり 赤色: 過去1年の残薬 黄色: 今回処方の服薬予定

医薬品名	残数	服用終了日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
トランサミンカプセル 250mg	3	R4/07/26	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
アレグラ錠 60mg																														
フスコデ配合錠																														
アレロック錠 5																														
カロナール錠 20																														
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)	3	R4/07/12																												

本日調剤日【赤線】より超えている日数 = 前回の処方期間が重なっている

残薬カレンダーで表示される期間
(理論残薬)
→過去1年分の残薬

確認事項 残薬記録 併用薬 F3 確認事項

残薬記録

アレロック錠5	10日分
トランサミンカプセル 250mg	7日分
ロコイド軟膏 0.1% : 少しの残っている	
残薬理由: 昼間は仕事をしているため、服用を忘れてしまう	

I. 過去処方との比較や今回処方についての疑問点等の情報確認

- 今回処方の監査結果マークをクリックすると[処方監査]タブが開き、内容を確認できます
または、[処方監査]タブを直接クリックで内容を確認できます

R4/07/10 テストB病院 内科、外科 の処方 (未入力)

調剤日	R4/07/10 【4】	指導者	西谷stg
指導日	R4/07/10 00:00	指導対象者	本人

R4/07/10 テストB病院 (内科) 医師 BB次郎

1	日数	ロキソニン錠 60 mg	3錠	重複	残-4
	新規	ロキソプロフェンNa錠 60 mg 「サワイ」	3錠	重複	
	日数	セルベックスカプセル 50 mg	3カプセル	残-4	適応症
	日数	カルナクリン錠 50 50単位	3錠	残-4	
	日数	メトグルコ錠 250 mg DSU	6錠	H	残-4 禁忌
	1日3回食後服用				
2	日数	バイアスピリン錠 100 mg DSU			
	日数	ハルナールD錠 0.2 mg	1錠	重複	残-4
	日数	ハルナールD錠 0.2 mg	1錠	重複	残-4

鑑査結果



処方監査

全体 新規薬 併用薬 禁忌薬 今回処方 過去処方 生活情報を含める

日数 バップフォー錠 10 10 mg

疾病 禁忌 [現疾患] 緑内障
閉塞隅角緑内障の患者→投与禁忌
※抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状が悪化するおそれがある。

疑義照会する

疑義照会登録画面に
遷移します

日数 セルベックスカプセル 50 mg

適応症 禁忌 B: ロキソニン錠 60 mg ロキソプロフェンNa錠 60 mg 「サワイ」
Bは消化性潰瘍の患者に禁忌の情報があります→Aの適応を確認

適応症 禁忌 B: バイアスピリン錠 100 mg
Bは消化性潰瘍の患者に禁忌

指導文に内容が
転記されます

疑義照会登録

問い合わせ日時 必須 R04/07/08 12 時 07 分

医療機関 テストB病院

診療科 内科

処方元以外へ問い合わせ ☐

医薬品 (チェック対象)

- ☐ メトグルコ錠 250 mg
- ☐ バイアスピリン錠 100 mg
- ☐ ハルナールD錠 0.2 mg
- ☒ バップフォー錠 10
- ☐ タケブロンOD錠 15
- ☐ モーラステープL 40 mg

服薬指導の要点

頭書き転記 医薬品差分 指導支援

S: 体調

O: 確認 [セルベックスカプセル 50 mg] 消化性潰瘍の患者ではないことを確認。

A: 指導

P: 留意

I. 過去処方との比較や今回処方についての疑問点等の情報確認 監査アイコン

● 相互作用

-  → 併用禁忌
-  → 原則併用禁忌
-  → 重大な併用注意
-  → 併用注意

● 用量

-  → 上限値を上回っている
-  → 基準値より下回っている

検査値で登録した身長、体重に基づいた標準的な一日の
投与回数、限界投与量を算出し処方の内容と比較・判定

● 配合禁忌

- 相互作用の監査情報が理化学的変化の場合にアイコン表示
添付文書の使用上の注意の理化学的変化に基づいてチェック
-  → 配合禁忌
 -  → 配合回避
 -  → 配合注意

● 配合剤

監査対象となります
例) 処方薬: スージャヌ配合
禁忌薬: ジャヌビア錠
↓
禁忌薬と同じ成分「シタグリプチン」を含んでいます

● 疾病(疾病監査 オプション)

-  登録した疾病について、適応症に禁忌の医薬品が処方された場合にアイコンが表示

● 適応症(疾病監査 オプション)

-  → 処方薬の適応症が特定のもので、
禁忌が疑われる場合にアラートが表示

● 重複

-  → 同一医薬品
-  → 同一成分

※残薬がある場合は過去処方に対しても相互作用、成分重複の監査を実施します

● 製品重複(他科処方)

以下2つの条件を満たし、
今回処方とは別日に同一医薬品が処方されている場合
今回処方エリアに「重複」アイコンが表示

- ・異なる医療機関または診療科
- ・服薬期間が重複している

● 薬効重複(系統重複)

- ・処方監査対象 : 今回処方、残薬(同一診療科は除く)、併用薬
 - ・薬効アイコン表示: 薬効重複があった場合のみ
- ※監査と薬効アイコンの表示条件は異なります

● 禁忌薬



- 「個別禁忌薬」で登録された禁忌薬が処方された場合に表示
- 「個別禁忌薬」に登録されている禁忌薬と同じ成分を含有する薬剤が処方されている場合に表示

● 妊娠

「監査項目」妊娠・授乳の登録内容が対象
監査レベルは添付文書に基づいてチェック

-  → 1 : 投与禁忌
-  → 2～5: 原則投与禁忌
-  → 7 : 慎重投与・授乳回避・授乳禁止

※監査レベル6: 有益性投与 → 該当数が多いため、判定なし
出産予定日を登録することで妊娠何週目かを表示します
平均妊娠数週40週を逆算して週数を算出していますので、
あくまで参考情報としてご活用ください

Ⅱ. 手早く、尚且つ、充実した指導内容を残す

- 服薬指導の要点の入力について
初期表示設定している枠が表示されます

- 次回申し送りたい内容を入力すると、患者選択時にポップアップさせることができます ※薬歴簿に印字されます
グループ管理＞動作設定＞指導区分＞送りポップアップ する・しない

薬歴簿に印字したくない申し送りは
【患者情報】からご登録ください P.21記載



指導区分 変更
クリックすると選択肢が
表示されます

ボックス追加ボタン
クリック

- 指導対象者(薬歴簿印字されます)

- 医薬品の変更点を指導文へ反映したい

[医薬品差分]...表示している過去処方と今回処方を比較をし、
変更された内容を入力することができます

- 薬品名をドラック操作で引用

- 薬品名を左ワンクリック(タップ)でコピー状態になる

Ⅱ. 手早く、尚且つ、充実した指導内容を残す



服薬指導の要点

頭書き転記

医薬品差分

指導支援

[患者主観]...受診理由や経過観察、症状について選択すると
選んだ内容を元に生成された指導文が挿入されます

「薬局」「グループ」毎に
カスタマイズできます
指導文管理 > 患者主観

[医薬品]...医薬品毎の効能効果や副作用の注意など、
「確認」「指導」に関するテンプレートを入力できます
今回処方薬、前回処方薬、登録してある併用薬が対象です

単語を選んでクリックします
指導文が自動で生成されます

[重大な副作用]...副作用に関する注意喚起、確認した内容を、入力できます
今回処方薬が対象です
併用薬、残薬を含む場合はチェックボックスをクリック

複数の薬品に対して
共通する重大な副作用を登録
できます

[分類別]...分類毎に登録したテンプレートを利用できます

例) 慢性疾患 SOAPのセットを作
成すると、入力時間の短縮が
期待できます
指導文管理 > 分類別

Ⅱ. 手早く、尚且つ、充実した指導内容を残す

- 過去処方の指導文から、指導文を引用することができます
※Doボタンを使用不可にすることもできます(グループ毎に設定可)

過去処方 の 指導文

[Do]...過去処方 の 指導文から、指導文を引用できます
[S][O][A][P] ...区分毎にも引用することができます

服薬指導の要点		Do
S	腹部にかゆみがあるので皮膚科受診した。	→
O	[モーラステップ20mg]重大な副作用の「光線過敏症」の初期症状として、日の当たる部分が赤くなる・痛い・かゆい・水膨れ等なかったことを確認。	→
A	[リンデロン-V軟膏0.12%]主な副作用として、皮膚の刺激感等の症状がでることがあるため、気になる症状があれば相談するよう指導。	→

[確認]...薬歴ストーリー記録をサポート

服薬指導の要点		Do
S	腹部にかゆみがあるので皮膚科受診した。	→
O	[モーラステップ20mg]重大な副作用の「光線過敏症」の初期症状として、日の当たる部分が赤くなる・痛い・かゆい・水膨れ等なかったことを確認。	→
A	[リンデロン-V軟膏0.12%]主な副作用として、皮膚の刺激感等の症状がでることがあるため、気になる症状があれば相談するよう指導。	→

今回の服薬指導に必要な確認事項を忘れないように、システムが注意喚起して、継続的な患者サポートをアシストします

- 確認が表示される条件:[薬品名]+ 指導文の末尾が下記の文言 になっていること

注意 (注意・注意喚起ボタンで表示される文章)
-「等の症状がでることがあるため、気になる症状があれば相談するよう指導。」

注意喚起 (発現ボタンで表示される文章)

発現 -「等の症状がときどきでる。同じ症状が現れた場合は、直ちに連絡するよう指導。」

今回処方 の 指導文

服薬指導の要点		頭書き転記	医薬品差分	指導支援
S	腹部にかゆみがあるので皮膚科受診した。			+ ×
O	[モーラステップ20mg]重大な副作用の「光線過敏症」の初期症状として、日の当たる部分が赤くなる・痛い・かゆい・水膨れ等なかったことを確認。			+ ×
A	[リンデロン-V軟膏0.12%]主な副作用として、皮膚の刺激感等の症状がでることがあるため、気になる症状があれば相談するよう指導。			+ ×

服薬指導の要点		頭書き転記	医薬品差分	指導支援
S				+ ×
O	[リンデロン-V軟膏0.12%]主な副作用として、皮膚の刺激感といった症状がないことを確認。			+ ×
A				+ ×

〇〇といった症状がないことを確認。
前回の指導文と継続性のある文章が自動で挿入されます

服薬指導の要点

患者主観	医薬品	重大な副作用	分類別
標準	個人	薬局	好発時期 ● 全て ○ 初期 ○ 継続 ○ 常時
医薬品一覧 今回処方 アレグラ錠60mg トランサミンカプセル250mg			
指導文・内容 眠気 頭痛 体がだるい 下痢 腹痛 吐き気			
注意 確認 発現			

Ⅱ. 手早く、尚且つ、充実した指導内容を残す

■ 確認事項の入力について

同時に頭書き(表紙)を登録 することができます



確認事項		残薬記録	併用薬 F3	確認事項
●服薬状況・残薬状況		●手帳活用状況		
●他科受診・併用薬		●副作用		
●体調変化		●体質・アレルギー等		
●相互作用のある飲食物		●患者生活像・嗜好品		
●相談事項の要点		●後発品希望		
●調剤情報		●特記事項		

確認事項		残薬記録	併用薬 F3	確認事項
●服薬状況・残薬状況		●手帳活用状況		提示：継続して持参するよう説明
●他科受診・併用薬	あり(別途記載) (頭書きにも登録)	●副作用		発現なし (頭書きにも登録)
●体質・アレルギー等	胃が弱い (頭書きにも登録)	●相互作用のある飲食物		摂取なし (頭書きにも登録)
●患者生活像・嗜好品	お酒 (頭書きにも登録)	●相談事項の要点		なし
●後発品希望	しない	●調剤情報		

確認事項入力

頭書き一括選択

確認事項 (R5/01/02)
○頭書き

【定期処方】 クリア Do 上書モード

服薬状況/残薬状況

●手帳活用の有無
持参

●他科受診
頭書き

●副作用
頭書き

●体質/アレルギー
体質・アレルギーなし 貧血 便秘症 候補

●調剤情報
頭書きにも登録

背景ピンクの項目は、必須入力！(薬局毎に設定変更可)
【全体】グループ管理＞動作設定＞確認事項
【薬局毎】薬局管理＞動作設定＞確認事項＞薬局設定

クリックして選択します
フリー入力もできます

入力

■ 保存・保留をすると、頭書きに反映されます



頭書き		監査項目	頭書き	個別禁忌薬
●他科受診・併用薬	あり(別途記載)			
●副作用	発現なし			
●体質・アレルギー等	胃が弱い			
●患者生活像・嗜好品	お酒			
●後発品希望	希望する(全て)			
●調剤情報	一包化(理由:多剤による飲み忘れ防止のため)			



確認事項コメントが前回入力内容と変更された場合に、自動的に頭書きへ転記することができます！ ※設定必要
【全体】グループ管理＞動作設定＞確認事項＞頭書き自動転記 する・しない

	前回	今回
●後発品希望	希望する (R5/03/01)	希望する(全て) 希望しない(全て)
●頭書きにも登録		希望しない

Ⅱ. 手早く、尚且つ、充実した指導内容を残す

■ 保存について



F12

服薬指導データ 保存

指導者 ☐ 管理 太郎 ☒ 自分(管理 太郎)

指導日 R4/11/18

指導時刻 12 時 15 分 現時刻

キャンセル 保留 完了

- **キャンセル**: 保存をせずに服薬指導画面に戻る
- **保留**: 途中まで入力した内容を記録
(併用薬、検査値だけ先に登録しておきたい場合も保留する)
- **完了**: 入力内容を確定
確定後に追記や修正などは、ログとして記録される
- **指導者**: ログインしている薬剤師名が表示
- **指導日・指導時刻**:

患者の服薬指導画面を開いた時刻が初期値として表示

「保留」保存時は表示されている指導日・指導時刻で記録される

※初期表示の日時は目安なので、必ず日時を確認し完了を行ってください

■ 複数端末で同時に1人の患者を開いた場合の注意点

- ・右上に人型アイコンが点滅表示します
- ・後から「保留」「保存」した内容が残ります ※先に書いた薬歴が消えてしまいます
- ・患者データを見るだけの場合は、何も更新せずに画面を離れましょう



■ 間違えて「保留」ボタンをクリックした場合の対処方法

- ・「保留」から「未入力」に戻すことができます
- ・「来局者」タブから操作できます
- ・保留で記載された内容がすべて削除されます

状況	調剤日	受付番号	患者氏名
保留	R7/10/07 (8時間経過)	1	テイキ センコウビイビイコ
			定期 先後BB子

保留で記載された内容がすべて削除されます

キャンセル OK

■ 薬歴印刷時の日時について(2箇所印字)

指導日: R7/10/24 12:22

指導者: デモシステム管理者

指導対象者: 本人

《服薬指導の要点》

〈S〉
風邪をひいた。今日の2剤は以前にも別の病院でも出してもらったことがある。

〈O〉
ブルフェンは1回2錠ずつ服用です。

〈A〉
[フロモックス錠100mg]細菌による感染症を治療する抗生物質です。

[R7/10/24 20:45 薬剤師 太郎01]

- **オレンジ枠**: メディクス画面上に表示されている指導日・指導時刻が印刷される
- **緑枠**: 薬歴保存時のクラウドサーバー時刻(現時間)が印刷される
※端末の時刻を変更しても反映されません
- **変更履歴**: 確定後に追記や修正した履歴は、薬歴簿に印字される
- **保留**: 保留した時刻は印刷されない
※薬歴保存を完了せず、保留状態の場合は保留時刻が印字される

Ⅱ. 手早く、尚且つ、充実した指導内容を残す

■ 特定薬剤管理指導加算1

ハイリスク処方薬には「H」アイコンマークが表示されます

- H 特定薬剤管理指導加算1を算定している
- H 特定薬剤管理指導加算1を算定していない

イ: 新たに処方された場合(10点)

新規 H

R6/06/01 テスト総合病院 内科 (未入力)

R6/06/01 テスト総合病院 (内科) 内科 太郎

新規	ジャディアンス錠 10mg	RMP	DSU	1錠	H
新規	コンサータ錠 18mg	RMP		1錠	H

ハイリスク薬管理指導支援ガイダンス

分類名

【精神神経用剤】コンサータ錠 18mg

【糖尿病用剤】ジャディアンス錠 10mg

冷や汗が出る ☒ 気分が悪い ☒

強い空腹感 ☒ 寒気がする ☒

注意 確認 発現

入力

ハイリス

【糖尿病用剤】【ジャディアンス錠】な副作用の「低血糖」の初期症状が出る、気分が悪い等の症状がでめ、気になる症状あれば相談するよう指導。

ハイリスク薬の指導区分へ指導文が挿入されます

ハイリスク薬の注意事項

ハイリスク薬の注意事項

分類名

【精神神経用剤】

【糖尿病用剤】

患者に対する処方内容(薬剤名、用法・用量等)の確認

服用患者のアドヒアランスの確認 (Sick Day 時の対処法についての指導)

問題なし クリア

問題あり 問題なし

問題なし クリア

薬剤

ジャディアンス錠 10mg

管理指導

ハイリスク薬の製剤毎にある注意事項を入力できます

キャンセル 入力

- 新規 初めて処方された薬品(※メディックスのデータ上)
- 変更 用法/用量の変更がある

ロ: 指導が必要な場合(5点)

副作用が発現した
処方変更があったなど

変更 H

R6/06/06 テストB病院 内科、外科 の処方(未入力)

日数 カルナクリン錠 50 50単位 3錠

変更 メトグルコ錠 250mg 6錠 H

ハイリスク薬管理指導支援ガイダンス

分類名

【血液凝固阻剤】バイアスピリン錠 100mg

【糖尿病用剤】メトグルコ錠 250mg

冷や汗が出る ☒ 強い空腹感 ☒ 手足の震え ☒

注意 確認 発現

副作用の発現をクリック入力

服薬指導の要点

頭書き転記 医薬品差分 指導支援

S

前回処方との変更点
が転記されます

O

●用量変更: 3錠 → 6錠
メトグルコ錠 250mg

ハイリス

副作用の症状や体調変化など、
指導が必要と判断した理由を記載

■ 特定薬剤管理指導加算1 アラート

※特定薬剤管理指導加算1を算定しています。
以下の医薬品の指導が未入力です。

メトホルミン塩酸塩錠600mg
完了してもよろしいですか？

キャンセル OK

※全てのハイリスク薬に指導の記載がないと、アラートが表示されます。
※ハイリスク加算対象の医薬品ではない場合(疾患や先生判断など)、「OK」をクリックし薬歴を保存できます。



Ⅱ. 手早く、尚且つ、充実した指導内容を残す

■ 乳幼児アラート アラート表示間隔:グループ管理 > 動作設定

乳幼児加算を算定し、今回受付の検査値欄に体重が入力されていない場合は、服薬指導画面表示時に確認ダイアログが表示されます

乳幼児加算

乳幼児服薬指導加算を算定していますが3ヶ月以内に体重が記録されていません。
体重を入力してください。

閉じる



検査値

検査値入力 ※検査値は半角数字で入力してください

検査項目を医療機関毎にカスタマイズ

検査日 R5/01/16 検査日変更

すべての項目 クリア Do

検査項目	基準値下限/上限 単位	R5/01/05	今回
身体 - 体重	0 ~ 200 Kg		105
身体 - 身長	0 ~ 200 cm		17
身体 - 体表面積 ※ボタン押下で自動計算されます。	0 ~ 5 m ²		0.4049

コメント R5/01/05 今回

フリーコメント入力可

12/20 3歳検診
問題なし

入力

■ 手帳アラート

レセコンと薬歴記載で[手帳あり / なし]の整合性が取れない場合にアラートが表示されます

レセコンでは「手帳あり」の電算コードで入力されていますが、
確認事項の手帳情報に関する項目の記載が「持参」で始まっていません。

完了してもよろしいですか？

キャンセル OK



確認事項

残薬記録 併用薬 確認事項

確認事項入力

頭書き一括選択

● 確認事項 (R5/01/02)

○ 頭書き

一括入力 クリア Do 上書きモード

服薬状況/残薬状況

良好→残薬量と、来局間隔より

初回来局 不良：来局間隔期間が開いている
不良：症状軽くなったため自己判断で服用減 候補

クリア

● 手帳活用の有無

持参

提示：継続して持参するよう説明 提示：前回手帳忘れ(シール貼付確認)
忘れ：シールお渡し(次回貼付確認) 候補

忘れ：シールお渡し(次回貼付確認) クリア

■ その他 加算アラート グループ管理 > 動作設定 > 指導区分 > 加算選択 > 入力必須

各加算を算定すると、自動的に指導区分ができます
「必須入力」の設定にしている場合、記載しないと
薬歴を保存できません

必須の指導区分が入力されていません。[麻薬指導加算]

OK



一包 吸入指導

麻薬 経管投薬

自家製剤

グループ共通の設定です

Ⅲ. 疑義照会の登録方法

■ 疑義照会の登録方法

●問い合わせ日時：服薬指導画面に表示される、「指導日」欄の日時から15分前が自動入力される

※保存した薬歴に対して後から疑義を追加した場合は、指導日時
の15分前ではなく、実際に薬歴を保存した時刻の15分前になります

●薬歴に印刷するか：薬歴に疑義照会の内容を印刷するか否か

●次回区分：

確認不要：今回一時的に発生した疑義に使用

疑義確認済み：次回以降、同じ処方があった場合に確認すべき疑義

毎回薬歴に記載：次回以降、同じ処方があった場合に薬歴に残すべき疑義

※自動で毎回薬歴に記載されるわけではありません

●Do登録：過去の疑義照会を選択しDo登録や編集を行うことができる

新規 ロキソニン錠60mg 3錠 登録

Ⅳ. 患者情報の登録 ○薬歴簿の表紙の充実

■ 監査項目

チェックした項目と今回処方医の医薬品を処方監査します

頭書き 監査項目 頭書き 個別禁忌薬

監査項目

処方欄に妊娠アイコンが表示されます。

妊娠・授乳婦 今回処方の医薬品との処方監査を実施します。

☒ 妊娠婦 ☒ 授乳婦

出産予定日 出産予定日から平均妊娠週数40週を逆算して週数を表示します。あくまで目安です。

例) 2023/4/11 または 2017/4/11

処方監査・指導支援に アイコンが表示されます。

嗜好品

☒ アルコール ☒ たばこ ☒ コーヒー(カフェイン) ☒ お茶(タンニン酸)

飲食物

☒ 乳製品(高カルシウム食) ☒ グレープフルーツ ☒ セイヨウオトギリソウ ☒ 納豆

☒ クロレラ ☒ 青汁 ☒ ミネラル入りビタミン剤 ☒ ビタミンを含む食品

☒ 大量の緑黄色野菜

予防接種

☒ ワクチン ☒ 生ワクチン

生活環境

☒ 運転 ☒ 高所での作業

処方欄に疾病アイコンが表示されます。

疾病 ※有料オプション

☒ 認知症 ☒ 脳梗塞 ☒ 胃潰瘍 ☒ 糖尿病

☒ 緑内障 ☒ 卵アレルギー ☒ 片頭痛 ☒ うつ病

☒ アスピリン喘息 ☒ 膝うつ病 ☒ 統合失調症 ☒ 不眠症

入力

■ 指導支援＞医薬品

登録した監査項目と関連する指導文を含む医薬品がある場合、指導文に「体質」の項目が表示されます

医薬品		重大な副作用	分類別	患者主観	
●標準 ○個人 ○薬局 ○グループ					
医薬品一覧		区分	見出し	指導文・内容	使用履歴
今回処方		体質	摂取制限(納豆・クロレラ・青汁・納豆菌・ビタミンK・セイヨウオトギリソウ・緑黄色野菜・アルコール)	納豆やクロレラ、青汁や納豆菌、ビタミンKを含むOTC薬やサプリメント、セイヨウオトギリソウを含む健康食品はとらないよう指導。ビタミンKを多く含む緑黄色野菜は一度に大量に食べないこと、またアルコール類は控えるよう指導。	
ワーファリン錠1mg					
メトグルコ錠250mg					
ザイザル錠5mg					
グラケカブセル15mg			効能効果【詳細版】	血液が固まるのを抑え、血栓(血液の固まり)ができるのを防ぐ薬です。血液を固まらせる物質の合成を促すビタミンKの働きを抑えます。	1回 R3/03/05

■ 今回処方エリア

監査で該当がある場合にアイコンが表示されます

新規	ノルバスク錠 5mg	1錠	併注 適応症 妊娠
新規	ワーファリン錠 5mg	1錠	H 併注 妊娠 疾病

● 妊娠・授乳婦: 今回処方の医薬品との処方監査を実施します 監査で該当した場合、医薬品横に「妊娠」アイコンが表示されます

● 出産予定日: 出産予定日から平均妊娠週数 40週を逆算して週数を表示します
40週までは何週経過したかを表示し、40週以降は一律「40週目経過」と表示されます

● 疾病: 禁忌、原則禁忌に該当する医薬品が処方された場合、「疾病」アイコンが表示されます
※患者の疾病がわからない場合でも、処方薬から適応症を自動判別し、禁忌に該当する医薬品が処方された場合 「適応症」アイコンが表示されます

● 嗜好品、飲食物、予防接種、生活環境: 登録した項目と相互作用のある医薬品が処方された場合、処方監査内でアイコンが表示されます



Ⅳ. 患者情報の登録 ○薬歴簿の表紙の充実

■ 頭書き

頭書き(表紙)を登録します(処方監査にかかりません)

(R4/07/20) 緑・・・本日入力日付
(R4/05/23) 黒・・・半年以内に登録されている
(R3/04/12) 赤・・・登録して半年以上経過
→頭書き更新時期アラート

※変更がなくても、3～6か月おきに確認されている
履歴(確認日付)が必要です 一括更新機能が便利!



■ 登録後の頭書き編集・非表示

登録された「頭書き」の内容をクリックします

● Do: 前回の内容をそのままコピーすることができます

※システム管理者で「Do」ボタンの表示・非表示の設定が可能です

表示方法(全てまたは直近のみ)、印刷時の表示の有無が変更できます (グループ管理>確認項目>各項目)

● 上書きモード: オン・オフすることで、項目ボタンを選択した際の挙動を切り替えられます

※各項目ボタンの内容などはシステム管理者で設定が可能です

● 編集: 既存の頭書きの入力内容を上書きする場合に使用します

● 複製して登録: 既存の入力内容を保持して新たに追加する場合に使用します

Ⅳ. 患者情報の登録 ○薬歴簿の表紙の充実

■ 個別禁忌薬（左側）

過去に副作用が発現した医薬品を登録します
同一成分の医薬品が処方された場合に監査がかかります

■ 併用薬（右側）

併用薬（OTCはオプション）を登録し、今回処方および処方が残っている前回処方薬に対して処方チェックを行います

- **個別禁忌薬**：服薬指導画面では、該当する医薬品に「個別禁忌薬」マークが表示されます
疑義照会内容の登録画面へ遷移できます
今回処方欄の右上にアラートが表示されます

- **併用薬**：YJコードがない医薬品は、相互作用のチェックがかかりません（個別禁忌薬同様）
未入力の薬歴に先に併用薬だけ登録する場合は、登録後に「保留」で保存してください

Ⅳ. 患者情報の登録 ○患者様の情報、かかりつけ薬剤師情報

■[患者情報]

患者名の下に表示される情報を編集します
頭書き(表紙)には印字されません ※かかりつけ情報は印字されます

フクスウ キカンイイタ
複数 機関EE太 様
S34/07/07(63歳1ヶ月) 家族あり
メモ 患者情報 処方歴 他店舗

秘密メモ
S34/07/07(63歳1ヶ月) 家族あり
メモ 患者情報 処方歴 他店舗

患者情報
一包化 (マグミットはヒート)
☐ ☐ ☐ ☒ 服薬指導時にポップアップ表示する

アイコン
★ ☆ ✎ 📎 📌 📺

ラベル
一包化 後発× アフターフォロー
6項目設定できます
ラベルの追加・削除
Filter labels
✓ ● 一包化

かかりつけ情報
薬剤師名 登録日 終了日
デモシステム管... 自分にする R05/04/06

かかりつけ情報 (連携)
薬剤師名 登録日 終了日
管理 花子 自分にする R06/05/07

入力

患者一覧から
抽出できます

フクスウ キカンイイタ
複数 機関EE太 様
S34/07/07(63歳1ヶ月) 家族あり
メモ 患者情報 処方歴 他店舗

一包化 (マグミットはヒート)
★ ☆
一包化 後発× アフターフォロー
初回来局日: R4/07/02 前回来局日: R4/08/27 (2日ぶり)
次回来局日の目安: R4/09/11
かかりつけ薬剤師: メディクス管理者 (R4/03/19) 代理: 大阪 花子 (R4/07/27)

患者検索 来局者一覧

S34/07/07 63歳
フクスウ キカンイイタ
複数 機関EE太
★ ☆ 一包化 後発×
アフターフォロー
注 写
〇〇病院 か メディクス管理者

■かかりつけ薬剤師 薬歴簿印字

薬剤服用歴管理記録
複数 機関EE太 (フクスウ キカンイイタ) S34/07/07
第1住所: 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-9-10 KDC渋谷ビル8階
《かかりつけ》 かかりつけ薬剤師名: メディクス管理者 登録日: R4/03/19
《代理かかりつけ》 代理かかりつけ薬剤師名: 大阪 花子 登録日: R4/07/27

■かかりつけ薬剤師アラート

かかりつけ指導料を算定しています。
服薬指導画面の患者情報ボタンを押して、かかりつけ情報を登録してください。
OK

レセコン: かかりつけ算定
メディクス: かかりつけ情報なし

整合性がとれないので、
アラートが表示されます！

IV. 患者情報の登録 ○他店舗での薬歴情報

■ 他店舗

同一法人内で同じ患者の他店舗への来局歴がある場合に、他店舗での薬歴情報を参照(過去1年分)、転記することができます

※「カナ氏名」「生年月日」が一致する患者

※他店舗適用範囲は近隣都道府県です



テスト ニュウヨウジ

テスト 乳幼児 様

H31/02/05(3歳6ヶ月)

メモ

患者情報

処方歴

他店舗



- 他店舗** 過去3ヶ月以内に来局歴あり
- 他店舗** 過去1年以内に来局歴あり
- 他店舗** 「カナ氏名」「生年月日」は一致するが「漢字氏名」が一致しない
- 他店舗** 来局歴情報なし(クリックできない)

保険情報		住所	電話番号
国保 保険者: 123456 記号番号: 111・222		〒1500002 東京都渋谷区 渋谷3-9-10	0001112222

他店舗情報					
※背景がグレーの情報はかなと生年月日は一致だが漢字が不一致					
店舗名	保険情報	住所/電話番号	医療機関名	状況	調剤日
メディクス調剤薬局 日比谷店	不明 保険者: 記号番号: ・	〒1500002 東京都渋谷区 渋谷3-9-10 0001112222		指導済	R4/02/17
あいうえおクリニック	国保 保険者: 123456 記号番号: 111・222	〒1500002 東京都渋谷区 渋谷3-9-10 0001112222	総合こどもクリニック 小児科	未入力	R3/12/20

参照したい
調剤日をクリック

他店舗情報

テスト ニュウヨウジ

テスト 乳幼児 様

H31/02/05(3歳6ヶ月)

調剤日 R3/12/20【2】

指導日 R3/12/20 00:00

R3/12/20

指導者

指導対象者 家族: 母

1 選 小児用ムコソルバンDS1.5% 0.78g

選 ムコタインDS50% 0.78g

選 オノンドライシロップ10% 0.91g

分2 朝夕食後 7日分

初回来局日: 最終来局日:

薬剤服用歴管理料(3月以内)

乳幼児服薬指導加算

【参照できる情報】

- 基本情報 ● 頭書き ● 処方内容 ● 写真
- 指導内容 ● 検査値 ● 在宅報告書 ● 情報提供書

● 後発品変更希望 希望する(全て) (R4/04/19)

● 調剤情報 乳幼児 (R4/04/19)

● 特記事項 休養中 (R4/04/19)

S ツロブテロールテープうまく貼れたことを確認。

O [カルボシステインDS50%「タカタ」]主な副作用として、下痢、吐くといった症状がないことを確認。

自薬局へ転記

【他店舗から転記できる情報】

- 頭書き
- 禁忌薬
- 処方薬(併用薬として転記)
- 併用薬(")

転記したい
項目をクリック

他店舗から転記

頭書き

● 他科受診・併用薬

☐ 他科受診・併用薬なし(R4/04/19)

● 副作用歴

☐ 副作用歴なし(R4/04/19)

キャンセル 一括選択 **登録**

頭書きに転記した内容は即座に保存されます。併用薬に転記した内容は服薬指導保存時に保存されます。
頭書きの確認日は本日に設定されます。

V. 情報提供書の作成 / 印刷

■ 情報提供書

用途にあわせてフォーマットを選択し、作成します。

※薬歴簿印刷時に情報提供書を印刷することが可能

詳細: マニュアル 服薬指導入力業務操作マニュアル 4.1.15 情報提供書

作成

提供書フォーマット選択

服薬状況等に係る情報提供書

服薬状況等に係る情報提供書

重複投薬等に係る報告書

服用薬剤に関する情報提供書

吸入指導の報告書

作成

服薬状況等に係る情報提供書作成

服薬情報等提供料に係る情報提供書

提供日 必須 R6/07/12

宛先 必須

患者職業

処方薬の情報

1 アレグラ錠 6.0 mg トランサミンカプセル 2.5 0 mg フスコデ配合錠
イソジンガーグル液 7 %

併用薬剤等 (一般用医薬品、医薬部外品、いわゆる健康食品を含む。) の情報

2 処方薬剤の服薬状況 (アドヒアランス) 及びそれに対する指導に関する情報

3 患者の訴え (アレルギー、副作用と思われる症状等)、患者の薬剤服用に係る意向に関する情報

削除 入力

入力

印刷

＜注意＞
薬歴を保留・保存前に
情報提供書を印刷すると、
薬剤師名が印字されません

検査値 処方監査 訪問 情報提供書 保存 F12

服薬状況等に係る情報提供書

作成 編集 印刷

提供日 R4/12/28 職業

宛先 [処方箋の医療機関]
山田 太郎様

情報提供書の概要 シムビコートタービュヘイラー 6.0 吸入 吸入指導について

1. 処方薬の情報 シムビコートタービュヘイラー 6.0 吸入

6. その他 吸入法再確認。用法用量確認。息止め・息吐き・吸入速度吸入の深さ・吸入回数・うがい問題なし 症状悪化あればDrに相談すること指導。

服薬状況等に係る情報提供書

山田 太郎様

新履リセット薬局 令和4年12月28日
広島市南区大津野町
電話 082-236-9563
(FAX) 082-
保険薬剤師氏名

患者氏名 性別 (男性) 生年月日 昭和34年07月01日 (63歳5ヶ月)
住所 東京都渋谷区渋谷3-9-10 KDC渋谷ビル6階
電話番号

処方箋発行日 令和4年12月01日 指示日 令和5年01月01日

情報提供書の概要 シムビコートタービュヘイラー 6.0 吸入 吸入指導について

1. 処方薬の情報 シムビコートタービュヘイラー 6.0 吸入

6. その他 吸入法再確認。用法用量確認。息止め・息吐き・吸入速度吸入の深さ・吸入回数・うがい問題なし 症状悪化あればDrに相談すること指導。

・情報提供書を書いた患者様を 抽出することができます
期間指定し、件数の把握をすることも可能です

来局者 全患者 訪問

情報提供書 ☐ あり

> 来局者 > 情報提供書あり > 検索

VI. 電話対応等の記録、薬歴の追記

■ 薬歴画面

「全患者一覧」で選択した患者、またはメニューバー「薬歴」から遷移する画面です

※保存(完了)した薬歴を修正した場合は履歴が残ります

■ イベント追加

処方と紐づけせずに患者様の記録を残す
(電話対応、投薬後フォロー内容など)

VII. 写真で取り込んだ画像の閲覧 / Google Mapの活用

■ 写真の活用

処方箋や残薬、お薬手帳、問診票など記録に残すことができます
登録できるファイル形式:PNG、JPG、GIF、BMP、PDF
ファイルサイズの上限:8MB



常に表示する写真(4枚)

過去処方箋に紐づく写真(2枚)

今回処方箋に紐づく写真(2枚)

写真

① 写真追加

＜ピン止め＞
優先して表示したい画像
はアイコンクリック

4枚以上登録 OK

写真

処方箋

写真

① 写真追加

ここにファイルを
ドロップして下さい

★iPad画面

② 写真ライブラリ

写真またはビデオを撮る

ファイルを選択

③ 再撮影

④ 写真を使用

⑤ OK

■ Google Mapの活用

レセコンで入力された第一住所が反映されます
薬の配達などをする際に便利な機能です

薬歴
患者基本
頭書き
写真

タテンボ シンキ
他店舗 新規 様


S47/03/03(57歳 1ヶ月) 0300010001 東京都渋谷区渋谷1-11-111

患者情報 処方 主治

＜住所・電話番号＞
患者名にカーソルをあてると、住所・電話番号が表示されます

第1住所種類	
第1郵便番号	100-0011
第1住所	東京都渋谷区渋谷1-11-111
第1電話番号	0300010001
第1FAX番号	

地図



VII. 患者様に有効な情報を提供する / 薬剤師IDごとに上部の色を変更 / 店舗切替

■ RMP資材

RMP対象薬剤の横に表示され、クリックすると RMP情報が確認できます

RMP 深緑: 患者向けRMP資材があり、特定薬剤管理指導加算3を算定している薬剤

RMP 黄緑: 患者向けRMP資材があり、特定薬剤管理指導加算3を算定していない薬剤

RMP 白: 患者向け資材がない、RMP対象薬剤(点数算定不可の可能性)

■ DSU(医薬品安全対策情報)の確認

毎月DSUの情報更新を行っています

■ 指導箋の確認

医薬品に対して指導箋が設定されている場合にアイコンが表示されます



システム共通の指導箋



グループ毎に設定した指導箋
グループ管理>動作設定>指導箋



■ 店舗切替

どの店舗にログインできるか薬剤師毎に制限できます
※システム管理者は全店閲覧できます

■ 薬剤師IDごとに上部の色を変更(誤ログイン防止)

Ⅷ. 定型文作成方法(操作マニュアル 指導文管理機能 抜粋)

■ よく使用する指導文を定型文登録(個人・薬局・グループ) 指導文管理>分類別>個人・薬局・グループ>新規作成

1 設定 2 分類別 3 個人 4 新規作成

5 クリックして選択(フォルダ作成のイメージ)

6 見出し入力
同じ見出しは使えません
例) 糖尿1・糖尿2

7 クリックしてどの指導区分に
反映するか選択します

8 + 指導文を追加

9 ボックスを追加します
SOAPのセットなど
一括で入力できるセットを
作成できます

■ よく使用する指導文を薬歴入力画面から定型文登録 服薬指導の要点>右下+ボタン>医薬品・分類別>追加

1 指導文を追加します。宜しいです。

2 登録先 必須 分類別 2

3 指導区分 A

4 分類 必須 A 3

5 見出し 必須 糖尿 1 4

6 指導文 いつもの薬と変わり(5)いことを説明。用法・用量確認血糖コントロール良好。

7 閉じる 追加 6

8 医薬品
(指導支援>医薬品>個人)
医薬品に紐づく定型文の登録

9 分類別
(指導支援>分類別>個人)
一つの指導区分ずつの登録

■ 使用するには... 指導支援>医薬品・分類別

患者主観	医薬品	重大な副作用	分類別
○個人 ○薬局 ●グループ	検索キーワード		
分類	S	特に変わりなし。	
施設	O	定期Do処方 日	
SOAP	A	いつもの薬と変わる副作用なし。	
	P	次回食事状況を	

◎ マニュアル、お問い合わせ

■ ヘルプページ確認方法

画面上部→右上「？」マークをクリック＞薬歴・お問い合わせフォーム



■ 遠隔サポート

薬局様の画面を見ながら遠隔でサポートいたします
「Team Viewer(チーム ビューア)」アイコンをクリック



■ MEDIXS薬歴

「よくある質問」「マニュアル」など閲覧できます
「薬歴」をクリック



■ 運用管理規定

「ドキュメント・ツール」にてダウンロードできます(Word)
その他ドキュメントのご用意もございます。



■ お問い合わせ

電話または、お問い合わせフォームからお問い合わせいただけます
「お問い合わせフォーム」をクリック

電話でのお問い合わせ

株式会社メドレー 電子薬歴メディクスサポート

03-6427-3067

対応時間：月～金(祝祭日除く)9:00～18:00