
(a) W2: 50–500 µm (primary)
Meuse (FTIR) (a = −2.29, n = 11)
Dommel (FTIR) (a = −2.35, n = 22)
Rhine (LDIR) (a = −2.98, n = 2)
Lek canal (LDIR) (a = −3.76, n = 2)
Dutch rivers
Carmel (a = −2.50, n = 15)
Pajaro (a = −3.71, n = 14)
Salinas (a = −2.49, n = 17)
San Lorenzo (a = −2.98, n = 14)
This study
10^2
10^3
10^4
Concentration (particles m^{-3})
(b) W1: 1–5000 µm (extrapolated)
Meuse (FTIR) (a = −2.29, n = 11)
Dommel (FTIR) (a = −2.35, n = 22)
Rhine (LDIR) (a = −2.98, n = 2)
Lek canal (LDIR) (a = −3.76, n = 2)
Dutch rivers
Carmel – single slope (a = −2.92, n = 15)
Carmel – two-segment (a = −2.44 | −3.17, n = 15)
Pajaro – single slope (a = −2.92, n = 14)
Pajaro – two-segment (a = −2.44 | −3.17, n = 14)
Salinas – single slope (a = −2.92, n = 17)
Salinas – two-segment (a = −2.44 | −3.17, n = 17)
San Lorenzo – single slope (a = −2.92, n = 14)
San Lorenzo – two-segment (a = −2.44 | −3.17, n = 14)
This study
10^4
10^5
10^6
10^7
10^8
Concentration (particles m^{-3})
Dataset
Dutch rivers
This study
Technique
µFTIR
FTIR
LDIR
RIVM published