

JAHASAENGRYUK Sol'n.

일반의약품 ^{보류번호} : 329

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

자하생력액은 허약체질, 육체피로, 식욕부진 때에 영양을 보급해 주는 자양강장제입니다.

【제품명】 자하생력액

【원료약품 및 그 분량】1병(20mL) 중

•유효성분 : 자하거엑스(별규) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
니코틴산아미드(KP) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
리보플라빈포스페이트나트륨(KP) · · · · · · · · · · · · · · · · · 6.85mg
카페인무수물(KP) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
피리독신염산염(KP)······5mg
티아민질산염(KP) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
※ 동물유래성분 : 지하거엑스(인태반)
•첨가제(보존제) : 벤조산나트륨 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

•기타 첨가제 : 농글리세린, 백당, 베타시클로덱스트린, 수크랄로스, 염화나트륨, 정제수, 진생후레 바 진저엘엣센스, 카라멜색소, D-소르비톨액, DL-사과산

【성상】진한 갈색의 액이 갈색유리병에 든 내용 액제

【효능·효과】 자양강장, 허약체질, 육체피로, 병후의 체력저하, 식욕부진, 영양장애, 발열성·소 모성질환

【용법·용량】성인 1일 1회, 1회 1병 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

이 약은 유효성분으로서 사람 태반 유래 성분을 함유하고 있으며, 원재료인 사람 태반을 제공하기로 동의한 임산부에 대하여 문진과 여타 감염증의 미감염 사실을 확인하고, 제조공정 중 바이러스 불활 성화 괴정 등을 통하여 감염증의 전파를 방지토록 하고 있으나, 사람 태반을 원재료로 사용하여 제조 한 것이므로 그 유익성이 위험성을 상회(웃돎)하는 경우에만 복용할 것

경남제약[주]

2 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응이 있는 환자
- 2) 레보도파 성분의 약을 복용하는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 카라멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 괴민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사. 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부, 수유부

5 이 약의 복용으로 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 구역, 구토, 묽은 변, 속쓰림이 나타나는 경우
- 2) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대시하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으키는 경우
- 3) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하여(이 약 1병(20mL) 중 피리독신염산염 5mg 함유) 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타나는 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 일정기간 복용하여도 증상의 개선이 없거나 익화될 경우에는 의사 또는 약시와 상의한다. 참고 로, 이 의약품을 2주 이상 복용한 경우 증상의 개선이 없었다는 임상시험결과가 보고된 바 있다.
- 3) 이 약은 경구용으로만 사용하고 주사용으로는 사용하지 않는다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
- 3) 오(잘못 사용) · 남용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

【포장단위】1병(20mL/병), 30병(20mL/병 X 30), 40병(20mL/병 X 40), 60병(20mL/병 X 30)X2), 80병(20mL/병 X 40)X2), 90병(20mL/병 X 30)X3), 90병(20mL/병 X 90)

【저장방법】차광기밀용기, 실온(1∼30℃)보관

【제조원】경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49

- ※ 본 제품은 DMF(Drug Master File, 원료의약품 신고제도)로 원료의약품에 대한 안전관리를 입 증하였습니다.
- ※ 기타 주의
 - 1. 허가된 효능 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 - 2 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다. 소비자 상담전화: 080-232-8600, www.kyungnampharm.com
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원 회고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- ※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템「http://nedrug.mfds.go,kr, →「의약품 등 검색」을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)