

답답한 코! 시원하게!

미놀

노즈 점비액
시원한 멘톨향

복용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

일반 의약품

분류번호 : 132

【제품명】 미놀노즈점비액

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중

- 유효성분 : 자일로메타졸린염산염(USP)..... 100mg
- 첨가제(보존제): 벤질코늄염화물..... 4mg
- 기타 첨가제: 에데트산나트륨수화물, 염화나트륨, 유칼리유, 인산수소나트륨수화물, 인산이수소나트륨, 정제수, 폴리옥실40하이드로제네이티드캐스터오일 D-소르비톨액 L-멘톨

【성상】 박하향의 무색 내지 미백색의 액체가 함유된 분무제

【효능·효과】 코감기(급성비염(코염)), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 머리무거움

【용법·용량】 만 12세 이상의 청소년 또는 성인에게 1일 3회의 범위에서, 1회 1번 각 비강(코안)에 분무한다(뿌린다). 적용간격은 8시간 이상으로 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 만 12세 미만의 어린이
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약(비염(코염)용 분무제 포함)에 의해 알레르기 증상에 : 발열, 발진 · 발적(총혈되어 붉어짐), 부종(부기), 자극감, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 고혈압, 심장질환, 당뇨병, 갑상선질환, 녹내장 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 5) 수유부 : 이 약이 모유로 분비되는지 알 수 없으므로, 이 약은 의사, 치과의사, 약사의 지시 · 감독하에 사용해야 한다.
- 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 7) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 사용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진 · 발적(총혈되어 붉어짐), 부종(부기), 자극감, 가려움
- 2) 3일간 사용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
- 2) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 일으킬 수 있으므로 과도하게 사용하지 말 것
- 3) 이 약은 비염(코염)용 분무제로만 사용하고, 눈과 귀에는 사용하지 말 것
- 4) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 말 것.
- 5) 7일 이상 계속 사용하지 말 것
- 6) 사용 시에는 음주하지 말 것
- 7) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용할 것.
- 8) 이 약은 벤질코늄염화물을 함유하고 있어, 기관지 경련을 일으킬 수 있으며, 특히 장시간 사용 시 비강 내 자극이나 종창(부기), 비강 점막의 부종을 유발할 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10mL/플라스틱병, 15mL/플라스틱병, 20mL/플라스틱병

【제 조 자】 (주)퍼슨

충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 47

【제조외파지】 경남제약(주)

충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49

【소비자상담전화】 080-232-8600, www.kyungnampharm.com

※ 기타 주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.


※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 약품의 용어설명 및 기타 자세한 약품 정보는 약품통합정보시스템 「<http://nedrug.mfds.go.kr>」 → 「약품 등 검색」을 참조하시기 바랍니다.


※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 사용방법

- 본 제품 구입 후 최초 사용 시에는 반드시 용기를 잘 흔든 후 5~10회 공기 중에 분사시켜 균일하게 뿌려질 수 있도록 한 후 코에 사용합니다. 이후 사용하실 때에는 단 1회만 공기중에 분사시킨 후 코에 사용하면 됩니다.
1. 먼저 코를 잘 뚫 다음 용기를 충분히 흔들고 뚜껑을 여십시오.
 2. 용기를 《사용법1》과 같이 잡으시고 공기 중에 분사시킵니다.
 3. 《사용법2》와 같이 용기의 끝을 콧구멍에 넣고, 지시된 투여 횟수 만큼 뿌려주십시오.
* 지시된 횟수 이상으로 사용하지 마십시오.
 4. 사용한 용기는 뚜껑을 닫고 똑바로 세운 상태로 보관하십시오.



《사용법1》



《사용법2》

경남제약(주)

FSP0309-N03
첨부문서 작성연월일 2023. 11. 23