

ETOLOGÍA


COMPORTAMIENTO RELACIONADO CON LA SEPARACIÓN CANINA

INTEGRANTES:

- MAGALLANES ALMEYDA KATERIN
- QUISPE YATACO KARLA
- MEDINA AYARZA GABRIELA
- ESPINO BONIFACIO MATILDE



CONTENIDOS



01

INTRODUCCIÓN

02

PREVALENCIA DE
CONDUCTAS RELACIONADAS
CON LA SEPARACIÓN

03

CONDUCTAS ESPECÍFICAS
MÁS FRECUENTES

04

VARIABLES ASOCIADAS
SIGNIFICATIVAMENTE

05

FACTORES DE RIESGO
(MODELO DE REGRESIÓN
LOGÍSTICA)

FACTORES PROTECTORES

06

COMPARACIÓN CON
EL ARTÍCULO CIENTÍFICO


07

RECOMENDACIONES

08

CONCLUSIONES








INTRODUCCIÓN



- Las conductas relacionadas con la separación (SRB) son problemas de comportamiento que aparecen cuando un perro permanece solo o separado de su propietario.
- Estas conductas incluyen vocalizaciones excesivas, destrucción de objetos, eliminación inadecuada y movimientos repetitivos, afectando el bienestar del animal y la convivencia con sus propietarios.
- Como referencia se utilizó el artículo científico "Canine separation-related behaviour at six months" de Dale et al. (2024), el cual evalúa los factores asociados al desarrollo de estas conductas en cachorros mediante un estudio longitudinal.
- A partir de este artículo y de la base de datos proporcionada, se realizó un análisis estadístico para identificar los principales factores relacionados con la presencia de SRB.



PREVALENCIA DE CONDUCTAS RELACIONADAS CON LA SEPARACIÓN





conducta_relacionada_separacion	Nº	porcentaje
No	87	60.0%
Sí	58	40.0%

Aproximadamente 4 de cada 10 cachorros presentaron conductas relacionadas con la separación.




CONDUCTAS ESPECÍFICAS MÁS FRECUENTES



conducta	n	porcentaje
camina_de_un_lado_a_otro	19	13.1
gira_en_circulos	17	11.7
destruye_objetos	14	9.7
lloriquea_gime	14	9.7
orina_inadecuada	9	6.2




VARIABLES ASOCIADAS SIGNIFICATIVAMENTE



variable	p_valor
respuesta_mala_conducta_relajado_6m	<0.001
sueno_nocturno_16sem	<0.001
progreso_entrenamiento_higienico_16sem	<0.001
premio_entrenamiento_16sem	<0.001
espacio_cerrado_16sem	0.001
edad_adquisicion	0.003
respuesta_mala_conducta_sin_atencion_6m	0.005
sexo	0.011
respuesta_al_retorno_6m	0.037
tipo_raza	0.038



FACTORES DE RIESGO (MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA) Y PROTECTORES



Característica	OR	85% CI	p-value
Sueño nocturno a ≤18 semanas			
10+ horas	—	—	
6-8 horas	31.5	5.78, 248	<0.001
9 horas	22.3	4.21, 168	<0.001
No específica	27.0	3.64, 260	0.002
Uso de espacio cerrado a ≤18 semanas			
Espacio cerrado nocturno	—	—	
Espacio cerrado solo de día	5.18	1.26, 26.4	0.031
Sin espacio cerrado	13.7	3.13, 80.1	0.001
Progreso de entrenamiento higiénico a ≤18 semanas			
0-3 accidentes/semana	—	—	
4+ accidentes/semana	27.1	5.54, 179	<0.001
Premio usado en entrenamiento a ≤18 semanas			
Premio especial o croqueta nueva	—	—	
Premio habitual/no especial	0.19	0.05, 0.59	0.007
Respuesta ante mala conducta sin atención a 8 meses			
≤1 técnica aversiva	—	—	
≥2 técnicas aversivas	8.32	2.04, 42.5	0.005
No presentó mala conducta	1.30	0.29, 5.49	0.7
Respuesta ante mala conducta al relajarse a 8 meses			
≤1 técnica aversiva	—	—	
≥2 técnicas aversivas	9.69	1.59, 68.7	0.017
Time-out/ignorar/retrasar atención	26.7	6.17, 150	<0.001
Respuesta del propietario al retorno a 8 meses			
No presentó mala conducta	—	—	
Respuesta calmada/otra	0.27	0.04, 1.54	0.14
Saludo efusivo/caricias/juego	1.24	0.20, 8.14	0.8
Edad del propietario			
15-34	—	—	
35+	0.35	0.04, 1.34	0.10

COMPARACION CON EL ARTÍCULO CiENTiFiCO

LOS RESULTADOS COINCIDEN CON EL ARTÍCULO CiENTiFiCO REVISADO?

Sí, nuestros resultados coinciden con el artículo de Dale et al. (2024).

- El sueño adecuado y el uso de un espacio cerrado durante la noche se asociaron con menor riesgo de SRB.
- Las técnicas aversivas, el entrenamiento higiénico deficiente y las respuestas negativas del propietario aumentaron el riesgo de SRB.
- Ambas investigaciones destacan la importancia de prácticas de manejo y entrenamiento positivo desde etapas tempranas.



RECOMENDACIONES PRACTICAS PARA PROPIETARIOS



- ESTABLECER RUTINAS DE SUEÑO ADECUADAS PARA FAVORECER EL DESCANSO NOCTURNO
- ACOSTUMBRAR PROGRESIVAMENTE AL COCHORRO A PERMANECER SOLO EN UN ESPACIO CERRADO Y SEGURO



- COMPLETAR CORRECTAMENTE EL ENTRENAMIENTO HIGIENICO PARA REDUCIR ACCIDENTES
- EVITAR EL USO DE CASTIGOS, GRITOS Y TECNICAS AVERSIVAS




- UTILIZAR METODOS DE ENTRENAMIENTO BASADOS EN REFUERZOS POSITIVO (PREMIOS , ELOGIOS , JUEGO)
- MANTENER INTERACCIONES CALMADAS Y CONSIENTES. ESPECIALMENTE AL REGRESAR AL HOGAR

CONCLUSION

- El 40% de los cachorros evaluados presentó conductas relacionadas con la separación.
- El análisis identificó factores de riesgo y protectores importantes relacionados con el sueño, el uso de espacio cerrado, el entrenamiento y la respuesta del propietario.
- La prevención temprana y el manejo adecuado son clave para reducir el desarrollo de estas conductas y mejorar el bienestar del cachorro y la convivencia familiar



A small, stylized orange and white dog is shown in mid-jump, surrounded by a cloud of grey, oval-shaped confetti. The dog has a white patch on its chest and a white stripe on its back.

¡GRACIAS!

